



◆1980年代以降、がんの罹患率（粗罹患率）は男女とも増加し続けている。
 ◆男性では、肺がん、大腸がん、前立腺がんの割合が増加し、胃がんの割合が減少。
 ◆女性では、大腸がん、乳がんの割合が増加し、胃がんの割合が減少。
 ◆The crude incidence rate of cancer has been continuously increasing since 1980's.
 ◆For males, the proportion of lung, colon/rectum, and prostate increased, while the proportion of stomach decreased.
 ◆For females, the proportion of colon/rectum and breast increased, while the proportion of stomach decreased.

1980年代からのがん罹患動向を粗罹患率でみると、がん全体の罹患率は男女とも一貫した増加傾向にある。部位の内訳では、男性では肺がん、大腸がん、前立腺がんの割合が増加し、女性では大腸がん、乳がんの割合が増加した。一方、胃がんは1980年代には全がん罹患率のうち男性で37%、女性で25%を占めていたが、その割合は減少の一途をたどり、2002年には男性19%、女性12%程度まで減少した。

The crude incidence rate of cancer has been continuously increasing for both sexes since 1980's. In terms of site distribution, the proportion of lung, colon/rectum, and prostate increased for males, and the proportion of colon/rectum and breast increased for females. Stomach cancer incidence rate, which accounted for approximately 37% and 25% of all-cancer incidence rate for males and females, respectively, continuously decreased to 19% and 12% for males and females respectively in 2002.

資料：国立がんセンターがん対策情報センター (<http://ganjoho.ncc.go.jp/professional/statistics/statistics.html>)
 Source: Center for Cancer Control and Information Services, National Cancer Center, Japan (<http://ganjoho.ncc.go.jp/professional/statistics/statistics.html>)