

付表 3. 施設別 2010-2011 年 5 年生存率集計

施設別 2010-2011 年 5 年生存率集計

本章では、令和元年「年度第 1 回都道府県がん診療連携拠点病院等連絡協議会がん登録部会での検討に基づき、施設別の生存率について集計を行った結果を報告する。**なお、生存率には様々な要因が影響を与える。施設別の数値を参照する前に、各施設のコメントを必ず参照頂きたい。**施設別の生存率集計値の公表については、各施設に公表の有無についてご判断いただいた。

- ・実測生存率を部位別及び UICC TNM 分類総合ステージ別に推定
 - *施設別相対生存率は、他死因を調整しきれないため算出せず、実測生存率のみ算出する
- ・集計対象部位:全がん及び胃、大腸、肝臓、肺、女性乳房
- ・対象例:自施設初回治療例(症例区分 2, 3)、
悪性新生物<腫瘍>(一部良性、良悪性不詳の脳・中枢神経系の腫瘍性疾患)、年齢 0~99 歳
 - *UICC TNM 分類総合ステージ別生存率は、癌腫を対象
- ・生存状況把握割合が 90%の施設

なお、データ収集は、全がん診療連携拠点病院と都道府県推薦病院であり、予後情報付データを提出できる施設のみを対象としている。また、本集計は院内がん登録が開始後初期の 5 年相対生存率を推定したものであり、登録対象の見つけ出しや病期分類の正確さ等登録データの精度上の問題、我が国における生存状況把握の困難さに伴う生存率の信頼性には依然課題が残る。本集計データの精度は施設によっても異なる可能性があり、生存率の解釈には注意を要する。

施設における 5 年生存率を解釈するためには、様々な予後に影響する要因についても合わせて検討する必要がある。ここでは、参考資料として部位別登録数、年齢別登録数、UICC TNM 分類総合ステージ別登録数(肝癌については、取扱い規約分類を含む)、観血的治療実施別登録数、発見経緯、肺については小細胞癌・非小細胞癌別登録数を提示した。施設別の集計結果を参照する際には、これらの要素・割合が異なる場合には生存率の推定値に影響を及ぼすため、**単純に本集計結果をもって当該施設のがん医療の優劣の評価にはつながらないことに留意されたい。**なお、今回参照として提示している臨床病期や年齢以外にも、各都道府県・がん診療連携拠点病院におけるがん診療体制の違いによる対象者の違いや併存症、重症度等も生存率には影響を与えることに留意する必要がある。

本報告書は、こうした情報を国民へ公開することを通して、医療の透明性を確保するとともに、がん診療連携拠点病院等が一丸となってがん診療を行なっていることを示すためのものである。また、各医療施設においては、単純に他施設と比較することは難しいが、自施設の情報を加味してデータを見ることにより、自施設での診療実態の把握、さらなるがん診療の質の向上に向けて取り組むことが期待されている。

付表 3. 項目一覧

1). 主要 5 部位施設別生存率

1 **北海道がんセンター**
2010－2011年2力年

コメント:

当院は肺がん乳がんの生存率が高い値をとっている。70歳以上の高齢者の割合が若干低いこと、観血的治療の割合が若干高いことが関係していると推測される。
生存率は患者背景の影響を受けるため、各施設の患者背景が不明である本報告書では施設間比較をするには慎重を要する。

1 北海道がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 142 | 57 | (1-3) | 99.3 | 59.6 | 51.0 | 67.2 | 69.1 |
| I期 | 80 | 14 | (1-3) | 98.8 | 82.3 | 71.9 | 89.1 | 73.1 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 65.6 |
| III期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 71.3 |
| IV期 | 37 | 34 | 0 | 100.0 | 8.1 | 2.1 | 19.6 | 66.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 88 | 54 | | | | | |
| % | 62.0 | 38.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 19 | 37 | 52 | 23 | | |
| % | 7.7 | 13.4 | 26.1 | 36.6 | 16.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 80 | 12 | 11 | 37 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.3 | 8.5 | 7.7 | 26.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 116 | 103 | 12 | (1-3) | | |
| % | 18.3 | 81.7 | 72.5 | 8.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 11 | 26 | 93 | | | |
| % | 8.5 | 7.7 | 18.3 | 65.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 130 | 43 | (1-3) | 97.7 | 66.2 | 57.3 | 73.7 | 66.8 |
| I期 | 39 | (4-6) | 0 | 100.0 | 87.2 | 71.9 | 94.5 | 68.6 |
| II期 | 27 | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.1 |
| III期 | 30 | (7-9) | (1-3) | 96.7 | 76.1 | 56.2 | 87.8 | 64.9 |
| IV期 | 34 | 28 | (1-3) | 97.1 | 15.2 | 5.5 | 29.3 | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 66 | 64 | | | | | |
| % | 50.8 | 49.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 17 | 47 | 36 | 18 | | |
| % | 9.2 | 13.1 | 36.2 | 27.7 | 13.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 27 | 30 | 34 | 0 | 0 | |
| % | 30.0 | 20.8 | 23.1 | 26.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 109 | 98 | 11 | 0 | | |
| % | 16.2 | 83.8 | 75.4 | 8.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 24 | 89 | | | |
| % | | | 18.5 | 68.5 | | | |

1 北海道がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 31 | 23 | (1-3) | 93.5 | 20.7 | 8.4 | 36.7 | 66.3 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.8 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 67.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 66.2 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 62.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 20 | 11 | | | | | |
| % | 64.5 | 35.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | 11 | (1-3) | | |
| % | | | 35.5 | 35.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (4-6) | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (7-9) | (1-3) | 17 | (1-3) | 0 | |
| | % | | | 54.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 87.1 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 12 | 15 | | | |
| % | | | 38.7 | 48.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 541 | 285 | 10 | 98.2 | 46.8 | 42.6 | 51.0 | 69.6 |
| I期 | 255 | 67 | (4-6) | 98.0 | 73.5 | 67.6 | 78.5 | 70.8 |
| II期 | 46 | 30 | 0 | 100.0 | 34.8 | 21.5 | 48.4 | 70.8 |
| III期 | 102 | 68 | (1-3) | 97.1 | 32.2 | 23.3 | 41.4 | 68.2 |
| IV期 | 134 | 118 | (1-3) | 98.5 | 10.6 | 6.1 | 16.6 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 319 | 222 | 対象数 | 42 | 499 | |
| % | 59.0 | 41.0 | % | 7.8 | 92.2 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 17 | 66 | 173 | 202 | 83 | |
| % | 3.1 | 12.2 | 32.0 | 37.3 | 15.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 255 | 46 | 102 | 134 | 0 | (4-6) |
| % | 47.1 | 8.5 | 18.9 | 24.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 239 | 302 | 290 | 11 | (1-3) | |
| % | 44.2 | 55.8 | 53.6 | 2.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 59 | 60 | 204 | 218 | | |
| % | 10.9 | 11.1 | 37.7 | 40.3 | | |

1 北海道がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 493 | 61 | (7-9) | 98.4 | 87.5 | 84.3 | 90.2 | 57.3 |
| I期 | 209 | (7-9) | (1-3) | 99.5 | 96.2 | 92.5 | 98.1 | 59.2 |
| II期 | 179 | 15 | (4-6) | 97.8 | 91.5 | 86.4 | 94.8 | 57.4 |
| III期 | 62 | 13 | (1-3) | 95.2 | 78.0 | 65.2 | 86.6 | 56.3 |
| IV期 | 38 | 23 | 0 | 100.0 | 39.5 | 24.2 | 54.4 | 55.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 493 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 150 | 121 | 130 | 74 | 18 | | |
| % | 30.4 | 24.5 | 26.4 | 15.0 | 3.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 209 | 179 | 62 | 38 | 0 | (4-6) | |
| % | 42.4 | 36.3 | 12.6 | 7.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 444 | 437 | (7-9) | 0 | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 88.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 127 | (7-9) | 53 | 305 | | | |
| % | 25.8 | | 10.8 | 61.9 | | | |

2 JA北海道厚生連旭川厚生病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

2 JA北海道厚生連旭川厚生病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 360 | 123 | 14 | 96.1 | 65.0 | 59.8 | 69.8 | 70.0 |
| I期 | 238 | 33 | 10 | 95.8 | 85.8 | 80.7 | 89.7 | 71.6 |
| II期 | 16 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.1 |
| III期 | 21 | 18 | (1-3) | | | | | 74.8 |
| IV期 | 72 | 64 | (1-3) | 97.2 | 8.7 | 3.6 | 16.8 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 265 | 95 | | | | | |
| % | 73.6 | 26.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 36 | 100 | 152 | 58 | | |
| % | 3.9 | 10.0 | 27.8 | 42.2 | 16.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 238 | 16 | 21 | 72 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 66.1 | 4.4 | 5.8 | 20.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 302 | 287 | 14 | (1-3) | | |
| % | 16.1 | 83.9 | 79.7 | 3.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 64 | 36 | 82 | 178 | | | |
| % | 17.8 | 10.0 | 22.8 | 49.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 323 | 113 | (7-9) | 97.5 | 64.6 | 59.1 | 69.6 | 69.1 |
| I期 | 75 | (7-9) | (4-6) | 93.3 | 90.5 | 81.1 | 95.4 | 67.2 |
| II期 | 82 | 24 | (1-3) | 98.8 | 70.5 | 59.3 | 79.1 | 74.6 |
| III期 | 80 | 22 | (1-3) | 98.8 | 72.3 | 61.1 | 80.8 | 67.9 |
| IV期 | 73 | 55 | (1-3) | 98.6 | 23.6 | 14.6 | 33.9 | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 196 | 127 | | | | | |
| % | 60.7 | 39.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 44 | 100 | 113 | 54 | | |
| % | 3.7 | 13.6 | 31.0 | 35.0 | 16.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 75 | 82 | 80 | 73 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 23.2 | 25.4 | 24.8 | 22.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 292 | 271 | 21 | 0 | | |
| % | 9.6 | 90.4 | 83.9 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 23 | 74 | 200 | | | |
| % | 8.0 | 7.1 | 22.9 | 61.9 | | | |

2 JA北海道厚生連旭川厚生病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 81 | 63 | (4-6) | 95.1 | 18.7 | 10.9 | 28.2 | 70.0 |
| I期 | 30 | 16 | (1-3) | 90.0 | 41.6 | 23.2 | 59.0 | 62.9 |
| II期 | 17 | 15 | 0 | | | | | 71.1 |
| III期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 69.7 |
| IV期 | 14 | 13 | (1-3) | | | | | 76.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 55 | 26 | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 21 | 36 | 13 | | |
| % | | 12.3 | 25.9 | 44.4 | 16.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 30 | 17 | 16 | 14 | (4-6) | 0 |
| | % | 37.0 | 21.0 | 19.8 | 17.3 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 23 | 18 | 22 | (4-6) | 0 |
| | % | 16.0 | 28.4 | 22.2 | 27.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 48 | 30 | | | |
| % | | | 59.3 | 37.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 254 | 181 | (4-6) | 97.6 | 27.3 | 21.9 | 32.9 | 71.6 |
| I期 | 82 | 36 | (1-3) | 98.8 | 55.6 | 44.1 | 65.6 | 71.4 |
| II期 | 12 | 10 | 0 | | | | | 78.3 |
| III期 | 84 | 64 | (1-3) | 97.6 | 22.0 | 13.8 | 31.4 | 71.2 |
| IV期 | 75 | 70 | (1-3) | 96.0 | 3.1 | 0.6 | 9.6 | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 178 | 76 | 対象数 | | 22 | 232 |
| % | 70.1 | 29.9 | % | | 8.7 | 91.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 18 | 91 | 86 | 56 | |
| % | | 7.1 | 35.8 | 33.9 | 22.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 82 | 12 | 84 | 75 | (1-3) | 0 |
| % | 32.3 | 4.7 | 33.1 | 29.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 172 | 82 | 77 | (4-6) | 0 | |
| % | 67.7 | 32.3 | 30.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 11 | 25 | 101 | 117 | | |
| % | 4.3 | 9.8 | 39.8 | 46.1 | | |

2 JA北海道厚生連旭川厚生病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 110 | 19 | (1-3) | 99.1 | 82.6 | 74.1 | 88.5 | 58.7 |
| I期 | 38 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| II期 | 47 | (4-6) | (1-3) | 97.9 | 89.1 | 75.8 | 95.3 | 56.9 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 46.7 |
| IV期 | 14 | 10 | 0 | | | | | 63.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 110 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 24 | 32 | 14 | (7-9) | | |
| % | 29.1 | 21.8 | 29.1 | 12.7 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 47 | 10 | 14 | (1-3) | 0 | |
| % | 34.5 | 42.7 | 9.1 | 12.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 91 | 70 | 21 | 0 | | |
| % | 17.3 | 82.7 | 63.6 | 19.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (4-6) | 13 | 78 | | | |
| % | 12.7 | | 11.8 | 70.9 | | | |

3

王子総合病院

2010-2011年2力年

コメント:

本報告書に記載がある通り、信頼性の高い生存率を算出するためには95%以上の生存状況把握割合を維持する必要があるとされている。当院の生存状況把握割合は前回報告された2009年診断症例の96.3%、2010年診断症例の97.6%に引き続き、2010年診断症例が97.6%、2011年診断症例が97.5%と高い割合を維持している。しかし、生存率は生存状況把握割合以外にも患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態、診断当時の病気の進行度等様々な因子に大きく影響されるため、単純に生存率だけではその施設のがん医療の優劣を決めることはできないということに留意する必要がある。

また、より正確な生存率を出すためには症例数がまだ少なく、今後、さらに症例を蓄積することでより信頼性の高いデータに近づけていく必要があると考える。

3 王子総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 202 | 95 | (4-6) | 97.5 | 52.3 | 45.2 | 59.0 | 73.1 |
| I期 | 118 | 34 | (1-3) | 97.5 | 70.9 | 61.8 | 78.3 | 73.5 |
| II期 | 14 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.9 |
| III期 | 21 | 13 | (1-3) | | | | | 78.4 |
| IV期 | 47 | 41 | 0 | 100.0 | 12.8 | 5.2 | 23.9 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 149 | 53 | | | | | |
| % | 73.8 | 26.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 38 | 81 | 59 | | |
| % | | 9.4 | 18.8 | 40.1 | 29.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 118 | 14 | 21 | 47 | 0 | (1-3) | |
| % | 58.4 | 6.9 | 10.4 | 23.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 169 | 152 | 15 | (1-3) | | |
| % | 16.3 | 83.7 | 75.2 | 7.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 72 | 105 | | | |
| % | | 9.4 | 35.6 | 52.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 195 | 66 | (4-6) | 97.4 | 65.8 | 58.7 | 72.1 | 71.7 |
| I期 | 54 | (7-9) | (1-3) | 96.3 | 85.0 | 72.3 | 92.2 | 73.5 |
| II期 | 38 | 13 | 0 | 100.0 | 65.8 | 48.5 | 78.5 | 72.8 |
| III期 | 52 | 16 | (1-3) | 98.1 | 69.2 | 54.7 | 79.8 | 71.9 |
| IV期 | 41 | 27 | (1-3) | 97.6 | 32.8 | 19.0 | 47.3 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 117 | 78 | | | | | |
| % | 60.0 | 40.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 52 | 78 | 45 | | |
| % | | 7.2 | 26.7 | 40.0 | 23.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | 38 | 52 | 41 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 27.7 | 19.5 | 26.7 | 21.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 186 | 175 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | 95.4 | 89.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 59 | 109 | | | |
| % | | 10.8 | 30.3 | 55.9 | | | |

3 王子総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 45 | 0 | 100.0 | 26.2 | 16.0 | 37.6 | 70.7 |
| I期 | 22 | 12 | 0 | | | | | 74.1 |
| II期 | 15 | 11 | 0 | | | | | 64.7 |
| III期 | 17 | 15 | 0 | | | | | 70.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 49 | 12 | | | | | |
| % | 80.3 | 19.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 15 | 24 | 13 | | |
| % | | | 24.6 | 39.3 | 21.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 15 | 17 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 36.1 | 24.6 | 27.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | 26 | 17 | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | | 42.6 | 27.9 | 21.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 16 | 16 | 0 | 0 | | |
| % | 73.8 | 26.2 | 26.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 28 | 29 | | | |
| % | | | 45.9 | 47.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 184 | 140 | (4-6) | 96.7 | 21.9 | 16.2 | 28.2 | 71.2 |
| I期 | 57 | 29 | (1-3) | 98.2 | 48.2 | 34.7 | 60.5 | 75.8 |
| II期 | 13 | 12 | (1-3) | | | | | 67.3 |
| III期 | 50 | 40 | (1-3) | 94.0 | 15.1 | 6.6 | 26.7 | 71.9 |
| IV期 | 56 | 52 | 0 | 100.0 | 7.1 | 2.3 | 15.8 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 134 | 50 | 対象数 | | 22 | 162 |
| % | 72.8 | 27.2 | % | | 12.0 | 88.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 18 | 49 | 67 | 43 | |
| % | | 9.8 | 26.6 | 36.4 | 23.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 57 | 13 | 50 | 56 | (7-9) | (1-3) |
| % | 31.0 | 7.1 | 27.2 | 30.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 130 | 54 | 45 | (7-9) | 0 | |
| % | 70.7 | 29.3 | 24.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 11 | 11 | 54 | 108 | | |
| % | 6.0 | 6.0 | 29.3 | 58.7 | | |

3 王子総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 84 | 12 | (1-3) | 97.6 | 85.4 | 75.7 | 91.4 | 61.7 |
| I期 | 36 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.9 | 73.1 | 95.7 | 59.7 |
| II期 | 31 | (1-3) | (1-3) | 93.5 | 89.7 | 71.3 | 96.5 | 56.0 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 65.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 84 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 19 | 25 | 11 | 11 | | |
| % | 21.4 | 22.6 | 29.8 | 13.1 | 13.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 31 | 15 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 42.9 | 36.9 | 17.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 83 | 75 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | 98.8 | 89.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 0 | 10 | 62 | | | |
| % | 14.3 | | 11.9 | 73.8 | | | |

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 261 | 100 | (7-9) | 96.9 | 61.5 | 55.3 | 67.1 | 70.3 |
| I期 | 166 | 34 | (7-9) | 95.8 | 79.3 | 72.3 | 84.8 | 71.7 |
| II期 | 22 | (4-6) | 0 | | | | | 72.2 |
| III期 | 23 | 12 | (1-3) | | | | | 66.5 |
| IV期 | 45 | 44 | 0 | 100.0 | 2.2 | 0.2 | 10.2 | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 172 | 89 | | | | | |
| % | 65.9 | 34.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 24 | 82 | 91 | 51 | | |
| % | 5.0 | 9.2 | 31.4 | 34.9 | 19.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 166 | 22 | 23 | 45 | (4-6) | 0 | |
| % | 63.6 | 8.4 | 8.8 | 17.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 206 | 203 | (1-3) | 0 | | |
| % | 21.1 | 78.9 | 77.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | 37 | 103 | 98 | | | |
| % | 8.8 | 14.2 | 39.5 | 37.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 251 | 107 | (4-6) | 98.4 | 57.2 | 50.8 | 63.0 | 70.4 |
| I期 | 63 | 17 | (1-3) | 96.8 | 72.7 | 59.7 | 82.0 | 70.9 |
| II期 | 58 | 19 | (1-3) | 98.3 | 67.2 | 53.5 | 77.6 | 76.9 |
| III期 | 67 | 24 | (1-3) | 98.5 | 63.9 | 51.2 | 74.2 | 70.3 |
| IV期 | 56 | 44 | 0 | 100.0 | 21.4 | 11.9 | 32.9 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 154 | 97 | | | | | |
| % | 61.4 | 38.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 27 | 78 | 74 | 59 | | |
| % | 5.2 | 10.8 | 31.1 | 29.5 | 23.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 63 | 58 | 67 | 56 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 25.1 | 23.1 | 26.7 | 22.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 208 | 183 | 24 | (1-3) | | |
| % | 17.1 | 82.9 | 72.9 | 9.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 22 | 101 | 113 | | | |
| % | 6.0 | 8.8 | 40.2 | 45.0 | | | |

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 100 | 66 | (4-6) | 96.0 | 32.1 | 23.0 | 41.4 | 69.8 |
| I期 | 37 | 17 | (1-3) | 97.3 | 53.7 | 36.4 | 68.2 | 65.7 |
| II期 | 33 | 23 | (1-3) | 97.0 | 28.3 | 14.1 | 44.3 | 69.5 |
| III期 | 20 | 16 | (1-3) | | | | | 72.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 67 | 33 | | | | | |
| % | 67.0 | 33.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 33 | 38 | 17 | | |
| % | | | 33.0 | 38.0 | 17.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 37 | 33 | 20 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 37.0 | 33.0 | 20.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 40 | 28 | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 12.0 | 40.0 | 28.0 | 17.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 77 | 23 | 23 | 0 | 0 | | |
| % | 77.0 | 23.0 | 23.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 78 | 20 | | | |
| % | | | 78.0 | 20.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 328 | 251 | (1-3) | 99.1 | 23.2 | 18.8 | 27.9 | 71.5 |
| I期 | 94 | 44 | (1-3) | 97.9 | 53.0 | 42.4 | 62.5 | 73.2 |
| II期 | 32 | 23 | 0 | 100.0 | 28.1 | 14.0 | 44.1 | 72.8 |
| III期 | 82 | 67 | (1-3) | 98.8 | 17.3 | 10.0 | 26.3 | 70.0 |
| IV期 | 110 | 108 | 0 | 100.0 | 1.8 | 0.4 | 5.8 | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 245 | 83 | 対象数 | 48 | 280 | | |
| % | 74.7 | 25.3 | % | 14.6 | 85.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 23 | 96 | 145 | 59 | | |
| % | | 7.0 | 29.3 | 44.2 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 94 | 32 | 82 | 110 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 28.7 | 9.8 | 25.0 | 33.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 214 | 114 | 112 | (1-3) | 0 | | |
| % | 65.2 | 34.8 | 34.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 29 | 167 | 123 | | | |
| % | | 8.8 | 50.9 | 37.5 | | | |

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 164 | 20 | (4-6) | 97.0 | 87.6 | 81.4 | 91.8 | 63.0 |
| I期 | 78 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 94.7 | 86.6 | 98.0 | 62.2 |
| II期 | 57 | (4-6) | (1-3) | 94.7 | 89.2 | 77.6 | 95.0 | 65.9 |
| III期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 68.7 |
| IV期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 57.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 164 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 35 | 22 | 54 | 37 | 16 | | |
| % | 21.3 | 13.4 | 32.9 | 22.6 | 9.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 78 | 57 | 15 | 12 | (1-3) | 0 | |
| % | 47.6 | 34.8 | 9.1 | 7.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 148 | 147 | (1-3) | 0 | | |
| % | 9.8 | 90.2 | 89.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | (4-6) | 34 | 99 | | | |
| % | 16.5 | | 20.7 | 60.4 | | | |

5 北見赤十字病院
2010-2011年2力年

コメント:

【地域性】

当院は北海道の北東部に位置し、オホーツク三次医療圏（人口約30万）唯一の地域がん診療連携拠点病院です。東西約150kmに渡る広大な地域のがん診療を担い、早期から進行がんまで幅広く診療しています。

【当院の方針】

患者様の年齢やがんのステージ（病期）、全身状態などを総合的に判断し、患者様やご家族への十分な説明の上、手術・放射線療法・化学療法・緩和療法を組合せた適切ながん診療を行っています。

【集計結果について】

本集計では、当院の平均年齢が肝臓以外の4部位で全国平均を上回り、特に乳房の平均年齢が高く、実測生存率への影響が予測されます。また、肺・乳房はIV期が、肝はIII期が多く、がんが進行した状態で当院を受診するケースが多いことが伺えます。

【今後の課題】

地域の行政等とも連携し、がんの早期発見のため検診率の向上に努めたいと考えます。

5 北見赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 287 | 122 | (4-6) | 98.3 | 56.9 | 50.9 | 62.4 | 71.4 |
| I期 | 193 | 45 | (1-3) | 98.4 | 76.4 | 69.7 | 81.8 | 73.0 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 70.8 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.0 |
| IV期 | 60 | 58 | (1-3) | 98.3 | 1.7 | 0.1 | 8.0 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 192 | 95 | | | | | |
| % | 66.9 | 33.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 25 | 76 | 113 | 62 | | |
| % | 3.8 | 8.7 | 26.5 | 39.4 | 21.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 193 | 19 | (7-9) | 60 | (4-6) | 0 | |
| % | 67.2 | 6.6 | | 20.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 232 | 217 | 10 | (4-6) | | |
| % | 19.2 | 80.8 | 75.6 | 3.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 32 | 119 | 122 | | | |
| % | 4.9 | 11.1 | 41.5 | 42.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 283 | 115 | (4-6) | 97.9 | 58.7 | 52.6 | 64.2 | 71.5 |
| I期 | 57 | 16 | (1-3) | 96.5 | 70.9 | 57.0 | 81.1 | 73.1 |
| II期 | 88 | 26 | 0 | 100.0 | 70.5 | 59.7 | 78.8 | 73.9 |
| III期 | 72 | 21 | (1-3) | 97.2 | 70.3 | 58.2 | 79.5 | 73.6 |
| IV期 | 57 | 46 | (1-3) | 96.5 | 16.7 | 8.3 | 27.7 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 158 | 125 | | | | | |
| % | 55.8 | 44.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 28 | 67 | 110 | 66 | | |
| % | 4.2 | 9.9 | 23.7 | 38.9 | 23.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 57 | 88 | 72 | 57 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 20.1 | 31.1 | 25.4 | 20.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 247 | 208 | 33 | (4-6) | | |
| % | 12.7 | 87.3 | 73.5 | 11.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 31 | 79 | 167 | | | |
| % | | 11.0 | 27.9 | 59.0 | | | |

5 北見赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 50 | 42 | 0 | 100.0 | 16.0 | 7.5 | 27.4 | 68.8 |
| I期 | 14 | 10 | 0 | | | | | 71.0 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 72.6 |
| III期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 69.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 35 | 15 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 16 | (7-9) | 14 | | |
| % | | | 32.0 | | 28.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 14 | 12 | 15 | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | 28.0 | 24.0 | 30.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | (4-6) | 16 | 14 | (4-6) | 0 |
| | % | | | 32.0 | 28.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 | | |
| % | 82.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 39 | (7-9) | | | |
| % | | | 78.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 244 | 185 | (1-3) | 99.2 | 23.7 | 18.6 | 29.2 | 71.6 |
| I期 | 67 | 22 | (1-3) | 98.5 | 66.8 | 54.1 | 76.8 | 73.1 |
| II期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 58 | 52 | 0 | 100.0 | 10.3 | 4.2 | 19.7 | 70.4 |
| IV期 | 93 | 91 | (1-3) | 98.9 | 1.1 | 0.1 | 5.3 | 72.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 194 | 50 | 対象数 | | 26 | 218 |
| % | 79.5 | 20.5 | % | | 10.7 | 89.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 70 | 99 | 50 | |
| % | | 8.2 | 28.7 | 40.6 | 20.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 67 | 17 | 58 | 93 | (7-9) | 0 |
| % | 27.5 | 7.0 | 23.8 | 38.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 182 | 62 | 60 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 74.6 | 25.4 | 24.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 10 | 21 | 94 | 119 | | |
| % | 4.1 | 8.6 | 38.5 | 48.8 | | |

5 北見赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 123 | 20 | (1-3) | 99.2 | 83.7 | 75.9 | 89.2 | 63.6 |
| I期 | 55 | (7-9) | (1-3) | 98.2 | 83.6 | 70.9 | 91.1 | 60.1 |
| II期 | 36 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.2 | 81.9 | 99.6 | 65.9 |
| III期 | 16 | 0 | 0 | | | | | 49.5 |
| IV期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 61.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 123 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 19 | 37 | 26 | 17 | | |
| % | 19.5 | 15.4 | 30.1 | 21.1 | 13.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | 36 | 16 | 12 | (4-6) | 0 | |
| % | 44.7 | 29.3 | 13.0 | 9.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 110 | 103 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 10.6 | 89.4 | 83.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (1-3) | 12 | 92 | | | |
| % | 13.8 | | 9.8 | 74.8 | | | |

6

日鋼記念病院

2010-2011年2カ年

コメント:

今回のデータをご覧いただく際には、以下の内容をご考慮ください。

「- (ハイフン)」は「0 (ゼロ)」ではありません。

・「生存率」は症例数が少ない場合、推定値が不安定となるため30例以上のみ表示
30例未満の場合は「- (ハイフン)」表示となっています。

・「集計値」では、個人情報への配慮から10例以下を「- (ハイフン)」表示となっています。

地域特性として、70歳以上の高齢患者さんの占める割合が全国平均に比して高い傾向にあります。そのため、罹患時すでに慢性疾患などを有する「併存症あり」の患者さんの割合も高くなっており、これらの要因が治療結果に影響する場合があります。

また、死亡数はすべて「がん死」とは限りません。がん治療で効果が認められていても、そのほかの併存症が原因で亡くなる場合も死亡数に含まれています。

進行しているがん（ステージIV）の患者割合が高い傾向にある理由は、以下のことが考えられます。

・健診（がん検診含む）の受診比率が低く、ある程度進行してから受診する患者が多いため。

・ステージI~IIIなどの手術適応症例では、当院において確定診断した後、都市部の病院での手術を選択するケースがあり、そのような症例は今回の分析対象外となっているため。

「生存率」がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

今回の公表データでは、治療に影響するさまざまな要因（合併症や治療方法など）についての条件が加味されていないため、そのままの数値で「がん治療の良否」を判断すべきではないことをご理解の上、お読みいただければ幸いです。

今後、がんの「予後」や「治療方法」などについてご心配なことがありましたら、ぜひ主治医にご相談ください。当院では「地域がん診療連携拠点病院」として、そのようなご相談も受け付けています。

6 日鋼記念病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 83 | 39 | (4-6) | 94.0 | 51.8 | 40.4 | 62.0 | 72.2 |
| I期 | 45 | 12 | (4-6) | 88.9 | 72.0 | 55.9 | 83.0 | 70.7 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 59.0 |
| IV期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 79.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 58 | 25 | | | | | |
| % | 69.9 | 30.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 28 | 27 | 21 | | |
| % | | | 33.7 | 32.5 | 25.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 12 | (7-9) | 12 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 54.2 | 14.5 | | 14.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 68 | 60 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | 18.1 | 81.9 | 72.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 33 | 37 | | | |
| % | | | 39.8 | 44.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 111 | 46 | (1-3) | 97.3 | 58.1 | 48.3 | 66.7 | 72.3 |
| I期 | 33 | 12 | 0 | 100.0 | 63.6 | 45.0 | 77.5 | 70.4 |
| II期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 74.5 |
| III期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 72.7 |
| IV期 | 20 | 17 | (1-3) | | | | | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 61 | 50 | | | | | |
| % | 55.0 | 45.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 27 | 37 | 31 | | |
| % | | 10.8 | 24.3 | 33.3 | 27.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 27 | 25 | 20 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 29.7 | 24.3 | 22.5 | 18.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 100 | 92 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 82.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 41 | 57 | | | |
| % | | | 36.9 | 51.4 | | | |

6 日鋼記念病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 37 | 27 | (4-6) | 89.2 | 19.4 | 8.0 | 34.5 | 74.3 |
| I期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.4 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 78.0 |
| III期 | 14 | 12 | (1-3) | | | | | 74.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 63.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 20 | 17 | | | | | |
| % | 54.1 | 45.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 20 | (7-9) | | |
| % | | | | 54.1 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 10 | (7-9) | 14 | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 27.0 | | 37.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 11 | 11 | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
| | % | | 29.7 | 29.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 14 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 62.2 | 37.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 31 | (4-6) | | | |
| % | | | 83.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | 54 | (1-3) | 98.6 | 25.7 | 16.3 | 36.2 | 74.7 |
| I期 | 20 | (7-9) | (1-3) | | | | | 78.3 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.6 |
| III期 | 20 | 16 | 0 | | | | | 74.1 |
| IV期 | 22 | 19 | 0 | | | | | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 55 | 18 | | (1-3) | 70 | | |
| % | 75.3 | 24.7 | | | 95.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 17 | 23 | 27 | | |
| % | | | 23.3 | 31.5 | 37.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 20 | (7-9) | 20 | 22 | (4-6) | 0 | |
| % | 27.4 | | 27.4 | 30.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 20 | 18 | (1-3) | 0 | | |
| % | 72.6 | 27.4 | 24.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 38 | 26 | | | |
| % | | | 52.1 | 35.6 | | | |

6 日鋼記念病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | 12 | (4-6) | 94.8 | 83.9 | 73.3 | 90.5 | 60.7 |
| I期 | 35 | 0 | (1-3) | 91.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 |
| II期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 59.8 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 61.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 75.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 77 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | (7-9) | 22 | 20 | (4-6) | | |
| % | 28.6 | | 28.6 | 26.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 35 | 27 | (7-9) | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| % | 45.5 | 35.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 71 | 61 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | | 92.2 | 79.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 0 | (7-9) | 53 | | | |
| % | 22.1 | | | 68.8 | | | |

7 函館厚生院 函館五稜郭病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

7 函館厚生院 函館五稜郭病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 372 | 167 | (1-3) | 99.2 | 55.0 | 49.8 | 59.9 | 69.5 |
| I期 | 224 | 51 | (1-3) | 99.1 | 77.2 | 71.1 | 82.1 | 68.7 |
| II期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 64.0 |
| III期 | 25 | 15 | (1-3) | | | | | 73.9 |
| IV期 | 103 | 94 | 0 | 100.0 | 8.7 | 4.3 | 15.2 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 267 | 105 | | | | | |
| % | 71.8 | 28.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 40 | 111 | 138 | 67 | | |
| % | 4.3 | 10.8 | 29.8 | 37.1 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 224 | 18 | 25 | 103 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 60.2 | 4.8 | 6.7 | 27.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 294 | 270 | 14 | 10 | | |
| % | 21.0 | 79.0 | 72.6 | 3.8 | 2.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 57 | 125 | 183 | | | |
| % | | 15.3 | 33.6 | 49.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 380 | 146 | (1-3) | 99.7 | 61.6 | 56.5 | 66.2 | 69.0 |
| I期 | 105 | 17 | 0 | 100.0 | 83.8 | 75.3 | 89.6 | 67.9 |
| II期 | 94 | 25 | (1-3) | 98.9 | 73.3 | 63.1 | 81.1 | 72.2 |
| III期 | 102 | 29 | 0 | 100.0 | 71.6 | 61.7 | 79.3 | 69.5 |
| IV期 | 77 | 74 | 0 | 100.0 | 3.9 | 1.0 | 10.0 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 223 | 157 | | | | | |
| % | 58.7 | 41.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 51 | 122 | 110 | 77 | | |
| % | 5.3 | 13.4 | 32.1 | 28.9 | 20.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 105 | 94 | 102 | 77 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 27.6 | 24.7 | 26.8 | 20.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 346 | 324 | 16 | (4-6) | | |
| % | 8.9 | 91.1 | 85.3 | 4.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 59 | 85 | 234 | | | |
| % | | 15.5 | 22.4 | 61.6 | | | |

7 函館厚生院 函館五稜郭病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 98 | 74 | 0 | 100.0 | 24.5 | 16.5 | 33.3 | 68.4 |
| I期 | 32 | 20 | 0 | 100.0 | 37.5 | 21.3 | 53.7 | 71.1 |
| II期 | 28 | 18 | 0 | | | | | 66.6 |
| III期 | 24 | 23 | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | 14 | 13 | 0 | | | | | 67.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 85 | 13 | | | | | |
| % | 86.7 | 13.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 41 | 32 | 11 | | |
| % | | 13.3 | 41.8 | 32.7 | 11.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 32 | 28 | 24 | 14 | 0 | 0 |
| | % | 32.7 | 28.6 | 24.5 | 14.3 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 17 | 25 | 25 | 30 | (1-3) | 0 |
| | % | 17.3 | 25.5 | 25.5 | 30.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 68 | 30 | 29 | (1-3) | 0 | | |
| % | 69.4 | 30.6 | 29.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 63 | 31 | | | |
| % | | | 64.3 | 31.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 321 | 224 | 0 | 100.0 | 30.2 | 25.3 | 35.3 | 70.4 |
| I期 | 106 | 34 | 0 | 100.0 | 67.9 | 58.1 | 75.9 | 70.2 |
| II期 | 18 | 11 | 0 | | | | | 70.9 |
| III期 | 88 | 75 | 0 | 100.0 | 14.8 | 8.3 | 23.0 | 70.4 |
| IV期 | 105 | 102 | 0 | 100.0 | 2.9 | 0.8 | 7.4 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 219 | 102 | 対象数 | | 27 | 294 |
| % | 68.2 | 31.8 | % | | 8.4 | 91.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 33 | 98 | 127 | 54 | |
| % | | 10.3 | 30.5 | 39.6 | 16.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 106 | 18 | 88 | 105 | (1-3) | (1-3) |
| % | 33.0 | 5.6 | 27.4 | 32.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 181 | 140 | 133 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 56.4 | 43.6 | 41.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 37 | 135 | 148 | | |
| % | | 11.5 | 42.1 | 46.1 | | |

7 函館厚生院 函館五稜郭病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 268 | 36 | 0 | 100.0 | 86.6 | 81.9 | 90.1 | 62.2 |
| I期 | 120 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.8 | 90.3 | 98.2 | 62.0 |
| II期 | 79 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.7 | 85.5 | 97.3 | 60.3 |
| III期 | 45 | 16 | 0 | 100.0 | 64.4 | 48.7 | 76.5 | 61.1 |
| IV期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 268 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 51 | 65 | 66 | 52 | 34 | | |
| % | 19.0 | 24.3 | 24.6 | 19.4 | 12.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 120 | 79 | 45 | 18 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 44.8 | 29.5 | 16.8 | 6.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 238 | 211 | 26 | (1-3) | | |
| % | 11.2 | 88.8 | 78.7 | 9.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 40 | (7-9) | 33 | 188 | | | |
| % | 14.9 | | 12.3 | 70.1 | | | |

8 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

8 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 188 | 84 | (1-3) | 98.4 | 54.8 | 47.4 | 61.6 | 70.0 |
| I期 | 103 | 21 | (1-3) | 97.1 | 79.1 | 69.8 | 85.9 | 71.3 |
| II期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 74.2 |
| III期 | 24 | 16 | 0 | | | | | 69.3 |
| IV期 | 43 | 40 | 0 | 100.0 | 7.0 | 1.8 | 17.1 | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 130 | 58 | | | | | |
| % | 69.1 | 30.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 61 | 66 | 35 | | |
| % | | 10.6 | 32.4 | 35.1 | 18.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 103 | 14 | 24 | 43 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 54.8 | 7.4 | 12.8 | 22.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 63 | 125 | 112 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 33.5 | 66.5 | 59.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | (4-6) | 69 | 88 | | | |
| % | 13.3 | | 36.7 | 46.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 220 | 94 | (4-6) | 97.3 | 56.6 | 49.8 | 62.9 | 69.7 |
| I期 | 51 | (7-9) | (1-3) | 94.1 | 83.9 | 70.4 | 91.6 | 68.9 |
| II期 | 63 | 21 | (1-3) | 98.4 | 66.7 | 53.6 | 76.8 | 72.2 |
| III期 | 56 | 23 | (1-3) | 98.2 | 58.2 | 44.1 | 69.9 | 69.1 |
| IV期 | 43 | 37 | (1-3) | 97.7 | 12.0 | 4.4 | 23.6 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 143 | 77 | | | | | |
| % | 65.0 | 35.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 28 | 64 | 74 | 43 | | |
| % | 5.0 | 12.7 | 29.1 | 33.6 | 19.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | 63 | 56 | 43 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 23.2 | 28.6 | 25.5 | 19.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 184 | 163 | 20 | (1-3) | | |
| % | 16.4 | 83.6 | 74.1 | 9.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 12 | 62 | 131 | | | |
| % | 6.8 | 5.5 | 28.2 | 59.5 | | | |

8 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 46 | 31 | (1-3) | 97.8 | 31.1 | 18.4 | 44.7 | 70.5 |
| I期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 65.3 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 79.0 |
| III期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 81.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 61.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 32 | 14 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 18 | 12 | 10 | | |
| % | | | 39.1 | 26.1 | 21.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | (7-9) | 14 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 37.0 | | 30.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 15 | 12 | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | | 32.6 | 26.1 | 28.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | 80.4 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 23 | 19 | | | |
| % | | | 50.0 | 41.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 78 | 0 | 100.0 | 13.3 | 7.3 | 21.2 | 69.5 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 55.0 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | 33 | 28 | 0 | 100.0 | 15.2 | 5.5 | 29.2 | 69.1 |
| IV期 | 49 | 47 | 0 | 100.0 | 4.1 | 0.8 | 12.3 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 72 | 18 | 対象数 | | 15 | 75 |
| % | 80.0 | 20.0 | % | | 16.7 | 83.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 29 | 33 | 13 | |
| % | | 14.4 | 32.2 | 36.7 | 14.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (4-6) | 0 | 33 | 49 | (1-3) | 0 |
| % | | | 36.7 | 54.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 82 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 91.1 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 34 | 48 | | |
| % | | | 37.8 | 53.3 | | |

8 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 145 | 16 | (1-3) | 97.9 | 88.9 | 82.5 | 93.0 | 59.4 |
| I期 | 47 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 |
| II期 | 68 | (4-6) | (1-3) | 95.6 | 92.5 | 82.9 | 96.8 | 59.8 |
| III期 | 25 | (4-6) | 0 | | | | | 60.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 66.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 145 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 36 | 40 | 31 | 28 | 10 | | |
| % | 24.8 | 27.6 | 21.4 | 19.3 | 6.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 47 | 68 | 25 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 32.4 | 46.9 | 17.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 136 | 126 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | | 93.8 | 86.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 48 | 0 | 10 | 87 | | | |
| % | 33.1 | | 6.9 | 60.0 | | | |

9 青森県立中央病院
2011年のみ

コメント:

特になし

9 青森県立中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 67 | (7-9) | 94.9 | 50.5 | 41.8 | 58.5 | 66.9 |
| I期 | 65 | 13 | (4-6) | 93.8 | 79.7 | 67.7 | 87.7 | 68.7 |
| II期 | 24 | 10 | (1-3) | | | | | 65.8 |
| III期 | 11 | 10 | (1-3) | | | | | 69.1 |
| IV期 | 36 | 34 | (1-3) | 97.2 | 5.6 | 1.0 | 16.3 | 63.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 96 | 40 | | | | | |
| % | 70.6 | 29.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 20 | 45 | 40 | 20 | | |
| % | 8.1 | 14.7 | 33.1 | 29.4 | 14.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 65 | 24 | 11 | 36 | 0 | 0 | |
| % | 47.8 | 17.6 | 8.1 | 26.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 110 | 93 | 17 | 0 | | |
| % | 19.1 | 80.9 | 68.4 | 12.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 17 | 28 | 76 | | | |
| % | 11.0 | 12.5 | 20.6 | 55.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 208 | 72 | 25 | 88.0 | 64.5 | 57.4 | 70.7 | 67.7 |
| I期 | 48 | (7-9) | (7-9) | 81.3 | 85.1 | 71.3 | 92.6 | 67.0 |
| II期 | 56 | 11 | 10 | 82.1 | 79.3 | 65.5 | 88.0 | 71.5 |
| III期 | 48 | 15 | (4-6) | 91.7 | 68.5 | 53.2 | 79.7 | 67.1 |
| IV期 | 51 | 38 | (1-3) | 96.1 | 23.6 | 12.8 | 36.2 | 64.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 122 | 86 | | | | | |
| % | 58.7 | 41.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 25 | 71 | 71 | 28 | | |
| % | 6.3 | 12.0 | 34.1 | 34.1 | 13.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 56 | 48 | 51 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 23.1 | 26.9 | 23.1 | 24.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 182 | 149 | 32 | (1-3) | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 71.6 | 15.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | (7-9) | 50 | 124 | | | |
| % | 12.0 | | 24.0 | 59.6 | | | |

9 青森県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 54 | 41 | (1-3) | 96.3 | 23.3 | 13.0 | 35.4 | 69.2 |
| I期 | 18 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.2 |
| II期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 71.3 |
| III期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 69.2 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 64.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 35 | 19 | | | | | | |
| % | 64.8 | 35.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 18 | 22 | (7-9) | | | |
| % | | | 33.3 | 40.7 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 18 | 11 | 17 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 33.3 | 20.4 | 31.5 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 15 | 13 | 19 | 0 | 0 | |
| | % | | 27.8 | 24.1 | 35.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 48 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 88.9 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 26 | 25 | | | | |
| % | | | 48.1 | 46.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 205 | 118 | 19 | 90.7 | 41.4 | 34.5 | 48.2 | 70.1 |
| I期 | 89 | 30 | 13 | 85.4 | 64.6 | 53.3 | 73.8 | 70.2 |
| II期 | 15 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.6 |
| III期 | 57 | 44 | (1-3) | 96.5 | 22.6 | 12.7 | 34.1 | 70.1 |
| IV期 | 42 | 38 | (1-3) | 95.2 | 8.3 | 2.3 | 19.6 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 126 | 79 | 対象数 | | 21 | 184 |
| % | 61.5 | 38.5 | % | | 10.2 | 89.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 24 | 67 | 84 | 27 | |
| % | | 11.7 | 32.7 | 41.0 | 13.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 89 | 15 | 57 | 42 | (1-3) | (1-3) |
| % | 43.4 | 7.3 | 27.8 | 20.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 103 | 102 | 98 | (4-6) | 0 | |
| % | 50.2 | 49.8 | 47.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 29 | 27 | 78 | 71 | | |
| % | 14.1 | 13.2 | 38.0 | 34.6 | | |

9 青森県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 93 | 20 | (4-6) | 94.6 | 78.2 | 68.3 | 85.4 | 61.4 |
| I期 | 32 | (4-6) | (1-3) | 93.8 | 87.4 | 69.8 | 95.1 | 60.6 |
| II期 | 43 | (7-9) | (1-3) | 95.3 | 81.0 | 65.6 | 90.0 | 60.2 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 65.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 93 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 19 | 26 | 12 | 14 | | |
| % | 23.7 | 20.4 | 28.0 | 12.9 | 15.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | 43 | 12 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 34.4 | 46.2 | 12.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 70 | 65 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 24.7 | 75.3 | 69.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (4-6) | 11 | 64 | | | |
| % | 12.9 | | 11.8 | 68.8 | | | |

10 八戸市立市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

とくになし

10 八戸市立市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 221 | 107 | (1-3) | 99.1 | 51.4 | 44.6 | 57.7 | 68.0 |
| I期 | 125 | 30 | (1-3) | 99.2 | 75.8 | 67.3 | 82.4 | 69.7 |
| II期 | 21 | 12 | (1-3) | | | | | 67.8 |
| III期 | 22 | 17 | 0 | | | | | 69.3 |
| IV期 | 51 | 47 | 0 | 100.0 | 7.8 | 2.5 | 17.2 | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 165 | 56 | | | | | |
| % | 74.7 | 25.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 32 | 68 | 82 | 26 | | |
| % | 5.9 | 14.5 | 30.8 | 37.1 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 125 | 21 | 22 | 51 | 0 | (1-3) | |
| % | 56.6 | 9.5 | 10.0 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 166 | 140 | 26 | 0 | | |
| % | 24.9 | 75.1 | 63.3 | 11.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 54 | 93 | 70 | | | |
| % | | 24.4 | 42.1 | 31.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 362 | 154 | (1-3) | 99.2 | 57.3 | 52.0 | 62.2 | 69.7 |
| I期 | 80 | 14 | (1-3) | 97.5 | 82.3 | 71.9 | 89.1 | 69.3 |
| II期 | 107 | 40 | (1-3) | 99.1 | 62.5 | 52.6 | 70.9 | 71.4 |
| III期 | 100 | 40 | 0 | 100.0 | 60.0 | 49.7 | 68.8 | 69.9 |
| IV期 | 66 | 59 | 0 | 100.0 | 10.6 | 4.7 | 19.4 | 66.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 212 | 150 | | | | | |
| % | 58.6 | 41.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 46 | 105 | 128 | 67 | | |
| % | 4.4 | 12.7 | 29.0 | 35.4 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 80 | 107 | 100 | 66 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 22.1 | 29.6 | 27.6 | 18.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 76 | 286 | 230 | 56 | 0 | | |
| % | 21.0 | 79.0 | 63.5 | 15.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 60 | 168 | 128 | | | |
| % | | 16.6 | 46.4 | 35.4 | | | |

10 八戸市立市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 48 | 35 | 0 | 100.0 | 27.1 | 15.5 | 40.0 | 67.6 |
| I期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 65.6 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 71.6 |
| III期 | 18 | 15 | 0 | | | | | 65.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 45.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 39 | (7-9) | | | | | | |
| % | 81.3 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 15 | 16 | (4-6) | | | |
| % | | 20.8 | 31.3 | 33.3 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 11 | 13 | 18 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 22.9 | 27.1 | 37.5 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| | % | 27.1 | 29.2 | 22.9 | 20.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 38 | 10 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | |
| % | 79.2 | 20.8 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 37 | (7-9) | | | | |
| % | | | 77.1 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 339 | 235 | 0 | 100.0 | 30.7 | 25.9 | 35.6 | 69.7 |
| I期 | 97 | 23 | 0 | 100.0 | 76.3 | 66.5 | 83.6 | 69.3 |
| II期 | 20 | 10 | 0 | | | | | 68.0 |
| III期 | 131 | 114 | 0 | 100.0 | 13.0 | 7.9 | 19.3 | 70.4 |
| IV期 | 89 | 86 | 0 | 100.0 | 3.4 | 0.9 | 8.7 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 233 | 106 | 対象数 | | 33 | 306 | | |
| % | 68.7 | 31.3 | % | | 9.7 | 90.3 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 10 | 35 | 117 | 116 | 61 | | | |
| % | 2.9 | 10.3 | 34.5 | 34.2 | 18.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 97 | 20 | 131 | 89 | (1-3) | 0 | | |
| % | 28.6 | 5.9 | 38.6 | 26.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 214 | 125 | 109 | 16 | 0 | | | |
| % | 63.1 | 36.9 | 32.2 | 4.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 70 | 178 | 88 | | | | |
| % | | 20.6 | 52.5 | 26.0 | | | | |

10 八戸市立市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 281 | 30 | (1-3) | 98.9 | 89.3 | 85.0 | 92.4 | 58.2 |
| I期 | 114 | (1-3) | (1-3) | 97.4 | 98.2 | 93.1 | 99.6 | 59.0 |
| II期 | 121 | 10 | 0 | 100.0 | 91.7 | 85.2 | 95.5 | 57.9 |
| III期 | 35 | 10 | 0 | 100.0 | 71.4 | 53.4 | 83.5 | 52.9 |
| IV期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 281 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 87 | 67 | 65 | 41 | 21 | | |
| % | 31.0 | 23.8 | 23.1 | 14.6 | 7.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 114 | 121 | 35 | 11 | 0 | 0 | |
| % | 40.6 | 43.1 | 12.5 | 3.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 265 | 228 | 37 | 0 | | |
| % | 5.7 | 94.3 | 81.1 | 13.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 81 | (4-6) | 48 | 146 | | | |
| % | 28.8 | | 17.1 | 52.0 | | | |

11 岩手県立中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

「全体について」

地域の総合病院である当院では、高齢で基礎疾患をお持ちの患者、救急搬送や緊急手術を要する患者等が多い。また多くの紹介を受け入れるセンター病院であることから、自施設での治療割合が非常に高く、乳癌を除いては、全国や地域の病院と比べ病期の進行した症例の診療を実施している割合も高いのが特徴です。

11 岩手県立中央病院
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 396 | 182 | (1-3) | 99.7 | 54.0 | 48.9 | 58.7 | 71.0 |
| I期 | 236 | 56 | (1-3) | 99.6 | 76.2 | 70.2 | 81.1 | 71.6 |
| II期 | 31 | (7-9) | 0 | 100.0 | 74.2 | 55.0 | 86.2 | 68.4 |
| III期 | 30 | 24 | 0 | 100.0 | 20.0 | 8.1 | 35.6 | 76.4 |
| IV期 | 98 | 93 | 0 | 100.0 | 5.1 | 1.9 | 10.7 | 72.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 284 | 112 | | | | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 41 | 102 | 147 | 92 | | |
| % | 3.5 | 10.4 | 25.8 | 37.1 | 23.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 236 | 31 | 30 | 98 | (1-3) | 0 | |
| % | 59.6 | 7.8 | 7.6 | 24.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 44 | 352 | 298 | 54 | 0 | | |
| % | 11.1 | 88.9 | 75.3 | 13.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 69 | (7-9) | 78 | 240 | | | |
| % | 17.4 | | 19.7 | 60.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 580 | 234 | (1-3) | 99.7 | 59.7 | 55.5 | 63.5 | 70.8 |
| I期 | 122 | 21 | (1-3) | 99.2 | 82.8 | 74.8 | 88.4 | 69.6 |
| II期 | 162 | 47 | 0 | 100.0 | 71.0 | 63.3 | 77.3 | 70.6 |
| III期 | 163 | 57 | 0 | 100.0 | 65.0 | 57.2 | 71.8 | 69.6 |
| IV期 | 118 | 102 | 0 | 100.0 | 13.6 | 8.1 | 20.4 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 337 | 243 | | | | | |
| % | 58.1 | 41.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 66 | 154 | 193 | 143 | | |
| % | 4.1 | 11.4 | 26.6 | 33.3 | 24.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 122 | 162 | 163 | 118 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 21.0 | 27.9 | 28.1 | 20.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 529 | 450 | 77 | (1-3) | | |
| % | 8.8 | 91.2 | 77.6 | 13.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 88 | 11 | 116 | 365 | | | |
| % | 15.2 | 1.9 | 20.0 | 62.9 | | | |

11 岩手県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 96 | 65 | (1-3) | 99.0 | 31.6 | 22.6 | 41.0 | 70.3 |
| I期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 67.4 |
| II期 | 28 | 18 | 0 | | | | | 72.9 |
| III期 | 30 | 24 | 0 | 100.0 | 20.0 | 8.1 | 35.6 | 68.8 |
| IV期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 61 | 35 | | | | | |
| % | 63.5 | 36.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 29 | 30 | 22 | | |
| % | | 12.5 | 30.2 | 31.3 | 22.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 28 | 30 | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | 22.9 | 29.2 | 31.3 | 13.5 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 17 | 29 | 16 | 30 | (4-6) | 0 |
| | % | 17.7 | 30.2 | 16.7 | 31.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 76 | 20 | 18 | (1-3) | 0 | | |
| % | 79.2 | 20.8 | 18.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 36 | 57 | | | |
| % | | | 37.5 | 59.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 475 | 324 | 0 | 100.0 | 31.8 | 27.7 | 36.0 | 69.8 |
| I期 | 137 | 36 | 0 | 100.0 | 73.7 | 65.5 | 80.3 | 70.3 |
| II期 | 24 | 13 | 0 | | | | | 71.1 |
| III期 | 134 | 105 | 0 | 100.0 | 21.6 | 15.1 | 28.9 | 70.5 |
| IV期 | 175 | 167 | 0 | 100.0 | 4.6 | 2.1 | 8.4 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 331 | 144 | 対象数 | 31 | 444 | | |
| % | 69.7 | 30.3 | % | 6.5 | 93.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 51 | 142 | 194 | 72 | | |
| % | 3.4 | 10.7 | 29.9 | 40.8 | 15.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 137 | 24 | 134 | 175 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 28.8 | 5.1 | 28.2 | 36.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 302 | 173 | 167 | (4-6) | 0 | | |
| % | 63.6 | 36.4 | 35.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 113 | 19 | 132 | 211 | | | |
| % | 23.8 | 4.0 | 27.8 | 44.4 | | | |

11 岩手県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 310 | 29 | (1-3) | 99.7 | 90.6 | 86.8 | 93.4 | 59.1 |
| I期 | 155 | (4-6) | 0 | 100.0 | 96.1 | 91.6 | 98.2 | 57.9 |
| II期 | 94 | (7-9) | 0 | 100.0 | 91.5 | 83.7 | 95.7 | 59.1 |
| III期 | 49 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 81.3 | 67.1 | 89.8 | 63.4 |
| IV期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 55.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 310 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 89 | 81 | 60 | 45 | 35 | | |
| % | 28.7 | 26.1 | 19.4 | 14.5 | 11.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 155 | 94 | 49 | 11 | 0 | (1-3) | |
| % | 50.0 | 30.3 | 15.8 | 3.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 279 | 276 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 10.0 | 90.0 | 89.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 83 | (7-9) | 38 | 181 | | | |
| % | 26.8 | | 12.3 | 58.4 | | | |

12 岩手県立二戸病院
2010-2011年2力年

コメント:

胃、大腸ともに70歳以上が60%以上を占め、高齢化の比率は依然として高い。又、病期ではIV期の割合が高い（胃30.9%、大腸24.6%）。

県内の主要病院と比較し、胃と大腸の5年生存率はやや低い傾向があり、地方の高齢化とより進行した状態で受診している事が反映されていると思われる。

12 岩手県立二戸病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 94 | 53 | (4-6) | 95.7 | 42.1 | 31.8 | 52.0 | 73.3 |
| I期 | 53 | 18 | (1-3) | 94.3 | 64.6 | 49.8 | 76.0 | 75.2 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 79.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 65.3 |
| IV期 | 29 | 29 | 0 | | | | | 73.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 58 | 36 | | | | | |
| % | 61.7 | 38.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 21 | 32 | 31 | | |
| % | | | 22.3 | 34.0 | 33.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | (4-6) | (4-6) | 29 | (1-3) | 0 | |
| % | 56.4 | | | 30.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 63 | 49 | 13 | (1-3) | | |
| % | 33.0 | 67.0 | 52.1 | 13.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | (4-6) | (7-9) | 59 | | | |
| % | 23.4 | | | 62.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 167 | 84 | (1-3) | 98.8 | 49.2 | 41.4 | 56.5 | 71.8 |
| I期 | 29 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.7 |
| II期 | 53 | 19 | (1-3) | 98.1 | 63.6 | 49.0 | 75.0 | 73.8 |
| III期 | 36 | 15 | 0 | 100.0 | 58.3 | 40.7 | 72.4 | 67.6 |
| IV期 | 41 | 38 | 0 | 100.0 | 7.3 | 1.9 | 17.8 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 91 | 76 | | | | | |
| % | 54.5 | 45.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 42 | 54 | 48 | | |
| % | | 11.4 | 25.1 | 32.3 | 28.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 53 | 36 | 41 | (7-9) | 0 | |
| % | 17.4 | 31.7 | 21.6 | 24.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 122 | 100 | 22 | 0 | | |
| % | 26.9 | 73.1 | 59.9 | 13.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (4-6) | 24 | 106 | | | |
| % | 18.6 | | 14.4 | 63.5 | | | |

12 岩手県立二戸病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 22 | 21 | 0 | | | | | 73.1 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 62.3 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 80.5 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 14 | (7-9) | | | | | | |
| % | 63.6 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 0 | (7-9) | (4-6) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 18 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 81.8 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | 15 | | | | |
| % | | | | 68.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 28 | 28 | 0 | | | | | 78.2 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 95.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 81.0 |
| IV期 | 19 | 19 | 0 | | | | | 76.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 22 | (4-6) | 対象数 | | (1-3) | 26 |
| % | 78.6 | | % | | | 92.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 14 | |
| % | | | | | 50.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 19 | 0 | 0 |
| % | | | | 67.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | 23 | | |
| % | | | | 82.1 | | |

12 岩手県立二戸病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 67.8 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 50.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 65.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 78.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 17 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | | |
| % | 64.7 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | 13 | | | |
| % | | | | 76.5 | | | |

13 岩手医科大学附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院は厚生労働省より都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受け、岩手県内においてがん診療の中心的役割を担っております。また、県内唯一の特定機能病院であり、併存疾患を有する患者様や病期の進んだ患者様の診療も実施しております。

全体として、すべての病期をカバーしており、公表データ上には地域における診療連携での当院の役割が表れております。

本報告書の国立がん研究センターによる説明にもあるとおり、生存率には種々の要因が影響を与えます。また、公表項目には、各病期における患者様の年齢構成比や併存疾患保有の割合、化学療法や内分泌治療などの非観血的治療の実施は反映されておらず、病院の診療実態を表現し切れておりません。

当該公表データはがん以外の死因を含んでいること、またデータでの単純な比較によって、施設ごとの治療成績の良し悪しが論じられるものではない点にご留意頂いたうえでご覧ください。

13 岩手医科大学附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 548 | 131 | 11 | 98.0 | 76.0 | 72.1 | 79.3 | 69.1 |
| I期 | 437 | 64 | (7-9) | 98.2 | 85.3 | 81.6 | 88.3 | 69.8 |
| II期 | 22 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.4 |
| III期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 65.7 |
| IV期 | 65 | 53 | (1-3) | 98.5 | 17.4 | 9.3 | 27.6 | 64.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 385 | 163 | | | | | |
| % | 70.3 | 29.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 59 | 154 | 210 | 93 | | |
| % | 5.8 | 10.8 | 28.1 | 38.3 | 17.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 437 | 22 | 19 | 65 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 79.7 | 4.0 | 3.5 | 11.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 505 | 456 | 49 | 0 | | |
| % | 7.8 | 92.2 | 83.2 | 8.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 125 | 25 | 228 | 170 | | | |
| % | 22.8 | 4.6 | 41.6 | 31.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 359 | 129 | (4-6) | 98.3 | 63.8 | 58.6 | 68.6 | 68.3 |
| I期 | 83 | 17 | (1-3) | 98.8 | 79.3 | 68.8 | 86.6 | 68.9 |
| II期 | 93 | 18 | 0 | 100.0 | 80.7 | 71.1 | 87.3 | 69.7 |
| III期 | 101 | 36 | (1-3) | 98.0 | 64.3 | 54.1 | 72.8 | 66.4 |
| IV期 | 72 | 57 | (1-3) | 97.2 | 19.3 | 11.0 | 29.3 | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 216 | 143 | | | | | |
| % | 60.2 | 39.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 49 | 105 | 113 | 65 | | |
| % | 7.5 | 13.6 | 29.2 | 31.5 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 83 | 93 | 101 | 72 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 23.1 | 25.9 | 28.1 | 20.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 330 | 279 | 51 | 0 | | |
| % | 8.1 | 91.9 | 77.7 | 14.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 74 | 10 | 94 | 181 | | | |
| % | 20.6 | 2.8 | 26.2 | 50.4 | | | |

13 岩手医科大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 265 | 172 | (1-3) | 99.6 | 35.0 | 29.3 | 40.8 | 67.2 |
| I期 | 82 | 43 | (1-3) | 98.8 | 47.4 | 36.2 | 57.7 | 68.5 |
| II期 | 97 | 53 | 0 | 100.0 | 45.4 | 35.3 | 54.9 | 67.1 |
| III期 | 70 | 62 | 0 | 100.0 | 11.4 | 5.3 | 20.1 | 68.4 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 185 | 80 | | | | | |
| % | 69.8 | 30.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 44 | 90 | 87 | 33 | | |
| % | 4.2 | 16.6 | 34.0 | 32.8 | 12.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 82 | 97 | 70 | 13 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 30.9 | 36.6 | 26.4 | 4.9 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 27 | 77 | 86 | 69 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 10.2 | 29.1 | 32.5 | 26.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 237 | 28 | 27 | (1-3) | 0 | | |
| % | 89.4 | 10.6 | 10.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 199 | 55 | | | |
| % | | | 75.1 | 20.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 362 | 224 | (1-3) | 99.2 | 37.9 | 32.9 | 42.9 | 69.3 |
| I期 | 166 | 57 | 0 | 100.0 | 65.7 | 57.9 | 72.3 | 71.8 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 71.2 |
| III期 | 85 | 73 | (1-3) | 97.6 | 13.4 | 7.1 | 21.7 | 69.3 |
| IV期 | 94 | 86 | (1-3) | 98.9 | 7.5 | 3.3 | 14.0 | 64.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 252 | 110 | 対象数 | | 20 | 342 |
| % | 69.6 | 30.4 | % | | 5.5 | 94.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 16 | 46 | 100 | 150 | 50 | |
| % | 4.4 | 12.7 | 27.6 | 41.4 | 13.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 166 | 12 | 85 | 94 | (1-3) | (1-3) |
| % | 45.9 | 3.3 | 23.5 | 26.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 164 | 198 | 186 | 11 | (1-3) | |
| % | 45.3 | 54.7 | 51.4 | 3.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 77 | 11 | 150 | 124 | | |
| % | 21.3 | 3.0 | 41.4 | 34.3 | | |

13 岩手医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 273 | 40 | (4-6) | 98.2 | 85.3 | 80.5 | 89.0 | 57.3 |
| I期 | 125 | (4-6) | (1-3) | 97.6 | 96.0 | 90.7 | 98.3 | 60.6 |
| II期 | 81 | (7-9) | (1-3) | 98.8 | 91.3 | 82.7 | 95.8 | 53.1 |
| III期 | 43 | 15 | (1-3) | 97.7 | 64.9 | 48.6 | 77.1 | 58.0 |
| IV期 | 22 | 13 | 0 | | | | | 58.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 273 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 79 | 89 | 54 | 36 | 15 | | |
| % | 28.9 | 32.6 | 19.8 | 13.2 | 5.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 125 | 81 | 43 | 22 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.8 | 29.7 | 15.8 | 8.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 248 | 240 | (7-9) | 0 | | |
| % | 9.2 | 90.8 | 87.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | (4-6) | 38 | 173 | | | |
| % | 21.2 | | 13.9 | 63.4 | | | |

14 岩手県立中部病院
2011年のみ

コメント:

特になし

14 岩手県立中部病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 204 | 77 | (1-3) | 99.5 | 62.2 | 55.2 | 68.5 | 71.5 |
| I期 | 143 | 30 | (1-3) | 99.3 | 79.0 | 71.3 | 84.8 | 72.1 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | 15 | 10 | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 33 | 30 | 0 | 100.0 | 9.1 | 2.3 | 21.7 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 146 | 58 | | | | | |
| % | 71.6 | 28.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 57 | 71 | 51 | | |
| % | | 10.3 | 27.9 | 34.8 | 25.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 143 | 12 | 15 | 33 | (1-3) | 0 | |
| % | 70.1 | 5.9 | 7.4 | 16.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 169 | 158 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 17.2 | 82.8 | 77.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (4-6) | 47 | 121 | | | |
| % | 15.2 | | 23.0 | 59.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 172 | 62 | 0 | 100.0 | 64.0 | 56.3 | 70.6 | 71.8 |
| I期 | 44 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.8 | 66.9 | 90.5 | 71.4 |
| II期 | 49 | 11 | 0 | 100.0 | 77.6 | 63.1 | 86.9 | 73.2 |
| III期 | 46 | 16 | 0 | 100.0 | 65.2 | 49.6 | 77.0 | 72.7 |
| IV期 | 30 | 26 | 0 | 100.0 | 13.3 | 4.2 | 27.8 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 92 | 80 | | | | | |
| % | 53.5 | 46.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 44 | 60 | 46 | | |
| % | | 9.9 | 25.6 | 34.9 | 26.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | 49 | 46 | 30 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.6 | 28.5 | 26.7 | 17.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 152 | 131 | (4-6) | 15 | | |
| % | 11.6 | 88.4 | 76.2 | | 8.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (4-6) | 12 | 124 | | | |
| % | 18.0 | | 7.0 | 72.1 | | | |

14 岩手県立中部病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 37 | 27 | 0 | 100.0 | 27.0 | 14.1 | 41.8 | 66.0 |
| I期 | 18 | 11 | 0 | | | | | 68.6 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 63.0 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 66.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 59.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 30 | (7-9) | | | | | | |
| % | 81.1 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 13 | 12 | (1-3) | | | |
| % | | | 35.1 | 32.4 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 18 | (4-6) | (7-9) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 48.6 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 14 | (1-3) | 11 | (1-3) | 0 | |
| | % | | 37.8 | | 29.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 30 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | | | |
| % | 81.1 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 20 | 15 | | | | |
| % | | | 54.1 | 40.5 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 70 | 59 | 0 | 100.0 | 15.7 | 8.4 | 25.2 | 70.6 |
| I期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 70.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 77.9 |
| III期 | 24 | 23 | 0 | | | | | 70.0 |
| IV期 | 28 | 26 | 0 | | | | | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 52 | 18 | 対象数 | | (4-6) | 65 | | |
| % | 74.3 | 25.7 | % | | | 92.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 17 | 29 | 15 | | | |
| % | | | 24.3 | 41.4 | 21.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | 24 | 28 | (1-3) | 0 | | |
| % | 14.3 | | 34.3 | 40.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 63 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 90.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 21 | 38 | | | | |
| % | | | 30.0 | 54.3 | | | | |

14 岩手県立中部病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 46 | 10 | (1-3) | 95.7 | 78.0 | 63.0 | 87.5 | 62.3 |
| I期 | 26 | (1-3) | (1-3) | | | | | 61.0 |
| II期 | 12 | (1-3) | (1-3) | | | | | 62.2 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 71.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 52.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 46 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 11 | (7-9) | 14 | (4-6) | | |
| % | 21.7 | 23.9 | | 30.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 12 | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 56.5 | 26.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 43 | 41 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 93.5 | 89.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (1-3) | (4-6) | 24 | | | |
| % | 30.4 | | | 52.2 | | | |

15 岩手県立磐井病院
2011年のみ

コメント:

特になし

15 岩手県立磐井病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 111 | 48 | (1-3) | 99.1 | 56.4 | 46.6 | 65.0 | 72.1 |
| I期 | 58 | (4-6) | 0 | 100.0 | 91.4 | 80.5 | 96.3 | 71.9 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 69.6 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 69.6 |
| IV期 | 27 | 26 | (1-3) | | | | | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 75 | 36 | | | | | |
| % | 67.6 | 32.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 29 | 47 | 23 | | |
| % | | 9.0 | 26.1 | 42.3 | 20.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 58 | 10 | (7-9) | 27 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 52.3 | 9.0 | | 24.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | 69 | 66 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 37.8 | 62.2 | 59.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (1-3) | 30 | 62 | | | |
| % | 16.2 | | 27.0 | 55.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 112 | 45 | (1-3) | 97.3 | 59.2 | 49.5 | 67.7 | 71.0 |
| I期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 71.5 |
| II期 | 31 | (4-6) | (1-3) | 93.5 | 80.0 | 60.8 | 90.5 | 70.1 |
| III期 | 26 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.8 |
| IV期 | 25 | 22 | 0 | | | | | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 64 | 48 | | | | | |
| % | 57.1 | 42.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 29 | 39 | 26 | | |
| % | | 12.5 | 25.9 | 34.8 | 23.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 31 | 26 | 25 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 22.3 | 27.7 | 23.2 | 22.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 89 | 86 | 0 | (1-3) | | |
| % | 20.5 | 79.5 | 76.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (1-3) | 18 | 77 | | | |
| % | 12.5 | | 16.1 | 68.8 | | | |

15 岩手県立磐井病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 19 | 18 | 0 | | | | | 74.5 |
| I期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 65.2 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 85.3 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.8 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 12 | (7-9) | | | | | |
| % | 63.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (7-9) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | | |
| % | 84.2 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 11 | (4-6) | | | |
| % | | | 57.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 11 | (7-9) | (1-3) | | | | | 79.8 |
| I期 | (1-3) | 0 | (1-3) | | | | | 77.0 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | | | | 77.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 80.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | | (1-3) | (7-9) | |
| % | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | | |
| % | | | | | | |

15 岩手県立磐井病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 34 | (4-6) | 0 | 100.0 | 85.3 | 68.2 | 93.6 | 63.6 |
| I期 | 17 | (1-3) | 0 | | | | | 64.7 |
| II期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 63.2 |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 47.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 34 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (7-9) | 10 | (4-6) | | |
| % | | | | 29.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 17 | 11 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 50.0 | 32.4 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 29 | 28 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 85.3 | 82.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (7-9) | 18 | | | |
| % | | | | 52.9 | | | |

16 岩手県立大船渡病院
2011年のみ

コメント:

当院は地域の中核病院であり、高齢で基礎疾患を有する患者が多いことから、病期の進行した症例の割合が高く、生存率は全体と比較して低くなったものと考えられます。
また、2011年をみの1年分のデータになっています。

16 岩手県立大船渡病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 31 | 21 | 0 | 100.0 | 32.3 | 16.9 | 48.6 | 75.2 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 72.7 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 68.7 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 75.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 19 | 12 | | | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | 11 | | |
| % | | | | | 35.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 10 | (1-3) | 0 | |
| % | | | | 32.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 21 | 15 | (4-6) | 0 | | |
| % | 32.3 | 67.7 | 48.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 21 | | | |
| % | | | | 67.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 64 | 36 | 0 | 100.0 | 43.8 | 31.5 | 55.4 | 73.8 |
| I期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 68.1 |
| II期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 74.3 |
| III期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 75.6 |
| IV期 | 20 | 19 | 0 | | | | | 76.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 46 | 18 | | | | | |
| % | 71.9 | 28.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 16 | 23 | 20 | | |
| % | | | 25.0 | 35.9 | 31.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 12 | 15 | 13 | 20 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 18.8 | 23.4 | 20.3 | 31.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 53 | 39 | 13 | (1-3) | | |
| % | 17.2 | 82.8 | 60.9 | 20.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 22 | 38 | | | |
| % | | | 34.4 | 59.4 | | | |

16 岩手県立大船渡病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 73.3 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.3 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 59.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 75.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 84.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 83.1 |
| I期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 81.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 対象数 | | 0 | (7-9) |
| % | | | % | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (7-9) | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | | | | | | |

16 岩手県立大船渡病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 24 | (4-6) | 0 | | | | | 66.5 |
| I期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 65.6 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 70.3 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 67.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 43.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 24 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 11 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 45.8 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 23 | 22 | 0 | (1-3) | | |
| % | | 95.8 | 91.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 0 | (1-3) | 17 | | | |
| % | | | | 70.8 | | | |

17

東北大学病院

2010－2011年2力年

コメント:

東北大学病院は、最先端の医療技術の開発・応用・評価を目指した特定機能病院であり、宮城県内はもとより東北地方、さらには全国各地から多くの患者さんの紹介を頂いております。生存率を医療施設の間で比較する場合には、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無などの要因を揃えて比較する必要があります。しかし、今回の集計は、がん医療体制の違いによる対象者の違いや合併症の有無が考慮されておられません。

ご自身またはご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご心配がありましたら、是非、主治医にご相談されることをお勧めします。

17 東北大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 336 | 101 | (1-3) | 99.4 | 69.9 | 64.6 | 74.5 | 68.8 |
| I期 | 268 | 44 | (1-3) | 99.3 | 83.5 | 78.5 | 87.5 | 70.2 |
| II期 | 13 | 10 | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 59.1 |
| IV期 | 40 | 36 | 0 | 100.0 | 10.0 | 3.2 | 21.5 | 63.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 268 | 68 | | | | | |
| % | 79.8 | 20.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 36 | 105 | 140 | 37 | | |
| % | 5.4 | 10.7 | 31.3 | 41.7 | 11.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 268 | 13 | 12 | 40 | (1-3) | 0 | |
| % | 79.8 | 3.9 | 3.6 | 11.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 285 | 278 | (7-9) | 0 | | |
| % | 15.2 | 84.8 | 82.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 109 | 15 | 127 | 85 | | | |
| % | 32.4 | 4.5 | 37.8 | 25.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 145 | 63 | (1-3) | 99.3 | 56.5 | 48.0 | 64.1 | 68.5 |
| I期 | 36 | 10 | (1-3) | 97.2 | 72.1 | 54.4 | 83.9 | 70.8 |
| II期 | 37 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.1 | 64.4 | 90.5 | 68.4 |
| III期 | 27 | 10 | 0 | | | | | 75.2 |
| IV期 | 42 | 33 | 0 | 100.0 | 21.4 | 10.6 | 34.7 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 82 | 63 | | | | | |
| % | 56.6 | 43.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 26 | 38 | 42 | 30 | | |
| % | | 17.9 | 26.2 | 29.0 | 20.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 37 | 27 | 42 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 24.8 | 25.5 | 18.6 | 29.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 119 | 99 | 18 | (1-3) | | |
| % | 17.9 | 82.1 | 68.3 | 12.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (7-9) | 65 | 55 | | | |
| % | 12.4 | | 44.8 | 37.9 | | | |

17 東北大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 128 | 69 | (4-6) | 96.1 | 45.2 | 36.3 | 53.6 | 66.5 |
| I期 | 54 | 16 | (4-6) | 92.6 | 69.3 | 54.8 | 80.0 | 66.3 |
| II期 | 32 | 20 | 0 | 100.0 | 37.5 | 21.3 | 53.7 | 64.1 |
| III期 | 29 | 23 | 0 | | | | | 65.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|-------|
| 対象数 | 93 | 35 | | | | | |
| % | 72.7 | 27.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 15 | 35 | 60 | (7-9) | | |
| % | 8.6 | 11.7 | 27.3 | 46.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 54 | 32 | 29 | (7-9) | 0 | (4-6) |
| | % | 42.2 | 25.0 | 22.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 20 | 51 | 27 | 21 | 0 | (4-6) |
| | % | 15.6 | 39.8 | 21.1 | 16.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 65 | 63 | 59 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 50.8 | 49.2 | 46.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 92 | 32 | | | |
| % | | | 71.9 | 25.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 373 | 232 | (4-6) | 98.9 | 37.4 | 32.4 | 42.3 | 69.2 |
| I期 | 136 | 37 | (1-3) | 97.8 | 72.4 | 63.9 | 79.1 | 70.3 |
| II期 | 32 | 23 | 0 | 100.0 | 28.1 | 14.0 | 44.1 | 70.5 |
| III期 | 93 | 71 | (1-3) | 98.9 | 22.9 | 15.0 | 31.9 | 67.9 |
| IV期 | 108 | 98 | 0 | 100.0 | 9.3 | 4.7 | 15.6 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 268 | 105 | 対象数 | 33 | 340 | | |
| % | 71.8 | 28.2 | % | 8.8 | 91.2 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 45 | 101 | 147 | 61 | | |
| % | 5.1 | 12.1 | 27.1 | 39.4 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 136 | 32 | 93 | 108 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 36.5 | 8.6 | 24.9 | 29.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 236 | 137 | 130 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 63.3 | 36.7 | 34.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 74 | 16 | 188 | 95 | | | |
| % | 19.8 | 4.3 | 50.4 | 25.5 | | | |

17 東北大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 219 | 32 | (1-3) | 99.5 | 85.4 | 79.9 | 89.4 | 56.4 |
| I期 | 99 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.0 | 88.3 | 97.9 | 59.2 |
| II期 | 65 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.8 | 80.6 | 95.7 | 54.3 |
| III期 | 31 | (7-9) | (1-3) | 96.8 | 73.8 | 54.4 | 86.0 | 56.9 |
| IV期 | 23 | 12 | 0 | | | | | 48.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 219 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 74 | 60 | 48 | 26 | 11 | | |
| % | 33.8 | 27.4 | 21.9 | 11.9 | 5.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 99 | 65 | 31 | 23 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.2 | 29.7 | 14.2 | 10.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 184 | 171 | 10 | (1-3) | | |
| % | 16.0 | 84.0 | 78.1 | 4.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 65 | (1-3) | 52 | 99 | | | |
| % | 29.7 | | 23.7 | 45.2 | | | |

宮城県立がんセンター
2010-2011年2力年

コメント:

2010-2011年の5年生存率集計施設別集計のコメント

生存率は、そのまま治療成績を示すわけではありません。生存率は、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係します。治療成績を比較する場合には、これらの要因を揃えて生存率を比較する必要があります。生存率が低い病院が、実は、地域の最後の砦として、他の病院よりも治療が難しい患者さんを多く受け入れているため、結果として生存率が低いということも考えられます。かかりつけの医師またはがん診療連携拠点病院にご相談されることをお勧めします。なお、当院における各部位についてのコメントは以下のとおりです。

【胃】

胃について公表された病期I期、IV期の実測5年生存率はがん診療連携拠点病院等の全体の値と比べ差はありませんでした。症例数が少ないII期、III期については非公表となっているためコメントはありません。当院の特徴として、がん検診で発見された症例の割合が高いため、I期の患者が多く、胃がん全体の実測生存率は良好でした。

【大腸】

平均年齢は69.2歳と、全施設と比較して大きな違いはありませんでした。当院の実測生存率は、いずれのステージでも全国平均よりも高い数値を示しています。当院のステージIIIの5年生存率は77.8%ですが、実臨床からはおおむねこのような結果と予測できます。臨床診断、外科治療、切除標本の取扱い、病理診断、追跡調査などの取組みから、より精度の高い結果が得られるように、また症例の集積に努めていくことが重要と考えます。

【肝】

2010年-2011年の全体の実測生存率は、2009年-2010年のそれと比較して低下していますが、これは2010年-2011年においては、UICC TNM総合ステージでIII期が26.3%(10例)と多かったためと考えられます。切除不能で局所療法への適応のない肝細胞癌に対して分子標的薬の使用が可能となったことから、今後、生存率の向上が見込まれます。

【肺】

肺がんは病期ごとに生存率が異なります。I期症例であれば、5年生存率を治療効果の指標とできますが、III期、IV期症例の場合は、生存期間は短く5年生存率による評価は困難です。しかし、分子標的治療の対象遺伝子が増えてきていることや2016年から免疫治療が実用化されていることから、肺がんの治療は急激に進歩しているため、5年生存率はこれから少しずつ改善していくことが期待できます。

【女性乳房】

当院のI期、II期の割合は83.3%と全国と比較しても若干多いと思われます。I期、II期の生存率は全国集計と比較してもほぼ同様から若干良好でした。生存状況把握割合も99%以上と、良好と思われます。周術期全身治療も進歩しており、今後さらなる改善が期待できます。III期、IV期に関しては非公表となっておりますのでコメントはありません。

18 宮城県立がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 345 | 120 | (4-6) | 98.8 | 65.2 | 59.9 | 69.9 | 70.5 |
| I期 | 249 | 44 | (1-3) | 98.8 | 82.3 | 76.9 | 86.5 | 71.3 |
| II期 | 27 | 13 | (1-3) | | | | | 67.6 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 66.2 |
| IV期 | 53 | 52 | 0 | 100.0 | 1.9 | 0.2 | 8.8 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 246 | 99 | | | | | |
| % | 71.3 | 28.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 49 | 93 | 131 | 66 | | |
| % | | 14.2 | 27.0 | 38.0 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 249 | 27 | 10 | 53 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 72.2 | 7.8 | 2.9 | 15.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 59 | 286 | 267 | (7-9) | 11 | | |
| % | 17.1 | 82.9 | 77.4 | | 3.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 107 | 36 | 77 | 125 | | | |
| % | 31.0 | 10.4 | 22.3 | 36.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 177 | 58 | (4-6) | 97.7 | 67.1 | 59.6 | 73.5 | 69.2 |
| I期 | 54 | (4-6) | (1-3) | 98.1 | 88.9 | 76.9 | 94.8 | 71.2 |
| II期 | 43 | (7-9) | (1-3) | 97.7 | 79.0 | 63.5 | 88.5 | 67.1 |
| III期 | 37 | (7-9) | (1-3) | 94.6 | 77.8 | 60.4 | 88.2 | 70.0 |
| IV期 | 41 | 35 | 0 | 100.0 | 14.6 | 5.9 | 27.0 | 64.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 94 | 83 | | | | | |
| % | 53.1 | 46.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 26 | 47 | 56 | 38 | | |
| % | 5.6 | 14.7 | 26.6 | 31.6 | 21.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | 43 | 37 | 41 | 0 | (1-3) | |
| % | 30.5 | 24.3 | 20.9 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 139 | 131 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 21.5 | 78.5 | 74.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 65 | (7-9) | 21 | 84 | | | |
| % | 36.7 | | 11.9 | 47.5 | | | |

18 宮城県立がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 38 | 31 | (1-3) | 97.4 | 16.2 | 6.6 | 29.7 | 67.9 |
| I期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 75.8 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 73.8 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 67.2 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 52.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|
| 対象数 | 27 | 11 | | | | | |
| % | 71.1 | 28.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (7-9) | 14 | (7-9) | | |
| % | | | | 36.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 10 | (7-9) | 10 | (7-9) | 0 | 0 |
| | % | 26.3 | | 26.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | (4-6) | 10 | 14 | 0 | 0 |
| | % | | | 26.3 | 36.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 19 | 18 | | | |
| % | | | 50.0 | 47.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 396 | 241 | (4-6) | 98.5 | 38.9 | 34.1 | 43.7 | 68.7 |
| I期 | 165 | 42 | (4-6) | 97.6 | 74.3 | 66.9 | 80.3 | 69.3 |
| II期 | 19 | 14 | 0 | | | | | 69.4 |
| III期 | 73 | 59 | (1-3) | 98.6 | 19.2 | 11.1 | 28.9 | 71.4 |
| IV期 | 138 | 126 | (1-3) | 99.3 | 8.3 | 4.4 | 13.7 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 272 | 124 | 対象数 | | 31 | 365 |
| % | 68.7 | 31.3 | % | | 7.8 | 92.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 18 | 44 | 136 | 142 | 56 | |
| % | 4.5 | 11.1 | 34.3 | 35.9 | 14.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 165 | 19 | 73 | 138 | 0 | (1-3) |
| % | 41.7 | 4.8 | 18.4 | 34.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 233 | 163 | 118 | (7-9) | 38 | |
| % | 58.8 | 41.2 | 29.8 | | 9.6 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 136 | 30 | 69 | 161 | | |
| % | 34.3 | 7.6 | 17.4 | 40.7 | | |

18 宮城県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 222 | 21 | (1-3) | 99.5 | 90.5 | 85.9 | 93.7 | 59.0 |
| I期 | 117 | (1-3) | (1-3) | 99.1 | 98.3 | 93.3 | 99.6 | 61.5 |
| II期 | 68 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.7 | 83.2 | 96.9 | 60.9 |
| III期 | 22 | (4-6) | 0 | | | | | 55.8 |
| IV期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 52.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 222 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 60 | 57 | 48 | 40 | 17 | | |
| % | 27.0 | 25.7 | 21.6 | 18.0 | 7.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 117 | 68 | 22 | 13 | (1-3) | 0 | |
| % | 52.7 | 30.6 | 9.9 | 5.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 188 | 152 | (1-3) | 35 | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 68.5 | | 15.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 71 | (1-3) | 21 | 127 | | | |
| % | 32.0 | | 9.5 | 57.2 | | | |

19 石巻赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

19 石巻赤十字病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 116 | 0 | 100.0 | 51.7 | 45.2 | 57.8 | 72.2 |
| I期 | 156 | 52 | 0 | 100.0 | 66.7 | 58.7 | 73.5 | 72.0 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | 15 | 13 | 0 | | | | | 70.7 |
| IV期 | 44 | 40 | 0 | 100.0 | 9.1 | 2.9 | 19.7 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 155 | 85 | | | | | |
| % | 64.6 | 35.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 56 | 98 | 60 | | |
| % | | 8.8 | 23.3 | 40.8 | 25.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 156 | 20 | 15 | 44 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 65.0 | 8.3 | 6.3 | 18.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 185 | 175 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 22.9 | 77.1 | 72.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | 13 | 70 | 129 | | | |
| % | 11.7 | 5.4 | 29.2 | 53.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 270 | 103 | (4-6) | 98.5 | 61.5 | 55.3 | 67.0 | 71.8 |
| I期 | 73 | 11 | 0 | 100.0 | 84.9 | 74.4 | 91.4 | 74.5 |
| II期 | 62 | 12 | 0 | 100.0 | 80.7 | 68.4 | 88.5 | 72.7 |
| III期 | 69 | 22 | (1-3) | 98.6 | 67.7 | 55.2 | 77.4 | 72.0 |
| IV期 | 63 | 56 | (1-3) | 95.2 | 7.6 | 2.6 | 16.3 | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 145 | 125 | | | | | |
| % | 53.7 | 46.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 29 | 74 | 91 | 70 | | |
| % | | 10.7 | 27.4 | 33.7 | 25.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 73 | 62 | 69 | 63 | (1-3) | 0 | |
| % | 27.0 | 23.0 | 25.6 | 23.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 57 | 213 | 196 | 16 | (1-3) | | |
| % | 21.1 | 78.9 | 72.6 | 5.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | (4-6) | 59 | 163 | | | |
| % | 15.6 | | 21.9 | 60.4 | | | |

19 石巻赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 45 | 31 | (1-3) | 97.8 | 30.0 | 17.4 | 43.8 | 72.2 |
| I期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 71.8 |
| II期 | 12 | (1-3) | (1-3) | | | | | 68.3 |
| III期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 75.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 79.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 30 | 15 | | | | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 10 | 23 | (7-9) | | | |
| % | | | 22.2 | 51.1 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 12 | 12 | 14 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 26.7 | 26.7 | 31.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 11 | (4-6) | 16 | (1-3) | 0 | |
| | % | 26.7 | 24.4 | | 35.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 34 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 75.6 | 24.4 | 22.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 19 | 23 | | | | |
| % | | | 42.2 | 51.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 342 | 238 | 0 | 100.0 | 30.4 | 25.6 | 35.3 | 72.0 |
| I期 | 133 | 52 | 0 | 100.0 | 60.9 | 52.1 | 68.6 | 72.9 |
| II期 | 24 | 15 | 0 | | | | | 68.9 |
| III期 | 85 | 77 | 0 | 100.0 | 9.4 | 4.4 | 16.7 | 71.8 |
| IV期 | 97 | 92 | 0 | 100.0 | 5.2 | 1.9 | 10.8 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 256 | 86 | 対象数 | | 40 | 302 | | |
| % | 74.9 | 25.1 | % | | 11.7 | 88.3 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 16 | 22 | 85 | 138 | 81 | | | |
| % | 4.7 | 6.4 | 24.9 | 40.4 | 23.7 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 133 | 24 | 85 | 97 | (1-3) | 0 | | |
| % | 38.9 | 7.0 | 24.9 | 28.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 192 | 150 | 149 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 56.1 | 43.9 | 43.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 34 | 39 | 107 | 162 | | | | |
| % | 9.9 | 11.4 | 31.3 | 47.4 | | | | |

19 石巻赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 46 | (1-3) | 99.6 | 80.8 | 75.2 | 85.3 | 60.3 |
| I期 | 113 | (7-9) | 0 | 100.0 | 92.0 | 85.3 | 95.8 | 59.4 |
| II期 | 78 | 16 | (1-3) | 98.7 | 79.4 | 68.6 | 86.8 | 58.3 |
| III期 | 39 | 12 | 0 | 100.0 | 69.2 | 52.2 | 81.2 | 61.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 54.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 240 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 66 | 48 | 54 | 55 | 17 | | |
| % | 27.5 | 20.0 | 22.5 | 22.9 | 7.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 113 | 78 | 39 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 47.1 | 32.5 | 16.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 213 | 199 | 14 | 0 | | |
| % | 11.3 | 88.8 | 82.9 | 5.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 55 | (1-3) | 26 | 156 | | | |
| % | 22.9 | | 10.8 | 65.0 | | | |

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

仙台医療センターにおける2010年～2011年の5年生存率集計結果を全国の集計結果と比較してコメントします。当院は2006年から「地域がん診療連携拠点病院」に認定されていますが、同時に救命救急・災害対策・エイズ治療の拠点病院でもあることからがん診療に特化したハイボリュームセンターとは異なった背景を持ちます。集計対象が30例未満の項目は数値が示されておりません。

(胃) 5年生存率の実測生存率は61.4%で全国平均とほぼ同等でした。ステージはI期が59.7%と全国平均63.8%よりやや少なくIV期が22.3%とやや多い傾向です。観血的治療ありが83.2%と平均80.5%よりわずかに高いです。治癒切除症例割合はほぼ同等でした。発見経緯はがん検診が20.6%と2009年までより多いようです。

(大腸) 5年生存率の実測生存率は63.5%と全国平均とほぼ同等でした。ステージもI～IVまでほぼ同等で2009年までよりステージの早い患者さんが多いです。観血的治療は92.2%と全国平均87.6%よりやや高いようです。治癒切除症例の割合はわずかに高い程度です。発見経緯はがん検診・健康診断は全国平均とほぼ同等ですが、2009年までより増加しておりステージの早い患者さんが多くなった理由であると考えます。

(肝) 5年生存率の実測生存率は22.3%で全国平均35.1%を下回っています。5大がんの中では肝がんの5年生存率は低く、その疾患的背景において当院のステージI期28.6%が全国平均39.8%を大きく下回っていることが原因と考えます。観血的治療は15.3%で、これも全国平均27.8%より大きく下回っています。以上が実測生存率低下の要因と考えられます。発見経緯はがん検診・健康診断が30人以下であり数値が示されていませんが、他の数値から全国平均と大きく差はないと考えます。

(肺) 5年生存率の実測生存率は48%で全国平均36.3%を大きく上回っています。ステージはI期が多くIV期が少なく、他はほぼ全国平均と同等です。観血的治療は51.6%と全国平均43.3%を上回っています。I期の肺がんが多いことが原因と考えられます。発見経緯はがん検診・健康診断が43.7%と全国平均20.3%を大きく上回っており、早期発見・早期治療が生存率の改善に寄与していると考えられます。

(女性乳房) 5年生存率の実測生存率は89.7%で全国平均とほぼ同等でした。ステージI～IVはほぼ全国平均と変わらず、観血的治療は95.2%と全国平均89.8%より多いです。治癒切除症例はほぼ同等と考えます。発見経緯も健康診断が30人以下で数値が示されていませんが他の数値からの推定から全国の病院の平均とほぼ同等と考えられます。

以上から2010～2011年では胃・大腸がんががん検診・健康診断での紹介患者が増加していることが調査結果に反映されていると考えます。

20 胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 238 | 91 | (7-9) | 97.1 | 61.4 | 54.8 | 67.2 | 68.1 |
| I期 | 142 | 28 | (1-3) | 97.9 | 80.2 | 72.7 | 85.9 | 69.9 |
| II期 | 16 | (1-3) | (1-3) | | | | | 65.5 |
| III期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 76.6 |
| IV期 | 53 | 47 | (1-3) | 96.2 | 8.7 | 2.9 | 18.6 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 164 | 74 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 34 | 75 | 73 | 43 | | |
| % | 5.5 | 14.3 | 31.5 | 30.7 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 142 | 16 | 14 | 53 | 10 | (1-3) | |
| % | 59.7 | 6.7 | 5.9 | 22.3 | 4.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 198 | 185 | 10 | (1-3) | | |
| % | 16.8 | 83.2 | 77.7 | 4.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 49 | (7-9) | 72 | 109 | | | |
| % | 20.6 | | 30.3 | 45.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 293 | 102 | 17 | 94.2 | 64.3 | 58.4 | 69.5 | 67.3 |
| I期 | 67 | 12 | (4-6) | 94.0 | 81.5 | 69.8 | 89.1 | 66.4 |
| II期 | 74 | 13 | (1-3) | 95.9 | 82.3 | 71.5 | 89.3 | 69.0 |
| III期 | 81 | 30 | (4-6) | 92.6 | 61.2 | 49.4 | 71.1 | 67.1 |
| IV期 | 56 | 43 | (1-3) | 96.4 | 21.4 | 11.7 | 33.1 | 66.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 164 | 129 | | | | | |
| % | 56.0 | 44.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 51 | 83 | 77 | 57 | | |
| % | 8.5 | 17.4 | 28.3 | 26.3 | 19.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 74 | 81 | 56 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 22.9 | 25.3 | 27.6 | 19.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 270 | 241 | 21 | (7-9) | | |
| % | 7.8 | 92.2 | 82.3 | 7.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 43 | 14 | 77 | 159 | | | |
| % | 14.7 | 4.8 | 26.3 | 54.3 | | | |

20 肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 98 | 75 | (1-3) | 96.9 | 22.8 | 15.0 | 31.6 | 72.2 |
| I期 | 28 | 14 | 0 | | | | | 75.8 |
| II期 | 27 | 22 | (1-3) | | | | | 70.8 |
| III期 | 28 | 24 | (1-3) | | | | | 71.4 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|--|
| 対象数 | 68 | 30 | | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 23 | 43 | 23 | | | |
| % | | | 23.5 | 43.9 | 23.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 27 | 28 | 10 | (4-6) | 0 | |
| | % | 28.6 | 27.6 | 28.6 | 10.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 27 | 27 | 16 | (4-6) | 0 | |
| | % | 23.5 | 27.6 | 27.6 | 16.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 83 | 15 | 15 | 0 | 0 | | | |
| % | 84.7 | 15.3 | 15.3 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 59 | 36 | | | | |
| % | | | 60.2 | 36.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 304 | 157 | 11 | 96.4 | 48.0 | 42.2 | 53.5 | 69.0 |
| I期 | 137 | 27 | (4-6) | 96.4 | 80.2 | 72.4 | 86.0 | 71.7 |
| II期 | 20 | (7-9) | (1-3) | | | | | 65.9 |
| III期 | 67 | 50 | (1-3) | 95.5 | 23.8 | 14.3 | 34.7 | 69.7 |
| IV期 | 72 | 67 | 0 | 100.0 | 6.9 | 2.6 | 14.3 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 対象数 | 203 | 101 | 対象数 | 23 | 281 | | | |
| % | 66.8 | 33.2 | % | 7.6 | 92.4 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 34 | 107 | 113 | 41 | | | |
| % | | 11.2 | 35.2 | 37.2 | 13.5 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 137 | 20 | 67 | 72 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 45.1 | 6.6 | 22.0 | 23.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 147 | 157 | 149 | (4-6) | (1-3) | | | |
| % | 48.4 | 51.6 | 49.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 101 | 32 | 82 | 89 | | | | |
| % | 33.2 | 10.5 | 27.0 | 29.3 | | | | |

20 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 165 | 17 | 11 | 93.3 | 89.7 | 83.9 | 93.4 | 58.2 |
| I期 | 65 | (4-6) | (4-6) | 93.8 | 93.9 | 84.4 | 97.6 | 60.6 |
| II期 | 69 | (1-3) | (1-3) | 95.7 | 95.7 | 87.1 | 98.6 | 60.8 |
| III期 | 18 | (1-3) | (4-6) | | | | | 56.0 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 55.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 165 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 51 | 45 | 28 | 25 | 16 | | |
| % | 30.9 | 27.3 | 17.0 | 15.2 | 9.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 65 | 69 | 18 | 10 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 39.4 | 41.8 | 10.9 | 6.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 157 | 141 | (1-3) | 14 | | |
| % | | 95.2 | 85.5 | | 8.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | 22 | 104 | | | |
| % | 20.6 | | 13.3 | 63.0 | | | |

21

大崎市民病院

2010-2011年2力年

コメント:

【胃】

2009-2010年同様、集計対象者数が364件と県内最多であり、宮城県北の拠点病院として重要な役割を果たしています。当院の特徴としては、70代・80代以上の割合（65.4%）が、全国平均（55.5%）、宮城県平均（57.3%）より高く5年生存率に影響していると思われます。またステージ別では、I期（早期）の割合（59.9%）が、全国平均（63.8%）、宮城県平均（67.9%）より低く、これも5年生存率に影響していると考えられます。

【大腸】

2010-2011年は、生存率が全国平均よりやや低い結果でした。これは、80歳以上の高齢者が多く、進行癌の割合が高い事が要因と考えられるため、これらの要因を考慮すると、概ね全国平均に近いものと予想されます。

【肝臓】

2010-2011年当時は、肝臓外科標榜前であり、治癒切除が期待できる症例等は、他施設に依頼していた背景があります。また、地域事情により他施設診断時に終末期にある症例も、緩和医療として引き受けていた背景があり、これらが5年生存率に影響していると考えられます。

【肺】

2010-2011年当時は呼吸器外科は標榜しておらず、I期の肺癌症例は他疾患の合併が多く、予後規定は併存疾患によるものと考えます。内科で診療を行うIV期はほぼ全国と同程度でした。

【乳】患者数はほぼ例年通りで、生存率も大きな変化はありませんでした。ステージI, IIの方が大多数を占め、約2割が検診で発見されています。検診で早期発見された患者の割合が増えれば、自ずと治療成績もさらに向上するものと思われます。

21 大崎市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 364 | 173 | (1-3) | 99.7 | 52.4 | 47.2 | 57.4 | 72.1 |
| I期 | 218 | 51 | (1-3) | 99.5 | 76.6 | 70.4 | 81.7 | 73.1 |
| II期 | 42 | 24 | 0 | 100.0 | 42.9 | 27.8 | 57.1 | 66.5 |
| III期 | 28 | 25 | 0 | | | | | 70.8 |
| IV期 | 62 | 60 | 0 | 100.0 | 3.2 | 0.6 | 9.9 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 239 | 125 | | | | | |
| % | 65.7 | 34.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 33 | 80 | 140 | 98 | | |
| % | 3.6 | 9.1 | 22.0 | 38.5 | 26.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 218 | 42 | 28 | 62 | 12 | (1-3) | |
| % | 59.9 | 11.5 | 7.7 | 17.0 | 3.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 80 | 284 | 241 | 15 | 28 | | |
| % | 22.0 | 78.0 | 66.2 | 4.1 | 7.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 61 | 13 | 47 | 243 | | | |
| % | 16.8 | 3.6 | 12.9 | 66.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 379 | 153 | (1-3) | 99.5 | 59.5 | 54.3 | 64.2 | 70.4 |
| I期 | 103 | 23 | (1-3) | 98.1 | 77.3 | 67.8 | 84.3 | 69.7 |
| II期 | 104 | 33 | 0 | 100.0 | 68.3 | 58.4 | 76.3 | 72.0 |
| III期 | 104 | 44 | 0 | 100.0 | 57.7 | 47.6 | 66.5 | 72.1 |
| IV期 | 49 | 45 | 0 | 100.0 | 8.2 | 2.6 | 17.9 | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 218 | 161 | | | | | |
| % | 57.5 | 42.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 59 | 96 | 104 | 105 | | |
| % | 4.0 | 15.6 | 25.3 | 27.4 | 27.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 103 | 104 | 104 | 49 | 14 | (4-6) | |
| % | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 12.9 | 3.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 333 | 231 | 24 | 78 | | |
| % | 12.1 | 87.9 | 60.9 | 6.3 | 20.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 68 | 16 | 47 | 248 | | | |
| % | 17.9 | 4.2 | 12.4 | 65.4 | | | |

21 大崎市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 63 | 48 | (1-3) | 98.4 | 22.6 | 13.2 | 33.6 | 73.3 |
| I期 | 26 | 17 | 0 | | | | | 73.3 |
| II期 | 18 | 13 | 0 | | | | | 71.7 |
| III期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 68.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 45 | 18 | | | | | | |
| % | 71.4 | 28.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 10 | 27 | 19 | | | |
| % | | | 15.9 | 42.9 | 30.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 26 | 18 | 10 | (1-3) | (4-6) | 0 | |
| | % | 41.3 | 28.6 | 15.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 28 | (7-9) | (4-6) | (7-9) | 0 | |
| | % | 20.6 | 44.4 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 61 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | | | |
| % | 96.8 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 21 | 40 | | | | |
| % | | | 33.3 | 63.5 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 174 | 146 | 0 | 100.0 | 16.1 | 11.1 | 21.9 | 71.0 |
| I期 | 33 | 17 | 0 | 100.0 | 48.5 | 30.8 | 64.1 | 70.2 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 66.4 |
| III期 | 39 | 37 | 0 | 100.0 | 5.1 | 0.9 | 15.2 | 71.8 |
| IV期 | 80 | 75 | 0 | 100.0 | 6.3 | 2.3 | 13.0 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 128 | 46 | 対象数 | | 20 | 154 |
| % | 73.6 | 26.4 | % | | 11.5 | 88.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 48 | 65 | 36 | |
| % | | 12.1 | 27.6 | 37.4 | 20.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 33 | 13 | 39 | 80 | (7-9) | (1-3) |
| % | 19.0 | 7.5 | 22.4 | 46.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 160 | 14 | 11 | 0 | (1-3) | |
| % | 92.0 | 8.0 | 6.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 33 | 125 | | |
| % | | 5.7 | 19.0 | 71.8 | | |

21 大崎市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 140 | 19 | 0 | 100.0 | 86.4 | 79.6 | 91.1 | 61.5 |
| I期 | 64 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.8 | 84.2 | 97.6 | 63.9 |
| II期 | 49 | (4-6) | 0 | 100.0 | 91.8 | 79.7 | 96.9 | 52.3 |
| III期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 57.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 64.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 140 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 31 | 29 | 37 | 28 | 15 | | |
| % | 22.1 | 20.7 | 26.4 | 20.0 | 10.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 64 | 49 | 17 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 45.7 | 35.0 | 12.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 123 | 87 | (1-3) | 33 | | |
| % | 12.1 | 87.9 | 62.1 | | 23.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (1-3) | (4-6) | 101 | | | |
| % | 22.1 | | | 72.1 | | | |

22 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院は、地域がん診療連携拠点病院として提供しているがん医療の適確な把握、臨床研究の推進を目的に、長年院内がん登録体制を整備してまいりました。さらに県内他施設に先駆け、主要5部位に前立腺を加えた6部位について、独自に実測及び相対5年生存率を算出し、ホームページでの情報公開を実施してまいりました。また、院内がん登録情報の精度向上の推進及び、がん登録推進法の施行にあたり、県内外の他施設のがん登録実務者研修会等においても指導的役割を果たしております。今回公表となる2010～11年集計に限らず、生存率集計・公開の目的は自施設と他施設との単純な比較ではありません。患者数の違いだけでなく、その年齢、進行度、根治手術の実施割合、合併症、新規薬剤の採用・実施の割合、等々多くの背景因子の影響を受ける生存率を単純に比較することは誤解を生じやすいと考えております。たとえば当院の結果を閲覧される場合には、消化管内視鏡や腹腔鏡・胸腔鏡を使用した非侵襲的治療（身体に負担の少ない治療）を得意としていることを前提に評価頂ければ幸いです。生存率施設別集計値の公表を良い機会と考え、都道府県別・施設別生存率を参考に、院内がん登録データのあらたな活用方法を検討し、引き続きがんに関する情報公開を推進してまいります。閲覧された方からのご感想・ご指摘をいただければ幸いです。

22 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 304 | 97 | (7-9) | 97.4 | 67.7 | 62.1 | 72.7 | 68.8 |
| I期 | 207 | 30 | (7-9) | 96.6 | 85.3 | 79.6 | 89.5 | 70.3 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 66.4 |
| III期 | 24 | 10 | 0 | | | | | 69.3 |
| IV期 | 49 | 45 | (1-3) | 98.0 | 6.3 | 1.6 | 15.6 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 207 | 97 | | | | | |
| % | 68.1 | 31.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 40 | 81 | 107 | 54 | | |
| % | 7.2 | 13.2 | 26.6 | 35.2 | 17.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 207 | 20 | 24 | 49 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 68.1 | 6.6 | 7.9 | 16.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 258 | 249 | (7-9) | 0 | | |
| % | 15.1 | 84.9 | 81.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 86 | 17 | 93 | 108 | | | |
| % | 28.3 | 5.6 | 30.6 | 35.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 270 | 85 | (4-6) | 98.5 | 68.2 | 62.3 | 73.5 | 69.5 |
| I期 | 74 | (7-9) | (1-3) | 98.6 | 90.4 | 80.9 | 95.3 | 67.7 |
| II期 | 60 | (7-9) | (1-3) | 98.3 | 84.8 | 72.7 | 91.8 | 70.4 |
| III期 | 77 | 24 | (1-3) | 97.4 | 68.6 | 56.8 | 77.7 | 75.0 |
| IV期 | 51 | 42 | 0 | 100.0 | 17.7 | 8.7 | 29.2 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 153 | 117 | | | | | |
| % | 56.7 | 43.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 40 | 70 | 83 | 60 | | |
| % | 6.3 | 14.8 | 25.9 | 30.7 | 22.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 74 | 60 | 77 | 51 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 27.4 | 22.2 | 28.5 | 18.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 220 | 214 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 18.5 | 81.5 | 79.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 19 | 67 | 158 | | | |
| % | 9.6 | 7.0 | 24.8 | 58.5 | | | |

22 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 38 | 28 | (1-3) | 94.7 | 23.6 | 11.3 | 38.4 | 67.4 |
| I期 | 19 | 12 | 0 | | | | | 70.5 |
| II期 | 11 | (7-9) | (1-3) | | | | | 57.2 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|
| 対象数 | 25 | 13 | | | | | |
| % | 65.8 | 34.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 11 | 15 | (1-3) | | |
| % | | | 28.9 | 39.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 19 | 11 | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 |
| | % | 50.0 | 28.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | (7-9) | 18 | (4-6) | 0 | 0 |
| | % | | | 47.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | 92.1 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 29 | (4-6) | | | |
| % | | | 76.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 107 | 74 | (1-3) | 97.2 | 30.3 | 21.8 | 39.2 | 70.5 |
| I期 | 27 | (7-9) | (1-3) | | | | | 73.2 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 74.7 |
| III期 | 24 | 20 | 0 | | | | | 66.7 |
| IV期 | 44 | 39 | 0 | 100.0 | 11.4 | 4.2 | 22.6 | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 86 | 21 | 対象数 | | 14 | 93 |
| % | 80.4 | 19.6 | % | | 13.1 | 86.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 28 | 43 | 21 | |
| % | | 10.3 | 26.2 | 40.2 | 19.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 27 | 11 | 24 | 44 | 0 | (1-3) |
| % | 25.2 | 10.3 | 22.4 | 41.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 79 | 28 | 26 | (1-3) | 0 | |
| % | 73.8 | 26.2 | 24.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 43 | 49 | | |
| % | | 10.3 | 40.2 | 45.8 | | |

22 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 184 | 12 | 0 | 100.0 | 93.5 | 88.8 | 96.2 | 59.3 |
| I期 | 107 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.2 | 91.6 | 99.1 | 58.8 |
| II期 | 64 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.8 | 84.2 | 97.6 | 56.9 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 53.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 54.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 184 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 47 | 48 | 48 | 28 | 13 | | |
| % | 25.5 | 26.1 | 26.1 | 15.2 | 7.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 107 | 64 | (7-9) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 58.2 | 34.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 172 | 172 | 0 | 0 | | |
| % | 6.5 | 93.5 | 93.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | (4-6) | 19 | 103 | | | |
| % | 31.5 | | 10.3 | 56.0 | | | |

23 秋田大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

23 秋田大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 282 | 66 | (4-6) | 98.6 | 76.4 | 71.0 | 81.0 | 70.0 |
| I期 | 226 | 31 | (1-3) | 98.7 | 86.2 | 80.9 | 90.1 | 71.4 |
| II期 | 17 | (1-3) | (1-3) | | | | | 63.0 |
| III期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 62.4 |
| IV期 | 22 | 21 | 0 | | | | | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 232 | 50 | | | | | |
| % | 82.3 | 17.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 25 | 95 | 125 | 34 | | |
| % | | 8.9 | 33.7 | 44.3 | 12.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 226 | 17 | 11 | 22 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 80.1 | 6.0 | 3.9 | 7.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 250 | 245 | (4-6) | 0 | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 86.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 16 | 140 | 91 | | | |
| % | 12.4 | 5.7 | 49.6 | 32.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 130 | 43 | (1-3) | 99.2 | 66.9 | 58.0 | 74.2 | 67.7 |
| I期 | 34 | (4-6) | 0 | 100.0 | 82.4 | 64.9 | 91.7 | 68.0 |
| II期 | 32 | (7-9) | 0 | 100.0 | 78.1 | 59.5 | 88.9 | 68.6 |
| III期 | 24 | (7-9) | (1-3) | | | | | 65.5 |
| IV期 | 34 | 22 | 0 | 100.0 | 35.3 | 19.9 | 51.0 | 61.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 90 | 40 | | | | | |
| % | 69.2 | 30.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 42 | 44 | 17 | | |
| % | | 16.9 | 32.3 | 33.8 | 13.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | 32 | 24 | 34 | 0 | (4-6) | |
| % | 26.2 | 24.6 | 18.5 | 26.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 115 | 103 | 12 | 0 | | |
| % | 11.5 | 88.5 | 79.2 | 9.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (4-6) | 54 | 50 | | | |
| % | 15.4 | | 41.5 | 38.5 | | | |

23 秋田大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 89 | 54 | (1-3) | 98.9 | 39.2 | 29.1 | 49.2 | 68.5 |
| I期 | 36 | 21 | 0 | 100.0 | 41.7 | 25.6 | 57.0 | 69.7 |
| II期 | 30 | 16 | (1-3) | 96.7 | 46.2 | 27.9 | 62.8 | 67.2 |
| III期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 70.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 58.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 60 | 29 | | | | | |
| % | 67.4 | 32.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 32 | 38 | (7-9) | | |
| % | | | 36.0 | 42.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 36 | 30 | 18 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 40.4 | 33.7 | 20.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 32 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| | % | 25.8 | 36.0 | 19.1 | 18.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 63 | 26 | 26 | 0 | 0 | | |
| % | 70.8 | 29.2 | 29.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 70 | 14 | | | |
| % | | | 78.7 | 15.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 263 | 152 | (4-6) | 97.7 | 41.3 | 35.2 | 47.2 | 69.1 |
| I期 | 131 | 47 | (1-3) | 97.7 | 63.5 | 54.5 | 71.2 | 70.6 |
| II期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 45 | 32 | 0 | 100.0 | 28.9 | 16.6 | 42.4 | 72.6 |
| IV期 | 68 | 63 | (1-3) | 95.6 | 3.4 | 0.7 | 10.5 | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 189 | 74 | 対象数 | | 10 | 253 |
| % | 71.9 | 28.1 | % | | 3.8 | 96.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 36 | 87 | 96 | 37 | |
| % | | 13.7 | 33.1 | 36.5 | 14.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 131 | 11 | 45 | 68 | (1-3) | (4-6) |
| % | 49.8 | 4.2 | 17.1 | 25.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 114 | 149 | 145 | (4-6) | 0 | |
| % | 43.3 | 56.7 | 55.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 32 | 24 | 120 | 87 | | |
| % | 12.2 | 9.1 | 45.6 | 33.1 | | |

23 秋田大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 65 | 17 | (1-3) | 98.5 | 73.5 | 60.9 | 82.6 | 58.2 |
| I期 | 18 | (1-3) | 0 | | | | | 56.5 |
| II期 | 28 | (1-3) | (1-3) | | | | | 64.3 |
| III期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 57.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 43.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 65 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 18 | 13 | 10 | (4-6) | | |
| % | 29.2 | 27.7 | 20.0 | 15.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 18 | 28 | 13 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 27.7 | 43.1 | 20.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 58 | 57 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 89.2 | 87.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (7-9) | 50 | | | |
| % | | | | 76.9 | | | |

24 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
2010-2011年2力年

コメント: 2009-2010年5年生存率と比較すると生存率向上の傾向にある。

24 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 132 | 77 | 0 | 100.0 | 41.7 | 33.2 | 49.9 | 73.4 |
| I期 | 71 | 25 | 0 | 100.0 | 64.8 | 52.5 | 74.7 | 70.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 77.8 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | |
| IV期 | 36 | 35 | 0 | 100.0 | 2.8 | 0.2 | 12.4 | 72.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 93 | 39 | | | | | |
| % | 70.5 | 29.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 26 | 45 | 43 | | |
| % | | 12.9 | 19.7 | 34.1 | 32.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 71 | (7-9) | (4-6) | 36 | 10 | (1-3) | |
| % | 53.8 | | | 27.3 | 7.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 79 | 71 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 40.2 | 59.8 | 53.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 10 | 39 | 71 | | | |
| % | 9.1 | 7.6 | 29.5 | 53.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 150 | 78 | 0 | 100.0 | 48.0 | 39.8 | 55.7 | 73.7 |
| I期 | 34 | 11 | 0 | 100.0 | 67.7 | 49.2 | 80.6 | 69.6 |
| II期 | 41 | 16 | 0 | 100.0 | 61.0 | 44.4 | 74.0 | 79.6 |
| III期 | 34 | 14 | 0 | 100.0 | 58.8 | 40.6 | 73.2 | 73.1 |
| IV期 | 32 | 29 | 0 | 100.0 | 9.4 | 2.4 | 22.3 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 81 | 69 | | | | | |
| % | 54.0 | 46.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 25 | 45 | 57 | | |
| % | | 12.0 | 16.7 | 30.0 | 38.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | 41 | 34 | 32 | (7-9) | 0 | |
| % | 22.7 | 27.3 | 22.7 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 101 | 92 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 32.7 | 67.3 | 61.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 37 | 101 | | | |
| % | | | 24.7 | 67.3 | | | |

24 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 11 | 11 | 0 | | | | | 72.5 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (1-3) | 0 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 0 | (1-3) | 0 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (4-6) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 135 | 94 | 0 | 100.0 | 30.4 | 22.8 | 38.2 | 74.2 |
| I期 | 47 | (7-9) | 0 | 100.0 | 80.9 | 66.4 | 89.5 | 70.1 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 80.3 |
| III期 | 39 | 36 | 0 | 100.0 | 7.7 | 2.0 | 18.7 | 74.6 |
| IV期 | 36 | 36 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 96 | 39 | 対象数 | | 11 | 124 |
| % | 71.1 | 28.9 | % | | 8.1 | 91.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 30 | 47 | 47 | |
| % | | 7.4 | 22.2 | 34.8 | 34.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 47 | (7-9) | 39 | 36 | (4-6) | 0 |
| % | 34.8 | | 28.9 | 26.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 86 | 49 | 47 | (1-3) | 0 | |
| % | 63.7 | 36.3 | 34.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | 36 | 76 | | |
| % | 11.9 | | 26.7 | 56.3 | | |

24 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | 10 | 0 | 100.0 | 86.7 | 76.6 | 92.6 | 62.6 |
| I期 | 42 | (1-3) | 0 | 100.0 | 92.9 | 79.5 | 97.6 | 64.3 |
| II期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 59.5 |
| III期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 55.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 86.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 75 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 15 | 19 | 17 | (7-9) | | |
| % | 20.0 | 20.0 | 25.3 | 22.7 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 19 | 11 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 56.0 | 25.3 | 14.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 68 | 68 | 0 | 0 | | |
| % | | 90.7 | 90.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 0 | 12 | 48 | | | |
| % | 20.0 | | 16.0 | 64.0 | | | |

25 大曲厚生医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

25 大曲厚生医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 181 | 109 | (1-3) | 99.4 | 39.8 | 32.6 | 46.8 | 72.8 |
| I期 | 71 | 16 | (1-3) | 98.6 | 77.4 | 65.8 | 85.5 | 72.8 |
| II期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 76.9 |
| III期 | 20 | 16 | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | 63 | 61 | 0 | 100.0 | 3.2 | 0.6 | 9.8 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 120 | 61 | | | | | |
| % | 66.3 | 33.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 15 | 33 | 72 | 54 | | |
| % | | 8.3 | 18.2 | 39.8 | 29.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 71 | 16 | 20 | 63 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 39.2 | 8.8 | 11.0 | 34.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 75 | 106 | 100 | (4-6) | 0 | | |
| % | 41.4 | 58.6 | 55.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 11 | 51 | 98 | | | |
| % | 11.6 | 6.1 | 28.2 | 54.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 202 | 85 | (1-3) | 99.0 | 57.8 | 50.7 | 64.3 | 71.9 |
| I期 | 50 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 84.0 | 70.5 | 91.6 | 68.9 |
| II期 | 34 | 10 | 0 | 100.0 | 70.6 | 52.2 | 83.0 | 70.0 |
| III期 | 62 | 18 | (1-3) | 98.4 | 70.6 | 57.5 | 80.4 | 73.2 |
| IV期 | 50 | 43 | 0 | 100.0 | 14.0 | 6.2 | 25.0 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 128 | 74 | | | | | |
| % | 63.4 | 36.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 57 | 70 | 51 | | |
| % | | 9.4 | 28.2 | 34.7 | 25.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 50 | 34 | 62 | 50 | (4-6) | 0 | |
| % | 24.8 | 16.8 | 30.7 | 24.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 157 | 138 | 17 | (1-3) | | |
| % | 22.3 | 77.7 | 68.3 | 8.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 40 | (7-9) | 53 | 100 | | | |
| % | 19.8 | | 26.2 | 49.5 | | | |

25 大曲厚生医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 37 | 34 | 0 | 100.0 | 8.1 | 2.1 | 19.6 | 71.5 |
| I期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 79.3 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 77.3 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 68.1 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 21 | 16 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 17 | (7-9) | | |
| % | | | | 45.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (4-6) | 12 | 10 | (1-3) | 0 | |
| % | | | 32.4 | 27.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (7-9) | (4-6) | 15 | (1-3) | 0 | |
| % | | | | 40.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 86.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 17 | 18 | | | |
| % | | | 45.9 | 48.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 116 | 71 | 0 | 100.0 | 38.8 | 30.0 | 47.5 | 70.7 |
| I期 | 36 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.9 | 73.1 | 95.7 | 67.3 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 66.7 |
| III期 | 33 | 27 | 0 | 100.0 | 18.2 | 7.4 | 32.8 | 71.3 |
| IV期 | 40 | 36 | 0 | 100.0 | 10.0 | 3.2 | 21.5 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 84 | 32 | 対象数 | | (7-9) | 109 | |
| % | 72.4 | 27.6 | % | | | 94.0 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 32 | 50 | 17 | | |
| % | | 12.1 | 27.6 | 43.1 | 14.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | (4-6) | 33 | 40 | 0 | (1-3) | |
| % | 31.0 | | 28.4 | 34.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 69 | 47 | 46 | (1-3) | 0 | | |
| % | 59.5 | 40.5 | 39.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | (7-9) | 41 | 44 | | | |
| % | 19.8 | | 35.3 | 37.9 | | | |

25 大曲厚生医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 66 | 13 | 0 | 100.0 | 80.3 | 68.5 | 88.1 | 64.5 |
| I期 | 30 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.7 | 78.6 | 99.5 | 60.7 |
| II期 | 18 | (1-3) | 0 | | | | | 67.7 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 66.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 84.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 66 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 16 | 16 | 11 | 13 | | |
| % | 15.2 | 24.2 | 24.2 | 16.7 | 19.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 30 | 18 | 12 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 45.5 | 27.3 | 18.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 56 | 53 | (1-3) | 0 | | |
| % | 15.2 | 84.8 | 80.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (1-3) | 11 | 38 | | | |
| % | 22.7 | | 16.7 | 57.6 | | | |

26 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

26 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 272 | 126 | 32 | 88.2 | 50.6 | 44.2 | 56.6 | 73.4 |
| I期 | 160 | 45 | 25 | 84.4 | 68.5 | 60.2 | 75.5 | 74.8 |
| II期 | 31 | 14 | (1-3) | 93.5 | 52.8 | 33.6 | 68.8 | 69.6 |
| III期 | 23 | 13 | (4-6) | | | | | 71.1 |
| IV期 | 56 | 52 | (1-3) | 98.2 | 6.7 | 2.0 | 15.6 | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 190 | 82 | | | | | |
| % | 69.9 | 30.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 29 | 40 | 113 | 82 | | |
| % | | 10.7 | 14.7 | 41.5 | 30.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 160 | 31 | 23 | 56 | (1-3) | 0 | |
| % | 58.8 | 11.4 | 8.5 | 20.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 73 | 199 | 192 | (7-9) | 0 | | |
| % | 26.8 | 73.2 | 70.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 43 | 20 | 81 | 128 | | | |
| % | 15.8 | 7.4 | 29.8 | 47.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 177 | 70 | 16 | 91.0 | 58.6 | 50.8 | 65.7 | 71.8 |
| I期 | 46 | 13 | (4-6) | 91.3 | 70.2 | 54.2 | 81.5 | 67.5 |
| II期 | 35 | (7-9) | (4-6) | 85.7 | 78.2 | 59.6 | 89.0 | 74.0 |
| III期 | 71 | 28 | (4-6) | 91.5 | 59.3 | 46.7 | 69.9 | 72.0 |
| IV期 | 22 | 20 | (1-3) | | | | | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 116 | 61 | | | | | |
| % | 65.5 | 34.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 24 | 45 | 55 | 50 | | |
| % | | 13.6 | 25.4 | 31.1 | 28.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | 35 | 71 | 22 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 26.0 | 19.8 | 40.1 | 12.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 153 | 136 | 17 | 0 | | |
| % | 13.6 | 86.4 | 76.8 | 9.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | (4-6) | 51 | 88 | | | |
| % | 18.1 | | 28.8 | 49.7 | | | |

26 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 18 | 13 | 0 | | | | | 69.2 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 61.3 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 65.0 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 57.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 12 | (4-6) | | | | | | |
| % | 66.7 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (4-6) | (1-3) | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 12 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 66.7 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 12 | (4-6) | | | | |
| % | | | 66.7 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 148 | 100 | (4-6) | 96.6 | 31.7 | 24.3 | 39.3 | 70.8 |
| I期 | 37 | (7-9) | (1-3) | 91.9 | 75.3 | 57.9 | 86.3 | 68.2 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.3 |
| III期 | 42 | 33 | (1-3) | 97.6 | 21.2 | 10.4 | 34.5 | 71.5 |
| IV期 | 59 | 52 | (1-3) | 98.3 | 10.4 | 4.2 | 19.7 | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 105 | 43 | 対象数 | | 24 | 124 |
| % | 70.9 | 29.1 | % | | 16.2 | 83.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 24 | 42 | 50 | 30 | |
| % | | 16.2 | 28.4 | 33.8 | 20.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 37 | (7-9) | 42 | 59 | (1-3) | 0 |
| % | 25.0 | | 28.4 | 39.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 96 | 52 | 51 | (1-3) | 0 | |
| % | 64.9 | 35.1 | 34.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 22 | 13 | 56 | 57 | | |
| % | 14.9 | 8.8 | 37.8 | 38.5 | | |

26 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 105 | 23 | (7-9) | 92.4 | 77.7 | 68.4 | 84.6 | 59.5 |
| I期 | 38 | (1-3) | (1-3) | 97.4 | 97.4 | 82.8 | 99.6 | 61.6 |
| II期 | 40 | (7-9) | (4-6) | 90.0 | 81.8 | 65.5 | 90.9 | 59.7 |
| III期 | 18 | (7-9) | (1-3) | | | | | 60.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 52.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 105 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 26 | 24 | 19 | 10 | | |
| % | 24.8 | 24.8 | 22.9 | 18.1 | 9.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 40 | 18 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 36.2 | 38.1 | 17.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 85 | 82 | (1-3) | 0 | | |
| % | 19.0 | 81.0 | 78.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | (1-3) | (7-9) | 66 | | | |
| % | 28.6 | | | 62.9 | | | |

27 秋田赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

27 秋田赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 452 | 149 | (1-3) | 99.8 | 67.0 | 62.5 | 71.2 | 69.4 |
| I期 | 316 | 43 | (1-3) | 99.7 | 86.4 | 82.1 | 89.7 | 69.6 |
| II期 | 34 | 16 | 0 | 100.0 | 52.9 | 35.1 | 68.0 | 71.7 |
| III期 | 22 | 19 | 0 | | | | | 71.1 |
| IV期 | 64 | 63 | 0 | 100.0 | 1.6 | 0.1 | 7.4 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 299 | 153 | | | | | |
| % | 66.2 | 33.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 62 | 122 | 171 | 79 | | |
| % | 4.0 | 13.7 | 27.0 | 37.8 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 316 | 34 | 22 | 64 | (4-6) | 11 | |
| % | 69.9 | 7.5 | 4.9 | 14.2 | | 2.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 71 | 381 | 371 | 10 | 0 | | |
| % | 15.7 | 84.3 | 82.1 | 2.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 55 | 63 | 149 | 185 | | | |
| % | 12.2 | 13.9 | 33.0 | 40.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 297 | 100 | (1-3) | 99.7 | 66.3 | 60.6 | 71.4 | 68.5 |
| I期 | 82 | 14 | 0 | 100.0 | 82.9 | 72.9 | 89.5 | 68.7 |
| II期 | 88 | 23 | 0 | 100.0 | 73.9 | 63.3 | 81.8 | 70.9 |
| III期 | 75 | 26 | 0 | 100.0 | 65.3 | 53.4 | 74.9 | 67.1 |
| IV期 | 39 | 34 | (1-3) | 97.4 | 12.3 | 4.3 | 24.9 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 178 | 119 | | | | | |
| % | 59.9 | 40.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 54 | 79 | 97 | 52 | | |
| % | 5.1 | 18.2 | 26.6 | 32.7 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 88 | 75 | 39 | (1-3) | 10 | |
| % | 27.6 | 29.6 | 25.3 | 13.1 | | 3.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 269 | 248 | 21 | 0 | | |
| % | 9.4 | 90.6 | 83.5 | 7.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 50 | 32 | 67 | 148 | | | |
| % | 16.8 | 10.8 | 22.6 | 49.8 | | | |

27 秋田赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 42 | 27 | 0 | 100.0 | 35.7 | 21.7 | 49.9 | 71.5 |
| I期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 70.3 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 68.3 |
| III期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 80.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 55.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 29 | 13 | | | | | |
| % | 69.0 | 31.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 11 | 15 | (7-9) | | |
| % | | | 26.2 | 35.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 18 | (1-3) | 13 | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | 42.9 | | 31.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 11 | (7-9) | (7-9) | (4-6) | 0 |
| | % | 23.8 | 26.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | 81.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 21 | 17 | | | |
| % | | | 50.0 | 40.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 195 | 126 | (1-3) | 99.5 | 35.4 | 28.7 | 42.1 | 70.3 |
| I期 | 87 | 27 | (1-3) | 98.9 | 69.0 | 58.1 | 77.5 | 70.5 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 74.8 |
| III期 | 39 | 34 | 0 | 100.0 | 12.8 | 4.7 | 25.2 | 67.9 |
| IV期 | 52 | 51 | 0 | 100.0 | 1.9 | 0.2 | 8.9 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 134 | 61 | 対象数 | | 12 | 183 |
| % | 68.7 | 31.3 | % | | 6.2 | 93.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 60 | 70 | 37 | |
| % | | 11.3 | 30.8 | 35.9 | 19.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 87 | (7-9) | 39 | 52 | (7-9) | (1-3) |
| % | 44.6 | | 20.0 | 26.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 107 | 88 | 86 | (1-3) | 0 | |
| % | 54.9 | 45.1 | 44.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 17 | 33 | 76 | 69 | | |
| % | 8.7 | 16.9 | 39.0 | 35.4 | | |

27 秋田赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 22 | 0 | 100.0 | 84.9 | 78.0 | 89.8 | 59.7 |
| I期 | 76 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.4 | 84.9 | 97.2 | 60.6 |
| II期 | 41 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.2 | 76.1 | 96.2 | 54.5 |
| III期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | 56.3 |
| IV期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 56.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 146 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 40 | 34 | 36 | 24 | 12 | | |
| % | 27.4 | 23.3 | 24.7 | 16.4 | 8.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 76 | 41 | 14 | 12 | (1-3) | 0 | |
| % | 52.1 | 28.1 | 9.6 | 8.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 124 | 120 | (4-6) | 0 | | |
| % | 15.1 | 84.9 | 82.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (7-9) | 21 | 99 | | | |
| % | 11.6 | | 14.4 | 67.8 | | | |

28 大館市立総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

28 大館市立総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 206 | 101 | (4-6) | 98.1 | 50.4 | 43.4 | 57.1 | 71.6 |
| I期 | 119 | 26 | (4-6) | 96.6 | 77.7 | 68.9 | 84.2 | 72.2 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 78.8 |
| III期 | 19 | 14 | 0 | | | | | 74.9 |
| IV期 | 53 | 50 | 0 | 100.0 | 5.7 | 1.5 | 14.1 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 130 | 76 | | | | | |
| % | 63.1 | 36.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 48 | 72 | 55 | | |
| % | | 12.6 | 23.3 | 35.0 | 26.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 119 | (7-9) | 19 | 53 | (7-9) | 0 | |
| % | 57.8 | | 9.2 | 25.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 60 | 146 | 133 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 29.1 | 70.9 | 64.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 16 | 105 | 68 | | | |
| % | 8.3 | 7.8 | 51.0 | 33.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 234 | 108 | (1-3) | 99.1 | 53.7 | 47.1 | 59.8 | 71.3 |
| I期 | 67 | 15 | (1-3) | 98.5 | 77.6 | 65.6 | 85.8 | 70.1 |
| II期 | 57 | 19 | 0 | 100.0 | 66.7 | 52.9 | 77.3 | 72.8 |
| III期 | 65 | 33 | 0 | 100.0 | 49.2 | 36.6 | 60.6 | 75.5 |
| IV期 | 40 | 36 | (1-3) | 97.5 | 7.9 | 2.0 | 19.0 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 133 | 101 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 53 | 101 | 48 | | |
| % | | 10.3 | 22.6 | 43.2 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 57 | 65 | 40 | (4-6) | 0 | |
| % | 28.6 | 24.4 | 27.8 | 17.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 205 | 165 | 17 | 23 | | |
| % | 12.4 | 87.6 | 70.5 | 7.3 | 9.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 15 | 107 | 90 | | | |
| % | 9.4 | 6.4 | 45.7 | 38.5 | | | |

28 大館市立総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 36 | 24 | 0 | 100.0 | 33.3 | 18.8 | 48.6 | 71.7 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 66.5 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 77.7 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 74.1 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 23 | 13 | | | | | |
| % | 63.9 | 36.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 10 | 16 | (4-6) | | |
| % | | | 27.8 | 44.4 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (7-9) | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| | % | | 27.8 | 30.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (7-9) | (1-3) | 18 | 0 | 0 | |
| | % | | | 50.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | 94.4 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 27 | (7-9) | | | |
| % | | | 75.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 51 | 0 | 100.0 | 3.8 | 0.7 | 11.5 | 72.7 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.8 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 69.9 |
| IV期 | 31 | 31 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 43 | 10 | | (7-9) | 46 | |
| % | 81.1 | 18.9 | | % | 86.8 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 14 | 20 | 15 | |
| % | | | 26.4 | 37.7 | 28.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 11 | 31 | (1-3) | 0 |
| % | | | 20.8 | 58.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 26 | 25 | | |
| % | | | 49.1 | 47.2 | | |

28 大館市立総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | 16 | (1-3) | 97.3 | 77.7 | 66.1 | 85.7 | 62.7 |
| I期 | 33 | (1-3) | 0 | 100.0 | 93.9 | 77.9 | 98.5 | 60.2 |
| II期 | 21 | (1-3) | (1-3) | | | | | 53.4 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 62.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 61.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 73 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 16 | 28 | 13 | (4-6) | | |
| % | 13.7 | 21.9 | 38.4 | 17.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 21 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 45.2 | 28.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 60 | 54 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 17.8 | 82.2 | 74.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | 13 | 48 | | | |
| % | 13.7 | | 17.8 | 65.8 | | | |

29 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

29 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 361 | 134 | (1-3) | 99.4 | 62.9 | 57.7 | 67.6 | 70.5 |
| I期 | 237 | 39 | (1-3) | 99.2 | 83.5 | 78.2 | 87.7 | 71.1 |
| II期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 66.3 |
| III期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 70.3 |
| IV期 | 67 | 64 | 0 | 100.0 | 4.5 | 1.2 | 11.4 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 232 | 129 | | | | | |
| % | 64.3 | 35.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 36 | 102 | 127 | 81 | | |
| % | 4.2 | 10.0 | 28.3 | 35.2 | 22.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 237 | 19 | 21 | 67 | 15 | (1-3) | |
| % | 65.7 | 5.3 | 5.8 | 18.6 | 4.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 73 | 288 | 279 | (7-9) | 0 | | |
| % | 20.2 | 79.8 | 77.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | 16 | 140 | 167 | | | |
| % | 10.5 | 4.4 | 38.8 | 46.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 221 | 96 | (1-3) | 99.1 | 56.6 | 49.8 | 62.8 | 72.5 |
| I期 | 41 | (7-9) | (1-3) | 97.6 | 82.9 | 67.5 | 91.5 | 73.3 |
| II期 | 67 | 17 | (1-3) | 98.5 | 74.6 | 62.4 | 83.4 | 71.1 |
| III期 | 53 | 20 | 0 | 100.0 | 62.3 | 47.8 | 73.8 | 73.8 |
| IV期 | 46 | 38 | 0 | 100.0 | 17.4 | 8.2 | 29.5 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 133 | 88 | | | | | |
| % | 60.2 | 39.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 48 | 87 | 59 | | |
| % | | 9.5 | 21.7 | 39.4 | 26.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 67 | 53 | 46 | 13 | (1-3) | |
| % | 18.6 | 30.3 | 24.0 | 20.8 | 5.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 183 | 166 | 16 | (1-3) | | |
| % | 17.2 | 82.8 | 75.1 | 7.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | (7-9) | 73 | 111 | | | |
| % | 13.6 | | 33.0 | 50.2 | | | |

29 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 56 | 45 | 0 | 100.0 | 19.6 | 10.5 | 30.9 | 71.6 |
| I期 | 27 | 18 | 0 | | | | | 71.1 |
| II期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 69.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 36 | 20 | | | | | | |
| % | 64.3 | 35.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 15 | 23 | 12 | | | |
| % | | | 26.8 | 41.1 | 21.4 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 27 | 11 | 10 | (4-6) | (4-6) | 0 | |
| | % | 48.2 | 19.6 | 17.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 15 | 11 | 13 | (4-6) | 0 | |
| | % | 23.2 | 26.8 | 19.6 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 54 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 96.4 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 40 | 16 | | | | |
| % | | | 71.4 | 28.6 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 165 | 121 | (1-3) | 99.4 | 26.7 | 20.2 | 33.6 | 71.3 |
| I期 | 47 | 15 | (1-3) | 97.9 | 68.0 | 52.7 | 79.3 | 73.3 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 78.0 |
| III期 | 50 | 42 | 0 | 100.0 | 16.0 | 7.5 | 27.4 | 71.5 |
| IV期 | 64 | 62 | 0 | 100.0 | 3.1 | 0.6 | 9.7 | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 116 | 49 | 対象数 | 15 | 150 | | | |
| % | 70.3 | 29.7 | % | 9.1 | 90.9 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 19 | 43 | 68 | 34 | | | |
| % | | 11.5 | 26.1 | 41.2 | 20.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 47 | (1-3) | 50 | 64 | (1-3) | 0 | | |
| % | 28.5 | | 30.3 | 38.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 113 | 52 | 52 | 0 | 0 | | | |
| % | 68.5 | 31.5 | 31.5 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 21 | (7-9) | 63 | 73 | | | | |
| % | 12.7 | | 38.2 | 44.2 | | | | |

29 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 123 | 20 | (1-3) | 99.2 | 83.7 | 75.8 | 89.1 | 59.6 |
| I期 | 49 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.0 | 86.4 | 99.7 | 59.4 |
| II期 | 48 | (4-6) | (1-3) | 97.9 | 89.4 | 76.3 | 95.4 | 61.4 |
| III期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 66.9 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 59.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 123 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 36 | 32 | 21 | 10 | | |
| % | 19.5 | 29.3 | 26.0 | 17.1 | 8.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 48 | 18 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 39.8 | 39.0 | 14.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 110 | 110 | 0 | 0 | | |
| % | 10.6 | 89.4 | 89.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 0 | 13 | 88 | | | |
| % | 17.9 | | 10.6 | 71.5 | | | |

30 市立秋田総合病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

30 市立秋田総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 110 | 43 | (1-3) | 99.1 | 60.9 | 51.1 | 69.3 | 73.4 |
| I期 | 68 | 15 | (1-3) | 98.5 | 77.9 | 66.0 | 86.0 | 73.9 |
| II期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 66.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.4 |
| IV期 | 28 | 24 | 0 | | | | | 73.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 77 | 33 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 27 | 46 | 29 | | |
| % | | | 24.5 | 41.8 | 26.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 68 | (4-6) | (4-6) | 28 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 61.8 | | | 25.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 85 | 77 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 22.7 | 77.3 | 70.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 11 | 56 | 31 | | | |
| % | 10.9 | 10.0 | 50.9 | 28.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 29 | (1-3) | 98.9 | 67.7 | 57.0 | 76.3 | 72.1 |
| I期 | 25 | (4-6) | 0 | | | | | 73.9 |
| II期 | 27 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 18 | (1-3) | 0 | | | | | 69.9 |
| IV期 | 13 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 58 | 32 | | | | | |
| % | 64.4 | 35.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 26 | 36 | 21 | | |
| % | | | 28.9 | 40.0 | 23.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 27 | 18 | 13 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 27.8 | 30.0 | 20.0 | 14.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 84 | 72 | 11 | (1-3) | | |
| % | | 93.3 | 80.0 | 12.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | 52 | 26 | | | |
| % | 11.1 | | 57.8 | 28.9 | | | |

30 市立秋田総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 27 | 18 | (1-3) | | | | | 68.1 |
| I期 | 15 | (7-9) | (1-3) | | | | | 66.4 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 72.7 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 87.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 18 | (7-9) | | | | | | |
| % | 66.7 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 12 | (1-3) | | | |
| % | | | | 44.4 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 15 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 55.6 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 10 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | | 37.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 19 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 70.4 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 21 | (4-6) | | | | |
| % | | | 77.8 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 35 | 27 | 0 | 100.0 | 22.9 | 10.8 | 37.6 | 74.1 |
| I期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 74.8 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 78.8 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 対象数 | 25 | 10 | | 対象数 | (4-6) | 31 | | | |
| % | 71.4 | 28.6 | | % | | 88.6 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 16 | (7-9) | | | | |
| % | | | | 45.7 | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | | |
| 対象数 | 12 | (4-6) | (4-6) | 13 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 34.3 | | | 37.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | | |
| 対象数 | 27 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | |
| % | 77.1 | | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 19 | 13 | | | | | |
| % | | | 54.3 | 37.1 | | | | | |

30 市立秋田総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 47 | (7-9) | 0 | 100.0 | 85.1 | 71.3 | 92.6 | 60.1 |
| I期 | 25 | (1-3) | 0 | | | | | 58.3 |
| II期 | 16 | 0 | 0 | | | | | 57.8 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 78.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 64.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 47 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 16 | (7-9) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 23.4 | 34.0 | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 16 | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 53.2 | 34.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 40 | 37 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 85.1 | 78.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | (7-9) | 29 | | | |
| % | 21.3 | | | 61.7 | | | |

31 山形県立中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

【乳】
発見経緯について、がん検診が29.8%と高くそのためステージIの割合が47.1%と高かった可能性が示唆される。
I期が96.4%、II期が96.4%と高く、このため全体でも91.2%と押し上げていた。
その他4部位は、特記なし

31 山形県立中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 604 | 173 | 10 | 98.3 | 71.2 | 67.4 | 74.7 | 69.5 |
| I期 | 406 | 50 | (7-9) | 97.8 | 87.6 | 84.0 | 90.5 | 70.7 |
| II期 | 38 | 13 | 0 | 100.0 | 65.8 | 48.5 | 78.5 | 68.5 |
| III期 | 48 | 27 | 0 | 100.0 | 43.8 | 29.6 | 57.1 | 67.6 |
| IV期 | 100 | 81 | 0 | 100.0 | 19.0 | 12.0 | 27.2 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 401 | 203 | | | | | |
| % | 66.4 | 33.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 74 | 167 | 218 | 115 | | |
| % | 5.0 | 12.3 | 27.6 | 36.1 | 19.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 406 | 38 | 48 | 100 | (1-3) | 10 | |
| % | 67.2 | 6.3 | 7.9 | 16.6 | | 1.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | 534 | 508 | 22 | (4-6) | | |
| % | 11.6 | 88.4 | 84.1 | 3.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 142 | 61 | 169 | 232 | | | |
| % | 23.5 | 10.1 | 28.0 | 38.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 394 | 102 | (4-6) | 99.0 | 74.1 | 69.5 | 78.1 | 68.9 |
| I期 | 123 | 16 | (1-3) | 97.6 | 86.9 | 79.6 | 91.8 | 68.6 |
| II期 | 92 | 16 | (1-3) | 98.9 | 82.6 | 73.1 | 88.9 | 71.7 |
| III期 | 96 | 18 | 0 | 100.0 | 81.3 | 71.9 | 87.8 | 69.8 |
| IV期 | 71 | 52 | 0 | 100.0 | 26.8 | 17.1 | 37.4 | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 236 | 158 | | | | | |
| % | 59.9 | 40.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 58 | 109 | 123 | 79 | | |
| % | 6.3 | 14.7 | 27.7 | 31.2 | 20.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 123 | 92 | 96 | 71 | 0 | 12 | |
| % | 31.2 | 23.4 | 24.4 | 18.0 | | 3.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 380 | 336 | 38 | (4-6) | | |
| % | 3.6 | 96.4 | 85.3 | 9.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 84 | 22 | 92 | 196 | | | |
| % | 21.3 | 5.6 | 23.4 | 49.7 | | | |

31 山形県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 71 | 49 | (1-3) | 98.6 | 30.8 | 20.5 | 41.7 | 72.1 |
| I期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 70.2 |
| II期 | 14 | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.4 |
| III期 | 19 | 18 | 0 | | | | | 73.4 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 76.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 47 | 24 | | | | | | |
| % | 66.2 | 33.8 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 16 | 35 | 13 | | | |
| % | | | 22.5 | 49.3 | 18.3 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 25 | 14 | 19 | 13 | 0 | 0 | |
| | % | 35.2 | 19.7 | 26.8 | 18.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 13 | 16 | 24 | 0 | 0 | |
| | % | 25.4 | 18.3 | 22.5 | 33.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 47 | 24 | 21 | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 66.2 | 33.8 | 29.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 44 | 22 | | | | |
| % | | | 62.0 | 31.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 325 | 206 | (1-3) | 99.4 | 36.6 | 31.4 | 41.8 | 71.3 |
| I期 | 125 | 30 | (1-3) | 98.4 | 75.9 | 67.4 | 82.5 | 71.4 |
| II期 | 25 | 15 | 0 | | | | | 73.1 |
| III期 | 67 | 59 | 0 | 100.0 | 11.9 | 5.6 | 20.9 | 72.1 |
| IV期 | 104 | 100 | 0 | 100.0 | 3.9 | 1.3 | 8.8 | 74.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 対象数 | 228 | 97 | 対象数 | 38 | 287 | | | |
| % | 70.2 | 29.8 | % | 11.7 | 88.3 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 90 | 122 | 74 | | | |
| % | | 9.8 | 27.7 | 37.5 | 22.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 125 | 25 | 67 | 104 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 38.5 | 7.7 | 20.6 | 32.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 163 | 162 | 155 | (4-6) | (1-3) | | | |
| % | 50.2 | 49.8 | 47.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 44 | 62 | 90 | 129 | | | | |
| % | 13.5 | 19.1 | 27.7 | 39.7 | | | | |

31 山形県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 238 | 21 | (1-3) | 99.6 | 91.2 | 86.8 | 94.2 | 57.4 |
| I期 | 112 | (4-6) | (1-3) | 99.1 | 96.4 | 90.8 | 98.6 | 57.7 |
| II期 | 84 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.4 | 89.3 | 98.8 | 55.6 |
| III期 | 28 | (4-6) | 0 | | | | | 57.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 59.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 238 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 68 | 79 | 37 | 43 | 11 | | |
| % | 28.6 | 33.2 | 15.5 | 18.1 | 4.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 112 | 84 | 28 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | |
| % | 47.1 | 35.3 | 11.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 228 | 216 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 4.2 | 95.8 | 90.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 71 | (7-9) | 42 | 117 | | | |
| % | 29.8 | | 17.6 | 49.2 | | | |

32 山形大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

大腸癌のI期においては、80歳以上の患者さんの割合が全国平均に比べて高いこと、また、大学病院の特性として、合併症のある患者さんを多く受け入れていることが、胃癌、肺癌のIII期、乳癌の実測生存率にも影響していると考えられます。

病期別にみると、大腸癌のII期・III期、肝癌のI期、肺癌のI期・IV期の実測生存率は、全国平均を上回る結果となりました。

32 山形大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 261 | 104 | (1-3) | 99.2 | 59.9 | 53.7 | 65.6 | 69.1 |
| I期 | 181 | 44 | (1-3) | 99.4 | 75.6 | 68.6 | 81.2 | 71.0 |
| II期 | 13 | (1-3) | 0 | | | | | 76.7 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 62.4 |
| IV期 | 54 | 50 | (1-3) | 98.1 | 5.7 | 1.5 | 14.2 | 65.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 200 | 61 | | | | | |
| % | 76.6 | 23.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 34 | 74 | 102 | 41 | | |
| % | 3.8 | 13.0 | 28.4 | 39.1 | 15.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 181 | 13 | (7-9) | 54 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 69.3 | 5.0 | | 20.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 63 | 198 | 167 | (7-9) | 24 | | |
| % | 24.1 | 75.9 | 64.0 | | 9.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | 13 | 112 | 102 | | | |
| % | 13.0 | 5.0 | 42.9 | 39.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 138 | 46 | 0 | 100.0 | 66.7 | 58.1 | 73.9 | 69.6 |
| I期 | 36 | (7-9) | 0 | 100.0 | 77.8 | 60.4 | 88.2 | 67.5 |
| II期 | 37 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.1 | 64.4 | 90.5 | 72.8 |
| III期 | 31 | (7-9) | 0 | 100.0 | 71.0 | 51.6 | 83.7 | 75.2 |
| IV期 | 25 | 21 | 0 | | | | | 67.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 75 | 63 | | | | | |
| % | 54.3 | 45.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 15 | 42 | 37 | 35 | | |
| % | | 10.9 | 30.4 | 26.8 | 25.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 37 | 31 | 25 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 26.1 | 26.8 | 22.5 | 18.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 123 | 104 | (7-9) | 10 | | |
| % | 10.9 | 89.1 | 75.4 | | 7.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (1-3) | 45 | 75 | | | |
| % | 12.3 | | 32.6 | 54.3 | | | |

32 山形大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 83 | 52 | (1-3) | 98.8 | 36.6 | 26.3 | 46.9 | 69.5 |
| I期 | 46 | 21 | (1-3) | 97.8 | 53.3 | 37.9 | 66.6 | 69.8 |
| II期 | 21 | 16 | 0 | | | | | 66.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 74.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 51 | 32 | | | | | |
| % | 61.4 | 38.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 24 | 37 | 11 | | |
| % | | | 28.9 | 44.6 | 13.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 46 | 21 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 55.4 | 25.3 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 29 | 17 | 11 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 30.1 | 34.9 | 20.5 | 13.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 76 | (7-9) | (4-6) | 0 | (1-3) | | |
| % | 91.6 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 65 | 14 | | | |
| % | | | 78.3 | 16.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 264 | 141 | 0 | 100.0 | 46.6 | 40.5 | 52.5 | 68.6 |
| I期 | 130 | 32 | 0 | 100.0 | 75.4 | 67.0 | 81.9 | 70.6 |
| II期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 63.5 |
| III期 | 55 | 45 | 0 | 100.0 | 18.2 | 9.4 | 29.3 | 71.1 |
| IV期 | 59 | 56 | 0 | 100.0 | 5.1 | 1.3 | 12.8 | 63.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 175 | 89 | 対象数 | | 27 | 237 | |
| % | 66.3 | 33.7 | % | | 10.2 | 89.8 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 35 | 77 | 101 | 38 | | |
| % | 4.9 | 13.3 | 29.2 | 38.3 | 14.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 130 | 14 | 55 | 59 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 49.2 | 5.3 | 20.8 | 22.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 114 | 150 | 140 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | 43.2 | 56.8 | 53.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 51 | 19 | 112 | 82 | | | |
| % | 19.3 | 7.2 | 42.4 | 31.1 | | | |

32 山形大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 100 | 17 | (1-3) | 98.0 | 82.8 | 73.9 | 89.0 | 59.6 |
| I期 | 37 | (4-6) | (1-3) | 97.3 | 89.0 | 73.4 | 95.7 | 64.1 |
| II期 | 41 | (4-6) | (1-3) | 97.6 | 87.6 | 72.6 | 94.6 | 56.9 |
| III期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 64.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 51.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 100 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 24 | 31 | 15 | (7-9) | | |
| % | 23.0 | 24.0 | 31.0 | 15.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 41 | 17 | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| % | 37.0 | 41.0 | 17.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 87 | 57 | (4-6) | 25 | | |
| % | 13.0 | 87.0 | 57.0 | | 25.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | (1-3) | 19 | 56 | | | |
| % | 23.0 | | 19.0 | 56.0 | | | |

33 山形市立病院済生館
2010-2011年2カ年

コメント:

原病死（がん死）のみでなく、他病死も含まれた生存率である。

33 山形市立病院済生館

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 278 | 134 | (1-3) | 99.3 | 51.8 | 45.7 | 57.5 | 73.9 |
| I期 | 173 | 55 | (1-3) | 98.8 | 68.2 | 60.7 | 74.6 | 74.5 |
| II期 | 24 | (4-6) | 0 | | | | | 71.7 |
| III期 | 16 | 14 | 0 | | | | | 79.7 |
| IV期 | 62 | 60 | 0 | 100.0 | 3.2 | 0.6 | 9.9 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 197 | 81 | | | | | |
| % | 70.9 | 29.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 59 | 112 | 86 | | |
| % | | 5.8 | 21.2 | 40.3 | 30.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 173 | 24 | 16 | 62 | 0 | (1-3) | |
| % | 62.2 | 8.6 | 5.8 | 22.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 63 | 215 | 196 | 19 | 0 | | |
| % | 22.7 | 77.3 | 70.5 | 6.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | (4-6) | 105 | 138 | | | |
| % | 10.4 | | 37.8 | 49.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 231 | 106 | (1-3) | 99.6 | 54.0 | 47.3 | 60.2 | 72.6 |
| I期 | 67 | 16 | 0 | 100.0 | 76.1 | 64.0 | 84.6 | 73.6 |
| II期 | 62 | 17 | 0 | 100.0 | 72.6 | 59.7 | 82.0 | 73.8 |
| III期 | 47 | 24 | (1-3) | 97.9 | 48.0 | 33.1 | 61.4 | 69.7 |
| IV期 | 50 | 45 | 0 | 100.0 | 10.0 | 3.7 | 20.1 | 74.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 127 | 104 | | | | | |
| % | 55.0 | 45.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 58 | 77 | 69 | | |
| % | | 9.1 | 25.1 | 33.3 | 29.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 62 | 47 | 50 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 29.0 | 26.8 | 20.3 | 21.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 202 | 186 | 13 | (1-3) | | |
| % | 12.6 | 87.4 | 80.5 | 5.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | (4-6) | 66 | 135 | | | |
| % | 11.3 | | 28.6 | 58.4 | | | |

33 山形市立病院済生館
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 36 | 24 | 0 | 100.0 | 33.3 | 18.8 | 48.6 | 73.4 |
| I期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 73.1 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 79.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 25 | 11 | | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 16 | 10 | | | |
| % | | | | 44.4 | 27.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 16 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 44.4 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 11 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | | 30.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 25 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | 27.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 19 | 16 | | | | |
| % | | | 52.8 | 44.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 201 | 170 | 0 | 100.0 | 15.4 | 10.8 | 20.8 | 74.8 |
| I期 | 70 | 47 | 0 | 100.0 | 32.9 | 22.2 | 43.9 | 76.5 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 86.7 |
| III期 | 56 | 52 | 0 | 100.0 | 7.1 | 2.3 | 15.8 | 73.4 |
| IV期 | 67 | 66 | 0 | 100.0 | 1.5 | 0.1 | 7.1 | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|
| 対象数 | 151 | 50 | 対象数 | | 16 | 185 | |
| % | 75.1 | 24.9 | % | | 8.0 | 92.0 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 41 | 64 | 79 | | |
| % | | 7.5 | 20.4 | 31.8 | 39.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 70 | (7-9) | 56 | 67 | (1-3) | 0 | |
| % | 34.8 | | 27.9 | 33.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 174 | 27 | 27 | 0 | 0 | | |
| % | 86.6 | 13.4 | 13.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 76 | 104 | | | |
| % | | 10.0 | 37.8 | 51.7 | | | |

33 山形市立病院済生館
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 85 | 19 | (1-3) | 98.8 | 77.4 | 66.9 | 84.9 | 63.5 |
| I期 | 32 | (4-6) | 0 | 100.0 | 87.5 | 70.0 | 95.1 | 63.8 |
| II期 | 32 | (4-6) | (1-3) | 96.9 | 87.1 | 69.2 | 95.0 | 64.5 |
| III期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 57.0 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 85 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 14 | 24 | 13 | 16 | | |
| % | 21.2 | 16.5 | 28.2 | 15.3 | 18.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | 32 | 14 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 37.6 | 37.6 | 16.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 80 | 77 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 94.1 | 90.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (1-3) | 17 | 49 | | | |
| % | 21.2 | | 20.0 | 57.6 | | | |

34 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

34 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 308 | 118 | 17 | 94.5 | 60.9 | 55.1 | 66.2 | 72.0 |
| I期 | 214 | 46 | 15 | 93.0 | 77.7 | 71.3 | 82.8 | 72.3 |
| II期 | 24 | 10 | 0 | | | | | 69.2 |
| III期 | 21 | 16 | (1-3) | | | | | 72.2 |
| IV期 | 48 | 46 | 0 | 100.0 | 4.2 | 0.8 | 12.6 | 72.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 226 | 82 | | | | | |
| % | 73.4 | 26.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 37 | 66 | 110 | 87 | | |
| % | | 12.0 | 21.4 | 35.7 | 28.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 214 | 24 | 21 | 48 | 0 | (1-3) | |
| % | 69.5 | 7.8 | 6.8 | 15.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 258 | 221 | 37 | 0 | | |
| % | 16.2 | 83.8 | 71.8 | 12.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 57 | 14 | 91 | 146 | | | |
| % | 18.5 | 4.5 | 29.5 | 47.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 233 | 90 | 16 | 93.1 | 59.6 | 52.8 | 65.8 | 72.6 |
| I期 | 45 | (4-6) | (4-6) | 88.9 | 88.1 | 73.7 | 94.9 | 70.1 |
| II期 | 73 | 24 | (7-9) | 90.4 | 64.8 | 52.1 | 74.9 | 76.8 |
| III期 | 71 | 30 | (1-3) | 95.8 | 56.4 | 43.9 | 67.2 | 72.4 |
| IV期 | 42 | 29 | (1-3) | 97.6 | 30.8 | 17.6 | 44.9 | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 132 | 101 | | | | | |
| % | 56.7 | 43.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 51 | 81 | 71 | | |
| % | | 11.2 | 21.9 | 34.8 | 30.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 73 | 71 | 42 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 19.3 | 31.3 | 30.5 | 18.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 208 | 175 | 33 | 0 | | |
| % | 10.7 | 89.3 | 75.1 | 14.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | 10 | 52 | 132 | | | |
| % | 16.7 | 4.3 | 22.3 | 56.7 | | | |

34 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 54 | 30 | (1-3) | 98.1 | 43.4 | 30.0 | 56.2 | 73.6 |
| I期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 73.1 |
| II期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 75.6 |
| III期 | 13 | 11 | (1-3) | | | | | 74.6 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 33 | 21 | | | | | | |
| % | 61.1 | 38.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 20 | 19 | | | |
| % | | | | 37.0 | 35.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 18 | 17 | 13 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 33.3 | 31.5 | 24.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 14 | 18 | 10 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 25.9 | 33.3 | 18.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 37 | 17 | 14 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 68.5 | 31.5 | 25.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 39 | 11 | | | | |
| % | | | 72.2 | 20.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 181 | 123 | (1-3) | 98.9 | 31.6 | 25.0 | 38.5 | 73.0 |
| I期 | 58 | 15 | (1-3) | 96.6 | 73.6 | 60.1 | 83.2 | 72.7 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 77.2 |
| III期 | 39 | 32 | 0 | 100.0 | 18.0 | 7.9 | 31.3 | 70.2 |
| IV期 | 67 | 64 | 0 | 100.0 | 4.5 | 1.2 | 11.4 | 72.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 123 | 58 | 対象数 | 15 | 166 | | | |
| % | 68.0 | 32.0 | % | 8.3 | 91.7 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 44 | 79 | 43 | | | |
| % | | 7.2 | 24.3 | 43.6 | 23.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 58 | 14 | 39 | 67 | (1-3) | 0 | | |
| % | 32.0 | 7.7 | 21.5 | 37.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 105 | 76 | 71 | (4-6) | 0 | | | |
| % | 58.0 | 42.0 | 39.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 20 | (7-9) | 47 | 106 | | | | |
| % | 11.0 | | 26.0 | 58.6 | | | | |

34 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 80 | 15 | 10 | 87.5 | 79.2 | 67.8 | 86.9 | 63.7 |
| I期 | 27 | (1-3) | (4-6) | | | | | 61.5 |
| II期 | 37 | (4-6) | (4-6) | 89.2 | 85.1 | 67.8 | 93.5 | 56.7 |
| III期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 63.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 80 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 21 | 21 | 15 | 12 | | |
| % | 13.8 | 26.3 | 26.3 | 18.8 | 15.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 27 | 37 | 10 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 33.8 | 46.3 | 12.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 67 | 54 | 13 | 0 | | |
| % | 16.3 | 83.8 | 67.5 | 16.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (1-3) | (4-6) | 54 | | | |
| % | 25.0 | | | 67.5 | | | |

35 日本海総合病院
2011年のみ

コメント:

特になし

35 日本海総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 335 | 127 | 16 | 95.2 | 61.4 | 55.9 | 66.4 | 72.5 |
| I期 | 231 | 48 | 14 | 93.9 | 78.6 | 72.6 | 83.4 | 72.0 |
| II期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 72.4 |
| III期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.2 |
| IV期 | 52 | 46 | 0 | 100.0 | 11.5 | 4.7 | 21.8 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 235 | 100 | | | | | |
| % | 70.1 | 29.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 33 | 80 | 112 | 103 | | |
| % | | 9.9 | 23.9 | 33.4 | 30.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 231 | 17 | 13 | 52 | 21 | (1-3) | |
| % | 69.0 | 5.1 | 3.9 | 15.5 | 6.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | 269 | 258 | 11 | 0 | | |
| % | 19.7 | 80.3 | 77.0 | 3.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 62 | 11 | 117 | 145 | | | |
| % | 18.5 | 3.3 | 34.9 | 43.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 213 | 90 | (1-3) | 99.5 | 57.7 | 50.7 | 64.0 | 70.8 |
| I期 | 52 | (7-9) | 0 | 100.0 | 82.7 | 69.4 | 90.6 | 69.7 |
| II期 | 50 | 15 | 0 | 100.0 | 70.0 | 55.3 | 80.7 | 72.6 |
| III期 | 47 | 12 | (1-3) | 97.9 | 74.1 | 58.9 | 84.4 | 68.5 |
| IV期 | 43 | 38 | 0 | 100.0 | 11.6 | 4.3 | 23.1 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 131 | 82 | | | | | |
| % | 61.5 | 38.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 24 | 57 | 65 | 55 | | |
| % | 5.6 | 11.3 | 26.8 | 30.5 | 25.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 52 | 50 | 47 | 43 | 15 | (4-6) | |
| % | 24.4 | 23.5 | 22.1 | 20.2 | 7.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | 171 | 153 | 18 | 0 | | |
| % | 19.7 | 80.3 | 71.8 | 8.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 47 | (1-3) | 46 | 118 | | | |
| % | 22.1 | | 21.6 | 55.4 | | | |

35 日本海総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 57 | 38 | (1-3) | 96.5 | 31.9 | 20.2 | 44.2 | 73.1 |
| I期 | 29 | 15 | (1-3) | | | | | 75.2 |
| II期 | 18 | 14 | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 59.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|
| 対象数 | 37 | 20 | | | | | |
| % | 64.9 | 35.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 15 | 19 | 18 | | |
| % | | | 26.3 | 33.3 | 31.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 29 | 18 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 |
| | % | 50.9 | 31.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 15 | 23 | 14 | (4-6) | 0 | 0 |
| | % | 26.3 | 40.4 | 24.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 12 | 12 | 0 | 0 | | |
| % | 78.9 | 21.1 | 21.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 41 | 15 | | | |
| % | | | 71.9 | 26.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 162 | 115 | (1-3) | 98.8 | 28.7 | 21.9 | 35.8 | 72.4 |
| I期 | 51 | 17 | 0 | 100.0 | 66.7 | 52.0 | 77.8 | 71.9 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.6 |
| III期 | 49 | 44 | (1-3) | 98.0 | 8.8 | 2.9 | 19.1 | 72.7 |
| IV期 | 48 | 42 | 0 | 100.0 | 12.5 | 5.1 | 23.4 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 117 | 45 | 対象数 | (7-9) | 153 | | |
| % | 72.2 | 27.8 | % | | 94.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 52 | 63 | 37 | | |
| % | | | 32.1 | 38.9 | 22.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | (7-9) | 49 | 48 | (4-6) | 0 | |
| % | 31.5 | | 30.2 | 29.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 101 | 61 | 56 | (4-6) | 0 | | |
| % | 62.3 | 37.7 | 34.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | (4-6) | 51 | 71 | | | |
| % | 21.6 | | 31.5 | 43.8 | | | |

35 日本海総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 101 | 11 | 0 | 100.0 | 89.1 | 81.2 | 93.8 | 59.0 |
| I期 | 49 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.9 | 84.7 | 99.0 | 56.4 |
| II期 | 33 | (1-3) | 0 | 100.0 | 93.9 | 77.9 | 98.5 | 60.0 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 65.6 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 59.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 101 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 23 | 25 | 14 | (7-9) | | |
| % | 29.7 | 22.8 | 24.8 | 13.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 33 | 15 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 48.5 | 32.7 | 14.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治療切除 | 非治療切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 91 | 91 | 0 | 0 | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 90.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 40 | 0 | (7-9) | 53 | | | |
| % | 39.6 | | | 52.5 | | | |

福島県立医科大学附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

〈胃癌〉

当院のI期胃癌の生存率は全国の値より上回っており、妥当な数値と考えられます。II期-IV期は集計対象が少ないため算定されていませんが、全体の生存率は福島県全体の値より高くなっています。

ただし当院の特性上、基礎疾患を有している胃癌患者が多く、他疾患による死亡例が多いのも現状です。

〈大腸癌〉

当院は様々な併存疾患を有する患者や、高度進行例が紹介される傾向が高い病院です。2010-2011年ではI期が全国と比較し症例数が極端に低くなっております。それらが観血的治療の低割合に影響していると考えられますが、手術に至った場合の治癒切除率は全国と比べて高い傾向となっています。

2010-2011年のII期-IV期の実測生存率は全国と比較して同率もしくはそれ以上の値となっています。

当院の立地や交通アクセスの問題または広い福島県全域から紹介を受けている状況から、術後の経過観察や補助療法、再発時の化学療法などを各地域の医療機関に依頼している症例も多く、それが生存状況把握率の低さに直結していると考えられます。

〈肝癌〉

当院の症例は他疾患の経過観察中に発見される症例が多く、病期がI期であっても、併存疾患により外科的切除の対象となる症例が相対的に減少するため、同ステージ患者の5年生存率の低下に寄与していると考えられます。またガイドライン上局所治療の適応であっても、ガイドラインに加味されない部位的困難症例が紹介される傾向にあり、結果的にI期であっても局所治療が施行し得ない症例が含まれていることもその一因と思われます。

〈肺癌〉

当院の値は全国とほぼ乖離なく、妥当な数字と考えられます。

II期の患者は限られており、統計学的に十分なデータではありません。

〈乳癌〉

当院のI期、II期乳癌の生存率は全国の値とほぼ同程度です。III期、IV期は集計対象が少ないため算定されていませんが、全体の生存率も全国、福島県全体の値と同様です。

生存率は年齢、進行度、治療方法など様々な影響を受けます。

また、実測生存率はがん以外の死亡を含んでいるため、単純な治療成績の比較とはなりません。

36 福島県立医科大学附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 333 | 86 | (1-3) | 99.4 | 74.1 | 69.0 | 78.4 | 69.7 |
| I期 | 271 | 51 | (1-3) | 99.6 | 81.1 | 75.9 | 85.3 | 71.3 |
| II期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 59.3 |
| III期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 69.1 |
| IV期 | 26 | 23 | 0 | | | | | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 232 | 101 | | | | | |
| % | 69.7 | 30.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 49 | 97 | 118 | 60 | | |
| % | | 14.7 | 29.1 | 35.4 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 271 | 12 | 16 | 26 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 81.4 | 3.6 | 4.8 | 7.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 292 | 284 | (7-9) | 0 | | |
| % | 12.3 | 87.7 | 85.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 74 | 24 | 151 | 84 | | | |
| % | 22.2 | 7.2 | 45.3 | 25.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 141 | 47 | (4-6) | 97.2 | 65.9 | 57.4 | 73.2 | 67.9 |
| I期 | 22 | (7-9) | 0 | | | | | 70.6 |
| II期 | 43 | (7-9) | (1-3) | 97.7 | 81.0 | 65.5 | 90.0 | 70.2 |
| III期 | 38 | (7-9) | (1-3) | 94.7 | 81.1 | 64.5 | 90.5 | 68.1 |
| IV期 | 32 | 24 | (1-3) | 96.9 | 22.6 | 10.0 | 38.3 | 71.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 94 | 47 | | | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 43 | 50 | 18 | | |
| % | | 15.6 | 30.5 | 35.5 | 12.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 43 | 38 | 32 | 0 | (4-6) | |
| % | 15.6 | 30.5 | 27.0 | 22.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 107 | 104 | (1-3) | 0 | | |
| % | 24.1 | 75.9 | 73.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | 53 | 71 | | | |
| % | 7.1 | | 37.6 | 50.4 | | | |

36 福島県立医科大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 115 | 81 | (1-3) | 97.4 | 27.8 | 19.9 | 36.3 | 67.6 |
| I期 | 51 | 27 | (1-3) | 96.1 | 45.0 | 30.9 | 58.2 | 67.1 |
| II期 | 29 | 22 | 0 | | | | | 67.8 |
| III期 | 21 | 18 | (1-3) | | | | | 69.2 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 57.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 83 | 32 | | | | | | |
| % | 72.2 | 27.8 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 35 | 48 | (7-9) | | | |
| % | | 15.7 | 30.4 | 41.7 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 51 | 29 | 21 | 11 | (1-3) | 0 | |
| | % | 44.3 | 25.2 | 18.3 | 9.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 16 | 40 | 26 | 23 | (7-9) | 0 | |
| | % | 13.9 | 34.8 | 22.6 | 20.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 78 | 37 | 35 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 67.8 | 32.2 | 30.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 76 | 32 | | | | |
| % | | | 66.1 | 27.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 337 | 205 | (7-9) | 97.9 | 38.0 | 32.8 | 43.2 | 68.9 |
| I期 | 140 | 41 | (1-3) | 99.3 | 70.5 | 62.2 | 77.4 | 70.1 |
| II期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 69.9 |
| III期 | 87 | 71 | (1-3) | 98.9 | 17.5 | 10.3 | 26.1 | 69.1 |
| IV期 | 86 | 80 | (1-3) | 96.5 | 3.7 | 1.0 | 9.5 | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 224 | 113 | 対象数 | | 41 | 296 |
| % | 66.5 | 33.5 | % | | 12.2 | 87.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 13 | 35 | 115 | 132 | 42 | |
| % | 3.9 | 10.4 | 34.1 | 39.2 | 12.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 140 | 18 | 87 | 86 | (4-6) | (1-3) |
| % | 41.5 | 5.3 | 25.8 | 25.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 171 | 166 | 155 | 10 | (1-3) | |
| % | 50.7 | 49.3 | 46.0 | 3.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 55 | 26 | 139 | 117 | | |
| % | 16.3 | 7.7 | 41.2 | 34.7 | | |

36 福島県立医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 175 | 16 | (1-3) | 98.3 | 90.8 | 85.4 | 94.3 | 57.6 |
| I期 | 64 | (1-3) | (1-3) | 96.9 | 98.4 | 89.4 | 99.8 | 62.3 |
| II期 | 79 | (4-6) | (1-3) | 98.7 | 93.6 | 85.3 | 97.3 | 52.0 |
| III期 | 26 | (7-9) | 0 | | | | | 61.1 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 62.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 175 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 49 | 52 | 44 | 19 | 11 | | |
| % | 28.0 | 29.7 | 25.1 | 10.9 | 6.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 64 | 79 | 26 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 36.6 | 45.1 | 14.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 161 | 140 | 20 | (1-3) | | |
| % | 8.0 | 92.0 | 80.0 | 11.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 46 | (4-6) | 34 | 89 | | | |
| % | 26.3 | | 19.4 | 50.9 | | | |

37 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

37 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 471 | 187 | 13 | 97.2 | 59.7 | 55.1 | 64.0 | 70.6 |
| I期 | 317 | 69 | 12 | 96.2 | 77.8 | 72.7 | 82.0 | 71.1 |
| II期 | 35 | 18 | 0 | 100.0 | 48.6 | 31.4 | 63.7 | 68.6 |
| III期 | 32 | 21 | 0 | 100.0 | 34.4 | 18.8 | 50.6 | 70.8 |
| IV期 | 82 | 75 | (1-3) | 98.8 | 7.4 | 3.0 | 14.5 | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 316 | 155 | | | | | |
| % | 67.1 | 32.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 47 | 138 | 152 | 112 | | |
| % | 4.7 | 10.0 | 29.3 | 32.3 | 23.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 317 | 35 | 32 | 82 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 67.3 | 7.4 | 6.8 | 17.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 72 | 399 | 355 | 41 | (1-3) | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 75.4 | 8.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | 29 | 150 | 234 | | | |
| % | 12.3 | 6.2 | 31.8 | 49.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 371 | 153 | (1-3) | 99.5 | 58.7 | 53.5 | 63.6 | 67.9 |
| I期 | 90 | 24 | 0 | 100.0 | 73.3 | 62.9 | 81.3 | 70.7 |
| II期 | 102 | 31 | 0 | 100.0 | 69.6 | 59.7 | 77.6 | 68.7 |
| III期 | 83 | 30 | (1-3) | 97.6 | 63.7 | 52.4 | 73.0 | 66.0 |
| IV期 | 81 | 62 | 0 | 100.0 | 23.5 | 14.9 | 33.1 | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 219 | 152 | | | | | |
| % | 59.0 | 41.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 52 | 114 | 106 | 70 | | |
| % | 7.8 | 14.0 | 30.7 | 28.6 | 18.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 102 | 83 | 81 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 24.3 | 27.5 | 22.4 | 21.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | 329 | 214 | 103 | 12 | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 57.7 | 27.8 | 3.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 52 | 11 | 99 | 209 | | | |
| % | 14.0 | 3.0 | 26.7 | 56.3 | | | |

37 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 74 | (1-3) | 99.2 | 38.8 | 30.1 | 47.3 | 69.0 |
| I期 | 54 | 23 | 0 | 100.0 | 57.4 | 43.2 | 69.3 | 70.7 |
| II期 | 28 | 13 | (1-3) | | | | | 72.4 |
| III期 | 30 | 29 | 0 | 100.0 | 3.3 | 0.3 | 14.5 | 64.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 76 | 45 | | | | | |
| % | 62.8 | 37.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 39 | 44 | 17 | | |
| % | | 16.5 | 32.2 | 36.4 | 14.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 54 | 28 | 30 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 44.6 | 23.1 | 24.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 28 | 39 | 25 | 27 | (1-3) | 0 |
| | % | 23.1 | 32.2 | 20.7 | 22.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 82 | 39 | 34 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 67.8 | 32.2 | 28.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 65 | 55 | | | |
| % | | | 53.7 | 45.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 382 | 272 | (4-6) | 98.4 | 28.0 | 23.6 | 32.6 | 70.3 |
| I期 | 120 | 45 | (1-3) | 99.2 | 62.3 | 52.9 | 70.3 | 71.4 |
| II期 | 24 | 17 | (1-3) | | | | | 72.3 |
| III期 | 121 | 96 | (1-3) | 97.5 | 18.7 | 12.3 | 26.2 | 71.4 |
| IV期 | 110 | 107 | (1-3) | 99.1 | 2.3 | 0.5 | 6.8 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 279 | 103 | 対象数 | | 26 | 356 |
| % | 73.0 | 27.0 | % | | 6.8 | 93.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 16 | 34 | 108 | 159 | 65 | |
| % | 4.2 | 8.9 | 28.3 | 41.6 | 17.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 120 | 24 | 121 | 110 | (7-9) | 0 |
| % | 31.4 | 6.3 | 31.7 | 28.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 240 | 142 | 118 | 18 | (4-6) | |
| % | 62.8 | 37.2 | 30.9 | 4.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 50 | 13 | 118 | 201 | | |
| % | 13.1 | 3.4 | 30.9 | 52.6 | | |

37 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 109 | 18 | (1-3) | 99.1 | 83.4 | 74.9 | 89.2 | 59.6 |
| I期 | 50 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.0 | 77.6 | 95.7 | 58.8 |
| II期 | 34 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.2 | 71.6 | 95.4 | 65.1 |
| III期 | 14 | (1-3) | (1-3) | | | | | 46.0 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 50.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 109 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 26 | 28 | 17 | 10 | | |
| % | 25.7 | 23.9 | 25.7 | 15.6 | 9.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 50 | 34 | 14 | 10 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.9 | 31.2 | 12.8 | 9.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 92 | 84 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 15.6 | 84.4 | 77.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (1-3) | 17 | 71 | | | |
| % | 17.4 | | 15.6 | 65.1 | | | |

38 竹田総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

38 竹田総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 347 | 166 | (1-3) | 99.7 | 52.1 | 46.7 | 57.2 | 72.2 |
| I期 | 208 | 57 | (1-3) | 99.5 | 72.5 | 65.9 | 78.1 | 72.6 |
| II期 | 22 | 12 | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | 26 | 16 | 0 | | | | | 68.5 |
| IV期 | 83 | 78 | 0 | 100.0 | 6.0 | 2.2 | 12.5 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 237 | 110 | | | | | |
| % | 68.3 | 31.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 37 | 78 | 132 | 93 | | |
| % | | 10.7 | 22.5 | 38.0 | 26.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 208 | 22 | 26 | 83 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 59.9 | 6.3 | 7.5 | 23.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 71 | 276 | 265 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 20.5 | 79.5 | 76.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 17 | 81 | 220 | | | |
| % | 8.4 | 4.9 | 23.3 | 63.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 325 | 159 | (1-3) | 99.4 | 50.8 | 45.2 | 56.1 | 71.6 |
| I期 | 74 | 21 | 0 | 100.0 | 71.6 | 59.9 | 80.5 | 73.4 |
| II期 | 94 | 29 | (1-3) | 97.9 | 68.6 | 58.1 | 77.0 | 74.6 |
| III期 | 73 | 36 | 0 | 100.0 | 50.7 | 38.8 | 61.4 | 68.6 |
| IV期 | 81 | 73 | 0 | 100.0 | 9.9 | 4.6 | 17.5 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 199 | 126 | | | | | |
| % | 61.2 | 38.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 37 | 88 | 93 | 96 | | |
| % | 3.4 | 11.4 | 27.1 | 28.6 | 29.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 74 | 94 | 73 | 81 | 0 | (1-3) | |
| % | 22.8 | 28.9 | 22.5 | 24.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 62 | 263 | 240 | 23 | 0 | | |
| % | 19.1 | 80.9 | 73.8 | 7.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | 10 | 73 | 219 | | | |
| % | 7.1 | 3.1 | 22.5 | 67.4 | | | |

38 竹田総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 81 | 62 | (1-3) | 98.8 | 22.8 | 14.3 | 32.4 | 73.1 |
| I期 | 34 | 24 | (1-3) | 97.1 | 27.7 | 13.9 | 43.4 | 73.3 |
| II期 | 29 | 21 | 0 | | | | | 70.8 |
| III期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 78.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 57 | 24 | | | | | | |
| % | 70.4 | 29.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 17 | 41 | 16 | | | |
| % | | | 21.0 | 50.6 | 19.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 34 | 29 | 13 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 42.0 | 35.8 | 16.0 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 30 | 23 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 25.9 | 37.0 | 28.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 60 | 21 | 21 | 0 | 0 | | | |
| % | 74.1 | 25.9 | 25.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 44 | 35 | | | | |
| % | | | 54.3 | 43.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 246 | 173 | (1-3) | 99.2 | 29.6 | 24.0 | 35.4 | 73.7 |
| I期 | 85 | 26 | (1-3) | 97.6 | 69.2 | 58.2 | 77.9 | 72.8 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 74.3 |
| III期 | 70 | 62 | 0 | 100.0 | 11.4 | 5.3 | 20.1 | 74.8 |
| IV期 | 77 | 75 | 0 | 100.0 | 2.6 | 0.5 | 8.1 | 75.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 対象数 | 179 | 67 | 対象数 | | 13 | 233 | | |
| % | 72.8 | 27.2 | % | | 5.3 | 94.7 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 58 | 91 | 80 | | | |
| % | | 5.7 | 23.6 | 37.0 | 32.5 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 85 | 12 | 70 | 77 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 34.6 | 4.9 | 28.5 | 31.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 158 | 88 | 86 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 64.2 | 35.8 | 35.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 15 | 22 | 95 | 114 | | | | |
| % | 6.1 | 8.9 | 38.6 | 46.3 | | | | |

38 竹田総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 122 | 16 | (1-3) | 99.2 | 86.9 | 79.5 | 91.7 | 61.6 |
| I期 | 49 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.9 | 84.7 | 99.0 | 62.6 |
| II期 | 46 | (4-6) | (1-3) | 97.8 | 91.3 | 78.5 | 96.6 | 62.7 |
| III期 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 61.4 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 122 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 23 | 33 | 18 | 18 | | |
| % | 24.6 | 18.9 | 27.0 | 14.8 | 14.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 46 | 20 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 40.2 | 37.7 | 16.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 100 | 99 | (1-3) | 0 | | |
| % | 18.0 | 82.0 | 81.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (7-9) | 16 | 69 | | | |
| % | 23.0 | | 13.1 | 56.6 | | | |

39 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

39 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 562 | 194 | 11 | 98.0 | 65.1 | 61.0 | 68.9 | 69.1 |
| I期 | 376 | 61 | 11 | 97.1 | 83.5 | 79.3 | 86.9 | 68.5 |
| II期 | 38 | 17 | 0 | 100.0 | 55.3 | 38.3 | 69.3 | 75.1 |
| III期 | 39 | 21 | 0 | 100.0 | 46.2 | 30.2 | 60.7 | 71.6 |
| IV期 | 95 | 90 | 0 | 100.0 | 5.3 | 2.0 | 11.0 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 391 | 171 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 86 | 149 | 196 | 104 | | |
| % | 4.8 | 15.3 | 26.5 | 34.9 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 376 | 38 | 39 | 95 | (1-3) | 11 | |
| % | 66.9 | 6.8 | 6.9 | 16.9 | | 2.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 86 | 476 | 443 | 33 | 0 | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 78.8 | 5.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 66 | 91 | 77 | 328 | | | |
| % | 11.7 | 16.2 | 13.7 | 58.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 304 | 123 | (4-6) | 98.7 | 59.5 | 53.7 | 64.8 | 68.6 |
| I期 | 59 | 10 | (1-3) | 96.6 | 83.0 | 70.7 | 90.5 | 68.3 |
| II期 | 80 | 20 | 0 | 100.0 | 75.0 | 64.0 | 83.1 | 71.7 |
| III期 | 87 | 27 | (1-3) | 97.7 | 68.8 | 57.9 | 77.5 | 67.1 |
| IV期 | 70 | 60 | 0 | 100.0 | 14.3 | 7.3 | 23.5 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 179 | 125 | | | | | |
| % | 58.9 | 41.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 57 | 75 | 97 | 58 | | |
| % | 5.6 | 18.8 | 24.7 | 31.9 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 80 | 87 | 70 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 19.4 | 26.3 | 28.6 | 23.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 266 | 226 | 39 | (1-3) | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 74.3 | 12.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 23 | 44 | 216 | | | |
| % | 6.9 | 7.6 | 14.5 | 71.1 | | | |

39 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 67 | 53 | 0 | 100.0 | 20.9 | 12.1 | 31.3 | 69.6 |
| I期 | 21 | 13 | 0 | | | | | 76.5 |
| II期 | 19 | 14 | 0 | | | | | 73.4 |
| III期 | 23 | 22 | 0 | | | | | 66.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 58.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 46 | 21 | | | | | | |
| % | 68.7 | 31.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 11 | 26 | 14 | | | |
| % | | 19.4 | 16.4 | 38.8 | 20.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 21 | 19 | 23 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 31.3 | 28.4 | 34.3 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 19 | 21 | 15 | (1-3) | 0 | |
| | % | 16.4 | 28.4 | 31.3 | 22.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 49 | 18 | 14 | (4-6) | 0 | | | |
| % | 73.1 | 26.9 | 20.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 27 | 38 | | | | |
| % | | | 40.3 | 56.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 326 | 223 | (1-3) | 99.1 | 31.3 | 26.3 | 36.3 | 69.8 |
| I期 | 100 | 29 | (1-3) | 99.0 | 71.0 | 61.0 | 78.8 | 69.2 |
| II期 | 33 | 23 | (1-3) | 97.0 | 28.7 | 14.4 | 44.7 | 72.1 |
| III期 | 66 | 49 | (1-3) | 98.5 | 24.6 | 15.0 | 35.5 | 71.8 |
| IV期 | 123 | 118 | 0 | 100.0 | 4.1 | 1.5 | 8.6 | 68.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 239 | 87 | 対象数 | | 38 | 288 |
| % | 73.3 | 26.7 | % | | 11.7 | 88.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 42 | 88 | 134 | 51 | |
| % | 3.4 | 12.9 | 27.0 | 41.1 | 15.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 100 | 33 | 66 | 123 | (4-6) | 0 |
| % | 30.7 | 10.1 | 20.2 | 37.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 205 | 121 | 114 | (7-9) | 0 | |
| % | 62.9 | 37.1 | 35.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 12 | 52 | 71 | 191 | | |
| % | 3.7 | 16.0 | 21.8 | 58.6 | | |

39 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 72 | 12 | 0 | 100.0 | 83.3 | 72.5 | 90.2 | 57.9 |
| I期 | 23 | (1-3) | 0 | | | | | 61.0 |
| II期 | 35 | (1-3) | 0 | 100.0 | 91.4 | 75.7 | 97.2 | 58.6 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 62.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 43.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 72 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 18 | 17 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 31.9 | 25.0 | 23.6 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 23 | 35 | 10 | (1-3) | 0 | (1-3) | |
| % | 31.9 | 48.6 | 13.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 67 | 64 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 93.1 | 88.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 56 | | | |
| % | | | | 77.8 | | | |

40 会津中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

「特になし」

40 会津中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 210 | 74 | (1-3) | 99.5 | 64.8 | 57.9 | 70.8 | 69.5 |
| I期 | 138 | 22 | 0 | 100.0 | 84.1 | 76.8 | 89.2 | 68.7 |
| II期 | 16 | 12 | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 67.0 |
| IV期 | 36 | 31 | (1-3) | 97.2 | 13.9 | 5.1 | 27.1 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 149 | 61 | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 30 | 67 | 70 | 37 | | |
| % | | 14.3 | 31.9 | 33.3 | 17.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 138 | 16 | 16 | 36 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 65.7 | 7.6 | 7.6 | 17.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 173 | 153 | 12 | (7-9) | | |
| % | 17.6 | 82.4 | 72.9 | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 35 | 66 | 87 | | | |
| % | 10.5 | 16.7 | 31.4 | 41.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 137 | 63 | (1-3) | 98.5 | 53.7 | 45.0 | 61.7 | 71.1 |
| I期 | 29 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.5 |
| II期 | 35 | 12 | 0 | 100.0 | 65.7 | 47.6 | 78.9 | 75.2 |
| III期 | 37 | 13 | 0 | 100.0 | 64.9 | 47.3 | 77.9 | 73.9 |
| IV期 | 32 | 31 | 0 | 100.0 | 3.1 | 0.2 | 13.7 | 66.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 85 | 52 | | | | | |
| % | 62.0 | 38.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 42 | 40 | 36 | | |
| % | | 10.2 | 30.7 | 29.2 | 26.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 35 | 37 | 32 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 21.2 | 25.5 | 27.0 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 108 | 88 | 10 | 10 | | |
| % | 21.2 | 78.8 | 64.2 | 7.3 | 7.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 47 | 77 | | | |
| % | | | 34.3 | 56.2 | | | |

40 会津中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 24 | 21 | 0 | | | | | 75.3 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 79.5 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.8 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 77.2 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 87.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 21 | (1-3) | | | | | |
| % | 87.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 10 | | |
| % | | | | | 41.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (1-3) | (7-9) | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 0 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | (1-3) | 0 | (1-3) | 0 | | |
| % | 95.8 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 15 | (7-9) | | | |
| % | | | 62.5 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 106 | 72 | 0 | 100.0 | 32.1 | 23.4 | 41.0 | 70.8 |
| I期 | 40 | 14 | 0 | 100.0 | 65.0 | 48.2 | 77.6 | 71.8 |
| II期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 67.7 |
| III期 | 24 | 21 | 0 | | | | | 73.3 |
| IV期 | 30 | 29 | 0 | 100.0 | 3.3 | 0.3 | 14.5 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 73 | 33 | 対象数 | | 12 | 94 |
| % | 68.9 | 31.1 | % | | 11.3 | 88.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 35 | 33 | 24 | |
| % | | 11.3 | 33.0 | 31.1 | 22.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 40 | 11 | 24 | 30 | 0 | (1-3) |
| % | 37.7 | 10.4 | 22.6 | 28.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 53 | 53 | 46 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 50.0 | 50.0 | 43.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | 48 | 36 | | |
| % | | 12.3 | 45.3 | 34.0 | | |

40 会津中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 130 | 16 | (4-6) | 96.9 | 87.5 | 80.3 | 92.1 | 61.8 |
| I期 | 63 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.7 | 84.0 | 97.6 | 65.1 |
| II期 | 46 | (4-6) | (4-6) | 91.3 | 88.4 | 74.3 | 95.0 | 57.7 |
| III期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 66.3 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 59.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 130 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 37 | 25 | 19 | 21 | | |
| % | 21.5 | 28.5 | 19.2 | 14.6 | 16.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 63 | 46 | 13 | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| % | 48.5 | 35.4 | 10.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 124 | 97 | 14 | 13 | | |
| % | | 95.4 | 74.6 | 10.8 | 10.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | (1-3) | (7-9) | 80 | | | |
| % | 29.2 | | | 61.5 | | | |

41 茨城県立中央病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院は県内唯一の県立総合病院であるとともに、地域がんセンター（県指定）、全国がんセンター協議会加盟施設並びに都道府県がん診療連携拠点病院として、がんの高度・専門医療を提供しています。このため、当院では地域から合併症の多い患者さんや全身状態の悪い患者さんもすべて断らずに受け入れています。
今回公表された集計結果が、必ずしも「がん治療の質の良否」を反映していないことをご理解のうえ、参考にしていただければ幸いです。

41 茨城県立中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 355 | 174 | (1-3) | 99.7 | 51.0 | 45.7 | 56.0 | 70.0 |
| I期 | 209 | 51 | (1-3) | 99.5 | 75.6 | 69.2 | 80.9 | 70.8 |
| II期 | 28 | 16 | 0 | | | | | 67.7 |
| III期 | 14 | 13 | 0 | | | | | 70.8 |
| IV期 | 96 | 90 | 0 | 100.0 | 6.3 | 2.6 | 12.3 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 248 | 107 | | | | | |
| % | 69.9 | 30.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 36 | 111 | 120 | 70 | | |
| % | 5.1 | 10.1 | 31.3 | 33.8 | 19.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 209 | 28 | 14 | 96 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 58.9 | 7.9 | 3.9 | 27.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 92 | 263 | 247 | 16 | 0 | | |
| % | 25.9 | 74.1 | 69.6 | 4.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | 37 | 125 | 160 | | | |
| % | 9.3 | 10.4 | 35.2 | 45.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 302 | 128 | (4-6) | 98.7 | 57.3 | 51.5 | 62.7 | 70.0 |
| I期 | 56 | (7-9) | 0 | 100.0 | 83.9 | 71.4 | 91.3 | 67.3 |
| II期 | 86 | 27 | (1-3) | 97.7 | 68.3 | 57.3 | 77.1 | 72.2 |
| III期 | 86 | 31 | (1-3) | 97.7 | 63.3 | 52.1 | 72.6 | 68.2 |
| IV期 | 72 | 61 | 0 | 100.0 | 15.3 | 8.1 | 24.5 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 183 | 119 | | | | | |
| % | 60.6 | 39.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 39 | 85 | 97 | 66 | | |
| % | 5.0 | 12.9 | 28.1 | 32.1 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 56 | 86 | 86 | 72 | 0 | (1-3) | |
| % | 18.5 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 263 | 254 | (7-9) | 0 | | |
| % | 12.9 | 87.1 | 84.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 25 | 89 | 171 | | | |
| % | 5.6 | 8.3 | 29.5 | 56.6 | | | |

41 茨城県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 144 | 108 | (1-3) | 99.3 | 24.8 | 18.1 | 32.1 | 69.6 |
| I期 | 49 | 29 | (1-3) | 98.0 | 40.3 | 26.6 | 53.7 | 68.5 |
| II期 | 39 | 30 | 0 | 100.0 | 23.1 | 11.5 | 37.1 | 74.0 |
| III期 | 39 | 33 | 0 | 100.0 | 15.4 | 6.2 | 28.3 | 65.4 |
| IV期 | 16 | 16 | 0 | | | | | 61.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 対象数 | 102 | 42 | | | | | |
| % | 70.8 | 29.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 42 | 59 | 19 | | |
| % | | 13.2 | 29.2 | 41.0 | 13.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 49 | 39 | 39 | 16 | 0 | (1-3) |
| | % | 34.0 | 27.1 | 27.1 | 11.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 24 | 46 | 43 | 29 | 0 | (1-3) |
| | % | 16.7 | 31.9 | 29.9 | 20.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 99 | 45 | 43 | (1-3) | 0 | | |
| % | 68.8 | 31.3 | 29.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 91 | 46 | | | |
| % | | | 63.2 | 31.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 411 | 260 | (4-6) | 98.5 | 36.4 | 31.8 | 41.1 | 70.7 |
| I期 | 157 | 38 | (4-6) | 97.5 | 75.6 | 68.1 | 81.6 | 70.6 |
| II期 | 33 | 22 | (1-3) | 97.0 | 32.8 | 17.7 | 48.9 | 72.7 |
| III期 | 100 | 84 | 0 | 100.0 | 16.0 | 9.6 | 23.8 | 71.3 |
| IV期 | 119 | 116 | (1-3) | 99.2 | 1.7 | 0.3 | 5.5 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 277 | 134 | 対象数 | 50 | 361 | | |
| % | 67.4 | 32.6 | % | 12.2 | 87.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 40 | 135 | 134 | 90 | | |
| % | 2.9 | 9.7 | 32.8 | 32.6 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 157 | 33 | 100 | 119 | 0 | (1-3) | |
| % | 38.2 | 8.0 | 24.3 | 29.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 230 | 181 | 178 | (1-3) | 0 | | |
| % | 56.0 | 44.0 | 43.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 80 | 165 | 137 | | | |
| % | 7.1 | 19.5 | 40.1 | 33.3 | | | |

41 茨城県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 145 | 20 | (1-3) | 97.9 | 86.0 | 79.2 | 90.8 | 62.0 |
| I期 | 62 | (4-6) | (1-3) | 98.4 | 93.5 | 83.5 | 97.5 | 62.3 |
| II期 | 51 | (4-6) | (1-3) | 96.1 | 92.0 | 80.0 | 96.9 | 65.2 |
| III期 | 17 | (1-3) | 0 | | | | | 65.1 |
| IV期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 56.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 145 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 35 | 49 | 31 | (7-9) | | |
| % | 14.5 | 24.1 | 33.8 | 21.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 62 | 51 | 17 | 15 | 0 | 0 | |
| % | 42.8 | 35.2 | 11.7 | 10.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 126 | 94 | 32 | 0 | | |
| % | 13.1 | 86.9 | 64.8 | 22.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | (1-3) | 17 | 100 | | | |
| % | 17.2 | | 11.7 | 69.0 | | | |

42 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
2011年のみ

コメント:

2010年診断症例については予後判明率が低く2010年・2011年合わせた症例数が細分化された項目において30例以下となり空欄で標記されている。

42 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 227 | 99 | (4-6) | 98.2 | 55.9 | 49.1 | 62.1 | 70.3 |
| I期 | 141 | 27 | (1-3) | 97.9 | 80.6 | 73.0 | 86.3 | 70.5 |
| II期 | 19 | 13 | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 19 | 15 | 0 | | | | | 70.6 |
| IV期 | 38 | 35 | (1-3) | 97.4 | 5.4 | 1.0 | 16.0 | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 160 | 67 | | | | | |
| % | 70.5 | 29.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 25 | 64 | 76 | 53 | | |
| % | | 11.0 | 28.2 | 33.5 | 23.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 141 | 19 | 19 | 38 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 62.1 | 8.4 | 8.4 | 16.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 56 | 171 | 156 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 24.7 | 75.3 | 68.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | 12 | 80 | 99 | | | |
| % | 15.9 | 5.3 | 35.2 | 43.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 195 | 87 | (1-3) | 99.0 | 55.0 | 47.7 | 61.7 | 71.5 |
| I期 | 41 | 15 | 0 | 100.0 | 63.4 | 46.8 | 76.1 | 68.1 |
| II期 | 45 | (7-9) | 0 | 100.0 | 82.2 | 67.6 | 90.7 | 71.8 |
| III期 | 55 | 20 | 0 | 100.0 | 63.6 | 49.5 | 74.8 | 72.8 |
| IV期 | 46 | 40 | (1-3) | 95.7 | 9.4 | 3.0 | 20.3 | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 113 | 82 | | | | | |
| % | 57.9 | 42.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 58 | 68 | 48 | | |
| % | | 7.7 | 29.7 | 34.9 | 24.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 45 | 55 | 46 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 21.0 | 23.1 | 28.2 | 23.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 152 | 146 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 22.1 | 77.9 | 74.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | 41 | 131 | | | |
| % | 8.2 | | 21.0 | 67.2 | | | |

42 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 48 | (1-3) | 97.1 | 29.0 | 18.7 | 40.1 | 70.2 |
| I期 | 25 | 13 | 0 | | | | | 71.7 |
| II期 | 21 | 13 | (1-3) | | | | | 69.0 |
| III期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 71.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 61.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 46 | 23 | | | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | 11 | 20 | 26 | 12 | | |
| % | | 15.9 | 29.0 | 37.7 | 17.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 25 | 21 | 17 | (1-3) | (4-6) | 0 |
| | % | 36.2 | 30.4 | 24.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 17 | 18 | 16 | 12 | (4-6) | 0 |
| | % | 24.6 | 26.1 | 23.2 | 17.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 64 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | | |
| % | 92.8 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 51 | 16 | | | |
| % | | | 73.9 | 23.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 161 | 111 | 0 | 100.0 | 31.1 | 24.1 | 38.3 | 72.8 |
| I期 | 49 | 16 | 0 | 100.0 | 67.4 | 52.3 | 78.6 | 72.8 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 74.7 |
| III期 | 39 | 29 | 0 | 100.0 | 25.6 | 13.3 | 39.9 | 73.2 |
| IV期 | 50 | 49 | 0 | 100.0 | 2.0 | 0.2 | 9.2 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 119 | 42 | 対象数 | 13 | 148 | | |
| % | 73.9 | 26.1 | % | 8.1 | 91.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 38 | 67 | 43 | | |
| % | | | 23.6 | 41.6 | 26.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 12 | 39 | 50 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 30.4 | 7.5 | 24.2 | 31.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 104 | 57 | 54 | (1-3) | 0 | | |
| % | 64.6 | 35.4 | 33.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (4-6) | 60 | 79 | | | |
| % | 11.2 | | 37.3 | 49.1 | | | |

42 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 51 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 86.0 | 72.9 | 93.1 | 64.8 |
| I期 | 20 | (1-3) | 0 | | | | | 65.2 |
| II期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 64.8 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 72.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 60.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 51 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 16 | 11 | (7-9) | | |
| % | | | 31.4 | 21.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 20 | 19 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 39.2 | 37.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 44 | 42 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 86.3 | 82.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 34 | | | |
| % | | | | 66.7 | | | |

43

友愛記念病院

2010-2011年2力年

コメント:

今回の生存率は、がんによる死亡以外のあらゆる死亡原因を含めて抽出された「実測生存率」となっています。
高齢化に伴う多数の基礎疾患の存在、がん診断時の進行具合や合併症等の様々な要因がすべての生存率に大きく影響していると考えます。
今回の結果のみで病院の是非を判断するのではなく、あくまでも参考値としてご覧いただきたいと思います。

43 友愛記念病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 216 | 88 | (4-6) | 98.1 | 59.0 | 52.1 | 65.2 | 68.8 |
| I期 | 135 | 20 | (1-3) | 98.5 | 85.1 | 77.8 | 90.1 | 69.2 |
| II期 | 19 | 12 | 0 | | | | | 76.2 |
| III期 | 14 | 11 | (1-3) | | | | | 70.8 |
| IV期 | 42 | 41 | 0 | 100.0 | 2.4 | 0.2 | 10.8 | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 147 | 69 | | | | | |
| % | 68.1 | 31.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 30 | 73 | 74 | 33 | | |
| % | | 13.9 | 33.8 | 34.3 | 15.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 135 | 19 | 14 | 42 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 62.5 | 8.8 | 6.5 | 19.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 61 | 155 | 109 | 19 | 27 | | |
| % | 28.2 | 71.8 | 50.5 | 8.8 | 12.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 38 | 24 | 142 | | | |
| % | 5.6 | 17.6 | 11.1 | 65.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 201 | 71 | (4-6) | 98.0 | 64.3 | 57.3 | 70.6 | 69.0 |
| I期 | 46 | 11 | (1-3) | 95.7 | 75.2 | 59.7 | 85.4 | 68.9 |
| II期 | 59 | 11 | (1-3) | 98.3 | 81.3 | 68.8 | 89.2 | 70.6 |
| III期 | 62 | 23 | (1-3) | 98.4 | 62.8 | 49.6 | 73.5 | 65.0 |
| IV期 | 25 | 24 | 0 | | | | | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 113 | 88 | | | | | |
| % | 56.2 | 43.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 26 | 58 | 71 | 35 | | |
| % | 5.5 | 12.9 | 28.9 | 35.3 | 17.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | 59 | 62 | 25 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 22.9 | 29.4 | 30.8 | 12.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 165 | 87 | 29 | 49 | | |
| % | 17.9 | 82.1 | 43.3 | 14.4 | 24.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 25 | 26 | 145 | | | |
| % | | 12.4 | 12.9 | 72.1 | | | |

43 友愛記念病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 38 | 34 | (1-3) | 97.4 | 8.9 | 2.3 | 21.0 | 70.1 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.5 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 71.5 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 28 | 10 | | | | | |
| % | 73.7 | 26.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 16 | (7-9) | | |
| % | | | | 42.1 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (7-9) | 12 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| | % | | 31.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (7-9) | 12 | 11 | (1-3) | 0 | |
| | % | | 31.6 | 28.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | 0 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 89.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | 29 | | | |
| % | | | | 76.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 35 | 33 | 0 | 100.0 | 5.7 | 1.0 | 16.7 | 79.8 |
| I期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 80.7 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 86.3 |
| IV期 | 17 | 17 | 0 | | | | | 79.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 29 | (4-6) | | (4-6) | 30 | |
| % | 82.9 | | | | 85.7 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 23 | |
| % | | | | | 65.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 17 | (1-3) | 0 |
| % | | | | 48.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 33 | (1-3) | 0 | 0 | (1-3) | |
| % | 94.3 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (7-9) | 25 | | |
| % | | | | 71.4 | | |

43 友愛記念病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 97 | 10 | 0 | 100.0 | 89.7 | 81.7 | 94.3 | 61.4 |
| I期 | 42 | (1-3) | 0 | 100.0 | 92.9 | 79.5 | 97.6 | 62.5 |
| II期 | 41 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.1 | 81.9 | 98.8 | 57.5 |
| III期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 57.6 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 52.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 97 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 16 | 26 | 25 | (4-6) | | |
| % | 24.7 | 16.5 | 26.8 | 25.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 41 | 10 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 43.3 | 42.3 | 10.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 78 | 26 | 17 | 35 | | |
| % | 19.6 | 80.4 | 26.8 | 17.5 | 36.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | (1-3) | (4-6) | 67 | | | |
| % | 23.7 | | | 69.1 | | | |

44 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

44 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 118 | 57 | 0 | 100.0 | 51.7 | 42.3 | 60.3 | 68.1 |
| I期 | 55 | 10 | 0 | 100.0 | 81.8 | 68.8 | 89.8 | 70.8 |
| II期 | 13 | (1-3) | 0 | | | | | 69.3 |
| III期 | 17 | 13 | 0 | | | | | 55.8 |
| IV期 | 31 | 30 | 0 | 100.0 | 3.2 | 0.2 | 14.1 | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 80 | 38 | | | | | |
| % | 67.8 | 32.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 12 | 43 | 39 | 16 | | |
| % | | 10.2 | 36.4 | 33.1 | 13.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | 13 | 17 | 31 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 46.6 | 11.0 | 14.4 | 26.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 100 | 96 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 81.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 37 | 62 | | | |
| % | | 11.9 | 31.4 | 52.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 101 | 46 | (1-3) | 99.0 | 54.4 | 44.2 | 63.5 | 69.1 |
| I期 | 25 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.9 |
| II期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 74.7 |
| III期 | 27 | 12 | 0 | | | | | 66.9 |
| IV期 | 22 | 20 | 0 | | | | | 65.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 57 | 44 | | | | | |
| % | 56.4 | 43.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 29 | 37 | 16 | | |
| % | | 13.9 | 28.7 | 36.6 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 25 | 27 | 22 | (1-3) | 0 | |
| % | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 21.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 87 | 77 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 13.9 | 86.1 | 76.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 42 | 45 | | | |
| % | | 9.9 | 41.6 | 44.6 | | | |

44 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 21 | 13 | 0 | | | | | 75.7 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |
| II期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 80.8 |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 78.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 18 | (1-3) | | | | | |
| % | 85.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 10 | | |
| % | | | | | 47.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (1-3) | 13 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | | 61.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | 13 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | | 61.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 15 | (4-6) | | | |
| % | | | 71.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 109 | 76 | 0 | 100.0 | 30.3 | 22.0 | 39.0 | 69.1 |
| I期 | 30 | (4-6) | 0 | 100.0 | 86.7 | 68.3 | 94.8 | 66.4 |
| II期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 71.6 |
| III期 | 24 | 22 | 0 | | | | | 76.6 |
| IV期 | 40 | 37 | 0 | 100.0 | 7.5 | 1.9 | 18.2 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 91 | 18 | 対象数 | | 19 | 90 |
| % | 83.5 | 16.5 | % | | 17.4 | 82.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 37 | 39 | 16 | |
| % | | 11.0 | 33.9 | 35.8 | 14.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 30 | 13 | 24 | 40 | (1-3) | (1-3) |
| % | 27.5 | 11.9 | 22.0 | 36.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 62 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| % | 56.9 | 43.1 | 43.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 26 | 46 | 35 | | |
| % | | 23.9 | 42.2 | 32.1 | | |

44 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 55 | 11 | 0 | 100.0 | 80.0 | 66.8 | 88.4 | 61.0 |
| I期 | 25 | (1-3) | 0 | | | | | 60.1 |
| II期 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 61.6 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 61.3 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 55 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 12 | 16 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 25.5 | 21.8 | 29.1 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 20 | (4-6) | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| % | 45.5 | 36.4 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 50 | 47 | 0 | (1-3) | | |
| % | | 90.9 | 85.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 10 | (4-6) | 30 | | | |
| % | 18.2 | 18.2 | | 54.5 | | | |

45 国立大学法人 筑波大学附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

45 国立大学法人 筑波大学附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 196 | 82 | (7-9) | 95.9 | 57.6 | 50.3 | 64.2 | 68.5 |
| I期 | 121 | 25 | (4-6) | 95.0 | 78.9 | 70.4 | 85.3 | 69.8 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 17 | (7-9) | (1-3) | | | | | 65.0 |
| IV期 | 44 | 40 | (1-3) | 97.7 | 7.7 | 2.0 | 18.4 | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 139 | 57 | | | | | |
| % | 70.9 | 29.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 22 | 67 | 72 | 25 | | |
| % | 5.1 | 11.2 | 34.2 | 36.7 | 12.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | 12 | 17 | 44 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 61.7 | 6.1 | 8.7 | 22.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 54 | 142 | 132 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 27.6 | 72.4 | 67.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 26 | 83 | 79 | | | |
| % | | 13.3 | 42.3 | 40.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 151 | 71 | (4-6) | 96.0 | 52.3 | 43.9 | 60.0 | 65.8 |
| I期 | 36 | (7-9) | 0 | 100.0 | 80.6 | 63.5 | 90.2 | 65.4 |
| II期 | 34 | (7-9) | (1-3) | 94.1 | 72.9 | 54.3 | 84.9 | 66.0 |
| III期 | 38 | 17 | (1-3) | 97.4 | 54.8 | 37.7 | 69.0 | 67.8 |
| IV期 | 40 | 37 | (1-3) | 95.0 | 3.0 | 0.2 | 13.2 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 90 | 61 | | | | | |
| % | 59.6 | 40.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 26 | 38 | 48 | 23 | | |
| % | 10.6 | 17.2 | 25.2 | 31.8 | 15.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 34 | 38 | 40 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 23.8 | 22.5 | 25.2 | 26.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 111 | 101 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 26.5 | 73.5 | 66.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 52 | 77 | | | |
| % | | 9.3 | 34.4 | 51.0 | | | |

45 国立大学法人 筑波大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 177 | 115 | (4-6) | 97.2 | 33.9 | 26.9 | 40.9 | 68.5 |
| I期 | 60 | 29 | (1-3) | 96.7 | 50.7 | 37.4 | 62.6 | 72.6 |
| II期 | 54 | 32 | (1-3) | 94.4 | 38.4 | 25.3 | 51.3 | 69.3 |
| III期 | 49 | 43 | 0 | 100.0 | 12.2 | 5.0 | 23.0 | 67.9 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 64.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 対象数 | 136 | 41 | | | | | | |
| % | 76.8 | 23.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 64 | 56 | 28 | | | |
| % | | 12.4 | 36.2 | 31.6 | 15.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 60 | 54 | 49 | 11 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 33.9 | 30.5 | 27.7 | 6.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 57 | 48 | 35 | 18 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 32.2 | 27.1 | 19.8 | 10.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 137 | 40 | 38 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 77.4 | 22.6 | 21.5 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 112 | 48 | | | | |
| % | | 7.3 | 63.3 | 27.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 361 | 203 | (7-9) | 98.1 | 43.3 | 38.1 | 48.4 | 68.8 |
| I期 | 152 | 37 | (4-6) | 96.1 | 75.2 | 67.5 | 81.4 | 71.2 |
| II期 | 30 | 16 | 0 | 100.0 | 46.7 | 28.4 | 63.0 | 71.7 |
| III期 | 79 | 59 | 0 | 100.0 | 25.3 | 16.4 | 35.3 | 67.7 |
| IV期 | 97 | 91 | (1-3) | 99.0 | 6.2 | 2.5 | 12.2 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 242 | 119 | 対象数 | | 22 | 339 | |
| % | 67.0 | 33.0 | % | | 6.1 | 93.9 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 42 | 127 | 136 | 44 | | |
| % | 3.3 | 11.6 | 35.2 | 37.7 | 12.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 152 | 30 | 79 | 97 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 42.1 | 8.3 | 21.9 | 26.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 199 | 162 | 161 | (1-3) | 0 | | |
| % | 55.1 | 44.9 | 44.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 43 | 64 | 123 | 131 | | | |
| % | 11.9 | 17.7 | 34.1 | 36.3 | | | |

45 国立大学法人 筑波大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 226 | 19 | (4-6) | 97.8 | 91.5 | 87.0 | 94.5 | 55.5 |
| I期 | 105 | (4-6) | (1-3) | 99.0 | 94.3 | 87.6 | 97.4 | 55.5 |
| II期 | 84 | (4-6) | (1-3) | 97.6 | 94.0 | 86.1 | 97.4 | 56.3 |
| III期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 58.2 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 56.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 226 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 83 | 56 | 53 | 29 | (4-6) | | |
| % | 36.7 | 24.8 | 23.5 | 12.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 105 | 84 | 27 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 46.5 | 37.2 | 11.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 193 | 188 | (4-6) | 0 | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 83.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 59 | 21 | 17 | 129 | | | |
| % | 26.1 | 9.3 | 7.5 | 57.1 | | | |

46 国立病院機構水戸医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

2010年 2011年 2ヶ年データを全国集計報告書の全国平均と比較しました。

(胃) 胃がんにおいてはUICCTNM分類ステージ別から1期が54%で全国平均より低く、4期は26%と全国平均均より少し高くなっており、約8割が観血的手術を受けており、原発巣治癒切除例が7割以上であり全国平均とほぼ同様です。年代別にみると、70歳代が最も多く、60歳代が次に多くなっています。こちらも全国平均とほぼ同様です。

(大腸) UICCTNM分類ステージ別に見ると 1期20%、2期が26% 3期が33%と、3期は全国平均より高い割合です。約9割が観血的手術を受けており全国平均より高くなっており、原発巣治癒切除例は9割近くになっており、年代別にみると、70歳代が最も多く、60歳代が次に多くなっております。

(肝) UICCTNM分類ステージ別においては、1期が最も多く、次に2期、3期、4期となっております。発見経緯では、経過観察中での発見が最も多くなっております。

(肺) 肺がんは男性が7割をしめ、70歳代が最も多く全体の4割であり、いずれも全国平均と同様です。UICCTNM分類ステージ別では、4期が最も多く38%次いで 1期36%となっております。発見経緯では、その他47%次いで他疾患治療中38%での発見が多くなっております。他疾患治療中偶然に発見されることが、4期が多い要因の一つではないかと考えられます。

(女性乳房) 年代別にみると消化器系の癌とは違い、50歳代未満が最も多く、次いで60歳代、50歳代となっております。UICCTNM分類ステージ別では、1期45%2期39%であります。観血的治療の実施率の割合は87%で全国平均とほぼ同様です。見経緯では、その他での発見が多く、年代が低いことと関連しているのではと思われます。

(生存率) 胃 大腸 肝 肺 とともに全国平均よりも低い割合になっております。しかしながら全身状態不良、 重い合併症 基礎疾患の頻度等報告書の中からは読み取れない地域性・環境等患者さんの背景からも生存率に影響があったことをご理解ご参考にしていただければ幸いです。

46 国立病院機構水戸医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 234 | 106 | (1-3) | 99.1 | 54.6 | 48.0 | 60.7 | 69.6 |
| I期 | 128 | 18 | (1-3) | 98.4 | 85.9 | 78.5 | 90.8 | 70.7 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 68.9 |
| III期 | 19 | 17 | 0 | | | | | 68.2 |
| IV期 | 63 | 58 | 0 | 100.0 | 7.9 | 2.9 | 16.2 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 178 | 56 | | | | | |
| % | 76.1 | 23.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 24 | 75 | 88 | 37 | | |
| % | 4.3 | 10.3 | 32.1 | 37.6 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 128 | 19 | 19 | 63 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 54.7 | 8.1 | 8.1 | 26.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 181 | 170 | 10 | (1-3) | | |
| % | 22.6 | 77.4 | 72.6 | 4.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 19 | 51 | 134 | | | |
| % | 12.8 | 8.1 | 21.8 | 57.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 221 | 85 | 0 | 100.0 | 61.5 | 54.8 | 67.6 | 70.5 |
| I期 | 45 | (4-6) | 0 | 100.0 | 91.1 | 78.0 | 96.6 | 69.7 |
| II期 | 58 | 16 | 0 | 100.0 | 72.4 | 59.0 | 82.1 | 69.2 |
| III期 | 73 | 27 | 0 | 100.0 | 63.0 | 50.9 | 72.9 | 73.4 |
| IV期 | 42 | 37 | 0 | 100.0 | 11.9 | 4.4 | 23.6 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 130 | 91 | | | | | |
| % | 58.8 | 41.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 33 | 55 | 75 | 51 | | |
| % | | 14.9 | 24.9 | 33.9 | 23.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 58 | 73 | 42 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 20.4 | 26.2 | 33.0 | 19.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 201 | 189 | 12 | 0 | | |
| % | 9.0 | 91.0 | 85.5 | 5.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 13 | 32 | 156 | | | |
| % | 9.0 | 5.9 | 14.5 | 70.6 | | | |

46 国立病院機構水戸医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 49 | 35 | 0 | 100.0 | 28.6 | 16.8 | 41.5 | 68.0 |
| I期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 67.6 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 63.8 |
| III期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 68.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 32 | 17 | | | | | |
| % | 65.3 | 34.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 18 | 17 | (4-6) | | |
| % | | | 36.7 | 34.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 16 | 14 | 11 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 32.7 | 28.6 | 22.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 17 | 13 | 11 | (1-3) | 0 |
| | % | | 34.7 | 26.5 | 22.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 23 | 23 | 0 | 0 | | |
| % | 53.1 | 46.9 | 46.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 36 | 12 | | | |
| % | | | 73.5 | 24.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 145 | 100 | 0 | 100.0 | 31.0 | 23.7 | 38.6 | 71.6 |
| I期 | 52 | 11 | 0 | 100.0 | 78.9 | 65.1 | 87.7 | 70.4 |
| II期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 75.6 |
| III期 | 25 | 24 | 0 | | | | | 73.6 |
| IV期 | 55 | 55 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 100 | 45 | 対象数 | 16 | 129 | | |
| % | 69.0 | 31.0 | % | 11.0 | 89.0 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 41 | 59 | 29 | | |
| % | | 9.7 | 28.3 | 40.7 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 52 | 11 | 25 | 55 | (1-3) | 0 | |
| % | 35.9 | 7.6 | 17.2 | 37.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 84 | 61 | 61 | 0 | 0 | | |
| % | 57.9 | 42.1 | 42.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 10 | 56 | 69 | | | |
| % | 6.9 | 6.9 | 38.6 | 47.6 | | | |

46 国立病院機構水戸医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 190 | 19 | (1-3) | 99.5 | 90.0 | 84.7 | 93.5 | 56.3 |
| I期 | 87 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.6 | 89.7 | 98.9 | 58.3 |
| II期 | 75 | (7-9) | (1-3) | 98.7 | 89.2 | 79.6 | 94.5 | 57.3 |
| III期 | 17 | (1-3) | 0 | | | | | 59.2 |
| IV期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 66.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 190 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 75 | 34 | 43 | 24 | 14 | | |
| % | 39.5 | 17.9 | 22.6 | 12.6 | 7.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 87 | 75 | 17 | 10 | (1-3) | 0 | |
| % | 45.8 | 39.5 | 8.9 | 5.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 166 | 166 | 0 | 0 | | |
| % | 12.6 | 87.4 | 87.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | (4-6) | 16 | 123 | | | |
| % | 23.7 | | 8.4 | 64.7 | | | |

47 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
2011年のみ

コメント:

当院では、全体的に進行した癌患者の割合が多く、各癌腫の生存率が低めになっている。
特に胃癌ではI期患者が全体の43.6%であるのに対し、IV期患者が全体の35.9%を占めていた。
肺癌ではI期の患者が29.5%で少なかった。

47 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | 48 | 0 | 100.0 | 38.5 | 27.8 | 49.1 | 70.5 |
| I期 | 34 | (7-9) | 0 | 100.0 | 79.4 | 61.6 | 89.6 | 68.8 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 72.7 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.1 |
| IV期 | 28 | 27 | 0 | | | | | 71.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 59 | 19 | | | | | |
| % | 75.6 | 24.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 21 | 36 | 13 | | |
| % | | | 26.9 | 46.2 | 16.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | (7-9) | 28 | (1-3) | 0 | |
| % | 43.6 | | | 35.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 47 | 39 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 39.7 | 60.3 | 50.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (7-9) | 19 | 39 | | | |
| % | 14.1 | | 24.4 | 50.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 83 | 32 | (1-3) | 97.6 | 61.3 | 49.9 | 70.9 | 68.7 |
| I期 | 21 | (1-3) | (1-3) | | | | | 64.0 |
| II期 | 26 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.7 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 67.3 |
| IV期 | 20 | 16 | 0 | | | | | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 55 | 28 | | | | | |
| % | 66.3 | 33.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 28 | 28 | 13 | | |
| % | | | 33.7 | 33.7 | 15.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 21 | 26 | 15 | 20 | (1-3) | 0 | |
| % | 25.3 | 31.3 | 18.1 | 24.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 70 | 67 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 15.7 | 84.3 | 80.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 25 | 42 | | | |
| % | | 14.5 | 30.1 | 50.6 | | | |

47 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合 (%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 14 | 10 | 0 | | | | | 73.2 |
| I 期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 78.3 |
| II 期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.7 |
| III 期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.0 |
| IV 期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | 71.4 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合 (%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 44 | 31 | 0 | 100.0 | 29.6 | 17.0 | 43.2 | 72.3 |
| I 期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 73.7 |
| II 期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.3 |
| III 期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 75.3 |
| IV 期 | 13 | 11 | 0 | | | | | 66.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 27 | 17 | 対象数 | | (1-3) | 42 |
| % | 61.4 | 38.6 | % | | | 95.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 15 | 16 | 10 | |
| % | | | 34.1 | 36.4 | 22.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 13 | (4-6) | 13 | 13 | (1-3) | 0 |
| % | 29.5 | | 29.5 | 29.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 22 | 22 | 14 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 50.0 | 50.0 | 31.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 11 | 18 | | |
| % | | | 25.0 | 40.9 | | |

47 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 37 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.1 | 64.4 | 90.5 | 62.4 |
| I期 | 16 | (1-3) | 0 | | | | | 64.0 |
| II期 | 13 | (1-3) | 0 | | | | | 64.2 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 55.3 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 56.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 37 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | (7-9) | 10 | (4-6) | | |
| % | 27.0 | | | 27.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | 13 | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 43.2 | 35.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 31 | 23 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | 83.8 | 62.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 25 | | | |
| % | | | | 67.6 | | | |

48 独立行政法人国立病院機構茨城東病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

48 独立行政法人国立病院機構茨城東病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

48 独立行政法人国立病院機構茨城東病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | . | . | . | . | . | . |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | . | . | . | . | . | . |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 76 | (1-3) | 97.8 | 44.3 | 35.9 | 52.4 | 71.4 |
| I期 | 62 | 14 | 0 | 100.0 | 77.4 | 64.9 | 86.0 | 70.6 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 70.3 |
| III期 | 43 | 34 | (1-3) | 93.0 | 15.3 | 6.2 | 28.1 | 71.2 |
| IV期 | 26 | 24 | 0 | | | | | 73.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 98 | 41 | 対象数 | | 13 | 126 |
| % | 70.5 | 29.5 | % | | 9.4 | 90.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 37 | 60 | 28 | |
| % | | 7.2 | 26.6 | 43.2 | 20.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 62 | (7-9) | 43 | 26 | 0 | 0 |
| % | 44.6 | | 30.9 | 18.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 60 | 79 | 76 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 43.2 | 56.8 | 54.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 19 | 10 | 83 | 27 | | |
| % | 13.7 | 7.2 | 59.7 | 19.4 | | |

48 独立行政法人国立病院機構茨城東病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

49 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
2010-2011年2力年

コメント:

部位全体には対象者の性別、年齢、病期、観血的治療の有無の他、併存症やそれぞれの病院の診療の役割・特徴、対象数なども影響していることを考慮しなければなりません。
病期別の値についても、対象数はさらに少なくなり、性・年齢、治療法、併存症等の要因は影響を与えます。

なお、生存率は統計学的に求められた数値です。一人ひとりの患者さんに一律にあてはまるものではありません。

不明な点があればお尋ねください。

49 胃
地方独立行政法人栃木県立がんセンター

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 501 | 177 | 24 | 95.2 | 64.5 | 60.2 | 68.6 | 68.1 |
| I期 | 324 | 48 | 22 | 93.2 | 85.0 | 80.6 | 88.5 | 68.8 |
| II期 | 39 | (7-9) | (1-3) | 97.4 | 79.5 | 63.1 | 89.2 | 65.1 |
| III期 | 28 | 17 | (1-3) | | | | | 63.5 |
| IV期 | 106 | 103 | 0 | 100.0 | 2.8 | 0.8 | 7.4 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 355 | 146 | | | | | |
| % | 70.9 | 29.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 65 | 168 | 170 | 68 | | |
| % | 6.0 | 13.0 | 33.5 | 33.9 | 13.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 324 | 39 | 28 | 106 | 0 | (4-6) | |
| % | 64.7 | 7.8 | 5.6 | 21.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 423 | 387 | 35 | (1-3) | | |
| % | 15.6 | 84.4 | 77.2 | 7.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 96 | 34 | 126 | 245 | | | |
| % | 19.2 | 6.8 | 25.1 | 48.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 290 | 94 | (7-9) | 97.2 | 67.5 | 61.7 | 72.5 | 67.8 |
| I期 | 74 | (7-9) | (1-3) | 98.6 | 89.2 | 79.5 | 94.4 | 65.8 |
| II期 | 73 | 13 | (4-6) | 94.5 | 82.0 | 71.0 | 89.1 | 67.4 |
| III期 | 74 | 17 | (1-3) | 95.9 | 76.8 | 65.4 | 84.9 | 65.2 |
| IV期 | 62 | 54 | 0 | 100.0 | 12.9 | 6.0 | 22.5 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 167 | 123 | | | | | |
| % | 57.6 | 42.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 50 | 98 | 80 | 47 | | |
| % | 5.2 | 17.2 | 33.8 | 27.6 | 16.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 74 | 73 | 74 | 62 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 25.5 | 25.2 | 25.5 | 21.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 255 | 233 | 21 | (1-3) | | |
| % | 12.1 | 87.9 | 80.3 | 7.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 61 | 15 | 35 | 179 | | | |
| % | 21.0 | 5.2 | 12.1 | 61.7 | | | |

49 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 93 | 74 | (1-3) | 97.8 | 19.4 | 12.1 | 28.1 | 69.9 |
| I期 | 26 | 13 | (1-3) | | | | | 70.0 |
| II期 | 25 | 19 | 0 | | | | | 73.9 |
| III期 | 29 | 29 | 0 | | | | | 67.7 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 72.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|--|--|
| 対象数 | 68 | 25 | | | | | | | |
| % | 73.1 | 26.9 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 30 | 40 | 12 | | | | |
| % | | 10.8 | 32.3 | 43.0 | 12.9 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 26 | 25 | 29 | 11 | (1-3) | 0 | | |
| | % | 28.0 | 26.9 | 31.2 | 11.8 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 25 | 22 | 33 | (1-3) | 0 | | |
| | % | 11.8 | 26.9 | 23.7 | 35.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | | |
| 対象数 | 69 | 24 | 22 | (1-3) | 0 | | | | |
| % | 74.2 | 25.8 | 23.7 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 54 | 38 | | | | | |
| % | | | 58.1 | 40.9 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 374 | 237 | (4-6) | 98.9 | 36.6 | 31.7 | 41.5 | 69.0 |
| I期 | 123 | 26 | (4-6) | 96.7 | 78.8 | 70.5 | 85.1 | 67.6 |
| II期 | 18 | 10 | 0 | | | | | 69.4 |
| III期 | 101 | 76 | 0 | 100.0 | 24.8 | 16.8 | 33.5 | 71.0 |
| IV期 | 128 | 123 | 0 | 100.0 | 3.9 | 1.5 | 8.3 | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 260 | 114 | 対象数 | | 47 | 327 | |
| % | 69.5 | 30.5 | % | | 12.6 | 87.4 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 54 | 115 | 132 | 59 | | |
| % | 3.7 | 14.4 | 30.7 | 35.3 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 123 | 18 | 101 | 128 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 32.9 | 4.8 | 27.0 | 34.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 223 | 151 | 146 | (4-6) | 0 | | |
| % | 59.6 | 40.4 | 39.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 57 | 27 | 90 | 200 | | | |
| % | 15.2 | 7.2 | 24.1 | 53.5 | | | |

49 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 386 | 37 | 13 | 96.6 | 90.4 | 87.0 | 92.9 | 57.2 |
| I期 | 169 | (4-6) | (4-6) | 96.4 | 97.0 | 93.0 | 98.7 | 57.4 |
| II期 | 133 | 10 | (4-6) | 97.0 | 92.5 | 86.4 | 95.9 | 55.4 |
| III期 | 66 | 10 | (1-3) | 97.0 | 84.7 | 73.4 | 91.4 | 58.6 |
| IV期 | 18 | 12 | (1-3) | | | | | 53.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 386 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 111 | 101 | 105 | 50 | 19 | | |
| % | 28.8 | 26.2 | 27.2 | 13.0 | 4.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 169 | 133 | 66 | 18 | 0 | 0 | |
| % | 43.8 | 34.5 | 17.1 | 4.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 359 | 351 | (7-9) | 0 | | |
| % | 7.0 | 93.0 | 90.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 129 | 10 | 42 | 205 | | | |
| % | 33.4 | 2.6 | 10.9 | 53.1 | | | |

50

自治医科大学附属病院
2010－2011年2力年

コメント:

当院は、大学附属病院・特定機能病院である性質上、近隣医療施設から併存疾患等のリスクを有するがん患者さんが紹介されることが多くあります。このように施設間で患者構成や背景に差があるため、各施設の生存率が直ちに当該施設の治療成績を反映するわけではありません。また、これら生存率の数値は施設間を比較する目的には適さないことに注意する必要があります。

50 自治医科大学附属病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 684 | 223 | 20 | 97.1 | 66.9 | 63.2 | 70.3 | 67.9 |
| I期 | 471 | 70 | 17 | 96.4 | 84.8 | 81.2 | 87.8 | 68.6 |
| II期 | 41 | 11 | 0 | 100.0 | 73.2 | 56.8 | 84.2 | 70.7 |
| III期 | 52 | 35 | 0 | 100.0 | 32.7 | 20.5 | 45.4 | 66.3 |
| IV期 | 99 | 94 | (1-3) | 99.0 | 4.1 | 1.3 | 9.4 | 63.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 489 | 195 | | | | | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 40 | 110 | 209 | 213 | 112 | | |
| % | 5.8 | 16.1 | 30.6 | 31.1 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 471 | 41 | 52 | 99 | 13 | (7-9) | |
| % | 68.9 | 6.0 | 7.6 | 14.5 | 1.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 108 | 576 | 464 | (4-6) | 108 | | |
| % | 15.8 | 84.2 | 67.8 | | 15.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 78 | 68 | 176 | 362 | | | |
| % | 11.4 | 9.9 | 25.7 | 52.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 533 | 179 | 19 | 96.4 | 65.8 | 61.6 | 69.7 | 65.3 |
| I期 | 153 | 18 | (7-9) | 94.1 | 87.9 | 81.5 | 92.2 | 66.2 |
| II期 | 126 | 23 | (1-3) | 97.6 | 81.5 | 73.5 | 87.3 | 67.8 |
| III期 | 119 | 39 | (1-3) | 98.3 | 67.0 | 57.7 | 74.7 | 63.3 |
| IV期 | 105 | 86 | (1-3) | 97.1 | 16.5 | 10.1 | 24.4 | 63.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 312 | 221 | | | | | |
| % | 58.5 | 41.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 53 | 104 | 164 | 155 | 57 | | |
| % | 9.9 | 19.5 | 30.8 | 29.1 | 10.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 153 | 126 | 119 | 105 | 12 | 18 | |
| % | 28.7 | 23.6 | 22.3 | 19.7 | 2.3 | 3.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 455 | 310 | (4-6) | 141 | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 58.2 | | 26.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 56 | 39 | 88 | 350 | | | |
| % | 10.5 | 7.3 | 16.5 | 65.7 | | | |

50 自治医科大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 262 | 164 | (4-6) | 97.7 | 36.4 | 30.5 | 42.2 | 68.0 |
| I期 | 126 | 60 | (1-3) | 97.6 | 51.8 | 42.7 | 60.1 | 70.2 |
| II期 | 80 | 56 | (1-3) | 97.5 | 28.4 | 18.9 | 38.6 | 67.1 |
| III期 | 37 | 32 | (1-3) | 97.3 | 11.3 | 3.6 | 23.9 | 64.7 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 対象数 | 208 | 54 | | | | | | |
| % | 79.4 | 20.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 100 | 104 | 19 | | | |
| % | | 11.5 | 38.2 | 39.7 | 7.3 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 126 | 80 | 37 | 10 | (7-9) | (1-3) | |
| | % | 48.1 | 30.5 | 14.1 | 3.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 56 | 103 | 62 | 31 | (7-9) | (1-3) | |
| | % | 21.4 | 39.3 | 23.7 | 11.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 217 | 45 | 14 | 0 | 31 | | | |
| % | 82.8 | 17.2 | 5.3 | | 11.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 11 | 178 | 73 | | | | |
| % | | 4.2 | 67.9 | 27.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 506 | 306 | (4-6) | 99.0 | 39.4 | 35.1 | 43.6 | 66.7 |
| I期 | 202 | 56 | (4-6) | 98.0 | 72.1 | 65.3 | 77.8 | 68.4 |
| II期 | 42 | 27 | (1-3) | 97.6 | 35.6 | 21.5 | 49.8 | 69.4 |
| III期 | 117 | 89 | 0 | 100.0 | 23.9 | 16.7 | 32.0 | 65.5 |
| IV期 | 132 | 127 | 0 | 100.0 | 3.8 | 1.4 | 8.1 | 66.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 対象数 | 353 | 153 | 対象数 | 39 | 467 | | | |
| % | 69.8 | 30.2 | % | 7.7 | 92.3 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 36 | 72 | 181 | 172 | 45 | | | |
| % | 7.1 | 14.2 | 35.8 | 34.0 | 8.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 202 | 42 | 117 | 132 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 39.9 | 8.3 | 23.1 | 26.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 225 | 281 | 181 | 0 | 100 | | | |
| % | 44.5 | 55.5 | 35.8 | | 19.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 36 | 71 | 161 | 238 | | | | |
| % | 7.1 | 14.0 | 31.8 | 47.0 | | | | |

50 自治医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 401 | 51 | (7-9) | 98.0 | 87.1 | 83.4 | 90.1 | 58.1 |
| I期 | 172 | (7-9) | (4-6) | 97.1 | 95.2 | 90.7 | 97.6 | 58.5 |
| II期 | 157 | 18 | (1-3) | 98.7 | 88.4 | 82.3 | 92.6 | 58.8 |
| III期 | 48 | (7-9) | (1-3) | 97.9 | 83.3 | 69.4 | 91.3 | 55.1 |
| IV期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 56.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 401 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 113 | 108 | 98 | 61 | 21 | | |
| % | 28.2 | 26.9 | 24.4 | 15.2 | 5.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 172 | 157 | 48 | 17 | (7-9) | 0 | |
| % | 42.9 | 39.2 | 12.0 | 4.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 349 | 153 | (1-3) | 194 | | |
| % | 13.0 | 87.0 | 38.2 | | 48.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 140 | (7-9) | 44 | 208 | | | |
| % | 34.9 | | 11.0 | 51.9 | | | |

51 栃木県済生会宇都宮病院
2010－2011年2力年

コメント:

当院は3次救命救急を担う地域中核病院であり、併存疾患を持った患者さんが多いのが特徴である。資料を比較する際にはその点をご留意ください。

51 栃木県済生会宇都宮病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 382 | 159 | 15 | 96.1 | 57.7 | 52.5 | 62.5 | 69.8 |
| I期 | 210 | 44 | 13 | 93.8 | 78.3 | 72.0 | 83.4 | 72.0 |
| II期 | 35 | 14 | 0 | 100.0 | 60.0 | 42.0 | 74.0 | 70.4 |
| III期 | 36 | 21 | (1-3) | 97.2 | 40.5 | 24.4 | 56.0 | 67.4 |
| IV期 | 80 | 73 | 0 | 100.0 | 8.8 | 3.9 | 16.2 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 281 | 101 | | | | | |
| % | 73.6 | 26.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 41 | 108 | 156 | 59 | | |
| % | 4.7 | 10.7 | 28.3 | 40.8 | 15.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 210 | 35 | 36 | 80 | (4-6) | 15 | |
| % | 55.0 | 9.2 | 9.4 | 20.9 | | 3.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 72 | 310 | 302 | (7-9) | 0 | | |
| % | 18.8 | 81.2 | 79.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 75 | 29 | 90 | 188 | | | |
| % | 19.6 | 7.6 | 23.6 | 49.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 343 | 122 | 12 | 96.5 | 63.9 | 58.6 | 68.8 | 70.0 |
| I期 | 82 | 12 | (4-6) | 93.9 | 84.8 | 74.7 | 91.0 | 68.8 |
| II期 | 109 | 32 | (1-3) | 97.2 | 70.4 | 60.8 | 78.0 | 71.6 |
| III期 | 86 | 23 | (1-3) | 96.5 | 72.9 | 62.1 | 81.1 | 67.4 |
| IV期 | 60 | 51 | 0 | 100.0 | 15.0 | 7.4 | 25.1 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 214 | 129 | | | | | |
| % | 62.4 | 37.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 33 | 108 | 109 | 75 | | |
| % | 5.2 | 9.6 | 31.5 | 31.8 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 109 | 86 | 60 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 23.9 | 31.8 | 25.1 | 17.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 304 | 303 | (1-3) | 0 | | |
| % | 11.4 | 88.6 | 88.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 77 | 14 | 53 | 199 | | | |
| % | 22.4 | 4.1 | 15.5 | 58.0 | | | |

51 栃木県済生会宇都宮病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 123 | 92 | (1-3) | 99.2 | 24.9 | 17.6 | 32.9 | 69.7 |
| I期 | 50 | 33 | (1-3) | 98.0 | 33.3 | 20.7 | 46.5 | 70.5 |
| II期 | 48 | 36 | 0 | 100.0 | 25.0 | 13.9 | 37.8 | 69.7 |
| III期 | 19 | 17 | 0 | | | | | 71.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 85 | 38 | | | | | |
| % | 69.1 | 30.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 16 | 35 | 47 | 22 | | |
| % | | 13.0 | 28.5 | 38.2 | 17.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 50 | 48 | 19 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 40.7 | 39.0 | 15.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 58 | 25 | 12 | (4-6) | 0 |
| | % | 18.7 | 47.2 | 20.3 | 9.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 95 | 28 | 28 | 0 | 0 | | |
| % | 77.2 | 22.8 | 22.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 97 | 23 | | | |
| % | | | 78.9 | 18.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 294 | 189 | (1-3) | 99.3 | 35.5 | 30.1 | 41.0 | 70.8 |
| I期 | 93 | 22 | (1-3) | 97.8 | 76.0 | 65.9 | 83.5 | 69.5 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | 80 | 66 | 0 | 100.0 | 17.5 | 10.1 | 26.5 | 74.4 |
| IV期 | 90 | 86 | 0 | 100.0 | 4.4 | 1.5 | 10.1 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 216 | 78 | 対象数 | | 25 | 269 |
| % | 73.5 | 26.5 | % | | 8.5 | 91.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 32 | 89 | 114 | 55 | |
| % | | 10.9 | 30.3 | 38.8 | 18.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 93 | 20 | 80 | 90 | (4-6) | (4-6) |
| % | 31.6 | 6.8 | 27.2 | 30.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 153 | 141 | 140 | (1-3) | 0 | |
| % | 52.0 | 48.0 | 47.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 33 | 18 | 117 | 126 | | |
| % | 11.2 | 6.1 | 39.8 | 42.9 | | |

51 栃木県済生会宇都宮病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 196 | 15 | (4-6) | 97.4 | 92.4 | 87.6 | 95.3 | 59.6 |
| I期 | 106 | (4-6) | (1-3) | 97.2 | 95.3 | 89.0 | 98.0 | 63.4 |
| II期 | 64 | (4-6) | (1-3) | 96.9 | 93.8 | 84.2 | 97.6 | 58.9 |
| III期 | 20 | (1-3) | 0 | | | | | 56.2 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 53.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 196 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 47 | 47 | 56 | 32 | 14 | | |
| % | 24.0 | 24.0 | 28.6 | 16.3 | 7.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 106 | 64 | 20 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 54.1 | 32.7 | 10.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 184 | 183 | (1-3) | 0 | | |
| % | 6.1 | 93.9 | 93.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 62 | (7-9) | 27 | 100 | | | |
| % | 31.6 | | 13.8 | 51.0 | | | |

52 獨協医科大学病院
2010-2011年2カ年

コメント:

大学病院である当院には、がん以外の疾患を抱えた患者さんが多いのが特徴である。
様々な患者さんの背景が、生存率に大きく影響していることを考慮し、比較資料とする際には充分
ご留意いただきたい。

52 獨協医科大学病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 500 | 226 | 11 | 97.8 | 54.3 | 49.8 | 58.5 | 69.9 |
| I期 | 306 | 79 | 10 | 96.7 | 73.7 | 68.4 | 78.3 | 70.3 |
| II期 | 46 | 24 | 0 | 100.0 | 47.8 | 32.9 | 61.3 | 71.2 |
| III期 | 37 | 24 | 0 | 100.0 | 35.1 | 20.4 | 50.3 | 71.1 |
| IV期 | 105 | 96 | (1-3) | 99.0 | 7.7 | 3.6 | 13.9 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 386 | 114 | | | | | |
| % | 77.2 | 22.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 47 | 155 | 179 | 96 | | |
| % | 4.6 | 9.4 | 31.0 | 35.8 | 19.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 306 | 46 | 37 | 105 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 61.2 | 9.2 | 7.4 | 21.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 96 | 404 | 365 | 38 | (1-3) | | |
| % | 19.2 | 80.8 | 73.0 | 7.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 66 | 173 | 226 | | | |
| % | 7.0 | 13.2 | 34.6 | 45.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 498 | 198 | 15 | 97.0 | 59.6 | 55.1 | 63.8 | 68.3 |
| I期 | 141 | 23 | (7-9) | 94.3 | 83.3 | 75.9 | 88.6 | 68.7 |
| II期 | 129 | 41 | (1-3) | 97.7 | 67.9 | 59.0 | 75.2 | 71.3 |
| III期 | 104 | 37 | (1-3) | 97.1 | 63.5 | 53.3 | 72.0 | 67.6 |
| IV期 | 106 | 91 | 0 | 100.0 | 14.2 | 8.3 | 21.5 | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 319 | 179 | | | | | |
| % | 64.1 | 35.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 83 | 140 | 141 | 102 | | |
| % | 6.4 | 16.7 | 28.1 | 28.3 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 141 | 129 | 104 | 106 | (1-3) | 15 | |
| % | 28.3 | 25.9 | 20.9 | 21.3 | | 3.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 451 | 391 | 59 | (1-3) | | |
| % | 9.4 | 90.6 | 78.5 | 11.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 38 | 150 | 281 | | | |
| % | 5.8 | 7.6 | 30.1 | 56.4 | | | |

52 獨協医科大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 229 | 141 | (7-9) | 96.5 | 36.8 | 30.5 | 43.1 | 69.1 |
| I期 | 101 | 55 | (1-3) | 98.0 | 44.7 | 34.8 | 54.2 | 71.7 |
| II期 | 72 | 37 | (1-3) | 95.8 | 47.2 | 35.2 | 58.4 | 67.8 |
| III期 | 42 | 37 | (1-3) | 95.2 | 7.6 | 2.0 | 18.4 | 68.9 |
| IV期 | 12 | 11 | (1-3) | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 163 | 66 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 25 | 82 | 97 | 20 | | |
| % | | 10.9 | 35.8 | 42.4 | 8.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 101 | 72 | 42 | 12 | 0 | (1-3) |
| | % | 44.1 | 31.4 | 18.3 | 5.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 35 | 101 | 55 | 35 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 15.3 | 44.1 | 24.0 | 15.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 121 | 108 | 102 | (4-6) | 0 | | |
| % | 52.8 | 47.2 | 44.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 11 | 172 | 46 | | | |
| % | | 4.8 | 75.1 | 20.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 479 | 331 | 10 | 97.9 | 30.2 | 26.2 | 34.4 | 70.5 |
| I期 | 154 | 61 | (4-6) | 96.1 | 59.8 | 51.6 | 67.1 | 70.6 |
| II期 | 39 | 25 | 0 | 100.0 | 35.9 | 21.4 | 50.6 | 74.4 |
| III期 | 118 | 89 | 0 | 100.0 | 24.6 | 17.2 | 32.6 | 71.8 |
| IV期 | 165 | 155 | (4-6) | 97.6 | 4.1 | 1.7 | 8.2 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 360 | 119 | 対象数 | | 59 | 420 |
| % | 75.2 | 24.8 | % | | 12.3 | 87.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 13 | 40 | 156 | 172 | 98 | |
| % | 2.7 | 8.4 | 32.6 | 35.9 | 20.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 154 | 39 | 118 | 165 | 0 | (1-3) |
| % | 32.2 | 8.1 | 24.6 | 34.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 298 | 181 | 175 | (4-6) | 0 | |
| % | 62.2 | 37.8 | 36.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 12 | 55 | 179 | 233 | | |
| % | 2.5 | 11.5 | 37.4 | 48.6 | | |

52 獨協医科大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 167 | 23 | (4-6) | 97.0 | 86.1 | 79.8 | 90.5 | 59.7 |
| I期 | 69 | (4-6) | (1-3) | 97.1 | 91.2 | 81.5 | 96.0 | 63.9 |
| II期 | 59 | (1-3) | (1-3) | 96.6 | 94.8 | 84.8 | 98.3 | 60.4 |
| III期 | 24 | (4-6) | (1-3) | | | | | 59.9 |
| IV期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 63.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 167 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 41 | 33 | 57 | 20 | 16 | | |
| % | 24.6 | 19.8 | 34.1 | 12.0 | 9.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 69 | 59 | 24 | 15 | 0 | 0 | |
| % | 41.3 | 35.3 | 14.4 | 9.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 143 | 131 | 12 | 0 | | |
| % | 14.4 | 85.6 | 78.4 | 7.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 41 | (4-6) | 23 | 97 | | | |
| % | 24.6 | | 13.8 | 58.1 | | | |

53

那須赤十字病院

2010－2011年2力年

コメント:

本報告書の対象である平成22年1月から平成22年3月までは地域がん診療連携拠点病院、平成22年4月から平成23年12月は栃木県がん診療連携拠点指定病院に指定されておりました。

当院の位置する地域の特性上、全国平均と比べ高齢者の割合が多くなっています。併存疾患のある方、進行した状態で発見される方も多く、それらが生存率に影響を与えている可能性があります。

このような患者背景のほか、集計にはがん以外が原因で亡くなられた方も含まれ、治療内容などの条件が揃えられていないため、本報告書の生存率からは治療成績を評価することは出来ません。

また平成23年は東日本大震災により一部病棟が閉鎖し稼働病床数が減少した影響で、前年に比べがん登録件数も減少しています。

本報告書は以上の点にご留意の上、ご参照下さい。

53 那須赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 172 | 88 | (4-6) | 97.1 | 48.0 | 40.3 | 55.3 | 72.8 |
| I期 | 92 | 25 | (1-3) | 97.8 | 72.5 | 62.0 | 80.5 | 73.5 |
| II期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 77.4 |
| III期 | 13 | (7-9) | (1-3) | | | | | 66.3 |
| IV期 | 44 | 40 | (1-3) | 97.7 | 7.3 | 1.9 | 17.7 | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 123 | 49 | | | | | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 43 | 55 | 55 | | |
| % | | 9.9 | 25.0 | 32.0 | 32.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 92 | 13 | 13 | 44 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 53.5 | 7.6 | 7.6 | 25.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 54 | 118 | 85 | (1-3) | 31 | | |
| % | 31.4 | 68.6 | 49.4 | | 18.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 18 | 37 | 107 | | | |
| % | 5.8 | 10.5 | 21.5 | 62.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 181 | 87 | (7-9) | 95.0 | 50.9 | 43.3 | 58.0 | 70.9 |
| I期 | 36 | (4-6) | (1-3) | 91.7 | 85.4 | 68.4 | 93.7 | 67.7 |
| II期 | 49 | 17 | (1-3) | 93.9 | 64.4 | 49.1 | 76.2 | 71.9 |
| III期 | 49 | 20 | (1-3) | 93.9 | 57.8 | 42.4 | 70.4 | 70.2 |
| IV期 | 42 | 40 | 0 | 100.0 | 4.8 | 0.9 | 14.2 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 102 | 79 | | | | | |
| % | 56.4 | 43.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 20 | 44 | 60 | 47 | | |
| % | 5.5 | 11.0 | 24.3 | 33.1 | 26.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 49 | 49 | 42 | (4-6) | 0 | |
| % | 19.9 | 27.1 | 27.1 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 151 | 93 | (7-9) | 51 | | |
| % | 16.6 | 83.4 | 51.4 | | 28.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 31 | 131 | | | |
| % | | 8.3 | 17.1 | 72.4 | | | |

53 那須赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 68 | 52 | (1-3) | 97.1 | 21.7 | 12.6 | 32.3 | 69.6 |
| I期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 68.9 |
| II期 | 21 | 12 | (1-3) | | | | | 70.4 |
| III期 | 22 | 21 | 0 | | | | | 66.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 51.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 44 | 24 | | | | | |
| % | 64.7 | 35.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 24 | 23 | 12 | | |
| % | | | 35.3 | 33.8 | 17.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | 21 | 22 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 25.0 | 30.9 | 32.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 18 | 25 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 19.1 | 26.5 | 36.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | | |
| % | 97.1 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 25 | 43 | | | |
| % | | | 36.8 | 63.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 141 | 119 | (1-3) | 99.3 | 15.6 | 10.2 | 22.1 | 74.4 |
| I期 | 24 | (7-9) | 0 | | | | | 68.7 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.8 |
| III期 | 41 | 37 | (1-3) | 97.6 | 9.8 | 3.1 | 21.0 | 73.0 |
| IV期 | 55 | 55 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 98 | 43 | 対象数 | | 22 | 119 |
| % | 69.5 | 30.5 | % | | 15.6 | 84.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 34 | 47 | 50 | |
| % | | | 24.1 | 33.3 | 35.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 24 | (7-9) | 41 | 55 | 13 | (1-3) |
| % | 17.0 | | 29.1 | 39.0 | 9.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 114 | 27 | 14 | (1-3) | 12 | |
| % | 80.9 | 19.1 | 9.9 | | 8.5 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 41 | 90 | | |
| % | | 7.1 | 29.1 | 63.8 | | |

53 那須赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 100 | 11 | (1-3) | 97.0 | 88.9 | 80.9 | 93.7 | 61.8 |
| I期 | 48 | (1-3) | 0 | 100.0 | 93.8 | 81.9 | 97.9 | 60.1 |
| II期 | 40 | (1-3) | (1-3) | 92.5 | 92.2 | 77.6 | 97.4 | 55.8 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 100 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 18 | 23 | 17 | 16 | | |
| % | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 17.0 | 16.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 40 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 48.0 | 40.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 96 | 75 | (4-6) | 16 | | |
| % | | 96.0 | 75.0 | | 16.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | (4-6) | 10 | 54 | | | |
| % | 30.0 | | 10.0 | 54.0 | | | |

54

伊勢崎市民病院
2011年のみ

コメント:

我が国ではがんに罹る人は2人に1人という時代で、特に高齢者や他の病気をもっているがん患者さんが増えています。
当病院は総合病院ですので、心筋梗塞後で心機能が低下した人や腎不全で透析を受けている人など、がんセンター系の病院では扱われない方々も診療しています。
また当病院では、前立腺癌や腎癌、胃癌、大腸癌に対して、県内でいち早くロボット支援手術（いわゆるダヴィンチ手術）を取り入れるなど、医療の進歩に対応しています。

54 伊勢崎市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 167 | 82 | 0 | 100.0 | 50.9 | 43.1 | 58.2 | 69.6 |
| I期 | 94 | 19 | 0 | 100.0 | 79.8 | 70.2 | 86.6 | 69.9 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.1 |
| III期 | 17 | 12 | 0 | | | | | 68.3 |
| IV期 | 44 | 43 | 0 | 100.0 | 2.3 | 0.2 | 10.4 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 124 | 43 | | | | | |
| % | 74.3 | 25.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 60 | 58 | 26 | | |
| % | | 10.2 | 35.9 | 34.7 | 15.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 94 | (7-9) | 17 | 44 | (1-3) | 0 | |
| % | 56.3 | | 10.2 | 26.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 121 | 117 | (4-6) | 0 | | |
| % | 27.5 | 72.5 | 70.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 34 | 34 | 89 | | | |
| % | 6.0 | 20.4 | 20.4 | 53.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 142 | 66 | (1-3) | 98.6 | 53.4 | 44.8 | 61.2 | 69.0 |
| I期 | 26 | (7-9) | 0 | | | | | 72.7 |
| II期 | 33 | (7-9) | (1-3) | 97.0 | 78.7 | 60.4 | 89.2 | 67.9 |
| III期 | 46 | 19 | (1-3) | 97.8 | 58.3 | 42.7 | 71.0 | 69.3 |
| IV期 | 34 | 31 | 0 | 100.0 | 8.8 | 2.3 | 21.1 | 67.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 80 | 62 | | | | | |
| % | 56.3 | 43.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 19 | 37 | 51 | 27 | | |
| % | | 13.4 | 26.1 | 35.9 | 19.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 33 | 46 | 34 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 18.3 | 23.2 | 32.4 | 23.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 105 | 104 | (1-3) | 0 | | |
| % | 26.1 | 73.9 | 73.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 27 | 95 | | | |
| % | | 12.0 | 19.0 | 66.9 | | | |

54 伊勢崎市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | 54 | (1-3) | 98.7 | 29.9 | 20.1 | 40.2 | 71.5 |
| I期 | 22 | 13 | (1-3) | | | | | 70.6 |
| II期 | 23 | 11 | 0 | | | | | 73.9 |
| III期 | 18 | 18 | 0 | | | | | 68.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 72.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 47 | 30 | | | | | | |
| % | 61.0 | 39.0 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 27 | 34 | 13 | | | |
| % | | | 35.1 | 44.2 | 16.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 23 | 18 | (1-3) | 10 | (1-3) | |
| | % | 28.6 | 29.9 | 23.4 | | 13.0 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 15 | 26 | 17 | (7-9) | 11 | (1-3) | |
| | % | 19.5 | 33.8 | 22.1 | | 14.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 71 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 92.2 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 49 | 26 | | | | |
| % | | | 63.6 | 33.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 109 | (1-3) | 98.6 | 24.7 | 18.0 | 31.9 | 70.2 |
| I期 | 35 | 12 | 0 | 100.0 | 65.7 | 47.6 | 78.9 | 72.2 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 67.9 |
| III期 | 35 | 27 | (1-3) | 94.3 | 19.5 | 8.1 | 34.4 | 71.8 |
| IV期 | 65 | 65 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 107 | 39 | 対象数 | | 15 | 131 | | |
| % | 73.3 | 26.7 | % 10.3 | | 89.7 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 10 | 48 | 46 | 33 | | | |
| % | | 6.8 | 32.9 | 31.5 | 22.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 35 | (7-9) | 35 | 65 | (1-3) | 0 | | |
| % | 24.0 | | 24.0 | 44.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 96 | 50 | 49 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 65.8 | 34.2 | 33.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 32 | 29 | 83 | | | | |
| % | | 21.9 | 19.9 | 56.8 | | | | |

54 伊勢崎市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 10 | 0 | 100.0 | 85.5 | 74.7 | 91.9 | 61.0 |
| I期 | 28 | (1-3) | 0 | | | | | 63.1 |
| II期 | 28 | (1-3) | 0 | | | | | 59.7 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 58.2 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 60.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 69 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 14 | 16 | 11 | (7-9) | | |
| % | 27.5 | 20.3 | 23.2 | 15.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 28 | 28 | (4-6) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 40.6 | 40.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 64 | 64 | 0 | 0 | | |
| % | | 92.8 | 92.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (7-9) | 51 | | | |
| % | | | | 73.9 | | | |

55 群馬県立がんセンター
2010-2011年2カ年

コメント:

胃がん:実測生存率は良好と判断します。
大腸がん:全ステージで、実測生存率は比較的良好と判断します。
肝がん:症例数がやや少なく、解析コメントは控えます。
肺がん:進行症例の予後が、比較的良好と判断します。
乳がん:全ステージで、実測生存率は比較的良好と判断します。

55 群馬県立がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 468 | 179 | (1-3) | 99.8 | 61.7 | 57.1 | 65.9 | 67.7 |
| I期 | 277 | 37 | (1-3) | 99.6 | 86.6 | 82.0 | 90.1 | 66.8 |
| II期 | 27 | (7-9) | 0 | | | | | 70.2 |
| III期 | 40 | 20 | 0 | 100.0 | 50.0 | 33.8 | 64.2 | 68.8 |
| IV期 | 119 | 112 | 0 | 100.0 | 5.9 | 2.6 | 11.1 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 342 | 126 | | | | | |
| % | 73.1 | 26.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 67 | 165 | 150 | 64 | | |
| % | 4.7 | 14.3 | 35.3 | 32.1 | 13.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 277 | 27 | 40 | 119 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 59.2 | 5.8 | 8.5 | 25.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 127 | 341 | 312 | (4-6) | 25 | | |
| % | 27.1 | 72.9 | 66.7 | | 5.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 96 | 59 | 75 | 238 | | | |
| % | 20.5 | 12.6 | 16.0 | 50.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 337 | 134 | (1-3) | 99.7 | 60.2 | 54.8 | 65.2 | 66.0 |
| I期 | 82 | 18 | 0 | 100.0 | 78.1 | 67.5 | 85.6 | 67.2 |
| II期 | 77 | 12 | 0 | 100.0 | 84.4 | 74.2 | 90.8 | 69.0 |
| III期 | 91 | 36 | 0 | 100.0 | 60.4 | 49.6 | 69.6 | 64.4 |
| IV期 | 82 | 65 | (1-3) | 98.8 | 20.5 | 12.6 | 29.9 | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 203 | 134 | | | | | |
| % | 60.2 | 39.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 61 | 125 | 94 | 33 | | |
| % | 7.1 | 18.1 | 37.1 | 27.9 | 9.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 77 | 91 | 82 | 0 | (4-6) | |
| % | 24.3 | 22.8 | 27.0 | 24.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 284 | 235 | 12 | 37 | | |
| % | 15.7 | 84.3 | 69.7 | 3.6 | 11.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 53 | 20 | 48 | 216 | | | |
| % | 15.7 | 5.9 | 14.2 | 64.1 | | | |

55 群馬県立がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 95 | 73 | 0 | 100.0 | 23.2 | 15.3 | 32.0 | 69.2 |
| I期 | 33 | 22 | 0 | 100.0 | 33.3 | 18.2 | 49.3 | 73.9 |
| II期 | 29 | 18 | 0 | | | | | 67.8 |
| III期 | 21 | 21 | 0 | | | | | 73.8 |
| IV期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 63 | 32 | | | | | | |
| % | 66.3 | 33.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 35 | 35 | 13 | | | |
| % | | | 36.8 | 36.8 | 13.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 33 | 29 | 21 | 12 | 0 | 0 | |
| | % | 34.7 | 30.5 | 22.1 | 12.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 16 | 30 | 22 | 26 | (1-3) | 0 | |
| | % | 16.8 | 31.6 | 23.2 | 27.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 75 | 20 | 18 | 0 | (1-3) | | | |
| % | 78.9 | 21.1 | 18.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 58 | 32 | | | | |
| % | | | 61.1 | 33.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 310 | 199 | (1-3) | 99.7 | 35.8 | 30.5 | 41.1 | 67.9 |
| I期 | 90 | 25 | (1-3) | 98.9 | 72.2 | 61.7 | 80.3 | 67.6 |
| II期 | 29 | 10 | 0 | | | | | 71.7 |
| III期 | 75 | 57 | 0 | 100.0 | 24.0 | 15.1 | 34.1 | 68.1 |
| IV期 | 114 | 107 | 0 | 100.0 | 6.1 | 2.7 | 11.6 | 64.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 203 | 107 | 対象数 | | 31 | 279 | |
| % | 65.5 | 34.5 | % | | 10.0 | 90.0 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 38 | 115 | 111 | 31 | | |
| % | 4.8 | 12.3 | 37.1 | 35.8 | 10.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 29 | 75 | 114 | 0 | (1-3) | |
| % | 29.0 | 9.4 | 24.2 | 36.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 202 | 108 | 108 | 0 | 0 | | |
| % | 65.2 | 34.8 | 34.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 61 | 87 | 160 | | | |
| % | | 19.7 | 28.1 | 51.6 | | | |

55 群馬県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 391 | 36 | 0 | 100.0 | 90.8 | 87.5 | 93.3 | 56.9 |
| I期 | 158 | (1-3) | 0 | 100.0 | 99.4 | 95.6 | 99.9 | 56.3 |
| II期 | 177 | 12 | 0 | 100.0 | 93.2 | 88.4 | 96.1 | 58.4 |
| III期 | 47 | 14 | 0 | 100.0 | 70.2 | 55.0 | 81.2 | 59.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 61.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 391 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 129 | 75 | 130 | 43 | 14 | | |
| % | 33.0 | 19.2 | 33.2 | 11.0 | 3.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 158 | 177 | 47 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 40.4 | 45.3 | 12.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 364 | 302 | (1-3) | 60 | | |
| % | 6.9 | 93.1 | 77.2 | | 15.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 97 | 18 | 27 | 249 | | | |
| % | 24.8 | 4.6 | 6.9 | 63.7 | | | |

56 国立病院機構沼田病院
2011年のみ

コメント:

特になし

56 国立病院機構沼田病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 37 | 26 | 0 | 100.0 | 29.7 | 16.1 | 44.7 | 74.8 |
| I期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 74.7 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 86.3 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 78.0 |
| IV期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 19 | 18 | | | | | |
| % | 51.4 | 48.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 13 | 14 | | |
| % | | | | 35.1 | 37.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | (4-6) | 17 | 0 | 0 | |
| % | 32.4 | | | 45.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 22 | 18 | (4-6) | 0 | | |
| % | 40.5 | 59.5 | 48.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 30 | | | |
| % | | | | 81.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 30 | (1-3) | 96.2 | 43.4 | 29.9 | 56.1 | 75.0 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 77.0 |
| II期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | 75.6 |
| III期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 71.3 |
| IV期 | 17 | 15 | (1-3) | | | | | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 29 | 24 | | | | | |
| % | 54.7 | 45.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 13 | 26 | | |
| % | | | | 24.5 | 49.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 12 | 17 | (1-3) | 0 | |
| % | | 26.4 | 22.6 | 32.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 32 | 25 | (7-9) | 0 | | |
| % | 39.6 | 60.4 | 47.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 42 | | | |
| % | | | | 79.2 | | | |

56 国立病院機構沼田病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 81.3 |
| I期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 0 | 0 | 0 | (7-9) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 27 | 22 | (1-3) | | | | | 75.4 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 72.2 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.2 |
| IV期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 76.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 16 | 11 | 対象数 | | (1-3) | 25 |
| % | 59.3 | 40.7 | % | | | 92.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 13 | |
| % | | | | | 48.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (4-6) | 15 | 0 | 0 |
| % | | | | 55.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 16 | | |
| % | | | | 59.3 | | |

56 国立病院機構沼田病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 34 | (7-9) | (1-3) | 94.1 | 79.4 | 61.6 | 89.6 | 63.4 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 66.4 |
| II期 | 16 | (1-3) | 0 | | | | | 65.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 58.3 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 58.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 34 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 13 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | | 38.2 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | | 47.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 26 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 79.4 | 76.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (1-3) | 26 | | | |
| % | | | | 76.5 | | | |

57

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

【肝】

全体数が52例で少なく、全体の5年生存率が30.5%ではあるが、病期毎の生存率が算出されておらず、また治癒切除例が何例あるかもわからず、非観血的治療が約8割弱を占めているが、治療法が不明にて生存率の評価はできないと考える。肝予備能により治療法の選択がなされるので、病期がI、II期でも肝機能さえ悪ければ、治癒切除は困難であり、非観血的治療では5年生存は得られないと考える。おそらく5年生存例のほとんどは治癒切除症例であると考えられる。肝がんの治療成績を評価する上では、病期のみではなく、Child分類と治療法を考慮した解析が望ましい。

【肺】

当院の肺癌集計432例の5年生存率は31.8%であり、全国集計の36.3%に比べて成績が一見悪い。これは生存率良好なI、II期の占める割合に大きく左右される。ちなみに当院では肺癌全体の245/432; 57%がIII、IV期の進行肺癌であり、また高齢者が多い当院では例I、II期の症例であっても合併症やその他宿主側の理由で手術が出来ない例も少なくない。まして143/432; 33%がIV期症例でありこの点が大きく生存率を下げている原因であろう。従ってこのようなデータを出すときには必ず治療別の成績も出す必要があると考える。おそらく根治術が行われたI、II期の肺癌の5年生存率は満足の行く結果が得られていると考える。現在分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など症例によっては極めて有効な薬剤が日進月歩で誕生し臨床の場で用いられている。今後は手術+これら薬剤による治療成績も明らかになって来ると思われる。

【女性乳房】

当院の乳癌症例の5年生存率は88.0%で全国の87.9%とほぼ同率であるが、当院では治癒が困難なIV期症例が7-9/77(10%以上)あったのに対して全国ではIV期症例は5.0%と当院の半分以下であったことを加味すると当院の結果は全国より良好といえる。

57 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 22 | 13 | 0 | | | | | 72.2 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.4 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 72.3 |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 77.5 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 19 | (1-3) | | | | | |
| % | 86.4 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 10 | 0 | 0 | |
| % | | | | 45.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 12 | 10 | (1-3) | 0 | | |
| % | 45.5 | 54.5 | 45.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 16 | | | |
| % | | | | 72.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 40 | 27 | 0 | 100.0 | 32.5 | 18.8 | 47.0 | 73.9 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 77.0 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 71.4 |
| IV期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 22 | 18 | | | | | |
| % | 55.0 | 45.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 11 | 10 | 14 | | |
| % | | | 27.5 | 25.0 | 35.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 10 | 16 | (1-3) | 0 | |
| % | | | 25.0 | 40.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 25 | 19 | (4-6) | 0 | | |
| % | 37.5 | 62.5 | 47.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 28 | | | |
| % | | | | 70.0 | | | |

57 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 52 | 36 | (1-3) | 98.1 | 30.5 | 18.7 | 43.3 | 72.0 |
| I期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 72.0 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | 19 | 17 | (1-3) | | | | | 73.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 40 | 12 | | | | | |
| % | 76.9 | 23.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 15 | 22 | 11 | | |
| % | | | 28.8 | 42.3 | 21.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 14 | 13 | 19 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 26.9 | 25.0 | 36.5 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 18 | 12 | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | | 34.6 | 23.1 | 25.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 12 | 10 | 0 | (1-3) | | |
| % | 76.9 | 23.1 | 19.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 38 | 13 | | | |
| % | | | 73.1 | 25.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 432 | 294 | (1-3) | 99.3 | 31.8 | 27.5 | 36.2 | 71.8 |
| I期 | 152 | 56 | (1-3) | 99.3 | 63.1 | 54.9 | 70.2 | 71.6 |
| II期 | 32 | 17 | (1-3) | 96.9 | 46.3 | 28.5 | 62.4 | 71.4 |
| III期 | 102 | 79 | (1-3) | 99.0 | 22.0 | 14.5 | 30.5 | 71.5 |
| IV期 | 143 | 140 | 0 | 100.0 | 2.1 | 0.6 | 5.6 | 71.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 316 | 116 | 対象数 | | 56 | 376 |
| % | 73.1 | 26.9 | % | | 13.0 | 87.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 133 | 161 | 99 | |
| % | | 7.2 | 30.8 | 37.3 | 22.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 152 | 32 | 102 | 143 | (1-3) | (1-3) |
| % | 35.2 | 7.4 | 23.6 | 33.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 241 | 191 | 175 | 14 | (1-3) | |
| % | 55.8 | 44.2 | 40.5 | 3.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 71 | 47 | 134 | 180 | | |
| % | 16.4 | 10.9 | 31.0 | 41.7 | | |

57 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | (7-9) | 0 | 100.0 | 88.0 | 78.2 | 93.6 | 60.3 |
| I期 | 30 | (1-3) | 0 | 100.0 | 90.0 | 72.1 | 96.7 | 60.6 |
| II期 | 23 | 0 | 0 | | | | | 64.1 |
| III期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | 54.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 75 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 29 | 17 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 18.7 | 38.7 | 22.7 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 30 | 23 | 14 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 40.0 | 30.7 | 18.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 68 | 56 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | 90.7 | 74.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 14 | 47 | | | |
| % | | | 18.7 | 62.7 | | | |

58 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

当院においては、対象数、死亡数について未登録がみられるなど2010年-2011年
症例における院内がん登録の登録精度は不十分です。

58 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 212 | 96 | (4-6) | 97.6 | 54.1 | 47.0 | 60.5 | 71.8 |
| I期 | 112 | 28 | (4-6) | 95.5 | 74.1 | 64.8 | 81.4 | 69.8 |
| II期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 76.7 |
| IV期 | 52 | 46 | 0 | 100.0 | 11.5 | 4.7 | 21.8 | 74.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 147 | 65 | | | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 15 | 42 | 91 | 51 | | |
| % | 6.1 | 7.1 | 19.8 | 42.9 | 24.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 112 | 21 | 12 | 52 | (4-6) | 10 | |
| % | 52.8 | 9.9 | 5.7 | 24.5 | | 4.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 169 | 158 | 11 | 0 | | |
| % | 20.3 | 79.7 | 74.5 | 5.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 12 | 31 | 149 | | | |
| % | 9.4 | 5.7 | 14.6 | 70.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 219 | 94 | (4-6) | 97.7 | 56.4 | 49.5 | 62.8 | 70.4 |
| I期 | 41 | (4-6) | (1-3) | 97.6 | 85.2 | 70.0 | 93.1 | 70.8 |
| II期 | 55 | 15 | (1-3) | 96.4 | 72.2 | 58.1 | 82.2 | 68.1 |
| III期 | 57 | 25 | (1-3) | 96.5 | 54.6 | 40.6 | 66.6 | 71.0 |
| IV期 | 62 | 48 | 0 | 100.0 | 22.6 | 13.2 | 33.6 | 68.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 129 | 90 | | | | | |
| % | 58.9 | 41.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 29 | 60 | 60 | 59 | | |
| % | 5.0 | 13.2 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 55 | 57 | 62 | 0 | (4-6) | |
| % | 18.7 | 25.1 | 26.0 | 28.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 193 | 181 | 11 | (1-3) | | |
| % | 11.9 | 88.1 | 82.6 | 5.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (1-3) | 30 | 166 | | | |
| % | 9.1 | | 13.7 | 75.8 | | | |

58 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 138 | 89 | (1-3) | 98.6 | 35.4 | 27.5 | 43.4 | 70.5 |
| I期 | 51 | 20 | (1-3) | 96.1 | 60.7 | 45.9 | 72.6 | 70.8 |
| II期 | 39 | 26 | 0 | 100.0 | 33.3 | 19.3 | 48.0 | 70.6 |
| III期 | 29 | 26 | 0 | | | | | 71.2 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 74.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 89 | 49 | | | | | |
| % | 64.5 | 35.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 53 | 58 | 18 | | |
| % | | | 38.4 | 42.0 | 13.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 51 | 39 | 29 | 13 | (4-6) | 0 |
| | % | 37.0 | 28.3 | 21.0 | 9.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 32 | 43 | 29 | 27 | (7-9) | 0 |
| | % | 23.2 | 31.2 | 21.0 | 19.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 123 | 15 | 14 | (1-3) | 0 | | |
| % | 89.1 | 10.9 | 10.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 72 | 58 | | | |
| % | | | 52.2 | 42.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 292 | 235 | (1-3) | 99.7 | 19.3 | 14.9 | 24.0 | 71.2 |
| I期 | 79 | 34 | 0 | 100.0 | 57.0 | 45.3 | 67.0 | 71.4 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 80.5 |
| III期 | 52 | 48 | (1-3) | 98.1 | 5.9 | 1.5 | 14.6 | 73.3 |
| IV期 | 146 | 143 | 0 | 100.0 | 2.1 | 0.6 | 5.4 | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 216 | 76 | 対象数 | | 38 | 254 |
| % | 74.0 | 26.0 | % 13.0 | | 87.0 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 31 | 83 | 110 | 64 | |
| % | | 10.6 | 28.4 | 37.7 | 21.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 79 | (7-9) | 52 | 146 | (4-6) | (1-3) |
| % | 27.1 | | 17.8 | 50.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 213 | 79 | 75 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 72.9 | 27.1 | 25.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 24 | 12 | 69 | 187 | | |
| % | 8.2 | 4.1 | 23.6 | 64.0 | | |

58 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 31 | (1-3) | 99.2 | 87.1 | 82.1 | 90.7 | 60.3 |
| I期 | 92 | (7-9) | (1-3) | 97.8 | 92.4 | 84.7 | 96.3 | 60.6 |
| II期 | 98 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.9 | 89.5 | 98.5 | 60.2 |
| III期 | 32 | (7-9) | 0 | 100.0 | 71.9 | 52.9 | 84.3 | 59.3 |
| IV期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 240 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 60 | 56 | 54 | 48 | 22 | | |
| % | 25.0 | 23.3 | 22.5 | 20.0 | 9.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 92 | 98 | 32 | 11 | (7-9) | 0 | |
| % | 38.3 | 40.8 | 13.3 | 4.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 210 | 198 | 12 | 0 | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 82.5 | 5.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 40 | 16 | 19 | 165 | | | |
| % | 16.7 | 6.7 | 7.9 | 68.8 | | | |

59

公立富岡総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

生存率の公表を希望しません。
胃がんに関してはS T II、IIIの生存率が不良で、これは明らかに切除標本の検索方法による場合と、ステージングが病理診断のみで、画像上の遠隔転移が反映されない例が混在していて、本来のステージより左に偏移したためと思います。

また大腸がんでは上記の理由に加え、非手術症例比率が高く、生存率の値が低い結果になっています。

いずれにしても、生存率は病院としての治療成績は反映されず、ステージング技術や地域住民の年齢分布や受け入れ患者の背景の違いです。

本来施設の治療成績を見るなら、それらの背景の違いを考慮し、手術合併症や手術死亡、出血量、手術時間、化学療法ならば治療関連死を公表することで、施設の治療能力を比較できると思います。

今回の数値は、ステージング技術や患者の年齢分布、受け入れ患者の背景の違いで生じていて、治療成績を反映していません。

しかし数値が公表されれば、その施設の治療技術の差という誤解を生み、数値が一人歩きをすると考えますので、公表を希望しません。

60 桐生厚生総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

60 桐生厚生総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 156 | 97 | (1-3) | 99.4 | 37.7 | 30.1 | 45.2 | 71.9 |
| I期 | 53 | 13 | (1-3) | 98.1 | 75.2 | 61.1 | 84.8 | 69.7 |
| II期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 75.0 |
| III期 | 17 | 13 | 0 | | | | | 72.1 |
| IV期 | 58 | 56 | 0 | 100.0 | 3.5 | 0.6 | 10.6 | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 113 | 43 | | | | | |
| % | 72.4 | 27.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 48 | 55 | 38 | | |
| % | | 7.1 | 30.8 | 35.3 | 24.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | 17 | 17 | 58 | 10 | (1-3) | |
| % | 34.0 | 10.9 | 10.9 | 37.2 | 6.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | 86 | 77 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 44.9 | 55.1 | 49.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 26 | 120 | | | |
| % | | | 16.7 | 76.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 185 | 77 | (4-6) | 97.8 | 58.1 | 50.6 | 64.8 | 70.2 |
| I期 | 38 | (7-9) | 0 | 100.0 | 79.0 | 62.3 | 88.9 | 72.8 |
| II期 | 42 | 10 | (1-3) | 97.6 | 75.9 | 59.8 | 86.2 | 69.1 |
| III期 | 52 | 19 | (1-3) | 96.2 | 62.9 | 48.2 | 74.5 | 69.4 |
| IV期 | 38 | 34 | (1-3) | 97.4 | 9.2 | 2.5 | 21.4 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 112 | 73 | | | | | |
| % | 60.5 | 39.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 19 | 51 | 59 | 45 | | |
| % | 5.9 | 10.3 | 27.6 | 31.9 | 24.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 42 | 52 | 38 | 10 | (4-6) | |
| % | 20.5 | 22.7 | 28.1 | 20.5 | 5.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 144 | 138 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 22.2 | 77.8 | 74.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 19 | 159 | | | |
| % | | | 10.3 | 85.9 | | | |

60 桐生厚生総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | 56 | 0 | 100.0 | 23.3 | 14.4 | 33.5 | 72.0 |
| I期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 71.8 |
| II期 | 25 | 18 | 0 | | | | | 74.4 |
| III期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 73.1 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 73.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 41 | 32 | | | | | |
| % | 56.2 | 43.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 24 | 33 | 10 | | |
| % | | | 32.9 | 45.2 | 13.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 18 | 25 | 15 | 14 | (1-3) | 0 |
| | % | 24.7 | 34.2 | 20.5 | 19.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 15 | 22 | (7-9) | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 20.5 | 30.1 | | 23.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 62 | 11 | 11 | 0 | 0 | | |
| % | 84.9 | 15.1 | 15.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 15 | 58 | | | |
| % | | | 20.5 | 79.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 150 | 134 | (1-3) | 98.0 | 9.2 | 5.2 | 14.6 | 73.5 |
| I期 | 22 | 12 | (1-3) | | | | | 72.7 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 79.0 |
| III期 | 35 | 32 | (1-3) | 97.1 | 5.9 | 1.1 | 17.2 | 70.6 |
| IV期 | 86 | 84 | (1-3) | 98.8 | 1.2 | 0.1 | 5.7 | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 117 | 33 | 対象数 | | 21 | 129 |
| % | 78.0 | 22.0 | % | | 14.0 | 86.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 35 | 55 | 47 | |
| % | | 7.3 | 23.3 | 36.7 | 31.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 22 | (4-6) | 35 | 86 | (1-3) | 0 |
| % | 14.7 | | 23.3 | 57.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 148 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 98.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 18 | 130 | | |
| % | | | 12.0 | 86.7 | | |

60 桐生厚生総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 89 | 16 | (1-3) | 97.8 | 81.8 | 72.1 | 88.4 | 63.0 |
| I期 | 26 | (1-3) | (1-3) | | | | | 68.2 |
| II期 | 38 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 84.2 | 68.2 | 92.6 | 63.1 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 84.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 89 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 13 | 21 | 20 | 15 | | |
| % | 22.5 | 14.6 | 23.6 | 22.5 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 38 | 15 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | |
| % | 29.2 | 42.7 | 16.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 66 | 64 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 25.8 | 74.2 | 71.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 81 | | | |
| % | | | | 91.0 | | | |

61 前橋赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

61 前橋赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 262 | 136 | (7-9) | 97.3 | 47.9 | 41.7 | 53.8 | 70.4 |
| I期 | 134 | 41 | (4-6) | 96.3 | 69.1 | 60.5 | 76.2 | 69.5 |
| II期 | 22 | 10 | (1-3) | | | | | 72.3 |
| III期 | 26 | 14 | 0 | | | | | 71.2 |
| IV期 | 74 | 65 | (1-3) | 98.6 | 12.2 | 6.0 | 20.7 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 186 | 76 | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 24 | 75 | 89 | 59 | | |
| % | 5.7 | 9.2 | 28.6 | 34.0 | 22.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 134 | 22 | 26 | 74 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 51.1 | 8.4 | 9.9 | 28.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 74 | 188 | 168 | 17 | (1-3) | | |
| % | 28.2 | 71.8 | 64.1 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | 19 | 50 | 154 | | | |
| % | 14.9 | 7.3 | 19.1 | 58.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 276 | 125 | (4-6) | 98.6 | 54.2 | 48.1 | 59.9 | 70.2 |
| I期 | 60 | 17 | (1-3) | 98.3 | 71.7 | 58.5 | 81.3 | 67.6 |
| II期 | 73 | 21 | (1-3) | 98.6 | 70.9 | 58.9 | 79.9 | 73.9 |
| III期 | 66 | 22 | (1-3) | 98.5 | 66.2 | 53.3 | 76.2 | 72.3 |
| IV期 | 77 | 65 | (1-3) | 98.7 | 14.5 | 7.7 | 23.3 | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 153 | 123 | | | | | |
| % | 55.4 | 44.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 33 | 79 | 71 | 77 | | |
| % | 5.8 | 12.0 | 28.6 | 25.7 | 27.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 73 | 66 | 77 | 0 | 0 | |
| % | 21.7 | 26.4 | 23.9 | 27.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 248 | 209 | 27 | 12 | | |
| % | 10.1 | 89.9 | 75.7 | 9.8 | 4.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | 10 | 37 | 195 | | | |
| % | 12.3 | 3.6 | 13.4 | 70.7 | | | |

61 前橋赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 156 | 109 | (1-3) | 99.4 | 30.1 | 23.1 | 37.4 | 70.1 |
| I期 | 73 | 35 | (1-3) | 98.6 | 52.0 | 39.9 | 62.7 | 70.3 |
| II期 | 37 | 31 | 0 | 100.0 | 16.2 | 6.6 | 29.6 | 70.5 |
| III期 | 34 | 32 | 0 | 100.0 | 5.9 | 1.1 | 17.2 | 68.9 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 73.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|-------|
| 対象数 | 102 | 54 | | | | | |
| % | 65.4 | 34.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 24 | 52 | 50 | 29 | | |
| % | | 15.4 | 33.3 | 32.1 | 18.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 73 | 37 | 34 | 11 | 0 | (1-3) |
| | % | 46.8 | 23.7 | 21.8 | 7.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 41 | 52 | 29 | 34 | 0 | (1-3) |
| | % | 26.3 | 33.3 | 18.6 | 21.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 140 | 16 | 12 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 89.7 | 10.3 | 7.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 94 | 58 | | | |
| % | | | 60.3 | 37.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 263 | 170 | (1-3) | 98.9 | 34.7 | 28.9 | 40.5 | 72.4 |
| I期 | 97 | 29 | 0 | 100.0 | 70.1 | 59.9 | 78.2 | 72.1 |
| II期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 72.7 |
| III期 | 71 | 61 | (1-3) | 98.6 | 12.9 | 6.3 | 21.8 | 72.5 |
| IV期 | 75 | 70 | (1-3) | 97.3 | 4.2 | 1.1 | 10.6 | 73.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 199 | 64 | 対象数 | 18 | 245 | | |
| % | 75.7 | 24.3 | % | 6.8 | 93.2 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 77 | 111 | 57 | | |
| % | | 4.9 | 29.3 | 42.2 | 21.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 97 | 16 | 71 | 75 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 36.9 | 6.1 | 27.0 | 28.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 134 | 129 | 121 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 51.0 | 49.0 | 46.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 44 | (7-9) | 62 | 148 | | | |
| % | 16.7 | | 23.6 | 56.3 | | | |

61 前橋赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 125 | 18 | (1-3) | 97.6 | 85.5 | 78.0 | 90.6 | 59.2 |
| I期 | 50 | (1-3) | 0 | 100.0 | 94.0 | 82.5 | 98.0 | 58.8 |
| II期 | 43 | (1-3) | (1-3) | 97.7 | 95.4 | 82.7 | 98.8 | 66.1 |
| III期 | 20 | (1-3) | (1-3) | | | | | 54.8 |
| IV期 | 12 | 10 | 0 | | | | | 59.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 125 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 40 | 23 | 34 | 18 | 10 | | |
| % | 32.0 | 18.4 | 27.2 | 14.4 | 8.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 50 | 43 | 20 | 12 | 0 | 0 | |
| % | 40.0 | 34.4 | 16.0 | 9.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治療切除 | 非治療切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 106 | 94 | 12 | 0 | | |
| % | 15.2 | 84.8 | 75.2 | 9.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | (1-3) | 10 | 89 | | | |
| % | 19.2 | | 8.0 | 71.2 | | | |

62 群馬大学医学部附属病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

【胃】

胃癌の当院における生存率について、I期の生存率がやや低いという結果になっています。生存率は、患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態等様々な因子に大きく影響されます。よって、特に施設間では高齢者の多い施設、少ない施設、他の病気をもつ患者の多い施設、少ない施設があるため、生存率を比較して、その施設の治療の良し悪しを単純に論ずることはできませんので、ご注意ください。数字を見ていただくことが重要と考えます。

当院は群馬県内唯一の大学病院として、多くの併存疾患（持病）を有していたり、全身状態が不良だったり、高齢であったりするために他院で治療が困難とされた患者さんをご紹介いただき工夫しながら治療を行っています。従って、胃癌以外の原因により長期生存が叶わなかった患者さんが多く含まれていると考えられ、そのために生存率が低くなる傾向があると言えます。

【肝】

全病期の肝癌5年生存率が32.1%ですが、病期別の症例数が異なり、病期別生存率や観察期間が不明であり比較するのは困難です。

肝癌の生存率には、背景となる肝硬変などの肝予備機能にも左右されるため、参考値としての評価に留まります。

【肺】

手術症例については、大学病院でありハイリスク症例を担当しておりますが、概ね他の施設と同様の予後であり妥当と考えます。

III期・IV期といった内科症例については、当院・群馬県立がんセンターの成績が良好ですが、一部にはこれらの施設に来られる患者さんは、比較的年齢が若い方であることが影響している可能性があります。

群馬県全体としては、全国平均を下回っており、県全体として医師確保、医師の教育が必要と考えます。

【乳腺】

乳癌においては、群馬県では全国集計と比較し遜色ない結果であると考えられます。

各施設の結果についても、症例数の少ない施設では解釈に留意が必要だが、概ね問題ないと考えられる。乳癌では、他癌腫と比較して、比較的平均年齢も若く、より長期的な予後についても考慮していく必要があると考えます。

62 群馬大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 215 | 95 | 0 | 100.0 | 55.8 | 48.9 | 62.2 | 68.5 |
| I期 | 118 | 27 | 0 | 100.0 | 77.1 | 68.4 | 83.7 | 70.1 |
| II期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 65.4 |
| III期 | 34 | 20 | 0 | 100.0 | 41.2 | 24.8 | 56.9 | 68.1 |
| IV期 | 40 | 36 | 0 | 100.0 | 10.0 | 3.2 | 21.5 | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 157 | 58 | | | | | |
| % | 73.0 | 27.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 25 | 60 | 84 | 31 | | |
| % | 7.0 | 11.6 | 27.9 | 39.1 | 14.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 118 | 18 | 34 | 40 | (4-6) | 0 | |
| % | 54.9 | 8.4 | 15.8 | 18.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 169 | 162 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 21.4 | 78.6 | 75.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | 39 | 44 | 104 | | | |
| % | 13.0 | 18.1 | 20.5 | 48.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 188 | 63 | (1-3) | 98.9 | 66.3 | 59.0 | 72.5 | 66.5 |
| I期 | 43 | (7-9) | 0 | 100.0 | 83.7 | 68.9 | 91.9 | 67.3 |
| II期 | 58 | (7-9) | (1-3) | 98.3 | 86.0 | 73.9 | 92.7 | 67.1 |
| III期 | 48 | 13 | (1-3) | 97.9 | 72.4 | 57.3 | 83.0 | 66.0 |
| IV期 | 37 | 34 | 0 | 100.0 | 8.1 | 2.1 | 19.6 | 65.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 118 | 70 | | | | | |
| % | 62.8 | 37.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 30 | 62 | 49 | 28 | | |
| % | 10.1 | 16.0 | 33.0 | 26.1 | 14.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 43 | 58 | 48 | 37 | (1-3) | 0 | |
| % | 22.9 | 30.9 | 25.5 | 19.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 163 | 152 | 10 | (1-3) | | |
| % | 13.3 | 86.7 | 80.9 | 5.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 20 | 43 | 113 | | | |
| % | 6.4 | 10.6 | 22.9 | 60.1 | | | |

62 群馬大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 36 | 0 | 100.0 | 32.1 | 20.1 | 44.7 | 71.4 |
| I期 | 23 | 13 | 0 | | | | | 72.0 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 68.7 |
| III期 | 16 | 13 | 0 | | | | | 72.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 36 | 17 | | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 12 | 25 | (7-9) | | | |
| % | | | 22.6 | 47.2 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 23 | (7-9) | 16 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | 43.4 | | 30.2 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 18 | 11 | 12 | (4-6) | 0 | |
| | % | | 34.0 | 20.8 | 22.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 31 | 22 | 16 | (4-6) | 0 | | | |
| % | 58.5 | 41.5 | 30.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 23 | 25 | | | | |
| % | | | 43.4 | 47.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 272 | 136 | (4-6) | 98.2 | 49.4 | 43.3 | 55.2 | 68.6 |
| I期 | 141 | 41 | (1-3) | 98.6 | 70.9 | 62.6 | 77.6 | 68.6 |
| II期 | 21 | 10 | 0 | | | | | 69.8 |
| III期 | 50 | 33 | 0 | 100.0 | 34.0 | 21.4 | 47.0 | 68.5 |
| IV期 | 53 | 49 | (1-3) | 98.1 | 5.8 | 1.5 | 14.4 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 180 | 92 | 対象数 | | 17 | 255 | |
| % | 66.2 | 33.8 | % | | 6.3 | 93.8 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 41 | 81 | 104 | 35 | | |
| % | 4.0 | 15.1 | 29.8 | 38.2 | 12.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 141 | 21 | 50 | 53 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 51.8 | 7.7 | 18.4 | 19.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 128 | 144 | 136 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 47.1 | 52.9 | 50.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 51 | 87 | 113 | | | |
| % | 7.7 | 18.8 | 32.0 | 41.5 | | | |

62 群馬大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 251 | 23 | (4-6) | 98.0 | 90.8 | 86.5 | 93.8 | 58.2 |
| I期 | 103 | (1-3) | (1-3) | 97.1 | 98.0 | 92.4 | 99.5 | 58.3 |
| II期 | 100 | (4-6) | (1-3) | 99.0 | 95.0 | 88.4 | 97.9 | 58.7 |
| III期 | 36 | (7-9) | (1-3) | 97.2 | 74.7 | 57.0 | 86.0 | 57.4 |
| IV期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 57.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 251 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 71 | 64 | 72 | 29 | 15 | | |
| % | 28.3 | 25.5 | 28.7 | 11.6 | 6.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 103 | 100 | 36 | 10 | 0 | (1-3) | |
| % | 41.0 | 39.8 | 14.3 | 4.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 223 | 213 | 10 | 0 | | |
| % | 11.2 | 88.8 | 84.9 | 4.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | 12 | 19 | 178 | | | |
| % | 16.7 | 4.8 | 7.6 | 70.9 | | | |

63 群馬県済生会前橋病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

当院の登録は2011年から開始した為、今回の集計は1年間分の登録であり、登録数が少ない結果でした。
胃癌、大腸癌の登録結果においては、全体の5年生存率は比較的高いものの、ステージ毎の集計は不十分でした。
以上から結果の精度は低いと判断しておりますが、公表することと致しました。

63 群馬県済生会前橋病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 85 | 33 | 0 | 100.0 | 61.2 | 50.0 | 70.6 | 70.4 |
| I期 | 55 | 14 | 0 | 100.0 | 74.6 | 60.8 | 84.1 | 71.8 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 67.7 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 71.9 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 67 | 18 | | | | | |
| % | 78.8 | 21.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 23 | 25 | 22 | | |
| % | | 14.1 | 27.1 | 29.4 | 25.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| % | 64.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 76 | 68 | (7-9) | 0 | | |
| % | | 89.4 | 80.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 12 | 30 | 28 | | | |
| % | 17.6 | 14.1 | 35.3 | 32.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 76 | 23 | 0 | 100.0 | 69.7 | 58.1 | 78.7 | 70.3 |
| I期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 69.2 |
| II期 | 26 | (1-3) | 0 | | | | | 73.4 |
| III期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 65.3 |
| IV期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 51 | 25 | | | | | |
| % | 67.1 | 32.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 24 | 28 | 15 | | |
| % | | | 31.6 | 36.8 | 19.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 19 | 26 | 12 | 15 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.0 | 34.2 | 15.8 | 19.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 71 | 57 | 14 | 0 | | |
| % | | 93.4 | 75.0 | 18.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (1-3) | 11 | 47 | | | |
| % | 19.7 | | 14.5 | 61.8 | | | |

63 群馬県済生会前橋病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 56 | 31 | (1-3) | 96.4 | 43.7 | 30.4 | 56.3 | 69.6 |
| I期 | 31 | 12 | (1-3) | 96.8 | 60.3 | 40.8 | 75.2 | 70.9 |
| II期 | 11 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.4 |
| III期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 69.2 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 38 | 18 | | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 15 | 28 | (4-6) | | | |
| % | | | 26.8 | 50.0 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 31 | 11 | 11 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 55.4 | 19.6 | 19.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 20 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| | % | 35.7 | 26.8 | 17.9 | 19.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 55 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 98.2 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 46 | 10 | | | | |
| % | | | 82.1 | 17.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 81.4 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 74.0 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 83.3 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | | | (1-3) | (4-6) |
| % | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | 0 | 0 | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | |

63 群馬県済生会前橋病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 10 | 0 | 0 | | | | | 62.5 |
| I期 | (7-9) | 0 | 0 | | | | | 63.3 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 42.0 |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 70.0 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 10 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | | |
| % | | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | |

64 **さいたま赤十字病院**
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

64 さいたま赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 267 | 118 | (4-6) | 97.8 | 55.3 | 49.1 | 61.0 | 70.1 |
| I期 | 142 | 24 | (1-3) | 99.3 | 83.0 | 75.8 | 88.3 | 71.2 |
| II期 | 20 | 11 | 0 | | | | | 66.3 |
| III期 | 22 | 13 | (1-3) | | | | | 74.3 |
| IV期 | 64 | 60 | (1-3) | 98.4 | 5.4 | 1.5 | 13.2 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 190 | 77 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 75 | 113 | 43 | | |
| % | | 10.1 | 28.1 | 42.3 | 16.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 142 | 20 | 22 | 64 | 13 | (4-6) | |
| % | 53.2 | 7.5 | 8.2 | 24.0 | 4.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 57 | 210 | 191 | 19 | 0 | | |
| % | 21.3 | 78.7 | 71.5 | 7.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 53 | 32 | 55 | 127 | | | |
| % | 19.9 | 12.0 | 20.6 | 47.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 230 | 80 | (7-9) | 97.0 | 64.7 | 58.0 | 70.5 | 68.4 |
| I期 | 57 | (4-6) | (1-3) | 96.5 | 89.3 | 77.6 | 95.0 | 68.8 |
| II期 | 52 | 13 | (1-3) | 98.1 | 74.9 | 60.7 | 84.6 | 66.7 |
| III期 | 65 | 21 | (1-3) | 96.9 | 67.2 | 54.3 | 77.2 | 68.7 |
| IV期 | 38 | 33 | (1-3) | 94.7 | 8.7 | 2.3 | 20.8 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 136 | 94 | | | | | |
| % | 59.1 | 40.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 27 | 76 | 78 | 36 | | |
| % | 5.7 | 11.7 | 33.0 | 33.9 | 15.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 57 | 52 | 65 | 38 | (7-9) | 10 | |
| % | 24.8 | 22.6 | 28.3 | 16.5 | | 4.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 205 | 186 | 16 | (1-3) | | |
| % | 10.9 | 89.1 | 80.9 | 7.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 41 | 14 | 35 | 140 | | | |
| % | 17.8 | 6.1 | 15.2 | 60.9 | | | |

64 さいたま赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 102 | 75 | (1-3) | 99.0 | 26.4 | 18.3 | 35.2 | 70.5 |
| I期 | 28 | 18 | 0 | | | | | 67.2 |
| II期 | 26 | 13 | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | 31 | 29 | 0 | 100.0 | 6.5 | 1.2 | 18.6 | 70.2 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 66 | 36 | | | | | |
| % | 64.7 | 35.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 28 | 45 | 16 | | |
| % | | 9.8 | 27.5 | 44.1 | 15.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 26 | 31 | (7-9) | (7-9) | 0 |
| | % | 27.5 | 25.5 | 30.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 49 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 |
| | % | 48.0 | | 21.6 | 16.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 69 | 33 | 30 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 67.6 | 32.4 | 29.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 11 | 59 | 32 | | | |
| % | | 10.8 | 57.8 | 31.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 253 | 187 | (7-9) | 97.2 | 24.4 | 19.3 | 29.9 | 71.0 |
| I期 | 59 | 15 | (1-3) | 98.3 | 74.5 | 61.3 | 83.8 | 67.8 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 69.5 |
| III期 | 58 | 50 | (1-3) | 94.8 | 9.4 | 3.5 | 18.9 | 73.3 |
| IV期 | 111 | 104 | (1-3) | 98.2 | 4.6 | 1.7 | 9.7 | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 180 | 73 | 対象数 | 37 | 216 | | |
| % | 71.1 | 28.9 | % | 14.6 | 85.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 15 | 81 | 96 | 50 | | |
| % | 4.3 | 5.9 | 32.0 | 37.9 | 19.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 14 | 58 | 111 | 11 | 0 | |
| % | 23.3 | 5.5 | 22.9 | 43.9 | 4.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 172 | 81 | 76 | (4-6) | 0 | | |
| % | 68.0 | 32.0 | 30.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 44 | 41 | 142 | | | |
| % | 10.3 | 17.4 | 16.2 | 56.1 | | | |

64 さいたま赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 384 | 57 | 11 | 97.1 | 84.9 | 80.9 | 88.1 | 59.1 |
| I期 | 160 | 11 | (1-3) | 98.1 | 93.1 | 87.8 | 96.1 | 58.0 |
| II期 | 156 | 14 | (4-6) | 96.2 | 90.8 | 84.9 | 94.4 | 58.9 |
| III期 | 43 | 16 | (1-3) | 95.3 | 62.2 | 45.8 | 74.9 | 57.1 |
| IV期 | 19 | 11 | 0 | | | | | 61.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 384 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 109 | 81 | 103 | 61 | 30 | | |
| % | 28.4 | 21.1 | 26.8 | 15.9 | 7.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 160 | 156 | 43 | 19 | (4-6) | 0 | |
| % | 41.7 | 40.6 | 11.2 | 4.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 349 | 345 | (4-6) | 0 | | |
| % | 9.1 | 90.9 | 89.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 86 | 15 | 20 | 263 | | | |
| % | 22.4 | 3.9 | 5.2 | 68.5 | | | |

65 埼玉県立がんセンター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

65 埼玉県立がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 767 | 280 | 16 | 97.9 | 63.2 | 59.7 | 66.5 | 67.0 |
| I期 | 463 | 71 | 10 | 97.8 | 84.6 | 81.0 | 87.6 | 68.0 |
| II期 | 58 | 14 | (1-3) | 96.6 | 75.4 | 62.0 | 84.6 | 64.5 |
| III期 | 56 | 27 | (1-3) | 98.2 | 51.2 | 37.4 | 63.4 | 65.9 |
| IV期 | 176 | 159 | (1-3) | 98.3 | 8.1 | 4.6 | 12.8 | 65.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 577 | 190 | | | | | |
| % | 75.2 | 24.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 40 | 107 | 282 | 272 | 66 | | |
| % | 5.2 | 14.0 | 36.8 | 35.5 | 8.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 463 | 58 | 56 | 176 | 14 | 0 | |
| % | 60.4 | 7.6 | 7.3 | 22.9 | 1.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 164 | 603 | 572 | 21 | 10 | | |
| % | 21.4 | 78.6 | 74.6 | 2.7 | 1.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 94 | 102 | 173 | 398 | | | |
| % | 12.3 | 13.3 | 22.6 | 51.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 488 | 139 | 13 | 97.3 | 71.4 | 67.2 | 75.2 | 65.8 |
| I期 | 125 | 16 | (1-3) | 97.6 | 87.2 | 79.9 | 91.9 | 66.5 |
| II期 | 106 | 14 | (1-3) | 98.1 | 86.8 | 78.7 | 92.0 | 68.4 |
| III期 | 133 | 19 | (4-6) | 96.2 | 85.6 | 78.4 | 90.6 | 67.9 |
| IV期 | 108 | 83 | (1-3) | 98.1 | 22.9 | 15.4 | 31.2 | 61.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 299 | 189 | | | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 83 | 205 | 139 | 37 | | |
| % | 4.9 | 17.0 | 42.0 | 28.5 | 7.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 125 | 106 | 133 | 108 | 14 | (1-3) | |
| % | 25.6 | 21.7 | 27.3 | 22.1 | 2.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 79 | 409 | 389 | 12 | (7-9) | | |
| % | 16.2 | 83.8 | 79.7 | 2.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 107 | 30 | 64 | 287 | | | |
| % | 21.9 | 6.1 | 13.1 | 58.8 | | | |

65 埼玉県立がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 86 | (4-6) | 96.7 | 27.8 | 20.1 | 36.0 | 69.6 |
| I期 | 35 | 16 | 0 | 100.0 | 54.3 | 36.6 | 69.0 | 74.0 |
| II期 | 32 | 23 | (1-3) | 93.8 | 28.1 | 14.0 | 44.1 | 70.9 |
| III期 | 39 | 33 | (1-3) | 97.4 | 13.6 | 5.0 | 26.5 | 69.4 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 88 | 33 | | | | | |
| % | 72.7 | 27.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 44 | 48 | 16 | | |
| % | | 8.3 | 36.4 | 39.7 | 13.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 35 | 32 | 39 | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | 28.9 | 26.4 | 32.2 | 10.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 32 | 39 | 33 | (1-3) | 0 |
| | % | 10.7 | 26.4 | 32.2 | 27.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 64 | 57 | 56 | 0 | (1-3) | | |
| % | 52.9 | 47.1 | 46.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 63 | 52 | | | |
| % | | | 52.1 | 43.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 746 | 499 | 24 | 96.8 | 32.1 | 28.7 | 35.5 | 68.7 |
| I期 | 193 | 53 | 12 | 93.8 | 71.9 | 64.8 | 77.7 | 69.9 |
| II期 | 47 | 20 | 0 | 100.0 | 57.5 | 42.2 | 70.1 | 69.4 |
| III期 | 190 | 143 | (7-9) | 96.3 | 23.6 | 17.8 | 29.9 | 68.5 |
| IV期 | 304 | 276 | (4-6) | 98.4 | 7.9 | 5.2 | 11.4 | 66.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 532 | 214 | 対象数 | | 79 | 667 |
| % | 71.3 | 28.7 | % | | 10.6 | 89.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 25 | 65 | 296 | 282 | 78 | |
| % | 3.4 | 8.7 | 39.7 | 37.8 | 10.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 193 | 47 | 190 | 304 | (4-6) | (7-9) |
| % | 25.9 | 6.3 | 25.5 | 40.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 490 | 256 | 241 | (4-6) | 10 | |
| % | 65.7 | 34.3 | 32.3 | | 1.3 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 72 | 93 | 232 | 349 | | |
| % | 9.7 | 12.5 | 31.1 | 46.8 | | |

65 埼玉県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 881 | 101 | 14 | 98.4 | 88.5 | 86.2 | 90.4 | 55.3 |
| I期 | 326 | 10 | (4-6) | 98.2 | 96.9 | 94.4 | 98.3 | 58.0 |
| II期 | 365 | 29 | (4-6) | 98.6 | 92.0 | 88.7 | 94.4 | 54.5 |
| III期 | 141 | 33 | (1-3) | 97.9 | 76.5 | 68.6 | 82.7 | 53.6 |
| IV期 | 41 | 26 | 0 | 100.0 | 36.6 | 22.3 | 51.0 | 56.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 881 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 321 | 199 | 241 | 100 | 20 | | |
| % | 36.4 | 22.6 | 27.4 | 11.4 | 2.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 326 | 365 | 141 | 41 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 37.0 | 41.4 | 16.0 | 4.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 96 | 785 | 684 | 29 | 72 | | |
| % | 10.9 | 89.1 | 77.6 | 3.3 | 8.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 144 | 50 | 69 | 618 | | | |
| % | 16.3 | 5.7 | 7.8 | 70.1 | | | |

66 春日部市立医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

66 春日部市立医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 116 | 67 | (1-3) | 99.1 | 41.8 | 32.8 | 50.6 | 72.1 |
| I期 | 53 | 19 | (1-3) | 98.1 | 63.5 | 49.0 | 75.0 | 73.4 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 67.7 |
| III期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 68.3 |
| IV期 | 36 | 31 | 0 | 100.0 | 13.9 | 5.1 | 27.1 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 82 | 34 | | | | | |
| % | 70.7 | 29.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 33 | 53 | 21 | | |
| % | | | 28.4 | 45.7 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | (7-9) | 14 | 36 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 45.7 | | 12.1 | 31.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 78 | 74 | (4-6) | 0 | | |
| % | 32.8 | 67.2 | 63.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 35 | 67 | | | |
| % | | | 30.2 | 57.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 42 | (1-3) | 98.5 | 68.6 | 60.0 | 75.7 | 68.7 |
| I期 | 32 | (1-3) | (1-3) | 96.9 | 90.6 | 73.7 | 96.9 | 69.3 |
| II期 | 37 | (7-9) | (1-3) | 97.3 | 78.1 | 61.0 | 88.4 | 71.7 |
| III期 | 39 | 11 | 0 | 100.0 | 71.8 | 54.9 | 83.3 | 67.0 |
| IV期 | 23 | 19 | 0 | | | | | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 74 | 60 | | | | | |
| % | 55.2 | 44.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 56 | 45 | 17 | | |
| % | | 9.7 | 41.8 | 33.6 | 12.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | 37 | 39 | 23 | (1-3) | 0 | |
| % | 23.9 | 27.6 | 29.1 | 17.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 122 | 120 | (1-3) | 0 | | |
| % | 9.0 | 91.0 | 89.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | 11 | 36 | 60 | | | |
| % | 20.1 | 8.2 | 26.9 | 44.8 | | | |

66 春日部市立医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 28 | 22 | (1-3) | | | | | 71.0 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | |
| II期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 66.7 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 64.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 83.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 19 | (7-9) | | | | | |
| % | 67.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | (4-6) | 16 | (1-3) | | |
| % | | | | 57.1 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (4-6) | (7-9) | 12 | (1-3) | 0 | |
| | % | | | 42.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | 96.4 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 19 | (7-9) | | | |
| % | | | 67.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 125 | 109 | 0 | 100.0 | 12.8 | 7.7 | 19.3 | 69.3 |
| I期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 74.1 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.3 |
| III期 | 39 | 32 | 0 | 100.0 | 18.0 | 7.9 | 31.3 | 70.9 |
| IV期 | 65 | 63 | 0 | 100.0 | 3.1 | 0.6 | 9.5 | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 85 | 40 | 対象数 | | 16 | 109 |
| % | 68.0 | 32.0 | % | | 12.8 | 87.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 38 | 46 | 19 | |
| % | | 14.4 | 30.4 | 36.8 | 15.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 13 | (4-6) | 39 | 65 | (1-3) | 0 |
| % | 10.4 | | 31.2 | 52.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 113 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| % | 90.4 | 9.6 | 9.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 24 | 84 | | |
| % | | | 19.2 | 67.2 | | |

66 春日部市立医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 129 | 19 | 0 | 100.0 | 85.3 | 77.9 | 90.3 | 58.6 |
| I期 | 46 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.7 | 83.7 | 98.9 | 58.9 |
| II期 | 55 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.9 | 79.5 | 96.1 | 56.6 |
| III期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 54.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 129 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 33 | 32 | 40 | 21 | (1-3) | | |
| % | 25.6 | 24.8 | 31.0 | 16.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | 55 | 19 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 35.7 | 42.6 | 14.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 117 | 107 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 9.3 | 90.7 | 82.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (7-9) | 11 | 91 | | | |
| % | 15.5 | | 8.5 | 70.5 | | | |

67 獨協医科大学埼玉医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

当院では大学病院ということもあり合併症のある患者も多いため、I期において生存率が低い部位については、他疾患や合併症及び再発による死亡例が多いことが考えられます。
生存率公表データは、がん以外の死因も含まれる実測生存率であり、治療に影響する様々な要因が反映されていないため、治療成績を示すものではないことをご理解いただくと幸いです。

67 獨協医科大学埼玉医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 226 | 113 | (1-3) | 98.7 | 49.6 | 42.9 | 55.9 | 70.1 |
| I期 | 117 | 31 | 0 | 100.0 | 73.5 | 64.5 | 80.6 | 69.5 |
| II期 | 22 | 12 | (1-3) | | | | | 66.9 |
| III期 | 16 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.0 |
| IV期 | 68 | 61 | (1-3) | 98.5 | 9.3 | 3.8 | 17.9 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 158 | 68 | | | | | |
| % | 69.9 | 30.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 20 | 70 | 93 | 36 | | |
| % | | 8.8 | 31.0 | 41.2 | 15.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 117 | 22 | 16 | 68 | (1-3) | 0 | |
| % | 51.8 | 9.7 | 7.1 | 30.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 65 | 161 | 147 | 11 | (1-3) | | |
| % | 28.8 | 71.2 | 65.0 | 4.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 19 | 46 | 137 | | | |
| % | 10.6 | 8.4 | 20.4 | 60.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 357 | 133 | (4-6) | 98.9 | 62.5 | 57.2 | 67.3 | 67.6 |
| I期 | 77 | 12 | 0 | 100.0 | 84.4 | 74.2 | 90.8 | 67.0 |
| II期 | 110 | 24 | (1-3) | 98.2 | 78.0 | 69.0 | 84.7 | 68.0 |
| III期 | 78 | 24 | (1-3) | 98.7 | 68.9 | 57.2 | 77.9 | 65.9 |
| IV期 | 83 | 70 | (1-3) | 98.8 | 14.7 | 8.0 | 23.2 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 213 | 144 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 47 | 131 | 124 | 37 | | |
| % | 5.0 | 13.2 | 36.7 | 34.7 | 10.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 110 | 78 | 83 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 21.6 | 30.8 | 21.8 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 62 | 295 | 273 | 22 | 0 | | |
| % | 17.4 | 82.6 | 76.5 | 6.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | 44 | 64 | 221 | | | |
| % | 7.8 | 12.3 | 17.9 | 61.9 | | | |

67 獨協医科大学埼玉医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 160 | 115 | (4-6) | 96.9 | 27.5 | 20.7 | 34.6 | 69.8 |
| I期 | 69 | 33 | (1-3) | 95.7 | 51.7 | 39.3 | 62.8 | 70.3 |
| II期 | 39 | 33 | (1-3) | 97.4 | 15.0 | 5.9 | 28.0 | 69.2 |
| III期 | 36 | 33 | (1-3) | 97.2 | 6.0 | 1.1 | 17.3 | 72.1 |
| IV期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 63.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 96 | 64 | | | | | |
| % | 60.0 | 40.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 54 | 63 | 24 | | |
| % | | 8.8 | 33.8 | 39.4 | 15.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 69 | 39 | 36 | 15 | (1-3) | 0 |
| | % | 43.1 | 24.4 | 22.5 | 9.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 27 | 64 | 41 | 27 | (1-3) | 0 |
| | % | 16.9 | 40.0 | 25.6 | 16.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 103 | 57 | 52 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 64.4 | 35.6 | 32.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 106 | 45 | | | |
| % | | | 66.3 | 28.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 420 | 332 | (7-9) | 98.1 | 20.2 | 16.5 | 24.2 | 69.8 |
| I期 | 95 | 35 | (4-6) | 95.8 | 62.5 | 51.9 | 71.5 | 71.2 |
| II期 | 24 | 19 | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 128 | 109 | (1-3) | 98.4 | 13.9 | 8.6 | 20.6 | 70.3 |
| IV期 | 167 | 164 | (1-3) | 98.8 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 316 | 104 | 対象数 | | 47 | 373 |
| % | 75.2 | 24.8 | % | | 11.2 | 88.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 37 | 148 | 178 | 50 | |
| % | | 8.8 | 35.2 | 42.4 | 11.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 95 | 24 | 128 | 167 | (4-6) | (1-3) |
| % | 22.6 | 5.7 | 30.5 | 39.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 296 | 124 | 120 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 70.5 | 29.5 | 28.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 20 | 60 | 123 | 217 | | |
| % | 4.8 | 14.3 | 29.3 | 51.7 | | |

67 獨協医科大学埼玉医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 264 | 36 | (4-6) | 97.7 | 86.3 | 81.5 | 89.9 | 59.1 |
| I期 | 82 | (1-3) | (1-3) | 98.8 | 98.8 | 91.7 | 99.8 | 62.8 |
| II期 | 127 | 14 | (4-6) | 96.9 | 88.8 | 81.9 | 93.2 | 58.6 |
| III期 | 42 | 15 | (1-3) | 97.6 | 64.3 | 47.9 | 76.7 | 55.8 |
| IV期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 56.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 264 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 65 | 61 | 84 | 40 | 14 | | |
| % | 24.6 | 23.1 | 31.8 | 15.2 | 5.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 127 | 42 | 11 | 0 | (1-3) | |
| % | 31.1 | 48.1 | 15.9 | 4.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 213 | 185 | 28 | 0 | | |
| % | 19.3 | 80.7 | 70.1 | 10.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 48 | (7-9) | (7-9) | 198 | | | |
| % | 18.2 | | | 75.0 | | | |

68 川口市立医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

68 川口市立医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 184 | 83 | (7-9) | 95.7 | 54.3 | 46.8 | 61.2 | 70.2 |
| I期 | 104 | 19 | (4-6) | 96.2 | 81.6 | 72.7 | 87.9 | 72.1 |
| II期 | 14 | (7-9) | (1-3) | | | | | 73.8 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 71.4 |
| IV期 | 52 | 46 | (1-3) | 98.1 | 9.9 | 3.6 | 19.9 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 128 | 56 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 14 | 53 | 79 | 28 | | |
| % | 5.4 | 7.6 | 28.8 | 42.9 | 15.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 104 | 14 | 12 | 52 | 0 | (1-3) | |
| % | 56.5 | 7.6 | 6.5 | 28.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 138 | 123 | 14 | (1-3) | | |
| % | 25.0 | 75.0 | 66.8 | 7.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 34 | 111 | | | |
| % | | 17.4 | 18.5 | 60.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 258 | 95 | 14 | 94.6 | 62.6 | 56.3 | 68.3 | 68.3 |
| I期 | 58 | (7-9) | (4-6) | 89.7 | 84.1 | 71.7 | 91.4 | 66.2 |
| II期 | 69 | 18 | (4-6) | 91.3 | 72.6 | 60.0 | 81.8 | 68.8 |
| III期 | 78 | 21 | (1-3) | 98.7 | 73.1 | 61.7 | 81.5 | 70.1 |
| IV期 | 49 | 44 | 0 | 100.0 | 10.2 | 3.8 | 20.5 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 168 | 90 | | | | | |
| % | 65.1 | 34.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 35 | 89 | 90 | 32 | | |
| % | 4.7 | 13.6 | 34.5 | 34.9 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 58 | 69 | 78 | 49 | (4-6) | 0 | |
| % | 22.5 | 26.7 | 30.2 | 19.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 224 | 215 | (7-9) | 0 | | |
| % | 13.2 | 86.8 | 83.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 32 | 60 | 156 | | | |
| % | 3.9 | 12.4 | 23.3 | 60.5 | | | |

68 川口市立医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 45 | 39 | 0 | 100.0 | 13.3 | 5.4 | 24.9 | 69.7 |
| I期 | 19 | 13 | 0 | | | | | 71.6 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 63.4 |
| III期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 64.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 37 | (7-9) | | | | | |
| % | 82.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | 20 | (7-9) | | |
| % | | | 24.4 | 44.4 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 19 | (4-6) | 14 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 42.2 | | 31.1 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 15 | (7-9) | 10 | (1-3) | 0 |
| | % | | 33.3 | | 22.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 15 | 14 | (1-3) | 0 | | |
| % | 66.7 | 33.3 | 31.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 26 | 17 | | | |
| % | | | 57.8 | 37.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 201 | 164 | (4-6) | 97.5 | 17.5 | 12.6 | 23.1 | 69.5 |
| I期 | 36 | 10 | (1-3) | 91.7 | 71.8 | 53.9 | 83.7 | 70.4 |
| II期 | 13 | 11 | 0 | | | | | 72.5 |
| III期 | 73 | 68 | 0 | 100.0 | 6.9 | 2.5 | 14.2 | 69.4 |
| IV期 | 77 | 73 | (1-3) | 97.4 | 2.7 | 0.5 | 8.4 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 153 | 48 | 対象数 | | 23 | 178 |
| % | 76.1 | 23.9 | % | | 11.4 | 88.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 10 | 17 | 64 | 90 | 20 | |
| % | 5.0 | 8.5 | 31.8 | 44.8 | 10.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 36 | 13 | 73 | 77 | (1-3) | 0 |
| % | 17.9 | 6.5 | 36.3 | 38.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 160 | 41 | 37 | (4-6) | 0 | |
| % | 79.6 | 20.4 | 18.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 41 | 133 | | |
| % | | 10.9 | 20.4 | 66.2 | | |

68 川口市立医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 251 | 22 | 11 | 95.6 | 91.1 | 86.8 | 94.1 | 58.8 |
| I期 | 87 | (1-3) | (4-6) | 93.1 | 96.5 | 89.5 | 98.9 | 59.2 |
| II期 | 104 | (1-3) | (1-3) | 99.0 | 97.1 | 91.3 | 99.1 | 59.6 |
| III期 | 44 | (7-9) | (4-6) | 90.9 | 81.2 | 65.9 | 90.2 | 61.0 |
| IV期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 58.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 251 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 72 | 53 | 60 | 49 | 17 | | |
| % | 28.7 | 21.1 | 23.9 | 19.5 | 6.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 87 | 104 | 44 | 14 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 34.7 | 41.4 | 17.5 | 5.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 221 | 201 | 20 | 0 | | |
| % | 12.0 | 88.0 | 80.1 | 8.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 43 | 13 | 12 | 183 | | | |
| % | 17.1 | 5.2 | 4.8 | 72.9 | | | |

69 埼玉医科大学国際医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

～大腸がんについて補足コメント～
集計結果のうち当院で手術を施行したStageI症例数は148例で、死亡数は16例、5年生存率は89.2%
となっています。

69 埼玉医科大学国際医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 793 | 350 | 19 | 97.6 | 55.2 | 51.6 | 58.6 | 70.0 |
| I期 | 450 | 85 | (7-9) | 98.2 | 80.9 | 77.0 | 84.3 | 70.0 |
| II期 | 55 | 20 | 0 | 100.0 | 63.6 | 49.5 | 74.8 | 72.5 |
| III期 | 57 | 36 | (1-3) | 98.2 | 35.9 | 23.7 | 48.3 | 69.0 |
| IV期 | 201 | 187 | (7-9) | 96.0 | 3.4 | 1.4 | 6.8 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 561 | 232 | | | | | |
| % | 70.7 | 29.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 73 | 257 | 297 | 137 | | |
| % | 3.7 | 9.2 | 32.4 | 37.5 | 17.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 450 | 55 | 57 | 201 | 27 | (1-3) | |
| % | 56.7 | 6.9 | 7.2 | 25.3 | 3.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 239 | 554 | 513 | 39 | (1-3) | | |
| % | 30.1 | 69.9 | 64.7 | 4.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 76 | 91 | 144 | 482 | | | |
| % | 9.6 | 11.5 | 18.2 | 60.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 713 | 255 | 18 | 97.5 | 63.7 | 60.0 | 67.1 | 66.9 |
| I期 | 176 | 33 | (1-3) | 98.9 | 81.2 | 74.6 | 86.3 | 67.1 |
| II期 | 171 | 33 | (7-9) | 95.9 | 80.3 | 73.4 | 85.5 | 69.2 |
| III期 | 195 | 62 | (1-3) | 99.5 | 68.1 | 61.1 | 74.2 | 67.7 |
| IV期 | 149 | 119 | (7-9) | 94.6 | 16.2 | 10.7 | 22.7 | 64.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 439 | 274 | | | | | |
| % | 61.6 | 38.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 58 | 87 | 256 | 220 | 92 | | |
| % | 8.1 | 12.2 | 35.9 | 30.9 | 12.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 176 | 171 | 195 | 149 | (7-9) | 15 | |
| % | 24.7 | 24.0 | 27.3 | 20.9 | | 2.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 116 | 597 | 566 | 30 | (1-3) | | |
| % | 16.3 | 83.7 | 79.4 | 4.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 49 | 79 | 120 | 465 | | | |
| % | 6.9 | 11.1 | 16.8 | 65.2 | | | |

69 埼玉医科大学国際医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 126 | 75 | (1-3) | 97.6 | 39.3 | 30.6 | 47.8 | 69.5 |
| I期 | 46 | 16 | (1-3) | 97.8 | 64.6 | 48.8 | 76.6 | 69.3 |
| II期 | 34 | 22 | (1-3) | 97.1 | 33.5 | 18.3 | 49.5 | 69.7 |
| III期 | 17 | 14 | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|
| 対象数 | 91 | 35 | | | | | |
| % | 72.2 | 27.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 41 | 51 | 19 | | |
| % | | 7.9 | 32.5 | 40.5 | 15.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 46 | 34 | 17 | 14 | 14 | (1-3) |
| | % | 36.5 | 27.0 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 43 | 36 | 14 | 21 | 12 | (1-3) |
| | % | 34.1 | 28.6 | 11.1 | 16.7 | 9.5 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 79 | 73 | (4-6) | 0 | | |
| % | 37.3 | 62.7 | 57.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 56 | 66 | | | |
| % | | | 44.4 | 52.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 625 | 406 | 25 | 96.0 | 32.8 | 29.1 | 36.6 | 68.6 |
| I期 | 197 | 55 | (4-6) | 97.5 | 71.6 | 64.7 | 77.4 | 69.6 |
| II期 | 36 | 23 | 0 | 100.0 | 36.1 | 21.0 | 51.4 | 65.9 |
| III期 | 131 | 87 | (7-9) | 94.7 | 30.5 | 22.7 | 38.7 | 70.0 |
| IV期 | 252 | 233 | 12 | 95.2 | 3.0 | 1.3 | 5.8 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|--|
| 対象数 | 444 | 181 | 対象数 | | 53 | 572 | |
| % | 71.0 | 29.0 | % | | 8.5 | 91.5 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 65 | 239 | 221 | 74 | | |
| % | 4.2 | 10.4 | 38.2 | 35.4 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 197 | 36 | 131 | 252 | (7-9) | 0 | |
| % | 31.5 | 5.8 | 21.0 | 40.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 388 | 237 | 217 | 18 | (1-3) | | |
| % | 62.1 | 37.9 | 34.7 | 2.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 85 | 153 | 363 | | | |
| % | 3.8 | 13.6 | 24.5 | 58.1 | | | |

69 埼玉医科大学国際医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 675 | 81 | 18 | 97.3 | 87.8 | 85.1 | 90.1 | 58.2 |
| I期 | 267 | (4-6) | (7-9) | 97.4 | 97.7 | 95.0 | 99.0 | 57.5 |
| II期 | 271 | 23 | (4-6) | 97.8 | 91.4 | 87.4 | 94.2 | 57.1 |
| III期 | 83 | 22 | (1-3) | 97.6 | 72.8 | 61.8 | 81.2 | 57.8 |
| IV期 | 41 | 25 | (1-3) | 97.6 | 37.6 | 22.9 | 52.2 | 60.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 675 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 176 | 167 | 206 | 101 | 25 | | |
| % | 26.1 | 24.7 | 30.5 | 15.0 | 3.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 267 | 271 | 83 | 41 | 13 | 0 | |
| % | 39.6 | 40.1 | 12.3 | 6.1 | 1.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 121 | 554 | 501 | 51 | (1-3) | | |
| % | 17.9 | 82.1 | 74.2 | 7.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 138 | 34 | 64 | 439 | | | |
| % | 20.4 | 5.0 | 9.5 | 65.0 | | | |

70 社会福祉法人恩賜財団埼玉県済生会川口総合病院
2010-2011年2力年

コメント:

【肺 2010-2011年5年生存率、属性別集計対象数について】
当該年度では、当院に呼吸器外科がなかったため、登録された肺がん症例は全例手術不能な進行が
んでした。そのため、手術例など早期の症例が含まれる他施設に比べ、5年生存率が著しく低値と
なっていたものと推察されます。
このように診察対象となる患者さんが施設間で異なるため、全症例をまとめた5年生存率の値の解
釈には注意が必要と思われます。

70 社会福祉法人恩賜財団埼玉県済生会川口総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 266 | 101 | (1-3) | 99.2 | 61.9 | 55.8 | 67.4 | 70.9 |
| I期 | 175 | 31 | (1-3) | 99.4 | 82.3 | 75.8 | 87.2 | 72.7 |
| II期 | 23 | 13 | 0 | | | | | 70.8 |
| III期 | 20 | 15 | 0 | | | | | 63.1 |
| IV期 | 45 | 42 | 0 | 100.0 | 6.7 | 1.7 | 16.4 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 185 | 81 | | | | | |
| % | 69.5 | 30.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 19 | 74 | 114 | 48 | | |
| % | 4.1 | 7.1 | 27.8 | 42.9 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 175 | 23 | 20 | 45 | (1-3) | 0 | |
| % | 65.8 | 8.6 | 7.5 | 16.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 215 | 188 | 24 | (1-3) | | |
| % | 19.2 | 80.8 | 70.7 | 9.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 45 | 77 | 134 | | | |
| % | 3.8 | 16.9 | 28.9 | 50.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 275 | 100 | (1-3) | 99.3 | 63.4 | 57.4 | 68.8 | 68.4 |
| I期 | 80 | 12 | 0 | 100.0 | 85.0 | 75.1 | 91.2 | 68.7 |
| II期 | 75 | 17 | (1-3) | 98.7 | 77.1 | 65.8 | 85.1 | 70.1 |
| III期 | 68 | 28 | 0 | 100.0 | 58.8 | 46.2 | 69.4 | 68.0 |
| IV期 | 48 | 39 | (1-3) | 97.9 | 17.0 | 8.0 | 29.0 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 175 | 100 | | | | | |
| % | 63.6 | 36.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 42 | 87 | 87 | 45 | | |
| % | 5.1 | 15.3 | 31.6 | 31.6 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 80 | 75 | 68 | 48 | (4-6) | 0 | |
| % | 29.1 | 27.3 | 24.7 | 17.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 248 | 208 | 39 | (1-3) | | |
| % | 9.8 | 90.2 | 75.6 | 14.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 43 | 42 | 166 | | | |
| % | 8.7 | 15.6 | 15.3 | 60.4 | | | |

70
肝
5年生存率

社会福祉法人恩賜財団埼玉県済生会川口総合病院

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 86 | 70 | 0 | 100.0 | 18.6 | 11.2 | 27.4 | 68.5 |
| I期 | 25 | 17 | 0 | | | | | 67.9 |
| II期 | 19 | 14 | 0 | | | | | 69.2 |
| III期 | 25 | 22 | 0 | | | | | 70.0 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|--|
| 対象数 | 66 | 20 | | | | | | |
| % | 76.7 | 23.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 30 | 32 | 12 | | | |
| % | | | 34.9 | 37.2 | 14.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 25 | 19 | 25 | 14 | (1-3) | 0 | |
| | % | 29.1 | 22.1 | 29.1 | 16.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 16 | 24 | 24 | 19 | (1-3) | 0 | |
| | % | 18.6 | 27.9 | 27.9 | 22.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 70 | 16 | 16 | 0 | 0 | | | |
| % | 81.4 | 18.6 | 18.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 35 | 47 | | | | |
| % | | | 40.7 | 54.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 127 | 0 | 100.0 | 8.6 | 4.7 | 14.0 | 71.2 |
| I期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 83.4 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |
| III期 | 56 | 48 | 0 | 100.0 | 14.3 | 6.7 | 24.7 | 72.3 |
| IV期 | 69 | 66 | 0 | 100.0 | 4.4 | 1.2 | 11.1 | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 105 | 34 | 対象数 | | 16 | 123 | | |
| % | 75.5 | 24.5 | % | | 11.5 | 88.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 38 | 60 | 24 | | | |
| % | | 10.8 | 27.3 | 43.2 | 17.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 56 | 69 | (1-3) | 0 | | |
| % | | | 40.3 | 49.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| % | 100.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 18 | 101 | | | | |
| % | | 12.2 | 12.9 | 72.7 | | | | |

70 社会福祉法人恩賜財団埼玉県済生会川口総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 71 | 20 | (1-3) | 98.6 | 71.5 | 59.3 | 80.6 | 67.0 |
| I期 | 25 | (4-6) | 0 | | | | | 65.9 |
| II期 | 30 | (7-9) | 0 | 100.0 | 73.3 | 53.7 | 85.7 | 66.7 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 53.0 |
| IV期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 71 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 23 | 18 | 13 | | |
| % | | | 32.4 | 25.4 | 18.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 30 | (4-6) | 10 | 0 | 0 | |
| % | 35.2 | 42.3 | | 14.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 55 | 51 | (4-6) | 0 | | |
| % | 22.5 | 77.5 | 71.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 16 | 49 | | | |
| % | | | 22.5 | 69.0 | | | |

71 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
2011年のみ

コメント:

特になし

71 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 79 | 35 | (7-9) | 89.9 | 52.9 | 40.9 | 63.5 | 69.3 |
| I期 | 39 | (4-6) | (4-6) | 89.7 | 83.5 | 66.8 | 92.2 | 69.3 |
| II期 | (4-6) | 0 | (1-3) | | | | | 68.3 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 68.1 |
| IV期 | 25 | 21 | (1-3) | | | | | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 54 | 25 | | | | | |
| % | 68.4 | 31.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 27 | 26 | 15 | | |
| % | | | 34.2 | 32.9 | 19.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | (4-6) | 10 | 25 | (1-3) | 0 | |
| % | 49.4 | | 12.7 | 31.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 53 | 53 | 0 | 0 | | |
| % | 32.9 | 67.1 | 67.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 27 | 35 | | | |
| % | | 15.2 | 34.2 | 44.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 102 | 42 | (4-6) | 95.1 | 57.4 | 47.0 | 66.5 | 70.8 |
| I期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 71.3 |
| II期 | 35 | (7-9) | (1-3) | 94.3 | 76.1 | 57.9 | 87.3 | 71.7 |
| III期 | 30 | 11 | (1-3) | 96.7 | 62.6 | 42.7 | 77.3 | 69.8 |
| IV期 | 19 | 17 | (1-3) | | | | | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 63 | 39 | | | | | |
| % | 61.8 | 38.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 31 | 42 | 18 | | |
| % | | | 30.4 | 41.2 | 17.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 17 | 35 | 30 | 19 | 0 | (1-3) | |
| % | 16.7 | 34.3 | 29.4 | 18.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 88 | 87 | 0 | (1-3) | | |
| % | 13.7 | 86.3 | 85.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 36 | 51 | | | |
| % | | | 35.3 | 50.0 | | | |

71 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 17 | 10 | (1-3) | | | | | 67.5 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 63.3 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 43.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 14 | (1-3) | | | | | | |
| % | 82.4 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| % | 100.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | 10 | | | | |
| % | | | | 58.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 36 | 15 | (1-3) | 91.7 | 55.6 | 37.4 | 70.5 | 71.1 |
| I期 | 23 | 10 | (1-3) | | | | | 75.3 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 58.5 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 63.2 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 23 | 13 | 対象数 | | (1-3) | 34 |
| % | 63.9 | 36.1 | % | | | 94.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 11 | 10 | 10 | |
| % | | | 30.6 | 27.8 | 27.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 23 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 0 | (1-3) |
| % | 63.9 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| % | 38.9 | 61.1 | 61.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 19 | (4-6) | | |
| % | | | 52.8 | | | |

71 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 52 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.2 | 85.5 | 99.0 | 54.7 |
| I期 | 18 | 0 | 0 | | | | | 51.8 |
| II期 | 32 | (1-3) | 0 | 100.0 | 93.8 | 77.3 | 98.4 | 56.1 |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 57.5 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 52 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 10 | 11 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 44.2 | 19.2 | 21.2 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 18 | 32 | (1-3) | 0 | 0 | 0 | |
| % | 34.6 | 61.5 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 50 | 47 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 96.2 | 90.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | 10 | 18 | | | |
| % | 30.8 | | 19.2 | 34.6 | | | |

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院の生存状況把握割合は、全国と比較して概ね良好であり、生存率も比較的高い傾向となっています。

平均年齢は、全国と比較して若年傾向にあり、年齢階級別の割合におけるピークも低い部位が多い結果となっています。

全国と比較してIV期の割合が高い部位や、比較的生存率が低い部位では、当院が新規治療を多く手掛けており、他院での治療が困難な患者さんをご紹介いただくことが多い点も関連していると考えます。

今回の施設別集計で示される生存率は、実測生存率といわれるものであり、がん以外の死因による死亡を計算に含めているため、性別、年齢や他疾患の影響を受けるとされています。

また、同じステージであっても、がんの発生部位、リンパ節転移や遠隔転移の程度、がんの組織型等により、経過や治療方法が異なります。

このようなことから、様々な要因が生存率に影響を与えることを考慮の上、結果をご覧いただく必要があると考えます。

72 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1087 | 316 | 27 | 97.5 | 70.7 | 67.9 | 73.4 | 66.7 |
| I期 | 702 | 96 | 17 | 97.6 | 86.3 | 83.5 | 88.6 | 68.5 |
| II期 | 75 | 19 | (1-3) | 97.3 | 74.5 | 63.0 | 82.9 | 65.3 |
| III期 | 66 | 23 | (1-3) | 97.0 | 64.7 | 51.8 | 74.9 | 68.4 |
| IV期 | 194 | 165 | (1-3) | 98.5 | 13.8 | 9.4 | 19.2 | 63.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 800 | 287 | | | | | |
| % | 73.6 | 26.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 76 | 157 | 385 | 371 | 98 | | |
| % | 7.0 | 14.4 | 35.4 | 34.1 | 9.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 702 | 75 | 66 | 194 | 32 | 18 | |
| % | 64.6 | 6.9 | 6.1 | 17.8 | 2.9 | 1.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 243 | 844 | 796 | 21 | 27 | | |
| % | 22.4 | 77.6 | 73.2 | 1.9 | 2.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 260 | 67 | 350 | 410 | | | |
| % | 23.9 | 6.2 | 32.2 | 37.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 664 | 163 | 11 | 98.3 | 75.3 | 71.8 | 78.4 | 63.6 |
| I期 | 199 | 19 | (1-3) | 99.5 | 90.4 | 85.4 | 93.8 | 67.0 |
| II期 | 152 | 18 | (1-3) | 99.3 | 88.1 | 81.8 | 92.4 | 64.5 |
| III期 | 165 | 37 | (4-6) | 97.0 | 77.4 | 70.2 | 83.1 | 60.5 |
| IV期 | 127 | 86 | (4-6) | 96.9 | 30.9 | 22.9 | 39.1 | 61.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 383 | 281 | | | | | |
| % | 57.7 | 42.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 75 | 130 | 232 | 190 | 37 | | |
| % | 11.3 | 19.6 | 34.9 | 28.6 | 5.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 199 | 152 | 165 | 127 | (4-6) | 17 | |
| % | 30.0 | 22.9 | 24.8 | 19.1 | | 2.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 74 | 590 | 567 | (7-9) | 16 | | |
| % | 11.1 | 88.9 | 85.4 | | 2.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 166 | 35 | 110 | 353 | | | |
| % | 25.0 | 5.3 | 16.6 | 53.2 | | | |

72 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 278 | 179 | (7-9) | 97.1 | 34.5 | 28.9 | 40.2 | 67.5 |
| I期 | 110 | 43 | (1-3) | 97.3 | 60.5 | 50.6 | 68.9 | 71.8 |
| II期 | 77 | 53 | (1-3) | 98.7 | 30.9 | 21.0 | 41.4 | 67.0 |
| III期 | 45 | 40 | (1-3) | 97.8 | 9.3 | 3.0 | 20.1 | 66.8 |
| IV期 | 46 | 43 | (1-3) | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 206 | 72 | | | | | |
| % | 74.1 | 25.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 37 | 105 | 103 | 23 | | |
| % | 3.6 | 13.3 | 37.8 | 37.1 | 8.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 110 | 77 | 45 | 46 | 0 | 0 |
| | % | 39.6 | 27.7 | 16.2 | 16.5 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 55 | 92 | 61 | 68 | (1-3) | 0 |
| | % | 19.8 | 33.1 | 21.9 | 24.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 200 | 78 | 74 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 71.9 | 28.1 | 26.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 24 | 71 | 182 | | | |
| % | | 8.6 | 25.5 | 65.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1263 | 737 | 22 | 98.3 | 41.2 | 38.5 | 43.9 | 67.5 |
| I期 | 468 | 102 | 10 | 97.9 | 78.1 | 74.0 | 81.6 | 69.8 |
| II期 | 95 | 53 | 0 | 100.0 | 44.2 | 34.1 | 53.9 | 65.0 |
| III期 | 353 | 269 | (7-9) | 98.0 | 23.0 | 18.7 | 27.5 | 67.3 |
| IV期 | 334 | 308 | (4-6) | 98.5 | 6.5 | 4.2 | 9.5 | 66.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 893 | 370 | 対象数 | | 158 | 1105 |
| % | 70.7 | 29.3 | % | | 12.5 | 87.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 64 | 144 | 499 | 437 | 119 | |
| % | 5.1 | 11.4 | 39.5 | 34.6 | 9.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 468 | 95 | 353 | 334 | (4-6) | (7-9) |
| % | 37.1 | 7.5 | 27.9 | 26.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 639 | 624 | 604 | 18 | (1-3) | |
| % | 50.6 | 49.4 | 47.8 | 1.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 44 | 288 | 443 | 488 | | |
| % | 3.5 | 22.8 | 35.1 | 38.6 | | |

72 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 553 | 77 | 20 | 96.4 | 85.9 | 82.7 | 88.5 | 57.1 |
| I期 | 217 | (7-9) | (1-3) | 98.6 | 96.3 | 92.7 | 98.1 | 58.9 |
| II期 | 194 | 16 | (7-9) | 95.9 | 91.6 | 86.7 | 94.8 | 56.2 |
| III期 | 101 | 28 | (4-6) | 95.0 | 71.6 | 61.5 | 79.4 | 55.1 |
| IV期 | 40 | 25 | (4-6) | 90.0 | 33.9 | 19.3 | 49.1 | 55.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 553 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 158 | 144 | 167 | 66 | 18 | | |
| % | 28.6 | 26.0 | 30.2 | 11.9 | 3.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 217 | 194 | 101 | 40 | (1-3) | 0 | |
| % | 39.2 | 35.1 | 18.3 | 7.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 498 | 447 | 51 | 0 | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 80.8 | 9.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 133 | 12 | 79 | 329 | | | |
| % | 24.1 | 2.2 | 14.3 | 59.5 | | | |

73 国保旭中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

73 国保旭中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 511 | 240 | 17 | 96.7 | 52.9 | 48.4 | 57.1 | 71.2 |
| I期 | 309 | 73 | 16 | 94.8 | 76.2 | 71.0 | 80.6 | 70.6 |
| II期 | 27 | 16 | 0 | | | | | 74.6 |
| III期 | 39 | 23 | (1-3) | 97.4 | 39.8 | 24.5 | 54.8 | 68.1 |
| IV期 | 123 | 118 | 0 | 100.0 | 4.1 | 1.5 | 8.6 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 362 | 149 | | | | | |
| % | 70.8 | 29.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 42 | 139 | 208 | 107 | | |
| % | 2.9 | 8.2 | 27.2 | 40.7 | 20.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 309 | 27 | 39 | 123 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 60.5 | 5.3 | 7.6 | 24.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 152 | 359 | 316 | 42 | (1-3) | | |
| % | 29.7 | 70.3 | 61.8 | 8.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 59 | 41 | 155 | 256 | | | |
| % | 11.5 | 8.0 | 30.3 | 50.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 475 | 187 | 23 | 95.2 | 60.3 | 55.7 | 64.6 | 68.9 |
| I期 | 115 | 21 | 11 | 90.4 | 81.6 | 73.1 | 87.6 | 68.1 |
| II期 | 139 | 34 | (7-9) | 95.0 | 75.2 | 67.1 | 81.6 | 68.8 |
| III期 | 110 | 41 | (1-3) | 97.3 | 62.5 | 52.7 | 70.8 | 66.8 |
| IV期 | 101 | 88 | (1-3) | 99.0 | 12.0 | 6.6 | 19.2 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 289 | 186 | | | | | |
| % | 60.8 | 39.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 72 | 156 | 145 | 81 | | |
| % | 4.4 | 15.2 | 32.8 | 30.5 | 17.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 115 | 139 | 110 | 101 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 24.2 | 29.3 | 23.2 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 65 | 410 | 331 | 77 | (1-3) | | |
| % | 13.7 | 86.3 | 69.7 | 16.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 43 | 20 | 121 | 291 | | | |
| % | 9.1 | 4.2 | 25.5 | 61.3 | | | |

73 国保旭中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 152 | 115 | (4-6) | 97.4 | 23.6 | 17.1 | 30.7 | 70.6 |
| I期 | 54 | 33 | (1-3) | 94.4 | 37.3 | 24.4 | 50.1 | 70.3 |
| II期 | 39 | 26 | (1-3) | 97.4 | 33.1 | 19.1 | 47.9 | 68.6 |
| III期 | 34 | 31 | 0 | 100.0 | 8.8 | 2.3 | 21.1 | 72.1 |
| IV期 | 25 | 25 | 0 | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | 114 | 38 | | | | | |
| % | 75.0 | 25.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 42 | 67 | 22 | | |
| % | | 11.2 | 27.6 | 44.1 | 14.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 54 | 39 | 34 | 25 | 0 | 0 |
| | % | 35.5 | 25.7 | 22.4 | 16.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 39 | 43 | 41 | 29 | 0 | 0 |
| | % | 25.7 | 28.3 | 27.0 | 19.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 128 | 24 | 21 | (1-3) | 0 | | |
| % | 84.2 | 15.8 | 13.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 105 | 44 | | | |
| % | | | 69.1 | 28.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 483 | 348 | (4-6) | 98.8 | 27.9 | 24.0 | 32.0 | 70.5 |
| I期 | 150 | 52 | (4-6) | 96.7 | 65.3 | 57.0 | 72.3 | 71.7 |
| II期 | 35 | 21 | 0 | 100.0 | 40.0 | 24.0 | 55.5 | 71.2 |
| III期 | 123 | 104 | (1-3) | 99.2 | 15.3 | 9.6 | 22.3 | 69.7 |
| IV期 | 169 | 167 | 0 | 100.0 | 1.2 | 0.2 | 3.9 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 349 | 134 | 対象数 | | 59 | 424 |
| % | 72.3 | 27.7 | % | | 12.2 | 87.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 20 | 47 | 129 | 201 | 86 | |
| % | 4.1 | 9.7 | 26.7 | 41.6 | 17.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 150 | 35 | 123 | 169 | (4-6) | (1-3) |
| % | 31.1 | 7.2 | 25.5 | 35.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 317 | 166 | 151 | 15 | 0 | |
| % | 65.6 | 34.4 | 31.3 | 3.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 44 | 53 | 174 | 212 | | |
| % | 9.1 | 11.0 | 36.0 | 43.9 | | |

73 国保旭中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 205 | 38 | (4-6) | 97.1 | 81.4 | 75.4 | 86.1 | 62.2 |
| I期 | 68 | (7-9) | 0 | 100.0 | 89.7 | 79.6 | 95.0 | 62.0 |
| II期 | 81 | (7-9) | (4-6) | 93.8 | 88.9 | 79.7 | 94.0 | 59.4 |
| III期 | 35 | 10 | (1-3) | 97.1 | 71.4 | 53.4 | 83.5 | 66.2 |
| IV期 | 20 | 12 | 0 | | | | | 62.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 205 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 45 | 32 | 59 | 48 | 21 | | |
| % | 22.0 | 15.6 | 28.8 | 23.4 | 10.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 68 | 81 | 35 | 20 | (1-3) | 0 | |
| % | 33.2 | 39.5 | 17.1 | 9.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 177 | 141 | 35 | (1-3) | | |
| % | 13.7 | 86.3 | 68.8 | 17.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | (4-6) | 33 | 137 | | | |
| % | 14.1 | | 16.1 | 66.8 | | | |

74 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

74 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 661 | 235 | 11 | 98.3 | 64.2 | 60.4 | 67.7 | 70.9 |
| I期 | 460 | 81 | (7-9) | 98.3 | 82.3 | 78.4 | 85.5 | 71.0 |
| II期 | 36 | 14 | (1-3) | 97.2 | 60.7 | 42.8 | 74.5 | 68.5 |
| III期 | 34 | 25 | (1-3) | 97.1 | 24.3 | 11.4 | 39.7 | 70.3 |
| IV期 | 117 | 105 | (1-3) | 99.1 | 9.5 | 5.0 | 15.7 | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 465 | 196 | | | | | |
| % | 70.3 | 29.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 66 | 182 | 245 | 147 | | |
| % | 3.2 | 10.0 | 27.5 | 37.1 | 22.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 460 | 36 | 34 | 117 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 69.6 | 5.4 | 5.1 | 17.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 145 | 516 | 503 | 10 | (1-3) | | |
| % | 21.9 | 78.1 | 76.1 | 1.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 103 | 326 | 229 | | | |
| % | | 15.6 | 49.3 | 34.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 430 | 161 | (4-6) | 98.8 | 62.3 | 57.5 | 66.7 | 69.1 |
| I期 | 112 | 22 | (1-3) | 99.1 | 80.3 | 71.6 | 86.6 | 70.1 |
| II期 | 110 | 28 | (1-3) | 98.2 | 74.3 | 65.0 | 81.5 | 70.1 |
| III期 | 107 | 37 | (1-3) | 99.1 | 65.2 | 55.3 | 73.4 | 67.6 |
| IV期 | 76 | 63 | (1-3) | 98.7 | 16.0 | 8.8 | 25.2 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 250 | 180 | | | | | |
| % | 58.1 | 41.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 53 | 131 | 154 | 72 | | |
| % | 4.7 | 12.3 | 30.5 | 35.8 | 16.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 112 | 110 | 107 | 76 | 12 | 13 | |
| % | 26.0 | 25.6 | 24.9 | 17.7 | 2.8 | 3.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 91 | 339 | 318 | 17 | (4-6) | | |
| % | 21.2 | 78.8 | 74.0 | 4.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 40 | 164 | 223 | | | |
| % | | 9.3 | 38.1 | 51.9 | | | |

74 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 145 | 96 | (1-3) | 97.9 | 32.5 | 24.9 | 40.2 | 72.0 |
| I期 | 75 | 37 | (1-3) | 98.7 | 50.1 | 38.2 | 60.8 | 70.9 |
| II期 | 29 | 21 | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | 28 | 26 | (1-3) | | | | | 72.9 |
| IV期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 62.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 106 | 39 | | | | | |
| % | 73.1 | 26.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 37 | 69 | 26 | | |
| % | | 6.9 | 25.5 | 47.6 | 17.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 75 | 29 | 28 | 10 | (1-3) | 0 |
| | % | 51.7 | 20.0 | 19.3 | 6.9 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 36 | 49 | 36 | 21 | (1-3) | 0 |
| | % | 24.8 | 33.8 | 24.8 | 14.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 116 | 29 | 25 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 80.0 | 20.0 | 17.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 106 | 34 | | | |
| % | | | 73.1 | 23.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 411 | 263 | 11 | 97.3 | 35.0 | 30.4 | 39.7 | 70.1 |
| I期 | 142 | 41 | (1-3) | 97.9 | 71.1 | 62.9 | 77.8 | 71.4 |
| II期 | 31 | 14 | (1-3) | 90.3 | 51.5 | 32.1 | 67.8 | 67.2 |
| III期 | 104 | 85 | (1-3) | 99.0 | 17.5 | 10.9 | 25.4 | 69.5 |
| IV期 | 126 | 116 | (4-6) | 96.8 | 5.1 | 2.1 | 10.0 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 265 | 146 | 対象数 | | 31 | 380 |
| % | 64.5 | 35.5 | % | | 7.5 | 92.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 45 | 137 | 143 | 75 | |
| % | 2.7 | 10.9 | 33.3 | 34.8 | 18.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 142 | 31 | 104 | 126 | (4-6) | (1-3) |
| % | 34.5 | 7.5 | 25.3 | 30.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 257 | 154 | 141 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 62.5 | 37.5 | 34.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 69 | 181 | 160 | | |
| % | | 16.8 | 44.0 | 38.9 | | |

74 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 616 | 27 | 15 | 97.6 | 95.6 | 93.6 | 96.9 | 55.1 |
| I期 | 338 | (4-6) | (7-9) | 97.9 | 98.5 | 96.5 | 99.4 | 54.7 |
| II期 | 215 | (7-9) | (4-6) | 97.2 | 96.7 | 93.2 | 98.4 | 53.9 |
| III期 | 44 | (7-9) | 0 | 100.0 | 84.1 | 69.5 | 92.1 | 59.7 |
| IV期 | 17 | (7-9) | (1-3) | | | | | 61.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 616 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 244 | 141 | 132 | 72 | 27 | | |
| % | 39.6 | 22.9 | 21.4 | 11.7 | 4.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 338 | 215 | 44 | 17 | 0 | (1-3) | |
| % | 54.9 | 34.9 | 7.1 | 2.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 575 | 532 | 38 | (4-6) | | |
| % | 6.7 | 93.3 | 86.4 | 6.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 145 | 38 | 83 | 350 | | | |
| % | 23.5 | 6.2 | 13.5 | 56.8 | | | |

75 国保直営総合病院 君津中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

75 国保直営総合病院 君津中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 363 | 179 | 10 | 97.2 | 49.9 | 44.6 | 55.0 | 71.2 |
| I期 | 187 | 42 | (4-6) | 96.8 | 77.2 | 70.4 | 82.6 | 71.5 |
| II期 | 33 | 16 | (1-3) | 97.0 | 50.7 | 32.6 | 66.3 | 73.3 |
| III期 | 29 | 17 | (1-3) | | | | | 70.2 |
| IV期 | 93 | 88 | 0 | 100.0 | 5.4 | 2.0 | 11.3 | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 275 | 88 | | | | | |
| % | 75.8 | 24.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 39 | 98 | 133 | 83 | | |
| % | 2.8 | 10.7 | 27.0 | 36.6 | 22.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 187 | 33 | 29 | 93 | 20 | (1-3) | |
| % | 51.5 | 9.1 | 8.0 | 25.6 | 5.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 98 | 265 | 248 | 17 | 0 | | |
| % | 27.0 | 73.0 | 68.3 | 4.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 47 | 96 | 209 | | | |
| % | 3.0 | 12.9 | 26.4 | 57.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 427 | 168 | 10 | 97.7 | 60.0 | 55.2 | 64.6 | 70.0 |
| I期 | 96 | 14 | (1-3) | 99.0 | 85.3 | 76.5 | 91.0 | 69.8 |
| II期 | 105 | 34 | (1-3) | 98.1 | 67.0 | 57.1 | 75.2 | 71.0 |
| III期 | 113 | 37 | (4-6) | 96.5 | 66.4 | 56.8 | 74.4 | 70.4 |
| IV期 | 91 | 68 | (1-3) | 98.9 | 24.7 | 16.4 | 34.0 | 66.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 249 | 178 | | | | | |
| % | 58.3 | 41.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 42 | 146 | 153 | 72 | | |
| % | 3.3 | 9.8 | 34.2 | 35.8 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 96 | 105 | 113 | 91 | 17 | (4-6) | |
| % | 22.5 | 24.6 | 26.5 | 21.3 | 4.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 372 | 353 | 14 | (4-6) | | |
| % | 12.9 | 87.1 | 82.7 | 3.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 41 | 100 | 277 | | | |
| % | | 9.6 | 23.4 | 64.9 | | | |

75 肝
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 73 | (4-6) | 95.9 | 38.5 | 29.7 | 47.2 | 71.7 |
| I期 | 45 | 20 | (1-3) | 97.8 | 55.4 | 39.8 | 68.5 | 71.2 |
| II期 | 38 | 20 | (1-3) | 92.1 | 45.2 | 28.6 | 60.4 | 70.8 |
| III期 | 24 | 20 | (1-3) | | | | | 70.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 80.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|---|--|
| 対象数 | 75 | 46 | | | | | | |
| % | 62.0 | 38.0 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 28 | 59 | 22 | | | |
| % | | | 23.1 | 48.8 | 18.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 45 | 38 | 24 | (4-6) | 10 | 0 | |
| | % | 37.2 | 31.4 | 19.8 | | 8.3 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 37 | 30 | 18 | 11 | 0 | |
| | % | 20.7 | 30.6 | 24.8 | 14.9 | 9.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 90 | 31 | 25 | (4-6) | (1-3) | | | |
| % | 74.4 | 25.6 | 20.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 76 | 41 | | | | |
| % | | | 62.8 | 33.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 293 | 199 | (1-3) | 99.0 | 31.7 | 26.5 | 37.1 | 70.8 |
| I期 | 90 | 23 | (1-3) | 98.9 | 74.4 | 64.1 | 82.2 | 71.3 |
| II期 | 25 | 15 | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | 71 | 59 | (1-3) | 98.6 | 15.8 | 8.4 | 25.3 | 71.4 |
| IV期 | 94 | 89 | (1-3) | 98.9 | 4.5 | 1.5 | 10.1 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 211 | 82 | 対象数 | | 16 | 277 | |
| % | 72.0 | 28.0 | % | | 5.5 | 94.5 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 89 | 120 | 53 | | |
| % | | 8.9 | 30.4 | 41.0 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 25 | 71 | 94 | 12 | (1-3) | |
| % | 30.7 | 8.5 | 24.2 | 32.1 | 4.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 175 | 118 | 106 | 12 | 0 | | |
| % | 59.7 | 40.3 | 36.2 | 4.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 53 | 82 | 152 | | | |
| % | | 18.1 | 28.0 | 51.9 | | | |

75 国保直営総合病院 君津中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 170 | 31 | (1-3) | 98.2 | 81.6 | 74.8 | 86.7 | 63.8 |
| I期 | 60 | (4-6) | 0 | 100.0 | 91.7 | 81.1 | 96.4 | 64.4 |
| II期 | 90 | 13 | (1-3) | 97.8 | 85.3 | 76.0 | 91.2 | 63.0 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 78.0 |
| IV期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 170 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 34 | 65 | 38 | 12 | | |
| % | 12.4 | 20.0 | 38.2 | 22.4 | 7.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 90 | (7-9) | 10 | (1-3) | 0 | |
| % | 35.3 | 52.9 | | 5.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 139 | 126 | 12 | (1-3) | | |
| % | 18.2 | 81.8 | 74.1 | 7.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | (7-9) | 13 | 126 | | | |
| % | 14.1 | | 7.6 | 74.1 | | | |

76 千葉県がんセンター
2011年のみ

コメント:

施設別生存率集計では、本集計の調査方法の「集計の対象と集計方法」に記載がある通り、集計値が10例未満の場合は、個人が特定される可能性が高いことを踏まえ、1-3件の場合は、(1-3)、4-6件の場合は、(4-6)、7-9件の場合は、(7-9)と表示されています。

さらに患者集計値が30未満の場合は、生存率の信頼性が低くなるため、実測生存率が表示されておられません。

また、5年生存率は、実測生存率で計算されておりますが、実測生存率はがん以外で亡くなった場合も含まれておりますので、患者さんの割合において、高齢者が多くなるほど実測生存率は低下します。

したがって高齢者の比率が異なる他施設と単純に比較することはできません。

76 千葉県がんセンター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 425 | 136 | (7-9) | 97.9 | 67.8 | 63.1 | 72.1 | 68.0 |
| I期 | 293 | 41 | (7-9) | 96.9 | 85.9 | 81.3 | 89.4 | 68.4 |
| II期 | 28 | 13 | 0 | | | | | 69.2 |
| III期 | 26 | 17 | 0 | | | | | 64.7 |
| IV期 | 63 | 56 | 0 | 100.0 | 11.1 | 4.9 | 20.2 | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 298 | 127 | | | | | |
| % | 70.1 | 29.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 47 | 169 | 138 | 50 | | |
| % | 4.9 | 11.1 | 39.8 | 32.5 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 293 | 28 | 26 | 63 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 68.9 | 6.6 | 6.1 | 14.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 75 | 350 | 325 | 20 | (4-6) | | |
| % | 17.6 | 82.4 | 76.5 | 4.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 72 | 66 | 95 | 192 | | | |
| % | 16.9 | 15.5 | 22.4 | 45.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 222 | 77 | (1-3) | 98.6 | 65.2 | 58.6 | 71.1 | 66.2 |
| I期 | 59 | (7-9) | 0 | 100.0 | 84.8 | 72.7 | 91.8 | 67.5 |
| II期 | 43 | (7-9) | (1-3) | 97.7 | 83.7 | 68.9 | 91.9 | 69.6 |
| III期 | 59 | 13 | 0 | 100.0 | 78.0 | 65.1 | 86.6 | 65.5 |
| IV期 | 48 | 42 | 0 | 100.0 | 12.5 | 5.1 | 23.4 | 63.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 126 | 96 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 39 | 83 | 60 | 24 | | |
| % | 7.2 | 17.6 | 37.4 | 27.0 | 10.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 43 | 59 | 48 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 26.6 | 19.4 | 26.6 | 21.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 177 | 155 | 20 | (1-3) | | |
| % | 20.3 | 79.7 | 69.8 | 9.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | 24 | 34 | 122 | | | |
| % | 18.9 | 10.8 | 15.3 | 55.0 | | | |

76 千葉県がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 76 | 50 | (1-3) | 98.7 | 34.2 | 23.8 | 44.8 | 69.0 |
| I期 | 22 | 14 | (1-3) | | | | | 72.8 |
| II期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 68.5 |
| III期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 64.1 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 64 | 12 | | | | | |
| % | 84.2 | 15.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 22 | 30 | 11 | | |
| % | | | 28.9 | 39.5 | 14.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 21 | 18 | 14 | (1-3) | 0 |
| | % | 28.9 | 27.6 | 23.7 | 18.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 30 | 18 | 19 | (1-3) | 0 |
| | % | | 39.5 | 23.7 | 25.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 28 | 25 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 63.2 | 36.8 | 32.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 35 | 33 | | | |
| % | | | 46.1 | 43.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 283 | 168 | (4-6) | 98.2 | 40.2 | 34.4 | 45.9 | 67.6 |
| I期 | 116 | 24 | (1-3) | 97.4 | 79.2 | 70.6 | 85.5 | 69.0 |
| II期 | 15 | (7-9) | (1-3) | | | | | 67.1 |
| III期 | 69 | 54 | 0 | 100.0 | 21.7 | 12.9 | 32.0 | 65.8 |
| IV期 | 81 | 79 | (1-3) | 98.8 | 1.3 | 0.1 | 6.0 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 191 | 92 | 対象数 | | 14 | 269 |
| % | 67.5 | 32.5 | % | | 4.9 | 95.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 45 | 109 | 88 | 30 | |
| % | 3.9 | 15.9 | 38.5 | 31.1 | 10.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 116 | 15 | 69 | 81 | (1-3) | 0 |
| % | 41.0 | 5.3 | 24.4 | 28.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 130 | 153 | 131 | 14 | (7-9) | |
| % | 45.9 | 54.1 | 46.3 | 4.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 31 | 51 | 78 | 123 | | |
| % | 11.0 | 18.0 | 27.6 | 43.5 | | |

76 千葉県がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 355 | 31 | (1-3) | 99.7 | 91.3 | 87.8 | 93.8 | 57.4 |
| I期 | 140 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.6 | 94.4 | 99.6 | 59.8 |
| II期 | 141 | (4-6) | (1-3) | 99.3 | 96.5 | 91.7 | 98.5 | 56.6 |
| III期 | 48 | (7-9) | 0 | 100.0 | 85.4 | 71.8 | 92.8 | 53.9 |
| IV期 | 26 | 17 | 0 | | | | | 55.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 355 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 96 | 86 | 114 | 55 | (4-6) | | |
| % | 27.0 | 24.2 | 32.1 | 15.5 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 140 | 141 | 48 | 26 | 0 | 0 | |
| % | 39.4 | 39.7 | 13.5 | 7.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 319 | 284 | 31 | (4-6) | | |
| % | 10.1 | 89.9 | 80.0 | 8.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 92 | 19 | 40 | 204 | | | |
| % | 25.9 | 5.4 | 11.3 | 57.5 | | | |

77 船橋市立医療センター
2011年のみ

コメント:

特になし

77 船橋市立医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 157 | 63 | (1-3) | 99.4 | 59.9 | 51.7 | 67.0 | 70.5 |
| I期 | 91 | 19 | (1-3) | 98.9 | 79.1 | 69.2 | 86.1 | 71.6 |
| II期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 65.8 |
| III期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 65.1 |
| IV期 | 34 | 30 | 0 | 100.0 | 11.8 | 3.7 | 24.9 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 112 | 45 | | | | | |
| % | 71.3 | 28.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 48 | 60 | 29 | | |
| % | | 8.9 | 30.6 | 38.2 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 91 | 12 | 14 | 34 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 58.0 | 7.6 | 8.9 | 21.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 129 | 123 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 17.8 | 82.2 | 78.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (7-9) | 50 | 84 | | | |
| % | 8.9 | | 31.8 | 53.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 142 | 46 | (1-3) | 99.3 | 67.6 | 59.2 | 74.6 | 70.2 |
| I期 | 37 | (4-6) | (1-3) | 97.3 | 83.8 | 67.4 | 92.4 | 66.8 |
| II期 | 40 | (7-9) | 0 | 100.0 | 80.0 | 64.0 | 89.5 | 71.7 |
| III期 | 37 | 13 | 0 | 100.0 | 64.9 | 47.3 | 77.9 | 72.1 |
| IV期 | 22 | 15 | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 82 | 60 | | | | | |
| % | 57.7 | 42.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 49 | 55 | 23 | | |
| % | | | 34.5 | 38.7 | 16.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 40 | 37 | 22 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 26.1 | 28.2 | 26.1 | 15.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 123 | 117 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 13.4 | 86.6 | 82.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 10 | 28 | 86 | | | |
| % | 12.7 | 7.0 | 19.7 | 60.6 | | | |

77 船橋市立医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 33 | 21 | 0 | 100.0 | 36.4 | 20.6 | 52.3 | 72.9 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 72.4 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |
| III期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 26 | (7-9) | | | | | | |
| % | 78.8 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 17 | (4-6) | | | |
| % | | | | 51.5 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (7-9) | 11 | 11 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | 33.3 | 33.3 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | (7-9) | 13 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | 39.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 24 | (7-9) | (7-9) | 0 | (1-3) | | | |
| % | 72.7 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 23 | (7-9) | | | | |
| % | | | 69.7 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 159 | 108 | 0 | 100.0 | 32.1 | 25.0 | 39.4 | 70.0 |
| I期 | 53 | 15 | 0 | 100.0 | 71.7 | 57.5 | 81.9 | 70.9 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.1 |
| III期 | 40 | 33 | 0 | 100.0 | 17.5 | 7.7 | 30.6 | 69.6 |
| IV期 | 53 | 52 | 0 | 100.0 | 1.9 | 0.2 | 8.8 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 115 | 44 | 対象数 | | 14 | 145 |
| % | 72.3 | 27.7 | % | | 8.8 | 91.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 49 | 74 | 18 | |
| % | | 7.5 | 30.8 | 46.5 | 11.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 53 | (7-9) | 40 | 53 | (4-6) | 0 |
| % | 33.3 | | 25.2 | 33.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 97 | 62 | 61 | (1-3) | 0 | |
| % | 61.0 | 39.0 | 38.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 33 | 14 | 44 | 68 | | |
| % | 20.8 | 8.8 | 27.7 | 42.8 | | |

77 船橋市立医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 113 | 17 | (1-3) | 98.2 | 85.0 | 76.9 | 90.4 | 60.3 |
| I期 | 42 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.2 | 82.3 | 98.8 | 58.5 |
| II期 | 55 | (4-6) | (1-3) | 96.4 | 89.1 | 77.3 | 95.0 | 61.2 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 55.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 113 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 13 | 44 | 18 | (7-9) | | |
| % | 26.5 | 11.5 | 38.9 | 15.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 55 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 37.2 | 48.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 99 | 99 | 0 | 0 | | |
| % | 12.4 | 87.6 | 87.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (4-6) | 17 | 75 | | | |
| % | 13.3 | | 15.0 | 66.4 | | | |

78 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

78 胃 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター

胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 209 | 96 | (7-9) | 96.2 | 53.4 | 46.3 | 59.9 | 71.9 |
| I期 | 120 | 29 | (1-3) | 97.5 | 75.6 | 66.8 | 82.3 | 71.3 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 27 | 16 | (1-3) | | | | | 73.8 |
| IV期 | 52 | 46 | (1-3) | 94.2 | 8.8 | 2.9 | 18.8 | 73.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 142 | 67 | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 16 | 60 | 93 | 38 | | |
| % | | 7.7 | 28.7 | 44.5 | 18.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 120 | (4-6) | 27 | 52 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 57.4 | | 12.9 | 24.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 166 | 157 | (7-9) | 0 | | |
| % | 20.6 | 79.4 | 75.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | 16 | 61 | 105 | | | |
| % | 12.9 | 7.7 | 29.2 | 50.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 268 | 90 | (7-9) | 96.6 | 65.8 | 59.8 | 71.2 | 71.0 |
| I期 | 88 | 20 | (1-3) | 96.6 | 76.9 | 66.6 | 84.5 | 72.8 |
| II期 | 68 | 13 | (1-3) | 97.1 | 80.8 | 69.2 | 88.4 | 71.5 |
| III期 | 75 | 29 | (1-3) | 97.3 | 60.7 | 48.5 | 70.8 | 70.7 |
| IV期 | 28 | 25 | (1-3) | | | | | 73.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 164 | 104 | | | | | |
| % | 61.2 | 38.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 20 | 80 | 106 | 53 | | |
| % | | 7.5 | 29.9 | 39.6 | 19.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 88 | 68 | 75 | 28 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 32.8 | 25.4 | 28.0 | 10.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 240 | 225 | 13 | (1-3) | | |
| % | 10.4 | 89.6 | 84.0 | 4.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | 11 | 62 | 168 | | | |
| % | 10.1 | 4.1 | 23.1 | 62.7 | | | |

78 肝
 肝
 5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 79 | 49 | (1-3) | 96.2 | 36.7 | 26.1 | 47.4 | 71.0 |
| I期 | 19 | 11 | 0 | | | | | 68.4 |
| II期 | 34 | 16 | (1-3) | 94.1 | 52.3 | 34.3 | 67.5 | 71.5 |
| III期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 72.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 62 | 17 | | | | | |
| % | 78.5 | 21.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 18 | 33 | 17 | | |
| % | | 12.7 | 22.8 | 41.8 | 21.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 19 | 34 | 15 | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | 24.1 | 43.0 | 19.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 15 | 32 | 19 | (7-9) | (4-6) | 0 |
| | % | 19.0 | 40.5 | 24.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 64 | 15 | 15 | 0 | 0 | | |
| % | 81.0 | 19.0 | 19.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 44 | 33 | | | |
| % | | | 55.7 | 41.8 | | | |

肺
 5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 162 | 113 | (1-3) | 99.4 | 30.0 | 23.1 | 37.1 | 69.0 |
| I期 | 36 | (7-9) | 0 | 100.0 | 80.6 | 63.5 | 90.2 | 69.2 |
| II期 | 21 | 14 | (1-3) | | | | | 67.7 |
| III期 | 42 | 33 | 0 | 100.0 | 21.4 | 10.6 | 34.7 | 64.0 |
| IV期 | 56 | 55 | 0 | 100.0 | 1.8 | 0.2 | 8.3 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 127 | 35 | 対象数 | | 14 | 148 |
| % | 78.4 | 21.6 | % | | 8.6 | 91.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 18 | 53 | 57 | 26 | |
| % | | 11.1 | 32.7 | 35.2 | 16.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 36 | 21 | 42 | 56 | (7-9) | 0 |
| % | 22.2 | 13.0 | 25.9 | 34.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 97 | 65 | 58 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 59.9 | 40.1 | 35.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 26 | 10 | 37 | 89 | | |
| % | 16.0 | 6.2 | 22.8 | 54.9 | | |

78 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 93 | 17 | (1-3) | 98.9 | 81.7 | 72.3 | 88.2 | 62.5 |
| I期 | 38 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.4 | 82.8 | 99.6 | 59.4 |
| II期 | 26 | (1-3) | (1-3) | | | | | 58.3 |
| III期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 58.9 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 93 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 10 | 26 | 21 | 11 | | |
| % | 26.9 | 10.8 | 28.0 | 22.6 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 26 | 19 | (4-6) | (4-6) | 0 | |
| % | 40.9 | 28.0 | 20.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 73 | 72 | (1-3) | 0 | | |
| % | 21.5 | 78.5 | 77.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | 19 | 62 | | | |
| % | 10.8 | | 20.4 | 66.7 | | | |

79 順天堂大学医学部附属浦安病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

79 順天堂大学医学部附属浦安病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 288 | 133 | (1-3) | 99.0 | 53.4 | 47.4 | 59.0 | 67.7 |
| I期 | 152 | 32 | (1-3) | 98.7 | 78.7 | 71.2 | 84.4 | 68.9 |
| II期 | 26 | 15 | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | 24 | 13 | 0 | | | | | 54.5 |
| IV期 | 81 | 73 | (1-3) | 98.8 | 8.8 | 3.9 | 16.2 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 212 | 76 | | | | | |
| % | 73.6 | 26.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 39 | 99 | 96 | 35 | | |
| % | 6.6 | 13.5 | 34.4 | 33.3 | 12.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 152 | 26 | 24 | 81 | 0 | (4-6) | |
| % | 52.8 | 9.0 | 8.3 | 28.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 76 | 212 | 212 | 0 | 0 | | |
| % | 26.4 | 73.6 | 73.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 40 | 39 | 194 | | | |
| % | 5.2 | 13.9 | 13.5 | 67.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 344 | 104 | (7-9) | 97.4 | 69.3 | 64.1 | 74.0 | 65.9 |
| I期 | 99 | 14 | (1-3) | 97.0 | 85.6 | 76.9 | 91.2 | 67.5 |
| II期 | 82 | 19 | (1-3) | 97.6 | 76.4 | 65.5 | 84.2 | 67.6 |
| III期 | 105 | 27 | (1-3) | 98.1 | 74.1 | 64.5 | 81.4 | 67.6 |
| IV期 | 46 | 41 | (1-3) | 97.8 | 9.1 | 2.9 | 19.8 | 61.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 215 | 129 | | | | | |
| % | 62.5 | 37.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 36 | 48 | 117 | 109 | 34 | | |
| % | 10.5 | 14.0 | 34.0 | 31.7 | 9.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 99 | 82 | 105 | 46 | (1-3) | 10 | |
| % | 28.8 | 23.8 | 30.5 | 13.4 | | 2.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 310 | 310 | 0 | 0 | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 90.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 75 | 35 | 205 | | | |
| % | 8.4 | 21.8 | 10.2 | 59.6 | | | |

79 順天堂大学医学部附属浦安病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 67 | 49 | (1-3) | 98.5 | 25.8 | 16.0 | 36.7 | 69.4 |
| I期 | 23 | 14 | 0 | | | | | 69.3 |
| II期 | 21 | 13 | 0 | | | | | 69.8 |
| III期 | 20 | 19 | (1-3) | | | | | 67.8 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 78.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 39 | 28 | | | | | | |
| % | 58.2 | 41.8 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 20 | 30 | (7-9) | | | |
| % | | | 29.9 | 44.8 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 23 | 21 | 20 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 34.3 | 31.3 | 29.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 26 | 24 | 10 | 0 | 0 | |
| | % | | 38.8 | 35.8 | 14.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 61 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 91.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 16 | 49 | | | | |
| % | | | 23.9 | 73.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 308 | 223 | (4-6) | 98.1 | 26.4 | 21.5 | 31.5 | 68.7 |
| I期 | 71 | 31 | (1-3) | 98.6 | 55.8 | 43.4 | 66.4 | 70.8 |
| II期 | 27 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.6 |
| III期 | 83 | 64 | (1-3) | 98.8 | 22.4 | 14.1 | 31.9 | 68.9 |
| IV期 | 126 | 120 | (1-3) | 98.4 | 3.3 | 1.1 | 7.5 | 68.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 218 | 90 | 対象数 | | 35 | 273 |
| % | 70.8 | 29.2 | % | | 11.4 | 88.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 16 | 30 | 114 | 106 | 42 | |
| % | 5.2 | 9.7 | 37.0 | 34.4 | 13.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 71 | 27 | 83 | 126 | 0 | (1-3) |
| % | 23.1 | 8.8 | 26.9 | 40.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 214 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
| % | 69.5 | 30.5 | 30.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 10 | 80 | 57 | 161 | | |
| % | 3.2 | 26.0 | 18.5 | 52.3 | | |

79 順天堂大学医学部附属浦安病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 255 | 22 | (1-3) | 99.2 | 91.3 | 87.1 | 94.2 | 58.5 |
| I期 | 101 | (1-3) | (1-3) | 98.0 | 98.0 | 92.2 | 99.5 | 58.6 |
| II期 | 114 | (4-6) | 0 | 100.0 | 94.7 | 88.7 | 97.6 | 58.4 |
| III期 | 27 | (1-3) | 0 | | | | | 57.3 |
| IV期 | 12 | 10 | 0 | | | | | 53.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 255 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 74 | 56 | 74 | 32 | 19 | | |
| % | 29.0 | 22.0 | 29.0 | 12.5 | 7.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 101 | 114 | 27 | 12 | 0 | (1-3) | |
| % | 39.6 | 44.7 | 10.6 | 4.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 218 | 218 | 0 | 0 | | |
| % | 14.5 | 85.5 | 85.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | 36 | (4-6) | 157 | | | |
| % | 22.7 | 14.1 | | 61.6 | | | |

80

東京慈恵会医科大学附属柏病院
2010－2011年2力年

コメント:

当院は救命救急センターを有する地域中核の大学病院として、がん以外の疾患も併せてお持ちの方、救急搬送や緊急手術を要する方など、治療が難しいがん患者さんを多く受け入れております。そのため、がん専門病院など他の医療施設と比較すると生存率が低くなることがあります。生存率は、性別、年齢、診断時点でのがんの進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係するため、医療施設におけるがん診療の良し悪しを単純に示すものではありません。（がん以外が原因で死亡した場合も、生存率の集計に影響を及ぼします。）この生存率の集計結果にご質問がありましたら、主治医にご相談いただけますようお願い致します。

80 東京慈恵会医科大学附属柏病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 200 | 72 | (1-3) | 99.0 | 63.8 | 56.7 | 70.1 | 70.3 |
| I期 | 129 | 21 | (1-3) | 99.2 | 83.7 | 76.1 | 89.1 | 72.2 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 72.6 |
| III期 | 13 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.5 |
| IV期 | 42 | 36 | 0 | 100.0 | 14.3 | 5.8 | 26.5 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 133 | 67 | | | | | |
| % | 66.5 | 33.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 15 | 60 | 75 | 40 | | |
| % | 5.0 | 7.5 | 30.0 | 37.5 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 129 | 11 | 13 | 42 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 64.5 | 5.5 | 6.5 | 21.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 173 | 160 | 13 | 0 | | |
| % | 13.5 | 86.5 | 80.0 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 26 | 104 | 56 | | | |
| % | 7.0 | 13.0 | 52.0 | 28.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 222 | 78 | (1-3) | 98.6 | 64.4 | 57.7 | 70.3 | 68.0 |
| I期 | 67 | 12 | 0 | 100.0 | 82.1 | 70.6 | 89.4 | 71.5 |
| II期 | 76 | 18 | (1-3) | 98.7 | 76.0 | 64.7 | 84.1 | 66.9 |
| III期 | 44 | 17 | (1-3) | 97.7 | 60.5 | 44.3 | 73.3 | 65.9 |
| IV期 | 34 | 30 | (1-3) | 97.1 | 9.1 | 2.3 | 21.7 | 65.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 143 | 79 | | | | | |
| % | 64.4 | 35.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 25 | 82 | 74 | 29 | | |
| % | 5.4 | 11.3 | 36.9 | 33.3 | 13.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 76 | 44 | 34 | (1-3) | 0 | |
| % | 30.2 | 34.2 | 19.8 | 15.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 214 | 187 | 24 | (1-3) | | |
| % | | 96.4 | 84.2 | 10.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | 62 | 75 | 40 | | | |
| % | 20.3 | 27.9 | 33.8 | 18.0 | | | |

80 東京慈恵会医科大学附属柏病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 44 | (1-3) | 98.6 | 35.4 | 24.3 | 46.7 | 68.5 |
| I期 | 28 | 14 | 0 | | | | | 70.4 |
| II期 | 21 | 14 | 0 | | | | | 72.6 |
| III期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 60.1 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 56 | 13 | | | | | |
| % | 81.2 | 18.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 17 | 25 | 13 | | |
| % | | 14.5 | 24.6 | 36.2 | 18.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 21 | 12 | (1-3) | (4-6) | 0 |
| | % | 40.6 | 30.4 | 17.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 16 | 21 | 19 | (4-6) | (7-9) | 0 |
| | % | 23.2 | 30.4 | 27.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 32 | 22 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 53.6 | 46.4 | 31.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 44 | 16 | | | |
| % | | | 63.8 | 23.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 105 | 68 | (4-6) | 96.2 | 33.6 | 24.6 | 42.8 | 68.5 |
| I期 | 39 | 12 | (1-3) | 94.9 | 68.0 | 50.6 | 80.4 | 70.3 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 23 | 17 | (1-3) | | | | | 68.7 |
| IV期 | 33 | 32 | 0 | 100.0 | 3.0 | 0.2 | 13.4 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 77 | 28 | | | (7-9) | 98 |
| % | 73.3 | 26.7 | | | | 93.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 37 | 35 | 14 | |
| % | | 14.3 | 35.2 | 33.3 | 13.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 39 | (7-9) | 23 | 33 | (1-3) | 0 |
| % | 37.1 | | 21.9 | 31.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 48 | 57 | 55 | (1-3) | 0 | |
| % | 45.7 | 54.3 | 52.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 51 | 37 | | |
| % | | 14.3 | 48.6 | 35.2 | | |

80 東京慈恵会医科大学附属柏病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 203 | 20 | (1-3) | 98.5 | 90.1 | 85.1 | 93.5 | 57.5 |
| I期 | 90 | (4-6) | (1-3) | 97.8 | 93.3 | 85.7 | 96.9 | 57.0 |
| II期 | 84 | (7-9) | (1-3) | 98.8 | 91.6 | 83.2 | 95.9 | 56.3 |
| III期 | 23 | (4-6) | 0 | | | | | 59.6 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 50.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 203 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 66 | 42 | 52 | 30 | 13 | | |
| % | 32.5 | 20.7 | 25.6 | 14.8 | 6.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 84 | 23 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 44.3 | 41.4 | 11.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 196 | 191 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 96.6 | 94.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 77 | 26 | (4-6) | 96 | | | |
| % | 37.9 | 12.8 | | 47.3 | | | |

81 松戸市立総合医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

2010年、従来の外科、呼吸器外科による胃癌、大腸癌、肝癌、乳癌に対する診療体制に、化学療法内科（腫瘍内科）、呼吸器内科が加わった。
I, II, III期に対する標準的手術療法をベースとして、最新のエビデンスに基づいた補助化学療法の追加や、IV期、再発例に積極的に治療を行うケースが増えた。
IV期症例の生存期間は満足すべき成績ではなく、今後の向上に寄与するような工夫をしている。

81 松戸市立総合医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 159 | 87 | 0 | 100.0 | 45.3 | 37.4 | 52.8 | 71.9 |
| I期 | 72 | 18 | 0 | 100.0 | 75.0 | 63.3 | 83.5 | 73.6 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 78.6 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.6 |
| IV期 | 58 | 52 | 0 | 100.0 | 10.3 | 4.2 | 19.7 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 105 | 54 | | | | | |
| % | 66.0 | 34.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 41 | 67 | 37 | | |
| % | | 6.3 | 25.8 | 42.1 | 23.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 72 | 11 | (7-9) | 58 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 45.3 | 6.9 | | 36.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 112 | 97 | 13 | (1-3) | | |
| % | 29.6 | 70.4 | 61.0 | 8.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | 50 | 91 | | | |
| % | 6.3 | | 31.4 | 57.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 208 | 85 | (1-3) | 99.0 | 59.0 | 51.9 | 65.3 | 70.6 |
| I期 | 49 | (4-6) | (1-3) | 98.0 | 87.5 | 74.3 | 94.2 | 68.6 |
| II期 | 60 | 19 | (1-3) | 98.3 | 68.3 | 55.0 | 78.5 | 70.8 |
| III期 | 47 | 18 | 0 | 100.0 | 61.7 | 46.3 | 73.9 | 67.4 |
| IV期 | 39 | 32 | 0 | 100.0 | 18.0 | 7.9 | 31.3 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 132 | 76 | | | | | |
| % | 63.5 | 36.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 74 | 68 | 43 | | |
| % | | 9.6 | 35.6 | 32.7 | 20.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 60 | 47 | 39 | 11 | (1-3) | |
| % | 23.6 | 28.8 | 22.6 | 18.8 | 5.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 176 | 163 | 13 | 0 | | |
| % | 15.4 | 84.6 | 78.4 | 6.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (7-9) | 62 | 120 | | | |
| % | 8.2 | | 29.8 | 57.7 | | | |

81 松戸市立総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 64 | 45 | 0 | 100.0 | 29.7 | 19.1 | 41.1 | 71.4 |
| I期 | 31 | 16 | 0 | 100.0 | 48.4 | 30.2 | 64.4 | 70.9 |
| II期 | 14 | 10 | 0 | | | | | 70.4 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 55.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 35 | 29 | | | | | | |
| % | 54.7 | 45.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 19 | 30 | 10 | | | |
| % | | | 29.7 | 46.9 | 15.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 31 | 14 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 0 | |
| | % | 48.4 | 21.9 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 23 | (7-9) | 12 | (1-3) | 0 | |
| | % | 28.1 | 35.9 | | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 59 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 92.2 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 49 | 14 | | | | |
| % | | | 76.6 | 21.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 176 | 140 | 0 | 100.0 | 20.5 | 14.9 | 26.7 | 72.1 |
| I期 | 36 | 14 | 0 | 100.0 | 61.1 | 43.4 | 74.8 | 74.7 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 64.2 |
| III期 | 62 | 58 | 0 | 100.0 | 6.5 | 2.1 | 14.4 | 73.8 |
| IV期 | 57 | 54 | 0 | 100.0 | 5.3 | 1.4 | 13.2 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|------|
| 対象数 | 130 | 46 | 対象数 | | 19 | 157 |
| % | 73.9 | 26.1 | % | | 10.8 | 89.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 53 | 81 | 33 | |
| % | | | 30.1 | 46.0 | 18.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 36 | 11 | 62 | 57 | 10 | 0 |
| % | 20.5 | 6.3 | 35.2 | 32.4 | 5.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 137 | 39 | 38 | (1-3) | 0 | |
| % | 77.8 | 22.2 | 21.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 20 | 19 | 62 | 75 | | |
| % | 11.4 | 10.8 | 35.2 | 42.6 | | |

81 松戸市立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | 17 | (1-3) | 98.7 | 77.3 | 66.1 | 85.2 | 63.7 |
| I期 | 30 | (1-3) | 0 | 100.0 | 93.3 | 75.9 | 98.3 | 69.6 |
| II期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 63.0 |
| III期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 48.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 75 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 15 | 25 | 18 | (7-9) | | |
| % | | 20.0 | 33.3 | 24.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 30 | 19 | 17 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 40.0 | 25.3 | 22.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 60 | 54 | (4-6) | 0 | | |
| % | 20.0 | 80.0 | 72.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | 18 | 46 | | | |
| % | 13.3 | | 24.0 | 61.3 | | | |

82 日本医科大学千葉北総病院
2011年のみ

コメント:

当院では自施設最終来院日と死亡日を把握した上で、生存状況が不明の患者については千葉県地域がん登録での予後情報の利用や予後調査支援事業へ参加し、生存状況の把握に努めている。今回、2010年診断症例分については、予後調査支援事業参加前であることから生存状況把握割合が90%未満となった。
今後も引き続き予後調査支援事業に参加し、生存状況把握割合の向上に努める。

82 日本医科大学千葉北総病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 119 | 52 | 0 | 100.0 | 56.3 | 46.9 | 64.7 | 68.6 |
| I期 | 62 | (7-9) | 0 | 100.0 | 87.1 | 75.9 | 93.3 | 67.9 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 69.1 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.4 |
| IV期 | 33 | 30 | 0 | 100.0 | 9.1 | 2.3 | 21.7 | 68.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 87 | 32 | | | | | |
| % | 73.1 | 26.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 35 | 48 | 15 | | |
| % | | 13.4 | 29.4 | 40.3 | 12.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 62 | 10 | (7-9) | 33 | (4-6) | 0 | |
| % | 52.1 | 8.4 | | 27.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 88 | 77 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 26.1 | 73.9 | 64.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | 18 | 78 | | | |
| % | 13.4 | | 15.1 | 65.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 122 | 53 | (1-3) | 99.2 | 56.3 | 47.0 | 64.6 | 67.5 |
| I期 | 20 | (1-3) | (1-3) | | | | | 65.8 |
| II期 | 31 | (4-6) | 0 | 100.0 | 83.9 | 65.5 | 93.0 | 68.0 |
| III期 | 38 | 17 | 0 | 100.0 | 55.3 | 38.3 | 69.3 | 68.1 |
| IV期 | 29 | 24 | 0 | | | | | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 77 | 45 | | | | | |
| % | 63.1 | 36.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 39 | 34 | 19 | | |
| % | | 21.3 | 32.0 | 27.9 | 15.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 20 | 31 | 38 | 29 | (4-6) | 0 | |
| % | 16.4 | 25.4 | 31.1 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 99 | 84 | (4-6) | 11 | | |
| % | 18.9 | 81.1 | 68.9 | | 9.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | 23 | 82 | | | |
| % | 8.2 | | 18.9 | 67.2 | | | |

82 日本医科大学千葉北総病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 27 | 19 | 0 | | | | | 70.0 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.5 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 71.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 22 | (4-6) | | | | | |
| % | 81.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 10 | (4-6) | | |
| % | | | | 37.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (7-9) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | (4-6) | (1-3) | 0 | (1-3) | | |
| % | 81.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 16 | 11 | | | |
| % | | | 59.3 | 40.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 85 | (1-3) | 98.3 | 29.1 | 21.2 | 37.4 | 70.1 |
| I期 | 35 | 10 | 0 | 100.0 | 71.4 | 53.4 | 83.5 | 69.0 |
| II期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.4 |
| III期 | 29 | 24 | (1-3) | | | | | 67.9 |
| IV期 | 44 | 43 | 0 | 100.0 | 2.3 | 0.2 | 10.4 | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|
| 対象数 | 97 | 24 | 対象数 | | (7-9) | 112 | |
| % | 80.2 | 19.8 | % | | | 92.6 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 53 | 41 | 18 | | |
| % | | | 43.8 | 33.9 | 14.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 35 | 10 | 29 | 44 | (1-3) | 0 | |
| % | 28.9 | 8.3 | 24.0 | 36.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 72 | 49 | 42 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 59.5 | 40.5 | 34.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 18 | 24 | 67 | | | |
| % | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 55.4 | | | |

82 日本医科大学千葉北総病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 39 | (4-6) | 0 | 100.0 | 84.6 | 68.9 | 92.8 | 63.9 |
| I期 | 20 | (1-3) | 0 | | | | | 62.2 |
| II期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 65.4 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 60.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 39 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | (4-6) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | 33.3 | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 20 | 12 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 51.3 | 30.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 33 | 31 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 84.6 | 79.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (4-6) | 28 | | | |
| % | | | | 71.8 | | | |

83 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
2010-2011年2力年

コメント:

「5大がん（胃・大腸・肝・肺・女性乳房）」の2010-2011年5年生存率において、当院は前回と同様に全国値より高い値をとっている。これには観血的治療の割合が全国値より高く、70歳以上の高齢者の割合が全国値より低いこと等が関係していると考えられる。

生存率は、患者属性による影響を受けるため、生存率だけを見て施設間比較をするべきではなく、病期や年代別等の内容も併せて、総合的に見ていく必要がある。

83 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1527 | 339 | 87 | 94.3 | 77.4 | 75.2 | 79.4 | 66.8 |
| I期 | 1132 | 115 | 68 | 94.0 | 89.7 | 87.7 | 91.3 | 67.4 |
| II期 | 96 | 19 | (1-3) | 99.0 | 80.1 | 70.6 | 86.8 | 65.1 |
| III期 | 76 | 32 | (1-3) | 96.1 | 57.2 | 45.3 | 67.5 | 66.2 |
| IV期 | 206 | 168 | 15 | 92.7 | 13.0 | 8.6 | 18.3 | 65.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 1093 | 434 | | | | | |
| % | 71.6 | 28.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 102 | 224 | 538 | 512 | 151 | | |
| % | 6.7 | 14.7 | 35.2 | 33.5 | 9.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 1132 | 96 | 76 | 206 | 15 | (1-3) | |
| % | 74.1 | 6.3 | 5.0 | 13.5 | 1.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 202 | 1325 | 1248 | 59 | 18 | | |
| % | 13.2 | 86.8 | 81.7 | 3.9 | 1.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 274 | 177 | 572 | 504 | | | |
| % | 17.9 | 11.6 | 37.5 | 33.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 831 | 188 | 64 | 92.3 | 76.7 | 73.6 | 79.5 | 63.8 |
| I期 | 268 | 18 | 21 | 92.2 | 93.1 | 89.2 | 95.6 | 66.0 |
| II期 | 178 | 23 | 14 | 92.1 | 86.8 | 80.8 | 91.0 | 65.7 |
| III期 | 204 | 40 | 12 | 94.1 | 80.1 | 73.9 | 85.0 | 61.6 |
| IV期 | 151 | 103 | 14 | 90.7 | 26.5 | 19.4 | 34.1 | 61.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 471 | 360 | | | | | |
| % | 56.7 | 43.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 103 | 160 | 267 | 254 | 47 | | |
| % | 12.4 | 19.3 | 32.1 | 30.6 | 5.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 268 | 178 | 204 | 151 | (4-6) | 24 | |
| % | 32.3 | 21.4 | 24.5 | 18.2 | | 2.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 71 | 760 | 677 | 59 | 24 | | |
| % | 8.5 | 91.5 | 81.5 | 7.1 | 2.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 162 | 60 | 151 | 458 | | | |
| % | 19.5 | 7.2 | 18.2 | 55.1 | | | |

83 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 233 | 138 | 22 | 90.6 | 37.7 | 31.3 | 44.1 | 67.7 |
| I期 | 69 | 27 | (4-6) | 92.8 | 59.2 | 46.3 | 69.9 | 69.0 |
| II期 | 67 | 36 | (7-9) | 88.1 | 44.3 | 31.9 | 56.0 | 69.7 |
| III期 | 58 | 40 | (4-6) | 91.4 | 25.7 | 14.8 | 38.1 | 66.7 |
| IV期 | 29 | 26 | (1-3) | | | | | 61.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|---|
| 対象数 | 167 | 66 | | | | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 31 | 77 | 91 | 21 | | |
| % | 5.6 | 13.3 | 33.0 | 39.1 | 9.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 69 | 67 | 58 | 29 | 10 | 0 |
| | % | 29.6 | 28.8 | 24.9 | 12.4 | 4.3 | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 32 | 71 | 56 | 51 | 17 | 0 |
| | % | 13.7 | 30.5 | 24.0 | 21.9 | 7.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 146 | 87 | 76 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 62.7 | 37.3 | 32.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 23 | 141 | 68 | | | |
| % | | 9.9 | 60.5 | 29.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1152 | 451 | 82 | 92.9 | 59.4 | 56.4 | 62.2 | 65.8 |
| I期 | 599 | 91 | 33 | 94.5 | 84.5 | 81.3 | 87.2 | 68.3 |
| II期 | 101 | 48 | (7-9) | 93.1 | 50.6 | 40.2 | 60.1 | 66.6 |
| III期 | 242 | 143 | 24 | 90.1 | 36.1 | 29.8 | 42.5 | 63.6 |
| IV期 | 192 | 162 | 18 | 90.6 | 8.9 | 5.1 | 13.9 | 61.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 707 | 445 | 対象数 | 84 | 1068 | | |
| % | 61.4 | 38.6 | % | 7.3 | 92.7 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 88 | 172 | 452 | 360 | 80 | | |
| % | 7.6 | 14.9 | 39.2 | 31.3 | 6.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 599 | 101 | 242 | 192 | (4-6) | 12 | |
| % | 52.0 | 8.8 | 21.0 | 16.7 | | 1.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 428 | 724 | 705 | 17 | (1-3) | | |
| % | 37.2 | 62.8 | 61.2 | 1.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 74 | 358 | 440 | 280 | | | |
| % | 6.4 | 31.1 | 38.2 | 24.3 | | | |

83 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 827 | 65 | 51 | 93.8 | 91.9 | 89.8 | 93.6 | 55.7 |
| I期 | 310 | (7-9) | 24 | 92.3 | 97.3 | 94.7 | 98.6 | 56.9 |
| II期 | 359 | 14 | 17 | 95.3 | 96.0 | 93.4 | 97.6 | 55.7 |
| III期 | 120 | 19 | (4-6) | 95.8 | 84.0 | 76.1 | 89.5 | 53.2 |
| IV期 | 32 | 22 | (4-6) | 87.5 | 23.5 | 9.9 | 40.3 | 56.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 827 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 291 | 206 | 201 | 100 | 29 | | |
| % | 35.2 | 24.9 | 24.3 | 12.1 | 3.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 310 | 359 | 120 | 32 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 37.5 | 43.4 | 14.5 | 3.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 63 | 764 | 737 | 26 | (1-3) | | |
| % | 7.6 | 92.4 | 89.1 | 3.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 251 | 44 | 121 | 411 | | | |
| % | 30.4 | 5.3 | 14.6 | 49.7 | | | |

東京都立駒込病院
2010－2011年2力年

コメント:

当院は、がん・感染症を中心とする疾患に対し高度で専門的な診療機能を提供する総合病院である。特に、がんに加えて糖尿病や、高血圧、脳疾患などの併存疾患を多く持った患者さんや、比較的進行した患者さん、高齢の患者さんを多く受け入れている。

年齢階級別登録割合においては、70歳以上の割合が高くなっており、乳房を除く胃・大腸・肺・肝臓でも同様の傾向となっている。

生存率は、がんの病期以外にも患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態、診断時の進行度等の様々な因子に大きく影響される。また、手術療法や薬物療法は、格段に進歩してきているため、現在の状況を表しているものではない。生存率のみで治療成績や医療の質を比較することは難しいと考える。

84 東京都立駒込病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 690 | 245 | (1-3) | 99.6 | 64.4 | 60.7 | 67.9 | 69.5 |
| I期 | 472 | 86 | (1-3) | 99.6 | 81.7 | 77.9 | 84.9 | 71.1 |
| II期 | 44 | 13 | 0 | 100.0 | 70.5 | 54.6 | 81.7 | 66.6 |
| III期 | 32 | 17 | (1-3) | 96.9 | 46.3 | 28.5 | 62.4 | 64.9 |
| IV期 | 130 | 122 | 0 | 100.0 | 6.2 | 2.9 | 11.2 | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 490 | 200 | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 34 | 80 | 191 | 263 | 122 | | |
| % | 4.9 | 11.6 | 27.7 | 38.1 | 17.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 472 | 44 | 32 | 130 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 68.4 | 6.4 | 4.6 | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 124 | 566 | 524 | 36 | (4-6) | | |
| % | 18.0 | 82.0 | 75.9 | 5.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 46 | 111 | 203 | 330 | | | |
| % | 6.7 | 16.1 | 29.4 | 47.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 697 | 177 | (4-6) | 99.3 | 74.6 | 71.2 | 77.7 | 66.8 |
| I期 | 202 | 21 | (1-3) | 99.5 | 89.6 | 84.5 | 93.1 | 64.4 |
| II期 | 162 | 19 | (1-3) | 99.4 | 88.3 | 82.2 | 92.3 | 70.0 |
| III期 | 196 | 52 | (1-3) | 98.5 | 73.4 | 66.6 | 79.0 | 67.3 |
| IV期 | 116 | 82 | 0 | 100.0 | 29.3 | 21.3 | 37.7 | 65.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 397 | 300 | | | | | |
| % | 57.0 | 43.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 52 | 109 | 231 | 229 | 76 | | |
| % | 7.5 | 15.6 | 33.1 | 32.9 | 10.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 202 | 162 | 196 | 116 | (1-3) | 19 | |
| % | 29.0 | 23.2 | 28.1 | 16.6 | | 2.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 658 | 588 | 69 | (1-3) | | |
| % | 5.6 | 94.4 | 84.4 | 9.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 83 | 94 | 111 | 409 | | | |
| % | 11.9 | 13.5 | 15.9 | 58.7 | | | |

84 東京都立駒込病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 180 | 117 | (1-3) | 99.4 | 35.0 | 28.1 | 41.9 | 71.1 |
| I期 | 87 | 45 | (1-3) | 98.9 | 48.2 | 37.4 | 58.2 | 71.3 |
| II期 | 54 | 35 | 0 | 100.0 | 35.2 | 22.8 | 47.8 | 71.3 |
| III期 | 24 | 22 | 0 | | | | | 70.3 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 126 | 54 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 49 | 73 | 36 | | |
| % | | 10.0 | 27.2 | 40.6 | 20.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 87 | 54 | 24 | 14 | (1-3) | 0 |
| | % | 48.3 | 30.0 | 13.3 | 7.8 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 40 | 75 | 34 | 25 | (4-6) | 0 |
| | % | 22.2 | 41.7 | 18.9 | 13.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 142 | 38 | 34 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 78.9 | 21.1 | 18.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 125 | 48 | | | |
| % | | | 69.4 | 26.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 600 | 367 | (7-9) | 98.8 | 38.3 | 34.4 | 42.2 | 70.7 |
| I期 | 252 | 80 | (1-3) | 99.2 | 68.2 | 62.1 | 73.6 | 72.7 |
| II期 | 27 | 15 | 0 | | | | | 70.8 |
| III期 | 148 | 104 | (4-6) | 96.6 | 27.3 | 20.3 | 34.8 | 69.6 |
| IV期 | 170 | 167 | 0 | 100.0 | 1.8 | 0.5 | 4.7 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 380 | 220 | 対象数 | 45 | 555 | | |
| % | 63.3 | 36.7 | % | 7.5 | 92.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 60 | 170 | 251 | 104 | | |
| % | 2.5 | 10.0 | 28.3 | 41.8 | 17.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 252 | 27 | 148 | 170 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 42.0 | 4.5 | 24.7 | 28.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 370 | 230 | 216 | 10 | (4-6) | | |
| % | 61.7 | 38.3 | 36.0 | 1.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | 134 | 198 | 232 | | | |
| % | 6.0 | 22.3 | 33.0 | 38.7 | | | |

84 東京都立駒込病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 532 | 53 | (1-3) | 99.4 | 90.0 | 87.1 | 92.3 | 59.3 |
| I期 | 235 | (7-9) | (1-3) | 99.1 | 96.2 | 92.8 | 98.0 | 59.4 |
| II期 | 203 | 10 | 0 | 100.0 | 95.1 | 91.0 | 97.3 | 58.8 |
| III期 | 62 | 14 | (1-3) | 98.4 | 77.2 | 64.6 | 85.8 | 60.0 |
| IV期 | 30 | 19 | 0 | 100.0 | 36.7 | 20.1 | 53.4 | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 532 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 145 | 117 | 144 | 92 | 34 | | |
| % | 27.3 | 22.0 | 27.1 | 17.3 | 6.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 235 | 203 | 62 | 30 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 44.2 | 38.2 | 11.7 | 5.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 489 | 452 | 18 | 19 | | |
| % | 8.1 | 91.9 | 85.0 | 3.4 | 3.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 130 | 34 | 61 | 307 | | | |
| % | 24.4 | 6.4 | 11.5 | 57.7 | | | |

85 青梅市立総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

85 青梅市立総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 198 | 94 | 13 | 93.4 | 50.6 | 43.3 | 57.5 | 70.6 |
| I期 | 99 | 21 | (7-9) | 90.9 | 77.8 | 68.0 | 84.9 | 71.6 |
| II期 | 19 | 12 | 0 | | | | | 70.1 |
| III期 | 23 | 13 | 0 | | | | | 68.6 |
| IV期 | 54 | 45 | (4-6) | 92.6 | 10.3 | 3.8 | 20.5 | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 150 | 48 | | | | | |
| % | 75.8 | 24.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 60 | 88 | 28 | | |
| % | | 8.6 | 30.3 | 44.4 | 14.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 99 | 19 | 23 | 54 | (1-3) | 0 | |
| % | 50.0 | 9.6 | 11.6 | 27.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 56 | 142 | 126 | 15 | (1-3) | | |
| % | 28.3 | 71.7 | 63.6 | 7.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 53 | 115 | | | |
| % | | 13.1 | 26.8 | 58.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 235 | 92 | 10 | 95.7 | 60.3 | 53.7 | 66.3 | 70.1 |
| I期 | 54 | 10 | (4-6) | 92.6 | 81.1 | 67.7 | 89.4 | 70.6 |
| II期 | 57 | 11 | (4-6) | 93.0 | 79.9 | 66.6 | 88.3 | 73.0 |
| III期 | 66 | 25 | (1-3) | 98.5 | 62.1 | 49.2 | 72.5 | 71.9 |
| IV期 | 47 | 38 | 0 | 100.0 | 19.2 | 9.5 | 31.4 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 137 | 98 | | | | | |
| % | 58.3 | 41.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 22 | 75 | 80 | 48 | | |
| % | 4.3 | 9.4 | 31.9 | 34.0 | 20.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | 57 | 66 | 47 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 23.0 | 24.3 | 28.1 | 20.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 192 | 177 | 13 | (1-3) | | |
| % | 18.3 | 81.7 | 75.3 | 5.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 51 | 40 | 133 | | | |
| % | 4.7 | 21.7 | 17.0 | 56.6 | | | |

85 青梅市立総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 62 | 45 | (1-3) | 95.2 | 25.1 | 15.0 | 36.6 | 69.5 |
| I期 | 22 | 16 | 0 | | | | | 72.4 |
| II期 | 21 | 11 | (1-3) | | | | | 65.5 |
| III期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 62.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 43 | 19 | | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 18 | 23 | 11 | | | |
| % | | | 29.0 | 37.1 | 17.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 21 | 10 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 35.5 | 33.9 | 16.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 21 | 14 | 14 | (1-3) | 0 | |
| | % | 16.1 | 33.9 | 22.6 | 22.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 56 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 90.3 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 43 | 17 | | | | |
| % | | | 69.4 | 27.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 216 | 166 | (4-6) | 97.7 | 22.6 | 17.3 | 28.5 | 70.3 |
| I期 | 56 | 20 | (1-3) | 94.6 | 63.8 | 49.7 | 75.0 | 69.7 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 80.0 |
| III期 | 71 | 63 | 0 | 100.0 | 11.3 | 5.3 | 19.8 | 70.4 |
| IV期 | 79 | 77 | (1-3) | 98.7 | 1.3 | 0.1 | 6.2 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 対象数 | 149 | 67 | 対象数 | | 27 | 189 | | |
| % | 69.0 | 31.0 | % | | 12.5 | 87.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 17 | 62 | 91 | 38 | | | |
| % | | 7.9 | 28.7 | 42.1 | 17.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 56 | (7-9) | 71 | 79 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 25.9 | | 32.9 | 36.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 152 | 64 | 61 | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 70.4 | 29.6 | 28.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 28 | 66 | 122 | | | | |
| % | | 13.0 | 30.6 | 56.5 | | | | |

85 青梅市立総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 120 | 19 | (7-9) | 93.3 | 83.5 | 75.3 | 89.1 | 60.6 |
| I期 | 40 | (1-3) | (4-6) | 87.5 | 97.1 | 81.4 | 99.6 | 61.6 |
| II期 | 51 | (4-6) | (1-3) | 94.1 | 89.9 | 77.3 | 95.7 | 61.9 |
| III期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 58.3 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 48.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 120 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 26 | 33 | 20 | 12 | | |
| % | 24.2 | 21.7 | 27.5 | 16.7 | 10.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 40 | 51 | 21 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 33.3 | 42.5 | 17.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 108 | 99 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 10.0 | 90.0 | 82.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (4-6) | 12 | 84 | | | |
| % | 15.8 | | 10.0 | 70.0 | | | |

86 NTT東日本関東病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

86 NTT東日本関東病院
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 694 | 161 | 32 | 95.4 | 76.2 | 72.9 | 79.3 | 69.4 |
| I期 | 565 | 70 | 29 | 94.9 | 87.2 | 84.1 | 89.8 | 68.9 |
| II期 | 37 | 16 | 0 | 100.0 | 56.8 | 39.4 | 70.8 | 74.9 |
| III期 | 25 | 16 | 0 | | | | | 65.7 |
| IV期 | 60 | 54 | (1-3) | 95.0 | 6.4 | 1.8 | 15.2 | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 503 | 191 | | | | | |
| % | 72.5 | 27.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 90 | 217 | 243 | 117 | | |
| % | 3.9 | 13.0 | 31.3 | 35.0 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 565 | 37 | 25 | 60 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 81.4 | 5.3 | 3.6 | 8.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 61 | 633 | 606 | 23 | (4-6) | | |
| % | 8.8 | 91.2 | 87.3 | 3.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 80 | 124 | 229 | 261 | | | |
| % | 11.5 | 17.9 | 33.0 | 37.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 496 | 112 | 15 | 97.0 | 77.1 | 73.1 | 80.6 | 66.0 |
| I期 | 166 | 19 | (4-6) | 97.0 | 88.4 | 82.4 | 92.4 | 65.6 |
| II期 | 95 | 16 | (4-6) | 95.8 | 82.9 | 73.6 | 89.1 | 69.3 |
| III期 | 128 | 28 | (1-3) | 98.4 | 77.9 | 69.6 | 84.2 | 67.4 |
| IV期 | 65 | 47 | (1-3) | 96.9 | 26.6 | 16.4 | 37.9 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 314 | 182 | | | | | |
| % | 63.3 | 36.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 62 | 85 | 135 | 138 | 76 | | |
| % | 12.5 | 17.1 | 27.2 | 27.8 | 15.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 166 | 95 | 128 | 65 | (1-3) | 40 | |
| % | 33.5 | 19.2 | 25.8 | 13.1 | | 8.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 44 | 452 | 431 | 16 | (4-6) | | |
| % | 8.9 | 91.1 | 86.9 | 3.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 102 | 71 | 96 | 227 | | | |
| % | 20.6 | 14.3 | 19.4 | 45.8 | | | |

86 NTT東日本関東病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 74 | (1-3) | 98.5 | 45.1 | 36.6 | 53.3 | 68.0 |
| I期 | 57 | 28 | (1-3) | 98.2 | 50.3 | 36.6 | 62.4 | 68.0 |
| II期 | 44 | 22 | (1-3) | 97.7 | 49.4 | 33.9 | 63.1 | 70.6 |
| III期 | 24 | 13 | 0 | | | | | 66.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 103 | 33 | | | | | |
| % | 75.7 | 24.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 20 | 40 | 54 | 15 | | |
| % | | 14.7 | 29.4 | 39.7 | 11.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 57 | 44 | 24 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 41.9 | 32.4 | 17.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 33 | 52 | 31 | 17 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 24.3 | 38.2 | 22.8 | 12.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 117 | 19 | 15 | (4-6) | 0 | | |
| % | 86.0 | 14.0 | 11.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 87 | 41 | | | |
| % | | | 64.0 | 30.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 353 | 205 | (4-6) | 98.3 | 41.3 | 36.1 | 46.4 | 69.4 |
| I期 | 142 | 24 | (4-6) | 97.2 | 82.8 | 75.4 | 88.1 | 66.5 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 70.9 |
| III期 | 54 | 39 | 0 | 100.0 | 27.8 | 16.7 | 40.0 | 67.5 |
| IV期 | 137 | 130 | (1-3) | 98.5 | 3.7 | 1.4 | 7.9 | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 227 | 126 | 対象数 | 30 | 323 | | |
| % | 64.3 | 35.7 | % | 8.5 | 91.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 39 | 118 | 114 | 66 | | |
| % | 4.5 | 11.0 | 33.4 | 32.3 | 18.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 142 | 14 | 54 | 137 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 40.2 | 4.0 | 15.3 | 38.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 197 | 156 | 148 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 55.8 | 44.2 | 41.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 37 | 68 | 125 | 123 | | | |
| % | 10.5 | 19.3 | 35.4 | 34.8 | | | |

86 NTT東日本関東病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 20 | 0 | 100.0 | 85.6 | 78.6 | 90.5 | 63.4 |
| I期 | 57 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.5 | 86.7 | 99.1 | 66.3 |
| II期 | 55 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.9 | 79.5 | 96.1 | 60.7 |
| III期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 67.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 58.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 139 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 33 | 40 | 33 | 13 | | |
| % | 14.4 | 23.7 | 28.8 | 23.7 | 9.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 57 | 55 | 18 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 41.0 | 39.6 | 12.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 127 | 113 | 14 | 0 | | |
| % | 8.6 | 91.4 | 81.3 | 10.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 17 | 36 | 64 | | | |
| % | 15.8 | 12.2 | 25.9 | 46.0 | | | |

87 日本赤十字社医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

公表される実測生存率は、以下のような方法上の限界を踏まえて解釈すれば意味がある。しかし、そのLiteracyのないまま不適切に解釈される危険が高い。

- 1) 同一の病期でも施設間の進行度に差が残っている可能性があり、施設間の病期診断の方法も統一されていない。
- 2) 生存率には実測生存率を用いている。全生存率は「がん特異的」生存率ではないので合併疾患や全身状態に大きく影響されるにもかかわらず、その補正がなされていない。
- 3) 5年生存率は時間的検証を経た値であり、治療成績の指標としては一定の意味はある。しかし、がん治療は急速に進歩しており2010-11年当時と現在の治療は大きく異なる。新治療に対する施設の体制も変化しており、過去の治療成績で今の治療能力を推定することはできない。

87 日本赤十字社医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 280 | 111 | 14 | 95.0 | 59.5 | 53.4 | 65.1 | 69.5 |
| I期 | 173 | 32 | 12 | 93.1 | 80.9 | 74.1 | 86.1 | 69.3 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 68.3 |
| III期 | 19 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.3 |
| IV期 | 60 | 58 | 0 | 100.0 | 3.3 | 0.6 | 10.2 | 74.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 182 | 98 | | | | | |
| % | 65.0 | 35.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 32 | 80 | 97 | 54 | | |
| % | 6.1 | 11.4 | 28.6 | 34.6 | 19.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 173 | 20 | 19 | 60 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 61.8 | 7.1 | 6.8 | 21.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 231 | 206 | 15 | 10 | | |
| % | 17.5 | 82.5 | 73.6 | 5.4 | 3.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 56 | 104 | 113 | | | |
| % | | 20.0 | 37.1 | 40.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 349 | 102 | 18 | 94.8 | 70.1 | 64.9 | 74.6 | 68.2 |
| I期 | 87 | (7-9) | (7-9) | 90.8 | 90.4 | 81.6 | 95.1 | 67.9 |
| II期 | 87 | 17 | (4-6) | 95.4 | 80.2 | 70.0 | 87.2 | 69.6 |
| III期 | 105 | 33 | (1-3) | 98.1 | 68.2 | 58.3 | 76.3 | 65.2 |
| IV期 | 47 | 37 | (1-3) | 97.9 | 19.6 | 9.7 | 32.0 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 196 | 153 | | | | | |
| % | 56.2 | 43.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 49 | 106 | 99 | 67 | | |
| % | 8.0 | 14.0 | 30.4 | 28.4 | 19.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 87 | 87 | 105 | 47 | 13 | 10 | |
| % | 24.9 | 24.9 | 30.1 | 13.5 | 3.7 | 2.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 332 | 310 | 12 | 10 | | |
| % | 4.9 | 95.1 | 88.8 | 3.4 | 2.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 57 | 107 | 169 | | | |
| % | 4.6 | 16.3 | 30.7 | 48.4 | | | |

87 日本赤十字社医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 151 | 93 | (4-6) | 97.4 | 37.2 | 29.4 | 44.9 | 68.5 |
| I期 | 49 | 21 | (1-3) | 95.9 | 55.4 | 40.2 | 68.2 | 67.7 |
| II期 | 31 | 16 | (1-3) | 96.8 | 47.8 | 29.5 | 64.0 | 72.7 |
| III期 | 40 | 31 | (1-3) | 97.5 | 21.1 | 10.0 | 35.0 | 69.6 |
| IV期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|-------|
| 対象数 | 110 | 41 | | | | | |
| % | 72.8 | 27.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 13 | 53 | 44 | 30 | | |
| % | 7.3 | 8.6 | 35.1 | 29.1 | 19.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 49 | 31 | 40 | 12 | 18 | (1-3) |
| | % | 32.5 | 20.5 | 26.5 | 7.9 | 11.9 | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 26 | 44 | 22 | 31 | 28 | (1-3) |
| | % | 17.2 | 29.1 | 14.6 | 20.5 | 18.5 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 72 | 79 | 64 | (4-6) | 10 | | |
| % | 47.7 | 52.3 | 42.4 | | 6.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 89 | 46 | | | |
| % | | 9.9 | 58.9 | 30.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 202 | 144 | (7-9) | 96.0 | 26.9 | 20.9 | 33.3 | 71.9 |
| I期 | 44 | 13 | (4-6) | 90.9 | 68.6 | 52.1 | 80.5 | 69.3 |
| II期 | 15 | (7-9) | (1-3) | | | | | 63.8 |
| III期 | 55 | 45 | 0 | 100.0 | 18.2 | 9.4 | 29.3 | 69.7 |
| IV期 | 72 | 67 | (1-3) | 98.6 | 5.6 | 1.8 | 12.7 | 73.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 134 | 68 | 対象数 | 18 | 184 | | |
| % | 66.3 | 33.7 | % | 8.9 | 91.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 57 | 63 | 58 | | |
| % | | 9.4 | 28.2 | 31.2 | 28.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | 15 | 55 | 72 | 13 | (1-3) | |
| % | 21.8 | 7.4 | 27.2 | 35.6 | 6.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 134 | 68 | 56 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 66.3 | 33.7 | 27.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 42 | 91 | 64 | | | |
| % | | 20.8 | 45.0 | 31.7 | | | |

87 日本赤十字社医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 193 | 22 | (7-9) | 96.4 | 88.4 | 82.9 | 92.2 | 59.3 |
| I期 | 88 | (1-3) | (1-3) | 97.7 | 98.9 | 92.1 | 99.8 | 60.4 |
| II期 | 73 | (7-9) | (1-3) | 95.9 | 90.1 | 80.4 | 95.2 | 58.4 |
| III期 | 19 | (4-6) | (1-3) | | | | | 61.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 55.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 193 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 52 | 40 | 54 | 36 | 11 | | |
| % | 26.9 | 20.7 | 28.0 | 18.7 | 5.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 88 | 73 | 19 | (7-9) | (4-6) | 0 | |
| % | 45.6 | 37.8 | 9.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 170 | 143 | 11 | 16 | | |
| % | 11.9 | 88.1 | 74.1 | 5.7 | 8.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 35 | 36 | 96 | | | |
| % | 13.5 | 18.1 | 18.7 | 49.7 | | | |

コメント:

・ 当院の結果については、概ね全体の集計値と近い結果となっていると考えられるが以下に全体集計値と比較した患者属性の特徴を記載する。

・ 当院の患者属性の特徴について、まず年齢構成割合において、0-15歳（当院：1.3%、全体：0.4%）、15歳-39歳（当院：5.4%、全体：3.4%）で全体集計値より年齢構成割合が高く、小児がん、AYA世代がんの診療を積極的に行っていることが示唆される。一方、80歳以上（当院：13.3%、全体：16.6%）では全体集計値より低いものの、病期分類別の構成割合では、5大がんの多くで病期が進行した症例の割合が多く、特にIV期の構成割合はそれぞれ、胃癌（当院：22.7%、全体：19.8%）、大腸癌（当院：23.8%、全体：19.6%）、肺癌（当院：38.6%、全体：30.5%）、乳癌（当院：9.3%、全体：5.3%）となっており、当院の特徴として、難治症例や進行症例を多く受け入れていることが示される。

・ 前述のことから、当院の5大がんにおける観血的治療の実施割合は、胃癌（当院：73.1%、全体：80.5%）、大腸癌（当院：82.0%、全体：87.6%）、肺癌（当院：24.8%、全体：43.3%）、乳癌（当院：89.5%、全体：89.8%）となり、それぞれ全体集計値より下回るが、手術を実施した際の結果を「治癒切除」・「非治癒切除」に分けた場合の「治癒切除」の割合は、胃癌（当院：95.8%、全体：92.8%）、大腸癌（当院：92.3%、全体：89.3%）、肺癌（当院：94.0%、全体：93.3%）、乳癌（当院：97.8%、全体：92.0%）と、いずれも全体集計値を上回る結果となっている。

・ 当院の肝臓癌に関して、観血的治療の実施率（63.1%）が肝臓癌全体の観血的治療の実施率（27.8%）と比較して非常に高く、手術結果が「治癒切除」となった割合も、当院の治癒切除の割合（94.6%）は、肝臓癌全体の割合（89.6%）に比較しても上回っている。また当院の全がんに対する肝臓癌の症例数の割合（9.0%）も全体の集計値による割合（4.6%）よりも高く、当院の診療実績の特徴を示している。

・ 「生存率」の数値については、本報告書の冒頭にも記載されているが、生存状況の把握において、住民票照会の結果として死亡を確認している症例においては、当該の癌による癌死かどうか等の死因は分からない。

当院の生存状況把握においても死亡患者の約半数近くは住民票照会の結果として把握された死亡数（46.3%）であり、また、自施設での死亡症例（45.7%）や他施設からの照会や報告によって死亡を確認している症例（8.0%）においても、癌以外の合併症や併存症などの他疾患での病死の症例も多く（自施設死亡症例：約10.3%（不明：1.6%）、他施設死亡症例：約2.5%（不明・情報なし：12.6%）、実測生存率のみで施設別の5年生存率を評価することについては注意が必要と考えられる。さらに施設別の5年生存率では、病期分類が進行した症例が多い施設では、5年生存率は低く、病期分類が進行してない手術適応症例が多い施設では、5年生存率は高くなるので、生存率を比較対象とするのではなく、観血的治療の実施割合や、病期分類の割合等で施設間の診療の特徴を比較できる報告書と考える。

・ また、観血的治療の実施割合についても、年齢や進行病期の割合だけでなく、個々の患者のPS（パフォーマンスステータス＝全身状態）や合併症や併存症の有無等によっても治療方針は左右されるので、本付表には表れない要素においても統合的に判断が必要と考えられる。

88 日本大学医学部附属板橋病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 260 | 128 | 0 | 100.0 | 50.8 | 44.5 | 56.7 | 71.0 |
| I期 | 159 | 51 | 0 | 100.0 | 67.9 | 60.1 | 74.6 | 73.0 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 69.6 |
| III期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 55.7 |
| IV期 | 59 | 57 | 0 | 100.0 | 3.4 | 0.6 | 10.4 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 191 | 69 | | | | | |
| % | 73.5 | 26.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 19 | 74 | 105 | 52 | | |
| % | 3.8 | 7.3 | 28.5 | 40.4 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 159 | 19 | 14 | 59 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 61.2 | 7.3 | 5.4 | 22.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | 190 | 182 | (7-9) | 0 | | |
| % | 26.9 | 73.1 | 70.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 121 | 108 | | | |
| % | | 8.5 | 46.5 | 41.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 239 | 112 | (4-6) | 97.9 | 52.7 | 46.1 | 58.8 | 67.2 |
| I期 | 53 | 15 | (1-3) | 98.1 | 71.7 | 57.5 | 81.9 | 69.8 |
| II期 | 57 | 16 | (1-3) | 98.2 | 71.5 | 57.7 | 81.4 | 65.1 |
| III期 | 61 | 27 | (1-3) | 98.4 | 55.7 | 42.5 | 67.1 | 68.9 |
| IV期 | 57 | 47 | (1-3) | 98.2 | 16.3 | 8.1 | 27.1 | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 159 | 80 | | | | | |
| % | 66.5 | 33.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 41 | 68 | 79 | 33 | | |
| % | 7.5 | 17.2 | 28.5 | 33.1 | 13.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | 57 | 61 | 57 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 22.2 | 23.8 | 25.5 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 196 | 181 | 15 | 0 | | |
| % | 18.0 | 82.0 | 75.7 | 6.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 17 | 81 | 125 | | | |
| % | 6.7 | 7.1 | 33.9 | 52.3 | | | |

88 日本大学医学部附属板橋病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 290 | 168 | (4-6) | 97.9 | 41.4 | 35.6 | 47.0 | 68.5 |
| I期 | 116 | 51 | (1-3) | 98.3 | 55.7 | 46.1 | 64.2 | 69.9 |
| II期 | 99 | 56 | (4-6) | 96.0 | 41.8 | 31.9 | 51.5 | 69.3 |
| III期 | 57 | 46 | 0 | 100.0 | 19.3 | 10.3 | 30.4 | 68.2 |
| IV期 | 17 | 15 | 0 | | | | | 64.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 対象数 | 212 | 78 | | | | | |
| % | 73.1 | 26.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 27 | 99 | 122 | 29 | | |
| % | 4.5 | 9.3 | 34.1 | 42.1 | 10.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 116 | 99 | 57 | 17 | 0 | (1-3) |
| | % | 40.0 | 34.1 | 19.7 | 5.9 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 48 | 103 | 81 | 50 | 0 | (1-3) |
| | % | 16.6 | 35.5 | 27.9 | 17.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 107 | 183 | 173 | 10 | 0 | | |
| % | 36.9 | 63.1 | 59.7 | 3.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 212 | 60 | | | |
| % | | 5.2 | 73.1 | 20.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 399 | 298 | (4-6) | 99.0 | 24.9 | 20.8 | 29.3 | 68.9 |
| I期 | 99 | 33 | (1-3) | 99.0 | 66.6 | 56.4 | 74.9 | 71.0 |
| II期 | 18 | 11 | 0 | | | | | 62.8 |
| III期 | 123 | 105 | (1-3) | 99.2 | 13.9 | 8.5 | 20.7 | 70.1 |
| IV期 | 154 | 146 | (1-3) | 99.4 | 4.6 | 2.0 | 8.7 | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 290 | 109 | 対象数 | | 44 | 355 |
| % | 72.7 | 27.3 | % | | 11.0 | 89.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 16 | 34 | 161 | 130 | 58 | |
| % | 4.0 | 8.5 | 40.4 | 32.6 | 14.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 99 | 18 | 123 | 154 | (1-3) | (1-3) |
| % | 24.8 | 4.5 | 30.8 | 38.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 300 | 99 | 93 | (4-6) | 0 | |
| % | 75.2 | 24.8 | 23.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 26 | 68 | 120 | 185 | | |
| % | 6.5 | 17.0 | 30.1 | 46.4 | | |

88 日本大学医学部附属板橋病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 439 | 74 | (1-3) | 99.3 | 83.1 | 79.2 | 86.3 | 59.9 |
| I期 | 226 | 22 | (1-3) | 99.1 | 90.2 | 85.5 | 93.5 | 62.1 |
| II期 | 126 | 15 | 0 | 100.0 | 88.1 | 81.0 | 92.7 | 57.3 |
| III期 | 46 | 13 | (1-3) | 97.8 | 71.3 | 55.7 | 82.2 | 58.1 |
| IV期 | 41 | 24 | 0 | 100.0 | 41.5 | 26.4 | 55.9 | 62.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 439 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 119 | 94 | 106 | 75 | 45 | | |
| % | 27.1 | 21.4 | 24.1 | 17.1 | 10.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 226 | 126 | 46 | 41 | 0 | 0 | |
| % | 51.5 | 28.7 | 10.5 | 9.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 393 | 384 | (7-9) | 0 | | |
| % | 10.5 | 89.5 | 87.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 106 | 19 | 58 | 256 | | | |
| % | 24.1 | 4.3 | 13.2 | 58.3 | | | |

89

武蔵野赤十字病院
2010－2011年2力年

コメント:

当院は東京都多摩地区にある総合病院です。主要5部位がんに関し、胃、大腸、肝、肺の平均年齢はどれも60歳代の前半であり10歳下に乳がんがあります。どれも著しい若年層は無く、年齢からは多少、地方型よりの医療圏にあると考えられるのではないのでしょうか。また大腸、肺がんの4期は1期と同数、約100症例あり厳しい状態の患者も受け入れており、地域住民に貢献する赤十字の使命を果たしていると考えます。

89 武蔵野赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 367 | 149 | 13 | 96.5 | 58.7 | 53.4 | 63.6 | 71.4 |
| I期 | 210 | 34 | (7-9) | 96.7 | 83.4 | 77.6 | 87.9 | 71.5 |
| II期 | 33 | 10 | (1-3) | 90.9 | 68.0 | 48.6 | 81.3 | 74.8 |
| III期 | 24 | 14 | (1-3) | | | | | 75.0 |
| IV期 | 92 | 89 | (1-3) | 98.9 | 2.4 | 0.5 | 7.4 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 252 | 115 | | | | | |
| % | 68.7 | 31.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 31 | 90 | 142 | 89 | | |
| % | 4.1 | 8.4 | 24.5 | 38.7 | 24.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 210 | 33 | 24 | 92 | 0 | (7-9) | |
| % | 57.2 | 9.0 | 6.5 | 25.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 90 | 277 | 266 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 24.5 | 75.5 | 72.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | 41 | 35 | 272 | | | |
| % | 5.2 | 11.2 | 9.5 | 74.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 398 | 147 | (7-9) | 97.7 | 62.6 | 57.6 | 67.2 | 70.4 |
| I期 | 99 | 16 | (1-3) | 99.0 | 83.7 | 74.7 | 89.7 | 72.0 |
| II期 | 101 | 19 | (4-6) | 96.0 | 80.7 | 71.4 | 87.2 | 71.4 |
| III期 | 94 | 25 | (1-3) | 97.9 | 73.1 | 62.9 | 81.0 | 70.6 |
| IV期 | 99 | 87 | (1-3) | 98.0 | 10.5 | 5.4 | 17.6 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 228 | 170 | | | | | |
| % | 57.3 | 42.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 38 | 112 | 146 | 81 | | |
| % | 5.3 | 9.5 | 28.1 | 36.7 | 20.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 99 | 101 | 94 | 99 | 0 | (4-6) | |
| % | 24.9 | 25.4 | 23.6 | 24.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 61 | 337 | 280 | 55 | (1-3) | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 70.4 | 13.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 47 | 34 | 288 | | | |
| % | 7.3 | 11.8 | 8.5 | 72.4 | | | |

89 武蔵野赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 300 | 187 | (7-9) | 97.0 | 36.3 | 30.8 | 41.8 | 72.1 |
| I期 | 143 | 71 | (4-6) | 97.2 | 49.7 | 41.2 | 57.6 | 73.4 |
| II期 | 89 | 57 | (1-3) | 97.8 | 34.6 | 24.8 | 44.5 | 71.1 |
| III期 | 47 | 40 | (1-3) | 95.7 | 11.2 | 4.1 | 22.2 | 73.8 |
| IV期 | 21 | 19 | (1-3) | | | | | 63.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|---|--|
| 対象数 | 187 | 113 | | | | | | |
| % | 62.3 | 37.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 23 | 80 | 123 | 69 | | | |
| % | | 7.7 | 26.7 | 41.0 | 23.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 143 | 89 | 47 | 21 | 0 | 0 | |
| | % | 47.7 | 29.7 | 15.7 | 7.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 76 | 110 | 64 | 50 | 0 | 0 | |
| | % | 25.3 | 36.7 | 21.3 | 16.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 287 | 13 | 11 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 95.7 | 4.3 | 3.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 75 | 217 | | | | |
| % | | | 25.0 | 72.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 332 | 226 | 10 | 97.0 | 30.6 | 25.6 | 35.7 | 71.1 |
| I期 | 114 | 33 | (4-6) | 96.5 | 70.6 | 61.2 | 78.1 | 70.8 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 75.3 |
| III期 | 86 | 71 | (1-3) | 96.5 | 14.7 | 8.1 | 23.2 | 71.7 |
| IV期 | 114 | 111 | (1-3) | 98.2 | 0.9 | 0.1 | 4.5 | 72.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 222 | 110 | 対象数 | | 34 | 298 |
| % | 66.9 | 33.1 | % | | 10.2 | 89.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 29 | 90 | 136 | 66 | |
| % | 3.3 | 8.7 | 27.1 | 41.0 | 19.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 114 | 12 | 86 | 114 | (1-3) | (4-6) |
| % | 34.3 | 3.6 | 25.9 | 34.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 226 | 106 | 98 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 68.1 | 31.9 | 29.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 16 | 53 | 56 | 207 | | |
| % | 4.8 | 16.0 | 16.9 | 62.3 | | |

89 武蔵野赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 311 | 51 | (4-6) | 98.1 | 83.5 | 78.9 | 87.2 | 62.7 |
| I期 | 141 | (7-9) | 0 | 100.0 | 93.6 | 88.1 | 96.6 | 62.8 |
| II期 | 100 | 11 | (4-6) | 96.0 | 88.9 | 80.9 | 93.7 | 63.8 |
| III期 | 49 | 15 | (1-3) | 95.9 | 69.2 | 54.1 | 80.1 | 61.2 |
| IV期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 59.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 311 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 63 | 61 | 76 | 65 | 46 | | |
| % | 20.3 | 19.6 | 24.4 | 20.9 | 14.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 141 | 100 | 49 | 17 | 0 | (4-6) | |
| % | 45.3 | 32.2 | 15.8 | 5.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 276 | 264 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 84.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | 33 | 12 | 228 | | | |
| % | 12.2 | 10.6 | 3.9 | 73.3 | | | |

90 **がん研有明病院**
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

90 がん研有明病院
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1656 | 393 | (7-9) | 99.5 | 76.2 | 74.1 | 78.2 | 64.8 |
| I期 | 1152 | 100 | (4-6) | 99.7 | 91.3 | 89.5 | 92.8 | 65.3 |
| II期 | 120 | 27 | 0 | 100.0 | 77.5 | 68.9 | 84.0 | 63.7 |
| III期 | 90 | 31 | (1-3) | 97.8 | 64.9 | 54.0 | 73.8 | 63.6 |
| IV期 | 257 | 215 | (1-3) | 99.2 | 15.9 | 11.7 | 20.6 | 61.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 1131 | 525 | | | | | |
| % | 68.3 | 31.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 182 | 286 | 582 | 459 | 147 | | |
| % | 11.0 | 17.3 | 35.1 | 27.7 | 8.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 1152 | 120 | 90 | 257 | 27 | 10 | |
| % | 69.6 | 7.2 | 5.4 | 15.5 | 1.6 | 0.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 183 | 1473 | 1395 | 76 | (1-3) | | |
| % | 11.1 | 88.9 | 84.2 | 4.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 289 | 292 | 422 | 653 | | | |
| % | 17.5 | 17.6 | 25.5 | 39.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1023 | 224 | (1-3) | 99.9 | 78.1 | 75.4 | 80.5 | 63.2 |
| I期 | 252 | 13 | 0 | 100.0 | 94.8 | 91.3 | 97.0 | 64.5 |
| II期 | 240 | 29 | (1-3) | 99.6 | 87.9 | 83.0 | 91.4 | 64.3 |
| III期 | 284 | 49 | 0 | 100.0 | 82.8 | 77.8 | 86.7 | 61.3 |
| IV期 | 195 | 126 | 0 | 100.0 | 35.4 | 28.7 | 42.1 | 63.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 586 | 437 | | | | | |
| % | 57.3 | 42.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 148 | 188 | 342 | 260 | 85 | | |
| % | 14.5 | 18.4 | 33.4 | 25.4 | 8.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 252 | 240 | 284 | 195 | (7-9) | 45 | |
| % | 24.6 | 23.5 | 27.8 | 19.1 | | 4.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 71 | 952 | 881 | 65 | (4-6) | | |
| % | 6.9 | 93.1 | 86.1 | 6.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 205 | 125 | 194 | 499 | | | |
| % | 20.0 | 12.2 | 19.0 | 48.8 | | | |

90 がん研有明病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 83 | 0 | 100.0 | 38.1 | 29.9 | 46.2 | 67.3 |
| I期 | 41 | 15 | 0 | 100.0 | 63.4 | 46.8 | 76.1 | 71.3 |
| II期 | 38 | 22 | 0 | 100.0 | 42.1 | 26.4 | 57.0 | 65.1 |
| III期 | 35 | 27 | 0 | 100.0 | 22.9 | 10.8 | 37.6 | 67.1 |
| IV期 | 17 | 17 | 0 | | | | | 63.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 97 | 37 | | | | | |
| % | 72.4 | 27.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 20 | 39 | 52 | 14 | | |
| % | | 14.9 | 29.1 | 38.8 | 10.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 41 | 38 | 35 | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 30.6 | 28.4 | 26.1 | 12.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 51 | 35 | 28 | (7-9) | 0 |
| | % | 9.7 | 38.1 | 26.1 | 20.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | 68 | 65 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 49.3 | 50.7 | 48.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 16 | 77 | 38 | | | |
| % | | 11.9 | 57.5 | 28.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 884 | 407 | 0 | 100.0 | 54.0 | 50.6 | 57.2 | 66.1 |
| I期 | 434 | 67 | 0 | 100.0 | 84.6 | 80.8 | 87.6 | 67.0 |
| II期 | 51 | 19 | 0 | 100.0 | 62.8 | 48.0 | 74.4 | 64.8 |
| III期 | 193 | 135 | 0 | 100.0 | 30.1 | 23.7 | 36.6 | 65.5 |
| IV期 | 198 | 183 | 0 | 100.0 | 7.6 | 4.4 | 11.8 | 63.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 511 | 373 | 対象数 | | 62 | 822 |
| % | 57.8 | 42.2 | % | | 7.0 | 93.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 60 | 130 | 359 | 267 | 68 | |
| % | 6.8 | 14.7 | 40.6 | 30.2 | 7.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 434 | 51 | 193 | 198 | (4-6) | (1-3) |
| % | 49.1 | 5.8 | 21.8 | 22.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 394 | 490 | 477 | 12 | (1-3) | |
| % | 44.6 | 55.4 | 54.0 | 1.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 80 | 226 | 327 | 251 | | |
| % | 9.0 | 25.6 | 37.0 | 28.4 | | |

90 がん研有明病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1714 | 97 | (1-3) | 99.8 | 94.3 | 93.1 | 95.3 | 53.8 |
| I期 | 881 | 16 | (1-3) | 99.9 | 98.2 | 97.1 | 98.9 | 54.7 |
| II期 | 632 | 38 | (1-3) | 99.8 | 94.0 | 91.8 | 95.6 | 52.5 |
| III期 | 157 | 19 | 0 | 100.0 | 87.9 | 81.7 | 92.1 | 54.4 |
| IV期 | 42 | 24 | (1-3) | 97.6 | 41.6 | 26.5 | 56.0 | 54.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 1714 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 720 | 413 | 376 | 170 | 35 | | |
| % | 42.0 | 24.1 | 21.9 | 9.9 | 2.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 881 | 632 | 157 | 42 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 51.4 | 36.9 | 9.2 | 2.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 56 | 1658 | 1646 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 3.3 | 96.7 | 96.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 488 | 136 | 277 | 813 | | | |
| % | 28.5 | 7.9 | 16.2 | 47.4 | | | |

91 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

今回の報告では、患者の全身状態、併存疾患などの有無・程度、直接の死因などの背景情報は考慮されておらず、単純に実測生存率のみが算出されています。当院のように、重症患者、併存疾患の多い患者、高齢患者などを数多く扱っている施設や、治療が困難ながんの症例を積極的に受け入れている施設では、同じステージであっても生存率の数値は低く出てしまいます。今回の公表にあたり、くれぐれも施設別集計値の数字の単純比較によって施設間の治療成績の比較を行うことは避けていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、同じステージであっても、治療法の違いによっても生存率に違いが出ますので、治療法別の生存率のデータもあった方が望ましいと考えます。

91 国立大学法人 東京大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 581 | 183 | 34 | 94.1 | 67.3 | 63.2 | 71.0 | 68.5 |
| I期 | 401 | 54 | 25 | 93.8 | 86.0 | 82.1 | 89.1 | 69.0 |
| II期 | 44 | 19 | (1-3) | 97.7 | 55.8 | 39.9 | 69.1 | 69.2 |
| III期 | 31 | 19 | (1-3) | 93.5 | 35.7 | 19.1 | 52.7 | 67.2 |
| IV期 | 99 | 89 | (4-6) | 93.9 | 4.4 | 1.4 | 10.0 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 405 | 176 | | | | | |
| % | 69.7 | 30.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 83 | 176 | 213 | 80 | | |
| % | 5.0 | 14.3 | 30.3 | 36.7 | 13.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 401 | 44 | 31 | 99 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 69.0 | 7.6 | 5.3 | 17.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 77 | 504 | 461 | 34 | (7-9) | | |
| % | 13.3 | 86.7 | 79.3 | 5.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 114 | 240 | 213 | | | |
| % | 2.4 | 19.6 | 41.3 | 36.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 435 | 112 | 20 | 95.4 | 73.3 | 68.8 | 77.3 | 67.7 |
| I期 | 145 | 20 | (4-6) | 95.9 | 85.7 | 78.7 | 90.5 | 67.9 |
| II期 | 104 | 24 | (1-3) | 97.1 | 76.6 | 67.2 | 83.7 | 69.9 |
| III期 | 103 | 23 | (1-3) | 99.0 | 77.5 | 68.1 | 84.5 | 68.5 |
| IV期 | 65 | 42 | (7-9) | 89.2 | 28.8 | 17.9 | 40.6 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 264 | 171 | | | | | |
| % | 60.7 | 39.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 62 | 141 | 144 | 60 | | |
| % | 6.4 | 14.3 | 32.4 | 33.1 | 13.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 145 | 104 | 103 | 65 | (4-6) | 14 | |
| % | 33.3 | 23.9 | 23.7 | 14.9 | | 3.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 382 | 341 | 27 | 14 | | |
| % | 12.2 | 87.8 | 78.4 | 6.2 | 3.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 72 | 120 | 231 | | | |
| % | 2.8 | 16.6 | 27.6 | 53.1 | | | |

91 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 410 | 182 | 28 | 93.2 | 53.5 | 48.4 | 58.3 | 69.2 |
| I期 | 205 | 68 | 16 | 92.2 | 64.8 | 57.6 | 71.1 | 70.7 |
| II期 | 138 | 58 | (7-9) | 94.9 | 56.9 | 48.0 | 64.7 | 67.2 |
| III期 | 40 | 35 | (1-3) | 92.5 | 5.5 | 1.0 | 16.0 | 69.0 |
| IV期 | 19 | 18 | (1-3) | | | | | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 対象数 | 274 | 136 | | | | | | |
| % | 66.8 | 33.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 21 | 49 | 111 | 169 | 60 | | | |
| % | 5.1 | 12.0 | 27.1 | 41.2 | 14.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 205 | 138 | 40 | 19 | (4-6) | (4-6) | |
| | % | 50.0 | 33.7 | 9.8 | 4.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 89 | 178 | 91 | 38 | 10 | (4-6) | |
| | % | 21.7 | 43.4 | 22.2 | 9.3 | 2.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 285 | 125 | 90 | 25 | 10 | | | |
| % | 69.5 | 30.5 | 22.0 | 6.1 | 2.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 28 | 330 | 51 | | | | |
| % | | 6.8 | 80.5 | 12.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 374 | 187 | 28 | 92.5 | 47.0 | 41.7 | 52.1 | 70.0 |
| I期 | 215 | 63 | 15 | 93.0 | 69.2 | 62.3 | 75.0 | 69.9 |
| II期 | 22 | 17 | (1-3) | | | | | 73.6 |
| III期 | 62 | 47 | 0 | 100.0 | 24.2 | 14.4 | 35.3 | 69.5 |
| IV期 | 71 | 58 | 11 | 84.5 | 3.7 | 0.7 | 11.3 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 237 | 137 | 対象数 | | 25 | 349 | |
| % | 63.4 | 36.6 | % | | 6.7 | 93.3 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 40 | 103 | 142 | 72 | | |
| % | 4.5 | 10.7 | 27.5 | 38.0 | 19.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 215 | 22 | 62 | 71 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 57.5 | 5.9 | 16.6 | 19.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 149 | 225 | 206 | 14 | (4-6) | | |
| % | 39.8 | 60.2 | 55.1 | 3.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 87 | 201 | 84 | | | |
| % | | 23.3 | 53.7 | 22.5 | | | |

91 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 307 | 38 | 10 | 96.7 | 87.3 | 83.0 | 90.6 | 57.4 |
| I期 | 131 | 11 | (1-3) | 99.2 | 91.6 | 85.3 | 95.2 | 58.8 |
| II期 | 127 | (7-9) | (4-6) | 95.3 | 92.7 | 86.5 | 96.1 | 55.1 |
| III期 | 35 | (7-9) | (1-3) | 94.3 | 78.8 | 60.6 | 89.3 | 66.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 58.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 307 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 109 | 56 | 69 | 53 | 20 | | |
| % | 35.5 | 18.2 | 22.5 | 17.3 | 6.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 131 | 127 | 35 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 42.7 | 41.4 | 11.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 287 | 245 | 30 | 12 | | |
| % | 6.5 | 93.5 | 79.8 | 9.8 | 3.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 71 | 29 | 76 | 131 | | | |
| % | 23.1 | 9.4 | 24.8 | 42.7 | | | |

92 日本医科大学付属病院
2010-2011年2力年

コメント:

施設別生存率は、対象患者の併存疾患の有無や健康状態など、患者背景により大きく影響を受ける。その為、本集計が単純にがん治療の成績とはならない点に注意する必要があり、現段階では公表を差し控える。

93

聖路加国際病院

2010-2011年2力年

コメント:

生存率については大腸癌を除き、全体平均より数%高い傾向にある。疾病分布や発見経緯に特徴がみられ、生存率の差が生じている可能性がある。胃癌、大腸癌、肺癌、乳癌ともに発見経緯として健診・人間ドックの占める割合が全国平均に比べると高く、I期がやや多い傾向にある。東京都市部に存在し、年齢層が若く健康意識の高い健診受診者が多いことと健診施設が併設されていることが理由としてあげられる。疾病分布として乳癌が全がんの約半分を占めており、中でも50歳未満の若い年齢層の患者が多い。

93 聖路加国際病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 255 | 73 | (7-9) | 96.9 | 71.2 | 65.2 | 76.3 | 69.5 |
| I期 | 173 | 18 | (4-6) | 97.1 | 89.5 | 83.9 | 93.3 | 69.2 |
| II期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 70.4 |
| III期 | 17 | 10 | (1-3) | | | | | 73.5 |
| IV期 | 37 | 33 | (1-3) | 97.3 | 8.5 | 2.2 | 20.4 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 179 | 76 | | | | | |
| % | 70.2 | 29.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 28 | 91 | 82 | 46 | | |
| % | | 11.0 | 35.7 | 32.2 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 173 | 14 | 17 | 37 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 67.8 | 5.5 | 6.7 | 14.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 220 | 207 | 13 | 0 | | |
| % | 13.7 | 86.3 | 81.2 | 5.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 67 | 98 | 82 | | | |
| % | | 26.3 | 38.4 | 32.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 211 | 64 | 10 | 95.3 | 69.0 | 62.2 | 74.8 | 68.1 |
| I期 | 70 | (4-6) | (4-6) | 94.3 | 92.8 | 83.5 | 96.9 | 68.1 |
| II期 | 48 | 14 | (1-3) | 95.8 | 70.1 | 54.8 | 81.1 | 68.7 |
| III期 | 44 | 13 | (1-3) | 97.7 | 70.0 | 54.0 | 81.4 | 70.4 |
| IV期 | 35 | 30 | (1-3) | 97.1 | 11.9 | 3.8 | 25.0 | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 100 | 111 | | | | | |
| % | 47.4 | 52.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 35 | 52 | 61 | 45 | | |
| % | 8.5 | 16.6 | 24.6 | 28.9 | 21.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 70 | 48 | 44 | 35 | 0 | 14 | |
| % | 33.2 | 22.7 | 20.9 | 16.6 | | 6.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 198 | 174 | 24 | 0 | | |
| % | 6.2 | 93.8 | 82.5 | 11.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 52 | 65 | 83 | | | |
| % | 5.2 | 24.6 | 30.8 | 39.3 | | | |

93 聖路加国際病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 56 | 32 | (1-3) | 94.6 | 41.4 | 28.2 | 54.0 | 69.0 |
| I期 | 28 | 13 | (1-3) | | | | | 70.7 |
| II期 | 14 | (7-9) | (1-3) | | | | | 67.3 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 54.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 63.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 37 | 19 | | | | | | |
| % | 66.1 | 33.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 15 | 23 | 11 | | | |
| % | | | 26.8 | 41.1 | 19.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 14 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 50.0 | 25.0 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 19 | 23 | (4-6) | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| | % | 33.9 | 41.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 40 | 16 | 16 | 0 | 0 | | | |
| % | 71.4 | 28.6 | 28.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 39 | 13 | | | | |
| % | | | 69.6 | 23.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 174 | 95 | (4-6) | 97.1 | 44.8 | 37.2 | 52.1 | 68.8 |
| I期 | 87 | 19 | (1-3) | 96.6 | 77.9 | 67.5 | 85.3 | 67.8 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |
| III期 | 21 | 15 | (1-3) | | | | | 61.6 |
| IV期 | 56 | 53 | (1-3) | 98.2 | 3.7 | 0.7 | 11.2 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 107 | 67 | | (4-6) | 168 | |
| % | 61.5 | 38.5 | | | 96.6 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 12 | 28 | 49 | 44 | 41 | |
| % | 6.9 | 16.1 | 28.2 | 25.3 | 23.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 87 | (4-6) | 21 | 56 | (4-6) | 0 |
| % | 50.0 | | 12.1 | 32.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 115 | 59 | 58 | (1-3) | 0 | |
| % | 66.1 | 33.9 | 33.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 55 | 64 | 54 | | |
| % | | 31.6 | 36.8 | 31.0 | | |

93 聖路加国際病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1070 | 79 | 30 | 97.2 | 92.5 | 90.8 | 94.0 | 51.9 |
| I期 | 481 | 10 | 10 | 97.9 | 97.9 | 96.1 | 98.9 | 51.5 |
| II期 | 475 | 34 | 16 | 96.6 | 92.7 | 90.0 | 94.8 | 51.6 |
| III期 | 77 | (7-9) | (4-6) | 94.8 | 89.2 | 79.6 | 94.5 | 51.3 |
| IV期 | 35 | 26 | 0 | 100.0 | 25.7 | 12.8 | 40.8 | 51.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 1070 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 532 | 257 | 183 | 78 | 20 | | |
| % | 49.7 | 24.0 | 17.1 | 7.3 | 1.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 481 | 475 | 77 | 35 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.0 | 44.4 | 7.2 | 3.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 64 | 1006 | 1004 | (1-3) | 0 | | |
| % | 6.0 | 94.0 | 93.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 261 | 114 | 122 | 573 | | | |
| % | 24.4 | 10.7 | 11.4 | 53.6 | | | |

帝京大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院は都西北医療圏のがん診療の中核を担う地域がん診療連携拠点病院（高度型）、地域の基幹病院として高齢者や救急搬送、緊急手術を要する患者を含め、当院での診療が可能な患者を受けいています。年齢や併存疾患の有無に関わりなく、手術療法・薬物療法・放射線療法および緩和医療を含め適切ながん診療を提供しています。

生存率は、年齢および併存疾患の有無、重症度、発見経緯などにより影響を受けるため、施設間での優劣の評価やランキング形式などにより比較提示することは適さないと考えます。例えば、臨床病期I期とIV期の生存率がいずれも高い医療機関であっても、診療機能においてIV期の患者の診療の比率が相対的に大きい場合、その医療機関の全体の病期における生存率が低く算出されます。この点に十分留意しデータを取り扱う必要があり、患者さんご家族の不安を招くような不適切な利用や提示は好ましくないと考えています。

医療は日々向上しており、治療内容や方針についてご心配なことがありましたら、担当医にご相談されることをお勧めいたします。

94 帝京大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 275 | 122 | (4-6) | 98.2 | 55.4 | 49.3 | 61.0 | 70.7 |
| I期 | 170 | 33 | (4-6) | 97.6 | 80.5 | 73.6 | 85.7 | 70.7 |
| II期 | 18 | 10 | 0 | | | | | 70.1 |
| III期 | 24 | 21 | 0 | | | | | 71.9 |
| IV期 | 53 | 50 | (1-3) | 98.1 | 4.0 | 0.7 | 12.0 | 65.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 207 | 68 | | | | | |
| % | 75.3 | 24.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 85 | 116 | 44 | | |
| % | | 7.6 | 30.9 | 42.2 | 16.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 170 | 18 | 24 | 53 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 61.8 | 6.5 | 8.7 | 19.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 223 | 206 | 16 | (1-3) | | |
| % | 18.9 | 81.1 | 74.9 | 5.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 30 | 110 | 123 | | | |
| % | 4.4 | 10.9 | 40.0 | 44.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 333 | 131 | (4-6) | 98.2 | 60.3 | 54.8 | 65.4 | 67.6 |
| I期 | 79 | 17 | (1-3) | 96.2 | 78.1 | 67.1 | 85.8 | 67.1 |
| II期 | 96 | 24 | (1-3) | 97.9 | 74.9 | 64.9 | 82.4 | 70.0 |
| III期 | 77 | 29 | (1-3) | 98.7 | 61.9 | 50.0 | 71.7 | 67.3 |
| IV期 | 64 | 52 | 0 | 100.0 | 18.8 | 10.3 | 29.1 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 204 | 129 | | | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 43 | 99 | 116 | 48 | | |
| % | 8.1 | 12.9 | 29.7 | 34.8 | 14.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 79 | 96 | 77 | 64 | 10 | (7-9) | |
| % | 23.7 | 28.8 | 23.1 | 19.2 | 3.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 290 | 251 | 28 | 11 | | |
| % | 12.9 | 87.1 | 75.4 | 8.4 | 3.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 33 | 110 | 165 | | | |
| % | 7.5 | 9.9 | 33.0 | 49.5 | | | |

94 帝京大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 119 | 79 | (1-3) | 98.3 | 32.7 | 24.4 | 41.3 | 69.2 |
| I期 | 56 | 29 | (1-3) | 98.2 | 47.5 | 33.9 | 59.9 | 69.5 |
| II期 | 24 | 14 | (1-3) | | | | | 72.5 |
| III期 | 27 | 25 | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 86 | 33 | | | | | | |
| % | 72.3 | 27.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 38 | 48 | 18 | | | |
| % | | | 31.9 | 40.3 | 15.1 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 56 | 24 | 27 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 47.1 | 20.2 | 22.7 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 24 | 42 | 24 | 23 | (4-6) | (1-3) | |
| | % | 20.2 | 35.3 | 20.2 | 19.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 72 | 47 | 40 | (7-9) | 0 | | | |
| % | 60.5 | 39.5 | 33.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 78 | 34 | | | | |
| % | | | 65.5 | 28.6 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 320 | 232 | (4-6) | 98.1 | 26.5 | 21.7 | 31.5 | 70.6 |
| I期 | 89 | 34 | (1-3) | 98.9 | 61.5 | 50.6 | 70.8 | 72.5 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 64.5 |
| III期 | 92 | 74 | (1-3) | 97.8 | 18.0 | 10.9 | 26.6 | 70.8 |
| IV期 | 123 | 115 | (1-3) | 97.6 | 4.5 | 1.7 | 9.4 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 211 | 109 | 対象数 | | 24 | 296 |
| % | 65.9 | 34.1 | % | | 7.5 | 92.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 24 | 109 | 128 | 53 | |
| % | | 7.5 | 34.1 | 40.0 | 16.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 89 | 12 | 92 | 123 | (1-3) | (1-3) |
| % | 27.8 | 3.8 | 28.8 | 38.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 212 | 108 | 100 | (7-9) | 0 | |
| % | 66.3 | 33.8 | 31.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 10 | 37 | 110 | 163 | | |
| % | 3.1 | 11.6 | 34.4 | 50.9 | | |

94 帝京大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 233 | 28 | (7-9) | 96.6 | 87.8 | 82.9 | 91.4 | 57.2 |
| I期 | 91 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.6 | 88.7 | 98.3 | 56.1 |
| II期 | 99 | (4-6) | (7-9) | 92.9 | 95.8 | 89.2 | 98.4 | 57.4 |
| III期 | 22 | (4-6) | (1-3) | | | | | 60.5 |
| IV期 | 20 | 14 | 0 | | | | | 65.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 233 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 82 | 50 | 58 | 24 | 19 | | |
| % | 35.2 | 21.5 | 24.9 | 10.3 | 8.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 91 | 99 | 22 | 20 | 0 | (1-3) | |
| % | 39.1 | 42.5 | 9.4 | 8.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 206 | 177 | 23 | (4-6) | | |
| % | 11.6 | 88.4 | 76.0 | 9.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 62 | 14 | 46 | 111 | | | |
| % | 26.6 | 6.0 | 19.7 | 47.6 | | | |

95 杏林大学医学部付属病院
2010-2011年2力年

コメント:

2010年、2011年の登録数は前年より増加している。
しかし、この2-3年の登録数からみると依然少なく、実際の状況を十分反映していないと考えられる。
したがって、このデータはあくまでも参考値として参照するにとどめ、実情との乖離がある可能性を理解して頂きたい。
また大学病院の特徴として合併症を併発している患者や高齢患者が多く、患者背景が生存期間等の治療成績に影響している可能性があると考え

95 杏林大学医学部付属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 417 | 187 | 10 | 97.6 | 54.5 | 49.6 | 59.2 | 71.5 |
| I期 | 249 | 56 | (7-9) | 96.8 | 77.0 | 71.2 | 81.8 | 71.4 |
| II期 | 32 | 13 | (1-3) | 96.9 | 58.5 | 39.4 | 73.4 | 75.0 |
| III期 | 40 | 26 | 0 | 100.0 | 35.0 | 20.8 | 49.6 | 68.7 |
| IV期 | 90 | 87 | (1-3) | 98.9 | 2.3 | 0.4 | 7.1 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 290 | 127 | | | | | |
| % | 69.5 | 30.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 39 | 92 | 165 | 103 | | |
| % | 4.3 | 9.4 | 22.1 | 39.6 | 24.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 249 | 32 | 40 | 90 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 59.7 | 7.7 | 9.6 | 21.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 136 | 281 | 264 | 17 | 0 | | |
| % | 32.6 | 67.4 | 63.3 | 4.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 71 | 144 | 196 | | | |
| % | | 17.0 | 34.5 | 47.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 417 | 146 | (4-6) | 98.8 | 64.8 | 60.0 | 69.2 | 69.9 |
| I期 | 132 | 14 | (1-3) | 97.7 | 89.3 | 82.6 | 93.5 | 72.2 |
| II期 | 107 | 23 | 0 | 100.0 | 78.5 | 69.5 | 85.2 | 69.7 |
| III期 | 80 | 28 | (1-3) | 98.8 | 64.7 | 53.1 | 74.1 | 67.1 |
| IV期 | 87 | 76 | (1-3) | 98.9 | 11.7 | 6.0 | 19.4 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 245 | 172 | | | | | |
| % | 58.8 | 41.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 36 | 118 | 155 | 81 | | |
| % | 6.5 | 8.6 | 28.3 | 37.2 | 19.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 132 | 107 | 80 | 87 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 31.7 | 25.7 | 19.2 | 20.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | 351 | 327 | 18 | (4-6) | | |
| % | 15.8 | 84.2 | 78.4 | 4.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 103 | 96 | 211 | | | |
| % | | 24.7 | 23.0 | 50.6 | | | |

95 杏林大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | 53 | (1-3) | 96.0 | 26.6 | 17.1 | 37.2 | 70.5 |
| I期 | 23 | 11 | 0 | | | | | 66.6 |
| II期 | 17 | 12 | (1-3) | | | | | 69.2 |
| III期 | 23 | 19 | (1-3) | | | | | 73.7 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 46 | 29 | | | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 20 | 34 | 12 | | |
| % | | | 26.7 | 45.3 | 16.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 23 | 17 | 23 | 11 | 0 | (1-3) |
| | % | 30.7 | 22.7 | 30.7 | 14.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 26 | 14 | 22 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 14.7 | 34.7 | 18.7 | 29.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 61 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| % | 81.3 | 18.7 | 18.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 48 | 19 | | | |
| % | | | 64.0 | 25.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 445 | 279 | 11 | 97.5 | 35.9 | 31.4 | 40.5 | 69.6 |
| I期 | 158 | 38 | (1-3) | 99.4 | 75.8 | 68.3 | 81.8 | 70.3 |
| II期 | 30 | 15 | (1-3) | 93.3 | 46.6 | 27.7 | 63.5 | 73.8 |
| III期 | 83 | 63 | (1-3) | 97.6 | 22.6 | 14.2 | 32.2 | 70.0 |
| IV期 | 170 | 159 | (4-6) | 96.5 | 3.1 | 1.2 | 6.7 | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 291 | 154 | 対象数 | | 49 | 396 |
| % | 65.4 | 34.6 | % | | 11.0 | 89.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 22 | 43 | 146 | 148 | 86 | |
| % | 4.9 | 9.7 | 32.8 | 33.3 | 19.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 158 | 30 | 83 | 170 | (1-3) | (1-3) |
| % | 35.5 | 6.7 | 18.7 | 38.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 251 | 194 | 188 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 56.4 | 43.6 | 42.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 11 | 115 | 134 | 185 | | |
| % | 2.5 | 25.8 | 30.1 | 41.6 | | |

95 杏林大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 428 | 53 | 12 | 97.2 | 87.4 | 83.9 | 90.3 | 60.0 |
| I期 | 158 | (7-9) | (4-6) | 97.5 | 95.5 | 90.8 | 97.8 | 59.4 |
| II期 | 185 | 16 | (4-6) | 96.8 | 91.2 | 86.0 | 94.5 | 62.0 |
| III期 | 45 | 12 | 0 | 100.0 | 73.3 | 57.9 | 83.9 | 59.0 |
| IV期 | 18 | 11 | (1-3) | | | | | 53.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 428 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 122 | 78 | 108 | 76 | 44 | | |
| % | 28.5 | 18.2 | 25.2 | 17.8 | 10.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 158 | 185 | 45 | 18 | 21 | (1-3) | |
| % | 36.9 | 43.2 | 10.5 | 4.2 | 4.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 104 | 324 | 317 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 24.3 | 75.7 | 74.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 75 | 36 | 54 | 263 | | | |
| % | 17.5 | 8.4 | 12.6 | 61.4 | | | |

コメント:

【乳房】

乳がんはある程度の大きさに達すると、自己触診で触れることのできるがんではあるが、より治療率が高い早期に発見するためには、自覚症状のない時期の検診が勧められている。本解析からは、当院の乳がんの20%ほどを占める0期の乳がんが除かれているが、0期の乳がんにも求められる治療は手術（観血的治療）のみである一方で、I期～III期の乳がんの多くは、観血的治療+薬物療法が求められる。IV期の乳がんは、薬物療法が主体となる。本統計における、観血的治療の実施率91.8%（640件）、観血的治療実施無8.2%（57件）は、IV期と切除困難なIII期を含む進行乳がんが約8%を占めているということを表している。

今回の特徴は、前回と同様以下の通りである。高齢化の波で、60歳代の罹患が全国的に増えているのに対して、都会にある病院の特徴として、世代別では50歳未満が依然一番頻度が高く（35.9%）、ステージIIにモードがあること、ステージI、IIは、5年生存率が93%以上あることに着目してほしい。ステージIIIになると74.5%に激減するため、早期発見（ステージIIまで）を強調する意味がここで示されたと言えよう。前回との違いは、いずれのステージも生存率が僅かながら（3%程度）ではあるものの上昇していることである。

【胃がん】

当院の胃がん全体の5年生存率は66.5%であり、全国平均の61.5%を上回っている。当院は大学病院であるため併存疾患合併例が多く、他疾患観察中に胃がんと診断されたケースが38.5%を占める。また、胃がんのリスクが高い疾患患者に対し、定期的に上部消化管内視鏡などの検査を行い、早期発見に努めていることもあり、I期が全体の68.1%と最も多く、II～IV期は全国と比較して少ない。また、胃がんと診断されて観血的治療が行われた割合は88.5%（全国平均80.5%）および治癒切除が行われた割合は79.4%（全国平均74.7%）と全国平均よりも高いことも特徴である。

【肺がん】

当院の肺がん患者の属性の特徴としてはStage I（当院53.7%、全国データ37.7%）が多く、そのためあっても観血的治療実施率も高い（当院72.5%、全国データ43.3%）。またStage別の5年生存率についてもStage I: 81.4% vs 71.2%、Stage II: 65.1% vs 40.8%、Stage III: 30.0% vs 20.1%、Stage IV: 6.1% vs 4.7%（それぞれ当院データ vs 全国データ）と、いずれのStageにおいても良好な成績であり、診療科横断的な協力が必要な肺がん治療において集学的な治療が行われた結果を示しているものと考えられる。

【大腸がん】

当院の大腸がんに対する観血的治療は91.5%と高い実施率を示し、その約60%では腹腔鏡による低侵襲手術が行われている。また観血的治療が行われた症例における治癒切除も78.5%と良好である。5年実測生存率はI～IV期すべてにおいて全国水準を上回っており、IV期の症例に対しても手術治療（原発巣・転移巣切除）に加え、化学療法や放射線療法による多診療科連携による集学的治療を行い、実測生存率は26.1%と高い値を示している。

【肝臓がん】

肝細胞がんはB型およびC型肝炎を背景として発症することが多く、他疾患観察中の発見が多いのはこれらウイルス性肝炎のフォローアップ中に見つかることが多いためと思われる。肝がんの進行度や肝機能を評価して、肝切除、ラジオ波焼灼術、肝動脈塞栓術等の適切な治療を行っている。また、近年では非アルコール性脂肪性肝炎などを背景とした、肝細胞がんも増加している。これらの症例は従来の肝炎ウイルス由来肝細胞がんとは異なり、高リスク群としてフォローアップされていないため、より大きなサイズで発見されることが多い、肝機能が正常であることが多い、といった特徴がある。3cmを超える腫瘍では手術が他の治療法より治療成績が優れている。症例の多い施設で行えば肝切除は安全であり腹腔鏡手術などの低侵襲手術も選択可能である。肝機能が保たれていて大きな肝細胞がんに対する肝切除の果たす役割は大きい。

2010-11年当時は肝切除や肝動脈塞栓術を中心とした治療を行ない、観血的治療の実施率は43.5%で、各病期の5年生存率はおおむね全国平均と同様であった。2013年以降はラジオ波焼灼術が急激に増え、最近ではマイクロ波焼灼術や肝動注化学療法、分子標的薬治療の症例も多い。

96 順天堂大学医学部附属順天堂医院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 611 | 201 | 22 | 96.4 | 66.5 | 62.6 | 70.2 | 68.3 |
| I期 | 416 | 75 | 16 | 96.2 | 81.6 | 77.5 | 85.1 | 68.6 |
| II期 | 38 | 16 | (1-3) | 94.7 | 57.4 | 40.1 | 71.4 | 71.2 |
| III期 | 23 | 15 | 0 | | | | | 72.1 |
| IV期 | 101 | 91 | (4-6) | 96.0 | 6.6 | 2.7 | 12.8 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 438 | 173 | | | | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 35 | 71 | 194 | 234 | 77 | | |
| % | 5.7 | 11.6 | 31.8 | 38.3 | 12.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 416 | 38 | 23 | 101 | 0 | 33 | |
| % | 68.1 | 6.2 | 3.8 | 16.5 | | 5.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | 541 | 485 | 40 | 16 | | |
| % | 11.5 | 88.5 | 79.4 | 6.5 | 2.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 125 | 235 | 221 | | | |
| % | 4.9 | 20.5 | 38.5 | 36.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 437 | 123 | 14 | 96.8 | 71.4 | 66.8 | 75.4 | 66.0 |
| I期 | 138 | 17 | (7-9) | 94.2 | 87.3 | 80.3 | 91.9 | 68.4 |
| II期 | 92 | 16 | (4-6) | 95.7 | 82.1 | 72.4 | 88.6 | 67.7 |
| III期 | 108 | 30 | 0 | 100.0 | 72.2 | 62.7 | 79.7 | 65.4 |
| IV期 | 80 | 58 | (1-3) | 97.5 | 26.1 | 17.0 | 36.2 | 62.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 260 | 177 | | | | | |
| % | 59.5 | 40.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 45 | 62 | 149 | 133 | 48 | | |
| % | 10.3 | 14.2 | 34.1 | 30.4 | 11.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 138 | 92 | 108 | 80 | (1-3) | 16 | |
| % | 31.6 | 21.1 | 24.7 | 18.3 | | 3.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 400 | 343 | 37 | 20 | | |
| % | 8.5 | 91.5 | 78.5 | 8.5 | 4.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | 54 | 107 | 218 | | | |
| % | 13.3 | 12.4 | 24.5 | 49.9 | | | |

96 順天堂大学医学部附属順天堂医院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 186 | 111 | (4-6) | 97.3 | 39.5 | 32.4 | 46.5 | 68.5 |
| I期 | 74 | 29 | (1-3) | 97.3 | 60.1 | 48.0 | 70.3 | 70.2 |
| II期 | 57 | 34 | (1-3) | 98.2 | 40.1 | 27.4 | 52.5 | 70.0 |
| III期 | 42 | 36 | (1-3) | 95.2 | 11.0 | 3.6 | 23.2 | 66.8 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 63.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 126 | 60 | | | | | |
| % | 67.7 | 32.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 26 | 46 | 84 | 19 | | |
| % | 5.9 | 14.0 | 24.7 | 45.2 | 10.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 74 | 57 | 42 | 11 | 0 | (1-3) |
| | % | 39.8 | 30.6 | 22.6 | 5.9 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 83 | 47 | 37 | | (1-3) |
| | % | 9.7 | 44.6 | 25.3 | 19.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 105 | 81 | 65 | 12 | | (4-6) | |
| % | 56.5 | 43.5 | 34.9 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 131 | 45 | | | |
| % | | 5.4 | 70.4 | 24.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 723 | 316 | 32 | 95.6 | 55.2 | 51.4 | 58.7 | 66.8 |
| I期 | 374 | 68 | 14 | 96.3 | 81.4 | 77.0 | 85.1 | 67.3 |
| II期 | 38 | 13 | (1-3) | 97.4 | 65.1 | 47.6 | 78.1 | 68.3 |
| III期 | 185 | 125 | 10 | 94.6 | 30.0 | 23.4 | 36.8 | 67.4 |
| IV期 | 120 | 107 | (7-9) | 94.2 | 6.1 | 2.6 | 11.7 | 68.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 434 | 289 | 対象数 | | 44 | 679 | |
| % | 60.0 | 40.0 | % | | 6.1 | 93.9 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 58 | 100 | 244 | 234 | 87 | | |
| % | 8.0 | 13.8 | 33.7 | 32.4 | 12.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 374 | 38 | 185 | 120 | 0 | (4-6) | |
| % | 51.7 | 5.3 | 25.6 | 16.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 199 | 524 | 480 | 22 | 22 | | |
| % | 27.5 | 72.5 | 66.4 | 3.0 | 3.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 41 | 184 | 263 | 235 | | | |
| % | 5.7 | 25.4 | 36.4 | 32.5 | | | |

96 順天堂大学医学部附属順天堂医院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 697 | 66 | 21 | 97.0 | 90.4 | 87.9 | 92.4 | 56.0 |
| I期 | 259 | (7-9) | (7-9) | 96.5 | 96.5 | 93.3 | 98.1 | 57.4 |
| II期 | 333 | 21 | (7-9) | 97.9 | 93.6 | 90.4 | 95.8 | 56.0 |
| III期 | 81 | 20 | (4-6) | 93.8 | 74.5 | 63.3 | 82.7 | 60.0 |
| IV期 | 18 | 14 | 0 | | | | | 56.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 697 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 250 | 167 | 153 | 99 | 28 | | |
| % | 35.9 | 24.0 | 22.0 | 14.2 | 4.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 259 | 333 | 81 | 18 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 37.2 | 47.8 | 11.6 | 2.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 57 | 640 | 523 | 112 | (4-6) | | |
| % | 8.2 | 91.8 | 75.0 | 16.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 226 | 54 | 52 | 365 | | | |
| % | 32.4 | 7.7 | 7.5 | 52.4 | | | |

97 昭和大学病院
2011年のみ

コメント:

当院では自施設の最終来院日と死亡日、さらに予後調査支援事業に参加して生存状況の把握を行っています。自治体によっては協力が得られないことなどの理由により、2010年は生存状況把握率が90%未満(89.8%)となりました。2011年以降は生存状況把握率が90%以上に達しています。引き続き正常状況把握率の向上に努めます。

97 昭和大学病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 189 | 90 | (4-6) | 97.9 | 51.8 | 44.4 | 58.7 | 71.5 |
| I期 | 123 | 31 | (4-6) | 96.7 | 74.2 | 65.4 | 81.1 | 71.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 67.3 |
| III期 | 17 | 13 | 0 | | | | | 75.4 |
| IV期 | 39 | 38 | 0 | 100.0 | 2.6 | 0.2 | 11.5 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 141 | 48 | | | | | |
| % | 74.6 | 25.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 50 | 71 | 46 | | |
| % | | 8.5 | 26.5 | 37.6 | 24.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 123 | (7-9) | 17 | 39 | (1-3) | 0 | |
| % | 65.1 | | 9.0 | 20.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 139 | 124 | 11 | (4-6) | | |
| % | 26.5 | 73.5 | 65.6 | 5.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 20 | 74 | 85 | | | |
| % | 5.3 | 10.6 | 39.2 | 45.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 176 | 72 | (7-9) | 94.9 | 58.5 | 50.7 | 65.4 | 70.9 |
| I期 | 52 | 12 | (1-3) | 96.2 | 76.7 | 62.6 | 86.0 | 71.2 |
| II期 | 49 | 17 | (1-3) | 95.9 | 64.4 | 49.1 | 76.2 | 74.0 |
| III期 | 40 | 17 | (4-6) | 87.5 | 56.6 | 39.6 | 70.4 | 69.0 |
| IV期 | 26 | 23 | 0 | | | | | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 100 | 76 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 17 | 43 | 59 | 47 | | |
| % | 5.7 | 9.7 | 24.4 | 33.5 | 26.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 52 | 49 | 40 | 26 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 29.5 | 27.8 | 22.7 | 14.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 154 | 144 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 81.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 19 | 49 | 88 | | | |
| % | 11.4 | 10.8 | 27.8 | 50.0 | | | |

97 昭和大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 45 | 32 | 0 | 100.0 | 28.9 | 16.6 | 42.4 | 70.7 |
| I期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 69.4 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 74.3 |
| III期 | 14 | 13 | 0 | | | | | 69.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 34 | 11 | | | | | |
| % | 75.6 | 24.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 17 | 16 | (7-9) | | |
| % | | | 37.8 | 35.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 15 | 11 | 14 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 33.3 | 24.4 | 31.1 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 12 | 11 | 14 | (1-3) | 0 |
| | % | | 26.7 | 24.4 | 31.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 80.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 31 | 13 | | | |
| % | | | 68.9 | 28.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 151 | 118 | (1-3) | 98.0 | 20.5 | 14.4 | 27.3 | 71.9 |
| I期 | 40 | 18 | 0 | 100.0 | 55.0 | 38.5 | 68.8 | 72.7 |
| II期 | 13 | 11 | 0 | | | | | 74.1 |
| III期 | 46 | 40 | (1-3) | 97.8 | 11.3 | 4.1 | 22.4 | 72.0 |
| IV期 | 52 | 49 | (1-3) | 96.2 | 2.1 | 0.2 | 9.7 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 対象数 | 114 | 37 | 対象数 | | 16 | 135 |
| % | 75.5 | 24.5 | % | | 10.6 | 89.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 45 | 54 | 37 | |
| % | | 8.6 | 29.8 | 35.8 | 24.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 40 | 13 | 46 | 52 | 0 | 0 |
| % | 26.5 | 8.6 | 30.5 | 34.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 99 | 52 | 50 | (1-3) | 0 | |
| % | 65.6 | 34.4 | 33.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 10 | 26 | 50 | 65 | | |
| % | 6.6 | 17.2 | 33.1 | 43.0 | | |

97 昭和大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 247 | 24 | (7-9) | 96.8 | 90.1 | 85.6 | 93.3 | 54.6 |
| I期 | 110 | (1-3) | (4-6) | 95.5 | 99.1 | 93.4 | 99.9 | 54.8 |
| II期 | 104 | 12 | (1-3) | 97.1 | 88.3 | 80.3 | 93.2 | 55.1 |
| III期 | 24 | (4-6) | 0 | | | | | 50.6 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 58.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 247 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 109 | 53 | 40 | 35 | 10 | | |
| % | 44.1 | 21.5 | 16.2 | 14.2 | 4.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 110 | 104 | 24 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 44.5 | 42.1 | 9.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 231 | 208 | 16 | (7-9) | | |
| % | 6.5 | 93.5 | 84.2 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 56 | 20 | 34 | 137 | | | |
| % | 22.7 | 8.1 | 13.8 | 55.5 | | | |

98

慶應義塾大学病院
2010-2011年2カ年

コメント:

今回より当院も2カ年分のデータ集計が掲載される事になった。
生存状況把握割合は平均95%を超えており、安定した数字が出ていると思われる。
しかしながら、ある部位のがんのI期などは他施設と比較すると実測生存率が若干低い。
これは、大学病院という性質上、高齢者や重篤な併存疾患を抱えている患者も見られる事が一因と
言え、一概に実測生存率をがん専門病院と比較する事は難しいと考える。

98 慶應義塾大学病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 501 | 133 | 24 | 95.2 | 72.6 | 68.4 | 76.4 | 68.1 |
| I期 | 372 | 49 | 15 | 96.0 | 86.4 | 82.5 | 89.6 | 67.2 |
| II期 | 38 | 17 | (1-3) | 97.4 | 54.3 | 37.1 | 68.6 | 68.9 |
| III期 | 27 | 15 | 0 | | | | | 73.3 |
| IV期 | 58 | 49 | (7-9) | 87.9 | 5.6 | 1.1 | 15.7 | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 375 | 126 | | | | | |
| % | 74.9 | 25.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 70 | 160 | 161 | 82 | | |
| % | 5.6 | 14.0 | 31.9 | 32.1 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 372 | 38 | 27 | 58 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 74.3 | 7.6 | 5.4 | 11.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 64 | 437 | 407 | 17 | 13 | | |
| % | 12.8 | 87.2 | 81.2 | 3.4 | 2.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 124 | 138 | 215 | | | |
| % | 4.8 | 24.8 | 27.5 | 42.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 337 | 105 | (7-9) | 97.6 | 68.4 | 63.1 | 73.1 | 67.7 |
| I期 | 104 | 19 | (1-3) | 97.1 | 81.5 | 72.5 | 87.8 | 68.5 |
| II期 | 88 | 17 | 0 | 100.0 | 80.7 | 70.8 | 87.5 | 69.4 |
| III期 | 76 | 23 | (1-3) | 96.1 | 69.2 | 57.3 | 78.3 | 69.0 |
| IV期 | 57 | 43 | (1-3) | 98.2 | 23.2 | 13.2 | 34.9 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 215 | 122 | | | | | |
| % | 63.8 | 36.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 47 | 109 | 96 | 59 | | |
| % | 7.7 | 13.9 | 32.3 | 28.5 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 104 | 88 | 76 | 57 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 30.9 | 26.1 | 22.6 | 16.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 310 | 269 | 33 | (7-9) | | |
| % | 8.0 | 92.0 | 79.8 | 9.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 34 | 91 | 195 | | | |
| % | 5.0 | 10.1 | 27.0 | 57.9 | | | |

98 慶應義塾大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 133 | 73 | (4-6) | 96.2 | 43.6 | 35.0 | 52.0 | 67.4 |
| I期 | 48 | 20 | (1-3) | 95.8 | 57.1 | 41.7 | 69.9 | 68.0 |
| II期 | 58 | 34 | (1-3) | 98.3 | 40.8 | 28.1 | 53.1 | 69.0 |
| III期 | 16 | 12 | 0 | | | | | 68.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 74.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 99 | 34 | | | | | |
| % | 74.4 | 25.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 21 | 44 | 40 | 18 | | |
| % | 7.5 | 15.8 | 33.1 | 30.1 | 13.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 48 | 58 | 16 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 36.1 | 43.6 | 12.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 28 | 49 | 32 | 14 | 10 | 0 |
| | % | 21.1 | 36.8 | 24.1 | 10.5 | 7.5 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 95 | 38 | 31 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 71.4 | 28.6 | 23.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 107 | 22 | | | |
| % | | | 80.5 | 16.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 525 | 258 | 17 | 96.8 | 49.8 | 45.3 | 54.0 | 68.9 |
| I期 | 253 | 58 | (4-6) | 98.0 | 76.9 | 71.1 | 81.6 | 69.2 |
| II期 | 38 | 24 | (1-3) | 94.7 | 33.7 | 19.1 | 49.0 | 67.3 |
| III期 | 98 | 69 | (1-3) | 96.9 | 27.7 | 19.1 | 36.9 | 71.3 |
| IV期 | 124 | 103 | (7-9) | 94.4 | 12.6 | 7.3 | 19.4 | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 344 | 181 | 対象数 | | 38 | 487 |
| % | 65.5 | 34.5 | % | | 7.2 | 92.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 29 | 74 | 149 | 185 | 88 | |
| % | 5.5 | 14.1 | 28.4 | 35.2 | 16.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 253 | 38 | 98 | 124 | (7-9) | (1-3) |
| % | 48.2 | 7.2 | 18.7 | 23.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 258 | 267 | 244 | 11 | 12 | |
| % | 49.1 | 50.9 | 46.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 13 | 93 | 235 | 184 | | |
| % | 2.5 | 17.7 | 44.8 | 35.0 | | |

98 慶應義塾大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 334 | 34 | 10 | 97.0 | 89.6 | 85.8 | 92.5 | 59.1 |
| I期 | 175 | (7-9) | (4-6) | 97.1 | 94.8 | 90.2 | 97.2 | 60.4 |
| II期 | 122 | (7-9) | (4-6) | 95.9 | 92.4 | 85.9 | 96.0 | 56.8 |
| III期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 56.3 |
| IV期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 60.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 334 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 96 | 64 | 92 | 63 | 19 | | |
| % | 28.7 | 19.2 | 27.5 | 18.9 | 5.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 175 | 122 | 20 | 12 | (4-6) | 0 | |
| % | 52.4 | 36.5 | 6.0 | 3.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 288 | 201 | 38 | 49 | | |
| % | 13.8 | 86.2 | 60.2 | 11.4 | 14.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 46 | 37 | 61 | 190 | | | |
| % | 13.8 | 11.1 | 18.3 | 56.9 | | | |

99 東京都立多摩総合医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

99 東京都立多摩総合医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 559 | 182 | 14 | 97.5 | 66.8 | 62.7 | 70.6 | 70.9 |
| I期 | 377 | 57 | (4-6) | 98.7 | 84.7 | 80.7 | 88.0 | 70.1 |
| II期 | 41 | 17 | (1-3) | 97.6 | 57.5 | 40.8 | 71.0 | 72.7 |
| III期 | 39 | 21 | (1-3) | 92.3 | 42.2 | 26.1 | 57.5 | 71.2 |
| IV期 | 94 | 80 | (4-6) | 94.7 | 10.2 | 5.0 | 17.6 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 404 | 155 | | | | | |
| % | 72.3 | 27.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 46 | 153 | 234 | 106 | | |
| % | 3.6 | 8.2 | 27.4 | 41.9 | 19.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 377 | 41 | 39 | 94 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 67.4 | 7.3 | 7.0 | 16.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 95 | 464 | 452 | 12 | 0 | | |
| % | 17.0 | 83.0 | 80.9 | 2.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 112 | 57 | 127 | 263 | | | |
| % | 20.0 | 10.2 | 22.7 | 47.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 591 | 209 | 15 | 97.5 | 64.0 | 60.0 | 67.8 | 68.9 |
| I期 | 152 | 30 | (1-3) | 98.0 | 80.1 | 72.8 | 85.6 | 70.1 |
| II期 | 166 | 33 | (1-3) | 98.2 | 79.8 | 72.7 | 85.2 | 68.6 |
| III期 | 170 | 65 | (4-6) | 97.1 | 61.3 | 53.5 | 68.2 | 69.5 |
| IV期 | 97 | 79 | (1-3) | 96.9 | 16.0 | 9.4 | 24.1 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 331 | 260 | | | | | |
| % | 56.0 | 44.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 33 | 73 | 187 | 194 | 104 | | |
| % | 5.6 | 12.4 | 31.6 | 32.8 | 17.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 152 | 166 | 170 | 97 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 25.7 | 28.1 | 28.8 | 16.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 550 | 501 | 47 | (1-3) | | |
| % | 6.9 | 93.1 | 84.8 | 8.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 52 | 70 | 95 | 374 | | | |
| % | 8.8 | 11.8 | 16.1 | 63.3 | | | |

99 東京都立多摩総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 111 | 81 | (4-6) | 96.4 | 25.3 | 17.5 | 33.8 | 71.2 |
| I期 | 50 | 24 | (4-6) | 92.0 | 49.0 | 34.1 | 62.3 | 72.4 |
| II期 | 23 | 20 | 0 | | | | | 70.8 |
| III期 | 27 | 26 | 0 | | | | | 69.8 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|--|
| 対象数 | 78 | 33 | | | | | | |
| % | 70.3 | 29.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 29 | 54 | 18 | | | |
| % | | | 26.1 | 48.6 | 16.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 50 | 23 | 27 | 11 | 0 | 0 | |
| | % | 45.0 | 20.7 | 24.3 | 9.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 37 | 25 | 26 | (1-3) | 0 | |
| | % | 18.9 | 33.3 | 22.5 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 85 | 26 | 25 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 76.6 | 23.4 | 22.5 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 50 | 55 | | | | |
| % | | | 45.0 | 49.5 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 319 | 228 | 19 | 94.0 | 25.1 | 20.3 | 30.1 | 71.9 |
| I期 | 93 | 38 | (1-3) | 96.8 | 58.2 | 47.4 | 67.6 | 74.9 |
| II期 | 21 | 19 | 0 | | | | | 75.1 |
| III期 | 90 | 67 | (7-9) | 90.0 | 19.5 | 11.7 | 28.7 | 71.3 |
| IV期 | 113 | 104 | (7-9) | 93.8 | 2.0 | 0.4 | 6.3 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 対象数 | 208 | 111 | 対象数 | 39 | 280 | | | |
| % | 65.2 | 34.8 | % | 12.2 | 87.8 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 83 | 138 | 68 | | | |
| % | | 6.6 | 26.0 | 43.3 | 21.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 93 | 21 | 90 | 113 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 29.2 | 6.6 | 28.2 | 35.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 235 | 84 | 79 | (4-6) | (1-3) | | | |
| % | 73.7 | 26.3 | 24.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 11 | 56 | 70 | 182 | | | | |
| % | 3.4 | 17.6 | 21.9 | 57.1 | | | | |

99 東京都立多摩総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 508 | 52 | 11 | 97.8 | 89.7 | 86.7 | 92.0 | 58.9 |
| I期 | 208 | 12 | (4-6) | 98.1 | 94.2 | 89.9 | 96.6 | 59.0 |
| II期 | 216 | 16 | (7-9) | 96.8 | 92.5 | 88.0 | 95.3 | 58.2 |
| III期 | 61 | (7-9) | 0 | 100.0 | 85.3 | 73.6 | 92.0 | 58.6 |
| IV期 | 21 | 15 | 0 | | | | | 66.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 508 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 136 | 132 | 133 | 72 | 35 | | |
| % | 26.8 | 26.0 | 26.2 | 14.2 | 6.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 208 | 216 | 61 | 21 | 0 | (1-3) | |
| % | 40.9 | 42.5 | 12.0 | 4.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 467 | 464 | (1-3) | 0 | | |
| % | 8.1 | 91.9 | 91.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 118 | 43 | 39 | 308 | | | |
| % | 23.2 | 8.5 | 7.7 | 60.6 | | | |

100 公立昭和病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

100 公立昭和病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 345 | 130 | (7-9) | 97.4 | 62.1 | 56.7 | 67.0 | 71.0 |
| I期 | 216 | 32 | (4-6) | 97.2 | 85.1 | 79.6 | 89.2 | 71.2 |
| II期 | 23 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.3 |
| III期 | 20 | 11 | (1-3) | | | | | 73.8 |
| IV期 | 78 | 72 | (1-3) | 98.7 | 6.5 | 2.4 | 13.5 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 224 | 121 | | | | | |
| % | 64.9 | 35.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 40 | 85 | 142 | 69 | | |
| % | | 11.6 | 24.6 | 41.2 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 216 | 23 | 20 | 78 | (7-9) | 0 | |
| % | 62.6 | 6.7 | 5.8 | 22.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | 279 | 240 | 38 | (1-3) | | |
| % | 19.1 | 80.9 | 69.6 | 11.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 64 | 79 | 190 | | | |
| % | 3.5 | 18.6 | 22.9 | 55.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 395 | 153 | (7-9) | 98.2 | 60.9 | 55.9 | 65.6 | 69.8 |
| I期 | 82 | 13 | (1-3) | 98.8 | 84.1 | 74.2 | 90.5 | 68.5 |
| II期 | 117 | 22 | (1-3) | 99.1 | 81.2 | 72.8 | 87.2 | 71.5 |
| III期 | 98 | 42 | (1-3) | 96.9 | 56.6 | 46.1 | 65.8 | 70.1 |
| IV期 | 79 | 67 | (1-3) | 98.7 | 14.2 | 7.5 | 22.8 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 252 | 143 | | | | | |
| % | 63.8 | 36.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 47 | 115 | 149 | 71 | | |
| % | 3.3 | 11.9 | 29.1 | 37.7 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 117 | 98 | 79 | 13 | (4-6) | |
| % | 20.8 | 29.6 | 24.8 | 20.0 | 3.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 73 | 322 | 283 | 39 | 0 | | |
| % | 18.5 | 81.5 | 71.6 | 9.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 47 | 63 | 267 | | | |
| % | 4.6 | 11.9 | 15.9 | 67.6 | | | |

100 公立昭和病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 60 | 38 | (1-3) | 98.3 | 36.6 | 24.6 | 48.6 | 70.2 |
| I期 | 14 | (1-3) | (1-3) | | | | | 69.9 |
| II期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 75.4 |
| III期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 69.2 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 42 | 18 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 14 | 29 | (7-9) | | |
| % | | | 23.3 | 48.3 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 14 | 16 | 16 | (4-6) | (7-9) | 0 |
| | % | 23.3 | 26.7 | 26.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 18 | 11 | (7-9) | 12 | 0 |
| | % | 20.0 | 30.0 | 18.3 | | 20.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 22 | 18 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 63.3 | 36.7 | 30.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 30 | 24 | | | |
| % | | | 50.0 | 40.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 153 | 103 | (1-3) | 98.7 | 31.9 | 24.6 | 39.4 | 71.6 |
| I期 | 49 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 83.3 | 69.4 | 91.3 | 69.5 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 73.4 |
| III期 | 32 | 28 | 0 | 100.0 | 12.5 | 4.0 | 26.2 | 73.9 |
| IV期 | 57 | 56 | 0 | 100.0 | 1.8 | 0.1 | 8.2 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 108 | 45 | 対象数 | 10 | 143 | | |
| % | 70.6 | 29.4 | % | 6.5 | 93.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 46 | 59 | 34 | | |
| % | | 6.5 | 30.1 | 38.6 | 22.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 10 | 32 | 57 | (4-6) | 0 | |
| % | 32.0 | 6.5 | 20.9 | 37.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 87 | 66 | 63 | (1-3) | 0 | | |
| % | 56.9 | 43.1 | 41.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 22 | 60 | 71 | | | |
| % | | 14.4 | 39.2 | 46.4 | | | |

100 公立昭和病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 161 | 29 | (4-6) | 97.5 | 81.7 | 74.7 | 86.9 | 64.3 |
| I期 | 41 | (1-3) | (1-3) | 97.6 | 97.5 | 83.6 | 99.6 | 65.9 |
| II期 | 77 | 10 | (1-3) | 97.4 | 86.9 | 76.9 | 92.7 | 64.5 |
| III期 | 32 | 10 | (1-3) | 96.9 | 67.9 | 48.5 | 81.3 | 67.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 64.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 161 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 25 | 44 | 47 | 18 | | |
| % | 16.8 | 15.5 | 27.3 | 29.2 | 11.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 77 | 32 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.5 | 47.8 | 19.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 151 | 113 | 31 | (7-9) | | |
| % | 6.2 | 93.8 | 70.2 | 19.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (7-9) | 20 | 113 | | | |
| % | 11.8 | | 12.4 | 70.2 | | | |

101 東京医科歯科大学医学部附属病院
2011年のみ

コメント:

当院では5大がん診療に加えて、頭頸部外科、放射線治療科、食道外科、形成外科、脳神経外科などを中心に、隣接する歯学部附属病院と協働した頭頸部がんの最先端の診療体制を提供している。また、大腸肛門外科、泌尿器科などを中心に低侵襲手術についても積極的に行っている。さらに、神経内分泌腫瘍をはじめとして希少がんの診療体制を整えている。また、都内の大学病院としては唯一の緩和ケア病棟を有しており、骨転移診療部門、ペインクリニック科などの横断的診療部門、多職種との連携体制を強化し、転移・再発がんや治療困難な患者の包括的診療に注力している。保険診療化されたがんゲノム医療についてもがんゲノム診療科を新設し、以前から対応できる体制を整えている。

101 東京医科歯科大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 157 | 54 | (4-6) | 96.8 | 65.2 | 57.1 | 72.1 | 68.5 |
| I期 | 104 | 17 | (4-6) | 96.2 | 83.4 | 74.6 | 89.3 | 68.2 |
| II期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 11 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.6 |
| IV期 | 24 | 23 | 0 | | | | | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 115 | 42 | | | | | |
| % | 73.2 | 26.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 57 | 67 | 11 | | |
| % | | 10.8 | 36.3 | 42.7 | 7.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 104 | 14 | 11 | 24 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 66.2 | 8.9 | 7.0 | 15.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 132 | 128 | (4-6) | 0 | | |
| % | 15.9 | 84.1 | 81.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 27 | 52 | 66 | | | |
| % | 7.6 | 17.2 | 33.1 | 42.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 150 | 49 | (1-3) | 98.7 | 67.1 | 58.9 | 74.0 | 69.1 |
| I期 | 38 | 10 | 0 | 100.0 | 73.7 | 56.6 | 84.9 | 68.8 |
| II期 | 52 | 10 | (1-3) | 96.2 | 80.3 | 66.4 | 88.9 | 70.9 |
| III期 | 38 | 13 | 0 | 100.0 | 65.8 | 48.5 | 78.5 | 69.3 |
| IV期 | 20 | 15 | 0 | | | | | 62.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 104 | 46 | | | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | 55 | 44 | 27 | | |
| % | | 10.7 | 36.7 | 29.3 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 52 | 38 | 20 | (1-3) | 0 | |
| % | 25.3 | 34.7 | 25.3 | 13.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 137 | 128 | (7-9) | 0 | | |
| % | 8.7 | 91.3 | 85.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 18 | 36 | 88 | | | |
| % | | 12.0 | 24.0 | 58.7 | | | |

101 東京医科歯科大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 88 | 40 | (1-3) | 97.7 | 53.6 | 42.6 | 63.5 | 69.8 |
| I期 | 33 | (4-6) | (1-3) | 97.0 | 81.4 | 63.2 | 91.2 | 68.4 |
| II期 | 32 | 15 | 0 | 100.0 | 53.1 | 34.7 | 68.5 | 71.9 |
| III期 | 17 | 14 | 0 | | | | | 68.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 61 | 27 | | | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 27 | 39 | 11 | | |
| % | | | 30.7 | 44.3 | 12.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 33 | 32 | 17 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 37.5 | 36.4 | 19.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 36 | 26 | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | 11.4 | 40.9 | 29.5 | 14.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 55 | 52 | (1-3) | 0 | | |
| % | 37.5 | 62.5 | 59.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 54 | 29 | | | |
| % | | | 61.4 | 33.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 169 | 92 | (7-9) | 95.9 | 43.9 | 36.2 | 51.4 | 68.9 |
| I期 | 65 | 22 | (1-3) | 98.5 | 66.0 | 53.1 | 76.1 | 68.3 |
| II期 | 16 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.5 |
| III期 | 45 | 28 | (1-3) | 95.6 | 35.5 | 21.6 | 49.6 | 70.3 |
| IV期 | 42 | 34 | (1-3) | 92.9 | 13.1 | 4.8 | 25.6 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 126 | 43 | 対象数 | 15 | 154 | | |
| % | 74.6 | 25.4 | % | 8.9 | 91.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 64 | 56 | 24 | | |
| % | | 11.8 | 37.9 | 33.1 | 14.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 65 | 16 | 45 | 42 | 0 | (1-3) | |
| % | 38.5 | 9.5 | 26.6 | 24.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 71 | 98 | 93 | (4-6) | 0 | | |
| % | 42.0 | 58.0 | 55.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 31 | 68 | 59 | | | |
| % | 6.5 | 18.3 | 40.2 | 34.9 | | | |

101 東京医科歯科大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 106 | 12 | (4-6) | 95.3 | 88.3 | 80.2 | 93.2 | 60.8 |
| I期 | 45 | (1-3) | (4-6) | 91.1 | 95.2 | 82.3 | 98.8 | 64.0 |
| II期 | 45 | (1-3) | (1-3) | 97.8 | 95.5 | 83.0 | 98.8 | 57.0 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 62.4 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 62.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 106 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 16 | 29 | 25 | (7-9) | | |
| % | 27.4 | 15.1 | 27.4 | 23.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 45 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 42.5 | 42.5 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 97 | 96 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 91.5 | 90.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | (7-9) | 12 | 53 | | | |
| % | 32.1 | | 11.3 | 50.0 | | | |

102 東京都立墨東病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

102 東京都立墨東病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 331 | 164 | (4-6) | 98.8 | 50.1 | 44.5 | 55.3 | 70.1 |
| I期 | 166 | 41 | (1-3) | 98.8 | 75.2 | 67.8 | 81.1 | 70.1 |
| II期 | 34 | 16 | 0 | 100.0 | 52.9 | 35.1 | 68.0 | 69.7 |
| III期 | 30 | 17 | 0 | 100.0 | 43.3 | 25.6 | 59.9 | 65.3 |
| IV期 | 81 | 74 | (1-3) | 97.5 | 6.5 | 2.4 | 13.5 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 244 | 87 | | | | | |
| % | 73.7 | 26.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 27 | 93 | 145 | 47 | | |
| % | 5.7 | 8.2 | 28.1 | 43.8 | 14.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 166 | 34 | 30 | 81 | 19 | (1-3) | |
| % | 50.2 | 10.3 | 9.1 | 24.5 | 5.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 94 | 237 | 211 | 14 | 12 | | |
| % | 28.4 | 71.6 | 63.7 | 4.2 | 3.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 92 | 198 | | | |
| % | | 9.7 | 27.8 | 59.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 376 | 137 | 11 | 97.1 | 62.9 | 57.7 | 67.6 | 69.3 |
| I期 | 79 | 17 | 0 | 100.0 | 78.5 | 67.7 | 86.0 | 71.3 |
| II期 | 108 | 35 | (1-3) | 99.1 | 67.3 | 57.6 | 75.3 | 72.6 |
| III期 | 106 | 29 | (4-6) | 96.2 | 72.1 | 62.4 | 79.7 | 69.2 |
| IV期 | 68 | 48 | (4-6) | 92.6 | 25.5 | 15.6 | 36.7 | 65.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 255 | 121 | | | | | |
| % | 67.8 | 32.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 44 | 112 | 141 | 60 | | |
| % | 5.1 | 11.7 | 29.8 | 37.5 | 16.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 79 | 108 | 106 | 68 | 10 | (4-6) | |
| % | 21.0 | 28.7 | 28.2 | 18.1 | 2.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 343 | 269 | 41 | 33 | | |
| % | 8.8 | 91.2 | 71.5 | 10.9 | 8.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | 47 | 56 | 242 | | | |
| % | 8.2 | 12.5 | 14.9 | 64.4 | | | |

102 東京都立墨東病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 108 | 74 | (1-3) | 99.1 | 31.0 | 22.5 | 39.8 | 69.4 |
| I期 | 27 | 12 | (1-3) | | | | | 67.8 |
| II期 | 40 | 24 | 0 | 100.0 | 40.0 | 25.0 | 54.6 | 67.8 |
| III期 | 21 | 19 | 0 | | | | | 67.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|---|
| 対象数 | 74 | 34 | | | | | |
| % | 68.5 | 31.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 34 | 44 | 16 | | |
| % | | | 31.5 | 40.7 | 14.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 27 | 40 | 21 | (7-9) | 12 | 0 |
| | % | 25.0 | 37.0 | 19.4 | | 11.1 | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 14 | 31 | 34 | 15 | 14 | 0 |
| | % | 13.0 | 28.7 | 31.5 | 13.9 | 13.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 67 | 41 | 33 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 62.0 | 38.0 | 30.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 51 | 52 | | | |
| % | | | 47.2 | 48.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 173 | 129 | (1-3) | 98.8 | 24.7 | 18.6 | 31.4 | 68.3 |
| I期 | 41 | 15 | (1-3) | 97.6 | 62.6 | 45.8 | 75.5 | 71.7 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 67.9 |
| III期 | 38 | 33 | 0 | 100.0 | 13.2 | 4.8 | 25.8 | 67.8 |
| IV期 | 64 | 60 | (1-3) | 98.4 | 5.1 | 1.3 | 12.6 | 68.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 123 | 50 | 対象数 | 18 | 155 | | |
| % | 71.1 | 28.9 | % | 10.4 | 89.6 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 65 | 64 | 16 | | |
| % | | 12.7 | 37.6 | 37.0 | 9.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 14 | 38 | 64 | 16 | 0 | |
| % | 23.7 | 8.1 | 22.0 | 37.0 | 9.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 118 | 55 | 49 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 68.2 | 31.8 | 28.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 37 | 46 | 87 | | | |
| % | | 21.4 | 26.6 | 50.3 | | | |

102 東京都立墨東病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 211 | 38 | (1-3) | 98.6 | 81.9 | 76.0 | 86.5 | 63.9 |
| I期 | 69 | (7-9) | 0 | 100.0 | 87.0 | 76.4 | 93.0 | 62.9 |
| II期 | 80 | (4-6) | (1-3) | 97.5 | 95.0 | 87.2 | 98.1 | 61.6 |
| III期 | 33 | (7-9) | (1-3) | 97.0 | 72.1 | 53.2 | 84.4 | 66.9 |
| IV期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 211 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 34 | 38 | 58 | 56 | 25 | | |
| % | 16.1 | 18.0 | 27.5 | 26.5 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 69 | 80 | 33 | 17 | 10 | (1-3) | |
| % | 32.7 | 37.9 | 15.6 | 8.1 | 4.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 188 | 169 | (4-6) | 13 | | |
| % | 10.9 | 89.1 | 80.1 | | 6.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | (7-9) | 13 | 151 | | | |
| % | 18.0 | | 6.2 | 71.6 | | | |

103 日本医科大学多摩永山病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

103 日本医科大学多摩永山病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 19 | (4-6) | 90.2 | 66.0 | 52.0 | 76.8 | 70.5 |
| I期 | 34 | (1-3) | (1-3) | 91.2 | 93.6 | 76.6 | 98.4 | 68.8 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 75.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | 16 | 11 | (1-3) | | | | | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 46 | 15 | | | | | |
| % | 75.4 | 24.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 19 | 24 | 11 | | |
| % | | | 31.1 | 39.3 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | (7-9) | (1-3) | 16 | (1-3) | 0 | |
| % | 55.7 | | | 26.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 53 | 47 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 86.9 | 77.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 13 | 40 | | | |
| % | | | 21.3 | 65.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 82 | 29 | (1-3) | 96.3 | 63.5 | 51.9 | 73.0 | 69.5 |
| I期 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 72.0 |
| II期 | 26 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.3 |
| III期 | 21 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.6 |
| IV期 | 15 | 11 | (1-3) | | | | | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 44 | 38 | | | | | |
| % | 53.7 | 46.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 21 | 28 | 15 | | |
| % | | 15.9 | 25.6 | 34.1 | 18.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 20 | 26 | 21 | 15 | 0 | 0 | |
| % | 24.4 | 31.7 | 25.6 | 18.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 76 | 70 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 92.7 | 85.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 18 | 51 | | | |
| % | | | 22.0 | 62.2 | | | |

103 日本医科大学多摩永山病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 18 | 11 | (1-3) | | | | | 72.3 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.6 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 75.4 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 14 | (4-6) | | | | | | |
| % | 77.8 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (4-6) | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | 11 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| | % | 61.1 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 10 | (7-9) | | | | |
| % | | | 55.6 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 72 | 48 | (4-6) | 93.1 | 30.9 | 20.3 | 42.0 | 67.4 |
| I期 | 24 | 10 | (1-3) | | | | | 68.7 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 72.3 |
| III期 | 22 | 17 | (1-3) | | | | | 67.5 |
| IV期 | 23 | 21 | (1-3) | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 55 | 17 | | (4-6) | 66 | | | |
| % | 76.4 | 23.6 | | | 91.7 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 27 | 28 | (4-6) | | | |
| % | | | 37.5 | 38.9 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 24 | (1-3) | 22 | 23 | 0 | 0 | | |
| % | 33.3 | | 30.6 | 31.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 41 | 31 | 29 | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 56.9 | 43.1 | 40.3 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 12 | 10 | 50 | | | | |
| % | | 16.7 | 13.9 | 69.4 | | | | |

103 日本医科大学多摩永山病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | (7-9) | (1-3) | 97.4 | 88.1 | 78.4 | 93.6 | 61.7 |
| I期 | 37 | (4-6) | (1-3) | 94.6 | 88.8 | 72.8 | 95.6 | 62.3 |
| II期 | 28 | (1-3) | 0 | | | | | 58.9 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 69.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 50.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 77 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 15 | 26 | 11 | 10 | | |
| % | 19.5 | 19.5 | 33.8 | 14.3 | 13.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 28 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 48.1 | 36.4 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 76 | 73 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 98.7 | 94.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | (4-6) | 57 | | | |
| % | 13.0 | | | 74.0 | | | |

104 神奈川県立がんセンター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

104 神奈川県立がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 665 | 214 | (4-6) | 99.4 | 67.7 | 64.0 | 71.1 | 67.4 |
| I期 | 426 | 55 | (1-3) | 99.8 | 87.1 | 83.5 | 89.9 | 68.1 |
| II期 | 41 | 11 | 0 | 100.0 | 73.2 | 56.8 | 84.2 | 63.8 |
| III期 | 50 | 20 | 0 | 100.0 | 60.0 | 45.1 | 72.0 | 70.3 |
| IV期 | 139 | 127 | (1-3) | 97.8 | 7.5 | 3.9 | 12.8 | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 477 | 188 | | | | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 46 | 77 | 223 | 259 | 60 | | |
| % | 6.9 | 11.6 | 33.5 | 38.9 | 9.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 426 | 41 | 50 | 139 | 0 | (7-9) | |
| % | 64.1 | 6.2 | 7.5 | 20.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 136 | 529 | 527 | (1-3) | 0 | | |
| % | 20.5 | 79.5 | 79.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 89 | 148 | 151 | 277 | | | |
| % | 13.4 | 22.3 | 22.7 | 41.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 333 | 111 | (1-3) | 99.4 | 66.6 | 61.2 | 71.4 | 65.4 |
| I期 | 82 | 10 | (1-3) | 98.8 | 87.7 | 78.4 | 93.2 | 65.0 |
| II期 | 68 | 10 | 0 | 100.0 | 85.3 | 74.4 | 91.8 | 68.4 |
| III期 | 80 | 14 | 0 | 100.0 | 82.5 | 72.3 | 89.2 | 60.9 |
| IV期 | 95 | 76 | (1-3) | 98.9 | 19.4 | 12.2 | 28.0 | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 193 | 140 | | | | | |
| % | 58.0 | 42.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 62 | 118 | 93 | 32 | | |
| % | 8.4 | 18.6 | 35.4 | 27.9 | 9.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 68 | 80 | 95 | 0 | (7-9) | |
| % | 24.6 | 20.4 | 24.0 | 28.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 281 | 262 | 19 | 0 | | |
| % | 15.6 | 84.4 | 78.7 | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 44 | 56 | 198 | | | |
| % | 10.5 | 13.2 | 16.8 | 59.5 | | | |

104 神奈川県立がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 192 | 130 | (1-3) | 98.4 | 31.6 | 25.1 | 38.3 | 69.6 |
| I期 | 74 | 30 | (1-3) | 98.6 | 59.2 | 47.0 | 69.4 | 69.1 |
| II期 | 43 | 31 | (1-3) | 97.7 | 26.6 | 14.4 | 40.5 | 69.9 |
| III期 | 42 | 36 | (1-3) | 97.6 | 12.4 | 4.5 | 24.4 | 69.0 |
| IV期 | 31 | 31 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 139 | 53 | | | | | |
| % | 72.4 | 27.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 17 | 54 | 85 | 25 | | |
| % | 5.7 | 8.9 | 28.1 | 44.3 | 13.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 74 | 43 | 42 | 31 | (1-3) | 0 |
| | % | 38.5 | 22.4 | 21.9 | 16.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 26 | 65 | 38 | 56 | (1-3) | 0 |
| | % | 13.5 | 33.9 | 19.8 | 29.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 138 | 54 | 54 | 0 | 0 | | |
| % | 71.9 | 28.1 | 28.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 13 | 111 | 68 | | | |
| % | | 6.8 | 57.8 | 35.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 745 | 319 | (7-9) | 99.1 | 56.9 | 53.3 | 60.4 | 67.2 |
| I期 | 401 | 68 | (1-3) | 99.8 | 83.0 | 79.0 | 86.4 | 68.6 |
| II期 | 57 | 22 | (1-3) | 98.2 | 61.3 | 47.4 | 72.5 | 65.9 |
| III期 | 133 | 94 | (1-3) | 97.7 | 27.9 | 20.5 | 35.8 | 65.6 |
| IV期 | 146 | 133 | (1-3) | 98.6 | 7.7 | 4.1 | 12.7 | 62.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 437 | 308 | 対象数 | | 41 | 704 |
| % | 58.7 | 41.3 | % | | 5.5 | 94.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 49 | 107 | 251 | 264 | 74 | |
| % | 6.6 | 14.4 | 33.7 | 35.4 | 9.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 401 | 57 | 133 | 146 | (1-3) | (4-6) |
| % | 53.8 | 7.7 | 17.9 | 19.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 262 | 483 | 480 | (1-3) | 0 | |
| % | 35.2 | 64.8 | 64.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 77 | 186 | 225 | 257 | | |
| % | 10.3 | 25.0 | 30.2 | 34.5 | | |

104 神奈川県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 551 | 57 | (4-6) | 99.3 | 89.6 | 86.8 | 91.9 | 58.3 |
| I期 | 223 | 10 | (1-3) | 99.6 | 95.5 | 91.8 | 97.6 | 59.6 |
| II期 | 236 | 15 | (1-3) | 98.7 | 93.6 | 89.6 | 96.1 | 59.3 |
| III期 | 64 | 16 | 0 | 100.0 | 75.0 | 62.5 | 83.9 | 59.9 |
| IV期 | 26 | 15 | 0 | | | | | 52.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 551 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 162 | 119 | 152 | 86 | 32 | | |
| % | 29.4 | 21.6 | 27.6 | 15.6 | 5.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 223 | 236 | 64 | 26 | (1-3) | 0 | |
| % | 40.5 | 42.8 | 11.6 | 4.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 511 | 508 | (1-3) | 0 | | |
| % | 7.3 | 92.7 | 92.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 138 | 37 | 71 | 305 | | | |
| % | 25.0 | 6.7 | 12.9 | 55.4 | | | |

コメント:

《胃・大腸・乳》

当院では地域の特性として、高齢の患者様が多いという特性があります。生存率に関しては、施設ごとに年齢、併存症の有無、臨床病期などにより様々な修飾を受けます。

《肝》

肝癌は、ステージや肝機能・病変部位により手術、局所療法（ラジオ波焼灼療法）、肝動脈塞栓術など治療法を決定します。

当院は、様々なステージの患者様が紹介来院するため、治療法や予後も様々になります。また、慢性肝疾患を認めることが多く、高率に再発します。そのため、定期的な画像検査を施行し、その都度最適な治療法を選択します。

《肺癌》

今回公表される5年生存率ですが、治療前に併存する他疾患や合併症の有無が確認できておりません。これらにより、標準治療ができないことがしばしば認められます。そのため、施設毎の集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解いただきたいと思います。

当院では地域の特性として、高齢の患者様が多く、かつその他の疾病（持病）を有する患者様も多いという特性があります。

これらは、性別集計対象数の年代に表れていますが、50歳未満・50歳代はその割合が少なく、70歳代・80歳代が多く見られることで判ります。また発見経緯では、がん検診・健康診断の割合が低く、他疾患観察中が多いのです。すなわち他の病気で通院中の方が、何らかの症状を訴え、主治医から他の専門科を紹介しても、診断には至るものの進行癌として判る場合も少なからず見られるという訳です。また病期（I期～IV期）別の実側生存率に関してもI期のみをとって見ても、IA1期～IA3期までさらに3段階（主に腫瘍サイズで分類）に分類されるので、当院のように腫瘍サイズの大きいIA3期が多いところでは、I期の実側生存率は低めとなり、また高齢者でのIII期が多いという状況ですが、高齢者においては術後の補助治療（抗がん剤治療）も受けられる方、完遂できる患者様の構成比は少ないため、III期IV期の実側生存率は低くなる傾向があることが判っています。

105 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 575 | 234 | 10 | 98.3 | 59.1 | 54.9 | 63.0 | 71.8 |
| I期 | 355 | 74 | (7-9) | 98.0 | 79.0 | 74.4 | 82.9 | 73.6 |
| II期 | 37 | 20 | (1-3) | 97.3 | 46.0 | 29.6 | 60.9 | 71.9 |
| III期 | 49 | 25 | (1-3) | 98.0 | 49.0 | 34.5 | 62.0 | 69.9 |
| IV期 | 122 | 111 | (1-3) | 99.2 | 8.3 | 4.2 | 14.0 | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 410 | 165 | | | | | |
| % | 71.3 | 28.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 35 | 151 | 256 | 118 | | |
| % | 2.6 | 6.1 | 26.3 | 44.5 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 355 | 37 | 49 | 122 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 61.7 | 6.4 | 8.5 | 21.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 135 | 440 | 427 | 13 | 0 | | |
| % | 23.5 | 76.5 | 74.3 | 2.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 67 | 51 | 239 | 218 | | | |
| % | 11.7 | 8.9 | 41.6 | 37.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 467 | 179 | (7-9) | 98.1 | 61.4 | 56.8 | 65.7 | 70.5 |
| I期 | 120 | 22 | (1-3) | 97.5 | 81.4 | 73.1 | 87.3 | 70.2 |
| II期 | 132 | 36 | (4-6) | 97.0 | 72.4 | 63.9 | 79.3 | 73.2 |
| III期 | 110 | 38 | (1-3) | 99.1 | 65.4 | 55.7 | 73.5 | 68.8 |
| IV期 | 94 | 81 | 0 | 100.0 | 13.8 | 7.8 | 21.6 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 279 | 188 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 41 | 134 | 181 | 89 | | |
| % | 4.7 | 8.8 | 28.7 | 38.8 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 120 | 132 | 110 | 94 | (1-3) | 10 | |
| % | 25.7 | 28.3 | 23.6 | 20.1 | | 2.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 62 | 405 | 401 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 13.3 | 86.7 | 85.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 54 | 43 | 161 | 209 | | | |
| % | 11.6 | 9.2 | 34.5 | 44.8 | | | |

105 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 142 | 110 | 0 | 100.0 | 22.5 | 16.1 | 29.7 | 72.5 |
| I期 | 50 | 34 | 0 | 100.0 | 32.0 | 19.7 | 45.0 | 75.5 |
| II期 | 47 | 35 | 0 | 100.0 | 25.5 | 14.2 | 38.5 | 71.7 |
| III期 | 36 | 32 | 0 | 100.0 | 11.1 | 3.5 | 23.6 | 70.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 82.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 95 | 47 | | | | | |
| % | 66.9 | 33.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 39 | 63 | 30 | | |
| % | | | 27.5 | 44.4 | 21.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 50 | 47 | 36 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 35.2 | 33.1 | 25.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 16 | 51 | 23 | 18 | (1-3) | 0 |
| | % | 11.3 | 35.9 | 16.2 | 12.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 106 | 36 | 33 | (1-3) | 0 | | |
| % | 74.6 | 25.4 | 23.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 107 | 30 | | | |
| % | | | 75.4 | 21.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 401 | 305 | (4-6) | 98.5 | 23.3 | 19.3 | 27.6 | 70.7 |
| I期 | 111 | 32 | (4-6) | 96.4 | 70.6 | 61.1 | 78.3 | 69.6 |
| II期 | 25 | 18 | (1-3) | | | | | 70.7 |
| III期 | 109 | 103 | 0 | 100.0 | 5.5 | 2.3 | 10.9 | 69.2 |
| IV期 | 152 | 148 | 0 | 100.0 | 2.6 | 0.9 | 6.2 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 287 | 114 | 対象数 | | 55 | 346 |
| % | 71.6 | 28.4 | % | | 13.7 | 86.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 10 | 30 | 130 | 164 | 67 | |
| % | 2.5 | 7.5 | 32.4 | 40.9 | 16.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 111 | 25 | 109 | 152 | (1-3) | (1-3) |
| % | 27.7 | 6.2 | 27.2 | 37.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 253 | 148 | 144 | (4-6) | 0 | |
| % | 63.1 | 36.9 | 35.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 28 | 26 | 206 | 141 | | |
| % | 7.0 | 6.5 | 51.4 | 35.2 | | |

105 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 214 | 30 | (7-9) | 96.3 | 85.7 | 80.2 | 89.8 | 64.2 |
| I期 | 64 | (4-6) | (1-3) | 96.9 | 93.7 | 84.0 | 97.6 | 62.6 |
| II期 | 106 | 13 | (4-6) | 96.2 | 87.5 | 79.4 | 92.5 | 66.6 |
| III期 | 32 | (7-9) | (1-3) | 96.9 | 78.1 | 59.5 | 88.9 | 60.3 |
| IV期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 54.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 214 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 42 | 27 | 65 | 52 | 28 | | |
| % | 19.6 | 12.6 | 30.4 | 24.3 | 13.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 64 | 106 | 32 | 10 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 29.9 | 49.5 | 15.0 | 4.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 195 | 187 | (7-9) | 0 | | |
| % | 8.9 | 91.1 | 87.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 48 | (7-9) | 56 | 103 | | | |
| % | 22.4 | | 26.2 | 48.1 | | | |

106

横浜立市民病院
2010-2011年2力年

コメント:

公表された生存率は、合併症を多く持つ方や、高齢の方について、施設ごとに割合などが異なることを未だ考慮されておらず、

- (1) 早期がんの患者割合が多い施設ほど高くなる。
- (2) 若年者や合併症を持たない患者が多い施設ほど高くなる。

などの問題があります。

がんの生存率という国民にとって関心の高い数値の公表にあたっては、施設ごとの背景を十分に説明され、正しく理解されるよう、合併症保有患者や高齢者など治療法の異なる方々を再集計するなど、より丁寧な公表が必要だと考えます。

106 横浜市立市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 320 | 129 | (1-3) | 99.7 | 59.7 | 54.1 | 64.8 | 71.5 |
| I期 | 204 | 44 | (1-3) | 99.5 | 78.4 | 72.1 | 83.5 | 70.2 |
| II期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 66.1 |
| III期 | 19 | 12 | 0 | | | | | 75.3 |
| IV期 | 68 | 62 | 0 | 100.0 | 8.8 | 3.6 | 17.0 | 74.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 240 | 80 | | | | | |
| % | 75.0 | 25.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 17 | 103 | 113 | 78 | | |
| % | | 5.3 | 32.2 | 35.3 | 24.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 204 | 25 | 19 | 68 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 63.8 | 7.8 | 5.9 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 267 | 256 | 11 | 0 | | |
| % | 16.6 | 83.4 | 80.0 | 3.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 34 | 125 | 140 | | | |
| % | 6.6 | 10.6 | 39.1 | 43.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 423 | 153 | (4-6) | 98.8 | 63.7 | 58.9 | 68.1 | 69.2 |
| I期 | 112 | 24 | 0 | 100.0 | 78.6 | 69.8 | 85.1 | 69.4 |
| II期 | 116 | 28 | (1-3) | 98.3 | 75.7 | 66.7 | 82.5 | 69.4 |
| III期 | 116 | 35 | (1-3) | 97.4 | 69.7 | 60.5 | 77.2 | 68.3 |
| IV期 | 75 | 66 | 0 | 100.0 | 12.0 | 5.9 | 20.4 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 256 | 167 | | | | | |
| % | 60.5 | 39.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 37 | 40 | 111 | 142 | 93 | | |
| % | 8.7 | 9.5 | 26.2 | 33.6 | 22.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 112 | 116 | 116 | 75 | 0 | (4-6) | |
| % | 26.5 | 27.4 | 27.4 | 17.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 386 | 361 | 24 | (1-3) | | |
| % | 8.7 | 91.3 | 85.3 | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 33 | 109 | 257 | | | |
| % | 5.7 | 7.8 | 25.8 | 60.8 | | | |

106 横浜市立市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 80 | 60 | 0 | 100.0 | 25.0 | 16.2 | 34.8 | 72.3 |
| I期 | 30 | 17 | 0 | 100.0 | 43.3 | 25.6 | 59.9 | 72.4 |
| II期 | 27 | 22 | 0 | | | | | 69.8 |
| III期 | 19 | 17 | 0 | | | | | 74.7 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 59 | 21 | | | | | |
| % | 73.8 | 26.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 11 | 36 | 22 | | |
| % | | | 13.8 | 45.0 | 27.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 30 | 27 | 19 | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | 37.5 | 33.8 | 23.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 29 | 24 | 11 | (1-3) | 0 |
| | % | 16.3 | 36.3 | 30.0 | 13.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 60 | 20 | 18 | (1-3) | 0 | | |
| % | 75.0 | 25.0 | 22.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 36 | 41 | | | |
| % | | | 45.0 | 51.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 364 | 244 | 0 | 100.0 | 33.0 | 28.2 | 37.8 | 70.3 |
| I期 | 132 | 42 | 0 | 100.0 | 68.2 | 59.5 | 75.4 | 68.5 |
| II期 | 32 | 19 | 0 | 100.0 | 40.6 | 23.8 | 56.8 | 68.9 |
| III期 | 90 | 74 | 0 | 100.0 | 17.8 | 10.7 | 26.3 | 69.9 |
| IV期 | 107 | 106 | 0 | 100.0 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 72.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 250 | 114 | 対象数 | | 42 | 322 |
| % | 68.7 | 31.3 | % | | 11.5 | 88.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 17 | 37 | 108 | 135 | 67 | |
| % | 4.7 | 10.2 | 29.7 | 37.1 | 18.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 132 | 32 | 90 | 107 | (1-3) | (1-3) |
| % | 36.3 | 8.8 | 24.7 | 29.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 215 | 149 | 144 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 59.1 | 40.9 | 39.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 31 | 60 | 100 | 173 | | |
| % | 8.5 | 16.5 | 27.5 | 47.5 | | |

106 横浜市立市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 174 | 22 | 0 | 100.0 | 87.4 | 81.4 | 91.5 | 63.3 |
| I期 | 65 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.3 | 82.5 | 96.7 | 65.4 |
| II期 | 81 | (7-9) | 0 | 100.0 | 91.4 | 82.7 | 95.8 | 60.8 |
| III期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 61.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 82.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 174 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 37 | 32 | 37 | 46 | 22 | | |
| % | 21.3 | 18.4 | 21.3 | 26.4 | 12.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 65 | 81 | 19 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 37.4 | 46.6 | 10.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 160 | 143 | 15 | (1-3) | | |
| % | 8.0 | 92.0 | 82.2 | 8.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | (7-9) | 37 | 97 | | | |
| % | 19.0 | | 21.3 | 55.7 | | | |

107

相模原協同病院

2010-2011年2カ年

コメント:

<胃・大腸・肝・乳腺>

公表された各施設ごと生存率は、その地域のがん患者さんの年齢及び合併症などの背景や観血的治療の有無の割合に影響されるため、単純にがん治療の成績とならないため比較できるものではないと考えます。

<肺>

肺癌の治療は呼吸器センターとして内科と外科の合同カンファレンスで治療方針を決めています。基本的には肺癌治療ガイドラインに則り治療をしていますが、術後再発症例や局所進行肺癌に対しても連携を密にとりながら、エビデンスを重視しつつも、個々の患者に適した治療となるようにしています。

肺癌患者の多くは併存する呼吸・循環器疾患を有しており、特に当院においては高齢（70代以上が54.9%）患者が多いことから、肺癌による死亡より他病死が多いことが推測されます。生存率の単純な比較は治療成績の比較としては相応しくはなく、参考データのひとつとして考えるべきです。

107 相模原協同病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 188 | 109 | (1-3) | 98.9 | 41.7 | 34.6 | 48.7 | 70.0 |
| I期 | 82 | 20 | (1-3) | 98.8 | 75.4 | 64.5 | 83.4 | 70.3 |
| II期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 71.3 |
| III期 | 18 | 13 | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 68 | 64 | (1-3) | 98.5 | 4.6 | 1.2 | 11.7 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 142 | 46 | | | | | |
| % | 75.5 | 24.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 63 | 68 | 31 | | |
| % | | 10.6 | 33.5 | 36.2 | 16.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 16 | 18 | 68 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 43.6 | 8.5 | 9.6 | 36.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 72 | 116 | 109 | (7-9) | 0 | | |
| % | 38.3 | 61.7 | 58.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 28 | 36 | 116 | | | |
| % | | 14.9 | 19.1 | 61.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 252 | 84 | (4-6) | 98.4 | 66.3 | 60.0 | 71.8 | 69.0 |
| I期 | 48 | (7-9) | (1-3) | 95.8 | 85.0 | 71.1 | 92.6 | 69.4 |
| II期 | 70 | 16 | 0 | 100.0 | 77.1 | 65.4 | 85.3 | 70.5 |
| III期 | 72 | 17 | (1-3) | 98.6 | 76.1 | 64.4 | 84.4 | 69.6 |
| IV期 | 59 | 44 | (1-3) | 98.3 | 24.2 | 14.1 | 35.7 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 134 | 118 | | | | | |
| % | 53.2 | 46.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 23 | 74 | 104 | 35 | | |
| % | 6.3 | 9.1 | 29.4 | 41.3 | 13.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 70 | 72 | 59 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 19.0 | 27.8 | 28.6 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 227 | 200 | 27 | 0 | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 79.4 | 10.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 26 | 53 | 158 | | | |
| % | 6.0 | 10.3 | 21.0 | 62.7 | | | |

107 相模原協同病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 70 | 59 | (1-3) | 98.6 | 15.7 | 8.4 | 25.2 | 70.8 |
| I期 | 28 | 19 | 0 | | | | | 72.9 |
| II期 | 15 | 13 | (1-3) | | | | | 70.7 |
| III期 | 20 | 20 | 0 | | | | | 69.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 62.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 52 | 18 | | | | | | |
| % | 74.3 | 25.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 23 | 25 | 13 | | | |
| % | | | 32.9 | 35.7 | 18.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 15 | 20 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 40.0 | 21.4 | 28.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 22 | 17 | 19 | 0 | 0 | |
| | % | 17.1 | 31.4 | 24.3 | 27.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 63 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 90.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 41 | 22 | | | | |
| % | | | 58.6 | 31.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 302 | 216 | (7-9) | 97.7 | 27.0 | 22.1 | 32.2 | 71.5 |
| I期 | 106 | 41 | (1-3) | 97.2 | 60.3 | 50.2 | 69.0 | 70.5 |
| II期 | 21 | 13 | (1-3) | | | | | 71.0 |
| III期 | 61 | 52 | (1-3) | 98.4 | 13.4 | 6.3 | 23.2 | 71.0 |
| IV期 | 112 | 109 | (1-3) | 98.2 | 0.9 | 0.1 | 4.5 | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 224 | 78 | 対象数 | | 34 | 268 |
| % | 74.2 | 25.8 | % | | 11.3 | 88.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 99 | 107 | 68 | |
| % | | 7.0 | 32.8 | 35.4 | 22.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 106 | 21 | 61 | 112 | (1-3) | (1-3) |
| % | 35.1 | 7.0 | 20.2 | 37.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 198 | 104 | 100 | (4-6) | 0 | |
| % | 65.6 | 34.4 | 33.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 14 | 56 | 100 | 132 | | |
| % | 4.6 | 18.5 | 33.1 | 43.7 | | |

107 相模原協同病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 126 | 20 | (1-3) | 99.2 | 84.1 | 76.4 | 89.4 | 58.6 |
| I期 | 40 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.0 | 81.5 | 98.7 | 59.8 |
| II期 | 58 | (1-3) | (1-3) | 98.3 | 96.5 | 86.7 | 99.1 | 55.5 |
| III期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 56.0 |
| IV期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 61.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 126 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 41 | 22 | 38 | 15 | 10 | | |
| % | 32.5 | 17.5 | 30.2 | 11.9 | 7.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 40 | 58 | 16 | 12 | 0 | 0 | |
| % | 31.7 | 46.0 | 12.7 | 9.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 103 | 98 | (4-6) | 0 | | |
| % | 18.3 | 81.7 | 77.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 17 | 17 | 76 | | | |
| % | 12.7 | 13.5 | 13.5 | 60.3 | | | |

108 聖マリアンナ医科大学病院
2010-2011年2カ年

コメント:

施設、地域によりがん患者さんの年齢、合併症の有無、臨床病期の割合に違いがあるため、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

108 聖マリアンナ医科大学病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 412 | 165 | 17 | 95.9 | 58.7 | 53.7 | 63.3 | 70.7 |
| I期 | 242 | 39 | 10 | 95.9 | 83.3 | 77.9 | 87.5 | 70.7 |
| II期 | 31 | 15 | (1-3) | 90.3 | 47.5 | 28.4 | 64.3 | 70.8 |
| III期 | 33 | 20 | 0 | 100.0 | 39.4 | 23.1 | 55.4 | 69.5 |
| IV期 | 98 | 85 | (4-6) | 95.9 | 9.7 | 4.8 | 16.7 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 292 | 120 | | | | | |
| % | 70.9 | 29.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 35 | 125 | 156 | 80 | | |
| % | 3.9 | 8.5 | 30.3 | 37.9 | 19.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 242 | 31 | 33 | 98 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 58.7 | 7.5 | 8.0 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 101 | 311 | 286 | (4-6) | 19 | | |
| % | 24.5 | 75.5 | 69.4 | | 4.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 62 | 121 | 218 | | | |
| % | 2.7 | 15.0 | 29.4 | 52.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 357 | 139 | 23 | 93.6 | 59.2 | 53.8 | 64.2 | 68.8 |
| I期 | 86 | 19 | (7-9) | 91.9 | 76.3 | 65.4 | 84.2 | 67.5 |
| II期 | 77 | 22 | (4-6) | 93.5 | 69.8 | 57.8 | 79.0 | 72.9 |
| III期 | 102 | 34 | (7-9) | 92.2 | 65.1 | 54.8 | 73.7 | 71.4 |
| IV期 | 81 | 62 | (1-3) | 96.3 | 20.6 | 12.5 | 30.2 | 64.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 217 | 140 | | | | | |
| % | 60.8 | 39.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 44 | 108 | 113 | 66 | | |
| % | 7.3 | 12.3 | 30.3 | 31.7 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 86 | 77 | 102 | 81 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 24.1 | 21.6 | 28.6 | 22.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 305 | 266 | (4-6) | 33 | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 74.5 | | 9.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 31 | 80 | 235 | | | |
| % | 3.1 | 8.7 | 22.4 | 65.8 | | | |

108 聖マリアンナ医科大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 151 | 95 | 10 | 93.4 | 33.3 | 25.6 | 41.1 | 69.6 |
| I期 | 41 | 14 | (4-6) | 90.2 | 62.8 | 45.3 | 76.1 | 68.0 |
| II期 | 48 | 27 | (1-3) | 95.8 | 41.7 | 27.4 | 55.3 | 71.2 |
| III期 | 39 | 33 | (1-3) | 94.9 | 11.0 | 3.5 | 23.3 | 74.7 |
| IV期 | 22 | 20 | (1-3) | | | | | 62.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 98 | 53 | | | | | |
| % | 64.9 | 35.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 12 | 44 | 64 | 23 | | |
| % | | 7.9 | 29.1 | 42.4 | 15.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 41 | 48 | 39 | 22 | (1-3) | 0 |
| | % | 27.2 | 31.8 | 25.8 | 14.6 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 30 | 14 | 20 | 73 | 0 |
| | % | 8.6 | 19.9 | 9.3 | 13.2 | 48.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 91 | 60 | 56 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 60.3 | 39.7 | 37.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 71 | 72 | | | |
| % | | | 47.0 | 47.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 429 | 258 | 19 | 95.6 | 38.4 | 33.7 | 43.0 | 69.0 |
| I期 | 175 | 44 | (7-9) | 94.9 | 74.3 | 67.0 | 80.2 | 69.1 |
| II期 | 28 | 19 | (1-3) | | | | | 74.3 |
| III期 | 78 | 66 | 0 | 100.0 | 15.4 | 8.4 | 24.2 | 68.5 |
| IV期 | 139 | 122 | (7-9) | 93.5 | 7.1 | 3.4 | 12.6 | 67.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 281 | 148 | 対象数 | | 24 | 405 |
| % | 65.5 | 34.5 | % | | 5.6 | 94.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 19 | 47 | 152 | 148 | 63 | |
| % | 4.4 | 11.0 | 35.4 | 34.5 | 14.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 175 | 28 | 78 | 139 | (7-9) | (1-3) |
| % | 40.8 | 6.5 | 18.2 | 32.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 264 | 165 | 150 | (1-3) | 14 | |
| % | 61.5 | 38.5 | 35.0 | | 3.3 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 24 | 64 | 132 | 209 | | |
| % | 5.6 | 14.9 | 30.8 | 48.7 | | |

108 聖マリアンナ医科大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1117 | 107 | 57 | 94.9 | 90.1 | 88.2 | 91.8 | 54.8 |
| I期 | 471 | 10 | 29 | 93.8 | 97.8 | 95.9 | 98.8 | 54.2 |
| II期 | 486 | 36 | 21 | 95.7 | 92.4 | 89.6 | 94.4 | 55.9 |
| III期 | 97 | 18 | (4-6) | 95.9 | 81.3 | 71.9 | 87.8 | 57.6 |
| IV期 | 54 | 40 | (1-3) | 96.3 | 23.4 | 13.0 | 35.6 | 58.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 1117 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 463 | 247 | 235 | 123 | 49 | | |
| % | 41.5 | 22.1 | 21.0 | 11.0 | 4.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 471 | 486 | 97 | 54 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 42.2 | 43.5 | 8.7 | 4.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 146 | 971 | 954 | (4-6) | 12 | | |
| % | 13.1 | 86.9 | 85.4 | | 1.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 265 | 66 | 72 | 714 | | | |
| % | 23.7 | 5.9 | 6.4 | 63.9 | | | |

109 東海大学医学部附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

109 東海大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 509 | 179 | 29 | 94.3 | 64.4 | 60.0 | 68.4 | 68.8 |
| I期 | 345 | 58 | 26 | 92.5 | 82.9 | 78.4 | 86.5 | 71.3 |
| II期 | 35 | 12 | (1-3) | 97.1 | 65.4 | 47.1 | 78.7 | 60.7 |
| III期 | 27 | 21 | 0 | | | | | 65.2 |
| IV期 | 85 | 77 | (1-3) | 97.6 | 7.3 | 3.0 | 14.2 | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 378 | 131 | | | | | |
| % | 74.3 | 25.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 49 | 172 | 187 | 73 | | |
| % | 5.5 | 9.6 | 33.8 | 36.7 | 14.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 345 | 35 | 27 | 85 | 11 | (4-6) | |
| % | 67.8 | 6.9 | 5.3 | 16.7 | 2.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 88 | 421 | 403 | 17 | (1-3) | | |
| % | 17.3 | 82.7 | 79.2 | 3.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 118 | 210 | 167 | | | |
| % | 2.8 | 23.2 | 41.3 | 32.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 402 | 133 | 17 | 95.8 | 66.7 | 61.9 | 71.1 | 67.9 |
| I期 | 100 | 17 | (7-9) | 93.0 | 82.9 | 73.9 | 89.0 | 68.0 |
| II期 | 98 | 24 | (4-6) | 95.9 | 75.2 | 65.3 | 82.7 | 72.5 |
| III期 | 109 | 29 | (4-6) | 96.3 | 73.3 | 63.9 | 80.6 | 69.1 |
| IV期 | 77 | 60 | (1-3) | 98.7 | 21.8 | 13.4 | 31.6 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 263 | 139 | | | | | |
| % | 65.4 | 34.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 49 | 125 | 129 | 67 | | |
| % | 8.0 | 12.2 | 31.1 | 32.1 | 16.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 100 | 98 | 109 | 77 | (1-3) | 16 | |
| % | 24.9 | 24.4 | 27.1 | 19.2 | | 4.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 359 | 351 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 10.7 | 89.3 | 87.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 58 | 116 | 220 | | | |
| % | | 14.4 | 28.9 | 54.7 | | | |

109 東海大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 154 | 98 | (7-9) | 94.8 | 34.8 | 27.3 | 42.5 | 68.7 |
| I期 | 66 | 31 | (4-6) | 93.9 | 51.3 | 38.4 | 62.8 | 69.1 |
| II期 | 42 | 26 | (1-3) | 92.9 | 35.9 | 21.5 | 50.5 | 67.9 |
| III期 | 28 | 26 | 0 | | | | | 68.6 |
| IV期 | 16 | 15 | (1-3) | | | | | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 対象数 | 107 | 47 | | | | | |
| % | 69.5 | 30.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 48 | 62 | 21 | | |
| % | | 12.3 | 31.2 | 40.3 | 13.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 66 | 42 | 28 | 16 | 0 | (1-3) |
| | % | 42.9 | 27.3 | 18.2 | 10.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 36 | 47 | 35 | 29 | 0 | (1-3) |
| | % | 23.4 | 30.5 | 22.7 | 18.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 119 | 35 | 35 | 0 | 0 | | |
| % | 77.3 | 22.7 | 22.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 119 | 30 | | | |
| % | | | 77.3 | 19.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 507 | 307 | 12 | 97.6 | 38.7 | 34.4 | 43.0 | 68.6 |
| I期 | 217 | 65 | (7-9) | 96.3 | 69.5 | 62.9 | 75.2 | 67.8 |
| II期 | 44 | 27 | (1-3) | 97.7 | 37.3 | 23.2 | 51.4 | 67.3 |
| III期 | 121 | 101 | (1-3) | 99.2 | 15.9 | 10.0 | 23.0 | 69.2 |
| IV期 | 120 | 111 | (1-3) | 98.3 | 6.0 | 2.6 | 11.3 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 373 | 134 | 対象数 | | 41 | 466 |
| % | 73.6 | 26.4 | % | | 8.1 | 91.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 18 | 59 | 191 | 175 | 64 | |
| % | 3.6 | 11.6 | 37.7 | 34.5 | 12.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 217 | 44 | 121 | 120 | (1-3) | (1-3) |
| % | 42.8 | 8.7 | 23.9 | 23.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 250 | 257 | 252 | (4-6) | 0 | |
| % | 49.3 | 50.7 | 49.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 116 | 212 | 170 | | |
| % | | 22.9 | 41.8 | 33.5 | | |

109 東海大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 494 | 62 | (7-9) | 98.4 | 87.4 | 84.1 | 90.0 | 56.5 |
| I期 | 169 | (4-6) | (1-3) | 98.8 | 97.0 | 93.0 | 98.8 | 55.2 |
| II期 | 198 | 12 | (1-3) | 99.0 | 93.9 | 89.6 | 96.5 | 56.1 |
| III期 | 91 | 23 | (1-3) | 96.7 | 74.3 | 63.9 | 82.1 | 59.7 |
| IV期 | 31 | 19 | (1-3) | 96.8 | 38.2 | 21.5 | 54.8 | 61.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 494 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 162 | 127 | 127 | 57 | 21 | | |
| % | 32.8 | 25.7 | 25.7 | 11.5 | 4.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 169 | 198 | 91 | 31 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 34.2 | 40.1 | 18.4 | 6.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 56 | 438 | 437 | (1-3) | 0 | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 88.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 87 | 36 | 74 | 297 | | | |
| % | 17.6 | 7.3 | 15.0 | 60.1 | | | |

110 北里大学病院
2011年のみ

コメント:

当院における集計対象は2011年度であり、当該年度の生存状況把握割合は87%と90%を下回っていること、2015年より北里大学東病院より消化器がんを扱う診療科の合流があったことより、現在の当院の診療状況とはかなり異なる。

110 北里大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 36 | 18 | (1-3) | 97.2 | 49.7 | 32.6 | 64.7 | 73.5 |
| I期 | 14 | (1-3) | (1-3) | | | | | 72.9 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 73.1 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.5 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 73.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 25 | 11 | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 16 | (7-9) | | |
| % | | | | 44.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 14 | (7-9) | (1-3) | 11 | (1-3) | 0 | |
| % | 38.9 | | | 30.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 25 | 25 | 0 | 0 | | |
| % | 30.6 | 69.4 | 69.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 20 | 16 | | | |
| % | | | 55.6 | 44.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 102 | 51 | 0 | 100.0 | 50.0 | 40.0 | 59.2 | 67.7 |
| I期 | 22 | (7-9) | 0 | | | | | 68.6 |
| II期 | 26 | (7-9) | 0 | | | | | 67.5 |
| III期 | 26 | 11 | 0 | | | | | 68.2 |
| IV期 | 18 | 17 | 0 | | | | | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 58 | 44 | | | | | |
| % | 56.9 | 43.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 43 | 31 | 12 | | |
| % | | | 42.2 | 30.4 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 26 | 26 | 18 | 10 | 0 | |
| % | 21.6 | 25.5 | 25.5 | 17.6 | 9.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 80 | 79 | (1-3) | 0 | | |
| % | 21.6 | 78.4 | 77.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 37 | 51 | | | |
| % | | | 36.3 | 50.0 | | | |

110 北里大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 65.7 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.8 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 59.0 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (4-6) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 271 | 179 | (1-3) | 99.3 | 33.5 | 27.9 | 39.2 | 67.3 |
| I期 | 78 | 19 | 0 | 100.0 | 75.6 | 64.5 | 83.7 | 68.9 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 64.4 |
| III期 | 67 | 48 | (1-3) | 98.5 | 27.3 | 17.2 | 38.3 | 69.1 |
| IV期 | 109 | 102 | (1-3) | 99.1 | 5.6 | 2.3 | 11.0 | 65.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 185 | 86 | 対象数 | | 34 | 237 |
| % | 68.3 | 31.7 | % | | 12.5 | 87.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 13 | 38 | 102 | 93 | 25 | |
| % | 4.8 | 14.0 | 37.6 | 34.3 | 9.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 78 | 14 | 67 | 109 | (1-3) | (1-3) |
| % | 28.8 | 5.2 | 24.7 | 40.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 177 | 94 | 92 | (1-3) | 0 | |
| % | 65.3 | 34.7 | 33.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 34 | 45 | 71 | 121 | | |
| % | 12.5 | 16.6 | 26.2 | 44.6 | | |

110 北里大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 198 | 18 | (4-6) | 98.0 | 90.8 | 85.8 | 94.1 | 58.6 |
| I期 | 90 | 0 | (1-3) | 96.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 |
| II期 | 76 | (7-9) | (1-3) | 98.7 | 90.8 | 81.7 | 95.5 | 58.1 |
| III期 | 16 | (1-3) | 0 | | | | | 56.1 |
| IV期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 51.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 198 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 55 | 40 | 65 | 32 | (4-6) | | |
| % | 27.8 | 20.2 | 32.8 | 16.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 76 | 16 | 13 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 45.5 | 38.4 | 8.1 | 6.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 172 | 171 | (1-3) | 0 | | |
| % | 13.1 | 86.9 | 86.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 60 | 11 | (7-9) | 118 | | | |
| % | 30.3 | 5.6 | | 59.6 | | | |

111 昭和大学横浜市北部病院
2011年のみ

コメント:

特になし

111 昭和大学横浜市北部病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 245 | 88 | (4-6) | 98.4 | 63.8 | 57.5 | 69.5 | 69.6 |
| I期 | 174 | 34 | (4-6) | 97.7 | 80.2 | 73.4 | 85.4 | 70.6 |
| II期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 71.9 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 62.8 |
| IV期 | 46 | 43 | 0 | 100.0 | 6.5 | 1.7 | 16.1 | 66.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 192 | 53 | | | | | |
| % | 78.4 | 21.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 25 | 71 | 92 | 43 | | |
| % | 5.7 | 10.2 | 29.0 | 37.6 | 17.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 174 | 14 | 10 | 46 | 0 | (1-3) | |
| % | 71.0 | 5.7 | 4.1 | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 194 | 193 | (1-3) | 0 | | |
| % | 20.8 | 79.2 | 78.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 55 | 91 | 82 | | | |
| % | 6.9 | 22.4 | 37.1 | 33.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 355 | 83 | (4-6) | 98.9 | 76.5 | 71.7 | 80.5 | 67.8 |
| I期 | 136 | 22 | 0 | 100.0 | 83.8 | 76.5 | 89.0 | 67.3 |
| II期 | 83 | 14 | (1-3) | 98.8 | 82.9 | 72.9 | 89.5 | 70.0 |
| III期 | 87 | 17 | (1-3) | 96.6 | 80.1 | 70.0 | 87.1 | 67.0 |
| IV期 | 37 | 29 | 0 | 100.0 | 21.6 | 10.2 | 35.8 | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 201 | 154 | | | | | |
| % | 56.6 | 43.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 49 | 128 | 89 | 63 | | |
| % | 7.3 | 13.8 | 36.1 | 25.1 | 17.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 136 | 83 | 87 | 37 | (1-3) | 11 | |
| % | 38.3 | 23.4 | 24.5 | 10.4 | | 3.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 339 | 334 | (4-6) | 0 | | |
| % | 4.5 | 95.5 | 94.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 60 | 63 | 67 | 165 | | | |
| % | 16.9 | 17.7 | 18.9 | 46.5 | | | |

111 昭和大学横浜市北部病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 32 | 27 | 0 | 100.0 | 15.6 | 5.7 | 30.0 | 72.2 |
| I期 | 15 | 11 | 0 | | | | | 69.2 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.2 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 20 | 12 | | | | | | |
| % | 62.5 | 37.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | (7-9) | 14 | (7-9) | | | |
| % | | | | 43.8 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 15 | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 46.9 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | (1-3) | 18 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | 56.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 28 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 87.5 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 21 | (7-9) | | | | |
| % | | | 65.6 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 169 | 86 | 0 | 100.0 | 49.1 | 41.4 | 56.4 | 68.2 |
| I期 | 76 | 13 | 0 | 100.0 | 82.9 | 72.4 | 89.7 | 67.5 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 70.2 |
| III期 | 31 | 21 | 0 | 100.0 | 32.3 | 16.9 | 48.6 | 67.5 |
| IV期 | 47 | 45 | 0 | 100.0 | 4.3 | 0.8 | 12.8 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 115 | 54 | 対象数 | | 11 | 158 | |
| % | 68.0 | 32.0 | % | | 6.5 | 93.5 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 60 | 57 | 23 | | |
| % | | 12.4 | 35.5 | 33.7 | 13.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 76 | 13 | 31 | 47 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.0 | 7.7 | 18.3 | 27.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 74 | 95 | 91 | (4-6) | 0 | | |
| % | 43.8 | 56.2 | 53.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 44 | 60 | 61 | | | |
| % | | 26.0 | 35.5 | 36.1 | | | |

111 昭和大学横浜市北部病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 56 | (7-9) | 0 | 100.0 | 87.5 | 75.6 | 93.8 | 63.9 |
| I期 | 18 | (1-3) | 0 | | | | | 67.1 |
| II期 | 27 | (1-3) | 0 | | | | | 61.8 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 67.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 60.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 56 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | (4-6) | 14 | 13 | 10 | | |
| % | 26.8 | | 25.0 | 23.2 | 17.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 18 | 27 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 32.1 | 48.2 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 43 | 43 | 0 | 0 | | |
| % | 23.2 | 76.8 | 76.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 12 | 36 | | | |
| % | | | 21.4 | 64.3 | | | |

112 横浜市立みなと赤十字病院
2011年のみ

コメント:

当院は2012年より「地域がん診療連携拠点病院」に指定された。
そのため今回の集計対象データは2011年の1か年分である。
各医療施設による生存率の差は、対象者の併存症・合併症の有無、及び重症度等の背景因子が異なることも影響している。
生存率は、がんの治療成績を示すものではない事をご理解ください。

<胃がん>

UICC TNM分類総合ステージI期については、全国、県内と比較しても同等の生存率と言える。全体の5年生存率は52.1%であり、全国、県内と比べやや低い割合となっている。理由として、III期、IV期の対象者について、生存率が低いことが全体の生存率に影響している。（症例数が30未満のため生存率は表示されていない）

<大腸がん>

全体の生存率は、全国、県内と比較しても同等の生存率と言える。
UICC TNM分類総合ステージIV期の生存率が全国、県内と比較し高くなっている。
（IV期の生存率 当院：23.7%、全国：16.7%、県内：18.1%）

<肝がん>

UICC TNM分類総合ステージIII期の対象者数の割合は、全国、県内と比較し高い。
（III期の対象割合 当院：34.3%、全国：20.9%、県内：23.9%）
観血的治療実施の割合は低く、主に肝動脈塞栓術を中心とした治療を行っている。

<肺がん>

UICC TNM分類総合ステージIV期の対象者数の割合は55.6%と全体の半数以上の割合を占めている。
。全対象者のうち、観血的治療の実施なしが86.7%と高い割合となっている。

<乳がん>

全体の生存率は72.9%であり、全国、県内と比較し低い割合となっている。
（全体の生存率 当院：72.9%、全国：87.9%、県内：88.5%）
UICC TNM分類総合ステージIII期で発見された対象者数の割合が全国、県内と比較しやや高い。
（III期の対象割合 当院：29.2%、全国：12.4%、県内：11.9%）

112 横浜市立みなと赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 93 | 44 | (1-3) | 96.8 | 52.1 | 41.4 | 61.7 | 72.7 |
| I期 | 48 | (7-9) | (1-3) | 95.8 | 83.0 | 68.8 | 91.1 | 73.7 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 69.0 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 67.9 |
| IV期 | 22 | 21 | (1-3) | | | | | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 71 | 22 | | | | | |
| % | 76.3 | 23.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 32 | 31 | 26 | | |
| % | | | 34.4 | 33.3 | 28.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | (7-9) | (7-9) | 22 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 51.6 | | | 23.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 66 | 65 | (1-3) | 0 | | |
| % | 29.0 | 71.0 | 69.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 14 | 63 | | | |
| % | | 14.0 | 15.1 | 67.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 51 | (1-3) | 97.8 | 62.1 | 53.3 | 69.7 | 70.3 |
| I期 | 22 | (4-6) | (1-3) | | | | | 71.5 |
| II期 | 36 | (7-9) | 0 | 100.0 | 77.8 | 60.4 | 88.2 | 70.3 |
| III期 | 44 | 13 | (1-3) | 97.7 | 70.0 | 54.0 | 81.4 | 70.0 |
| IV期 | 32 | 24 | (1-3) | 96.9 | 23.7 | 10.7 | 39.6 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 86 | 50 | | | | | |
| % | 63.2 | 36.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 34 | 55 | 26 | | |
| % | | 10.3 | 25.0 | 40.4 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 36 | 44 | 32 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 16.2 | 26.5 | 32.4 | 23.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 121 | 119 | 0 | (1-3) | | |
| % | 11.0 | 89.0 | 87.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 11 | 114 | | | |
| % | | | 8.1 | 83.8 | | | |

112 横浜市立みなと赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 35 | 29 | (1-3) | 94.3 | 15.0 | 5.5 | 29.0 | 72.0 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.5 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.0 |
| III期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 78.2 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 23 | 12 | | | | | |
| % | 65.7 | 34.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 10 | 11 | 10 | | |
| % | | | 28.6 | 31.4 | 28.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (7-9) | 12 | (4-6) | (4-6) | 0 | |
| | % | | 34.3 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (7-9) | (7-9) | (7-9) | (4-6) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | 97.1 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 16 | 18 | | | |
| % | | | 45.7 | 51.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 79 | (1-3) | 98.9 | 11.3 | 5.8 | 18.8 | 73.8 |
| I期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 76.6 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 79.0 |
| III期 | 17 | 15 | (1-3) | | | | | 73.5 |
| IV期 | 50 | 49 | 0 | 100.0 | 2.0 | 0.2 | 9.2 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 60 | 30 | 対象数 | | 11 | 79 |
| % | 66.7 | 33.3 | % | | 12.2 | 87.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 21 | 33 | 28 | |
| % | | | 23.3 | 36.7 | 31.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 12 | (7-9) | 17 | 50 | (4-6) | 0 |
| % | 13.3 | | 18.9 | 55.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 78 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| % | 86.7 | 13.3 | 13.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 16 | 64 | | |
| % | | | 17.8 | 71.1 | | |

112 横浜市立みなと赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 48 | 13 | (1-3) | 97.9 | 72.9 | 58.0 | 83.3 | 66.4 |
| I期 | 10 | 0 | 0 | | | | | 65.3 |
| II期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 60.9 |
| III期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 69.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 75.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 48 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | 11 | 11 | 11 | | |
| % | 20.8 | | 22.9 | 22.9 | 22.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | 17 | 14 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 20.8 | 35.4 | 29.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | | |
| % | 25.0 | 75.0 | 75.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 39 | | | |
| % | | | | 81.3 | | | |

113 独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院
2011年のみ

コメント:

当院は、地域医療支援病院であり、合併症のある患者や高齢者の患者も多く受け入れている。また、他病死を含めた実測生存率での集計であるため一概に施設間での比較は難しいと考える。

113 独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 95 | 48 | (1-3) | 98.9 | 49.4 | 39.0 | 59.0 | 71.5 |
| I期 | 49 | 14 | (1-3) | 98.0 | 71.3 | 56.4 | 81.9 | 70.9 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 70.3 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.2 |
| IV期 | 26 | 24 | 0 | | | | | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 72 | 23 | | | | | |
| % | 75.8 | 24.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 29 | 37 | 19 | | |
| % | | | 30.5 | 38.9 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | (7-9) | (4-6) | 26 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 51.6 | | | 27.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 69 | 68 | (1-3) | 0 | | |
| % | 27.4 | 72.6 | 71.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 18 | 51 | | | |
| % | | 23.2 | 18.9 | 53.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 95 | 48 | (4-6) | 95.8 | 48.9 | 38.5 | 58.6 | 71.4 |
| I期 | 21 | (7-9) | (1-3) | | | | | 67.9 |
| II期 | 27 | (7-9) | (1-3) | | | | | 74.9 |
| III期 | 22 | 11 | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | 22 | 20 | 0 | | | | | 72.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 57 | 38 | | | | | |
| % | 60.0 | 40.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 26 | 33 | 24 | | |
| % | | | 27.4 | 34.7 | 25.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 21 | 27 | 22 | 22 | (1-3) | 0 | |
| % | 22.1 | 28.4 | 23.2 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 71 | 67 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 25.3 | 74.7 | 70.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 16 | 69 | | | |
| % | | | 16.8 | 72.6 | | | |

113 独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 28 | 19 | 0 | | | | | 71.8 |
| I期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 70.6 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 72.2 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 83.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 20 | (7-9) | | | | | | |
| % | 71.4 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 12 | (4-6) | | | |
| % | | | | 42.9 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 13 | (4-6) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | 46.4 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 10 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | | 35.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 26 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 92.9 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 23 | (4-6) | | | | |
| % | | | 82.1 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 101 | 81 | (4-6) | 96.0 | 17.8 | 10.9 | 26.0 | 71.5 |
| I期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 68.5 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 79.3 |
| III期 | 31 | 26 | (1-3) | 90.3 | 10.4 | 2.2 | 26.0 | 69.9 |
| IV期 | 42 | 41 | (1-3) | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 74 | 27 | 対象数 | | 11 | 90 |
| % | 73.3 | 26.7 | % | | 10.9 | 89.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 25 | 36 | 25 | |
| % | | 12.9 | 24.8 | 35.6 | 24.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 20 | (4-6) | 31 | 42 | (4-6) | 0 |
| % | 19.8 | | 30.7 | 41.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 68 | 33 | 32 | (1-3) | 0 | |
| % | 67.3 | 32.7 | 31.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 28 | 56 | | |
| % | | 11.9 | 27.7 | 55.4 | | |

113 独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 33 | (4-6) | 0 | 100.0 | 84.9 | 67.4 | 93.4 | 64.0 |
| I期 | 10 | 0 | 0 | | | | | 60.9 |
| II期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 62.5 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 66.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 61.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 33 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | (7-9) | (7-9) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | 11 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 30.3 | 33.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 23 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 81.8 | 69.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 27 | | | |
| % | | | | 81.8 | | | |

114 新潟県立がんセンター新潟病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

114 新潟県立がんセンター新潟病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 710 | 216 | (7-9) | 98.7 | 69.6 | 66.0 | 72.8 | 68.0 |
| I期 | 428 | 54 | (7-9) | 98.4 | 87.4 | 83.8 | 90.2 | 68.9 |
| II期 | 54 | 17 | 0 | 100.0 | 68.5 | 54.3 | 79.1 | 68.6 |
| III期 | 60 | 21 | (1-3) | 98.3 | 65.0 | 51.5 | 75.6 | 68.1 |
| IV期 | 129 | 115 | 0 | 100.0 | 10.9 | 6.2 | 16.9 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 493 | 217 | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 39 | 102 | 213 | 268 | 88 | | |
| % | 5.5 | 14.4 | 30.0 | 37.7 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 428 | 54 | 60 | 129 | 0 | 39 | |
| % | 60.3 | 7.6 | 8.5 | 18.2 | | 5.5 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 85 | 625 | 582 | 43 | 0 | | |
| % | 12.0 | 88.0 | 82.0 | 6.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 209 | 108 | 146 | 247 | | | |
| % | 29.4 | 15.2 | 20.6 | 34.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 352 | 103 | 0 | 100.0 | 70.7 | 65.7 | 75.2 | 66.9 |
| I期 | 86 | (7-9) | 0 | 100.0 | 91.9 | 83.7 | 96.0 | 66.6 |
| II期 | 88 | 15 | 0 | 100.0 | 83.0 | 73.3 | 89.4 | 65.6 |
| III期 | 100 | 17 | 0 | 100.0 | 83.0 | 74.1 | 89.1 | 66.3 |
| IV期 | 77 | 64 | 0 | 100.0 | 16.9 | 9.5 | 26.0 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 199 | 153 | | | | | |
| % | 56.5 | 43.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 66 | 110 | 103 | 50 | | |
| % | 6.5 | 18.8 | 31.3 | 29.3 | 14.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 86 | 88 | 100 | 77 | 0 | (1-3) | |
| % | 24.4 | 25.0 | 28.4 | 21.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 324 | 287 | 37 | 0 | | |
| % | 8.0 | 92.0 | 81.5 | 10.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 90 | 45 | 50 | 167 | | | |
| % | 25.6 | 12.8 | 14.2 | 47.4 | | | |

114 新潟県立がんセンター新潟病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 41 | (1-3) | 98.1 | 22.4 | 12.3 | 34.3 | 71.0 |
| I期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 68.2 |
| II期 | 19 | 15 | (1-3) | | | | | 67.9 |
| III期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 70.2 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 43 | 10 | | | | | | |
| % | 81.1 | 18.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 14 | 19 | 14 | | | |
| % | | | 26.4 | 35.8 | 26.4 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 16 | 19 | 13 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 30.2 | 35.8 | 24.5 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 18 | 16 | 13 | (1-3) | 0 | |
| | % | | 34.0 | 30.2 | 24.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 35 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | |
| % | 66.0 | 34.0 | 34.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 30 | 19 | | | | |
| % | | | 56.6 | 35.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 845 | 470 | (4-6) | 99.4 | 44.4 | 41.0 | 47.7 | 70.1 |
| I期 | 419 | 121 | (1-3) | 99.5 | 71.1 | 66.5 | 75.2 | 70.8 |
| II期 | 58 | 29 | (1-3) | 98.3 | 50.0 | 36.6 | 62.0 | 69.2 |
| III期 | 168 | 134 | 0 | 100.0 | 20.2 | 14.6 | 26.6 | 72.3 |
| IV期 | 198 | 184 | (1-3) | 99.0 | 7.1 | 4.1 | 11.2 | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 599 | 246 | 対象数 | | 64 | 781 | |
| % | 70.9 | 29.1 | % | | 7.6 | 92.4 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 101 | 245 | 315 | 156 | | |
| % | 3.3 | 12.0 | 29.0 | 37.3 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 419 | 58 | 168 | 198 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 49.6 | 6.9 | 19.9 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 464 | 381 | 363 | 18 | 0 | | |
| % | 54.9 | 45.1 | 43.0 | 2.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 147 | 85 | 290 | 323 | | | |
| % | 17.4 | 10.1 | 34.3 | 38.2 | | | |

114 新潟県立がんセンター新潟病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 587 | 43 | (7-9) | 98.6 | 92.7 | 90.2 | 94.5 | 56.2 |
| I期 | 258 | (4-6) | (1-3) | 99.2 | 97.7 | 94.9 | 99.0 | 56.3 |
| II期 | 274 | 16 | (4-6) | 98.2 | 94.2 | 90.6 | 96.4 | 55.9 |
| III期 | 38 | 13 | (1-3) | 97.4 | 65.7 | 48.3 | 78.4 | 56.6 |
| IV期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 587 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 194 | 150 | 147 | 79 | 17 | | |
| % | 33.0 | 25.6 | 25.0 | 13.5 | 2.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 258 | 274 | 38 | 15 | 0 | (1-3) | |
| % | 44.0 | 46.7 | 6.5 | 2.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 560 | 543 | 17 | 0 | | |
| % | 4.6 | 95.4 | 92.5 | 2.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 214 | 48 | 26 | 299 | | | |
| % | 36.5 | 8.2 | 4.4 | 50.9 | | | |

115 県立中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

115 県立中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 454 | 136 | (4-6) | 98.7 | 69.9 | 65.4 | 73.9 | 70.4 |
| I期 | 355 | 63 | (4-6) | 98.9 | 82.2 | 77.8 | 85.8 | 70.1 |
| II期 | 24 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 18 | 13 | 0 | | | | | 69.6 |
| IV期 | 50 | 47 | (1-3) | 98.0 | 4.1 | 0.8 | 12.5 | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 336 | 118 | | | | | |
| % | 74.0 | 26.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 54 | 120 | 155 | 105 | | |
| % | 4.4 | 11.9 | 26.4 | 34.1 | 23.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 355 | 24 | 18 | 50 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 78.2 | 5.3 | 4.0 | 11.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 60 | 394 | 361 | 33 | 0 | | |
| % | 13.2 | 86.8 | 79.5 | 7.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 98 | 31 | 86 | 239 | | | |
| % | 21.6 | 6.8 | 18.9 | 52.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 192 | 73 | (1-3) | 98.4 | 61.8 | 54.6 | 68.3 | 70.6 |
| I期 | 50 | 12 | 0 | 100.0 | 76.0 | 61.6 | 85.6 | 68.5 |
| II期 | 55 | 14 | (1-3) | 94.5 | 74.1 | 60.2 | 83.8 | 71.0 |
| III期 | 46 | 11 | 0 | 100.0 | 76.1 | 61.0 | 86.0 | 67.8 |
| IV期 | 37 | 35 | 0 | 100.0 | 5.4 | 1.0 | 15.9 | 72.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 104 | 88 | | | | | |
| % | 54.2 | 45.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 20 | 49 | 63 | 48 | | |
| % | 6.3 | 10.4 | 25.5 | 32.8 | 25.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 50 | 55 | 46 | 37 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 26.0 | 28.6 | 24.0 | 19.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 178 | 150 | 28 | 0 | | |
| % | 7.3 | 92.7 | 78.1 | 14.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | (1-3) | 35 | 117 | | | |
| % | 19.8 | | 18.2 | 60.9 | | | |

115 県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 66 | 0 | 100.0 | 26.7 | 18.0 | 36.1 | 71.9 |
| I期 | 40 | 25 | 0 | 100.0 | 37.5 | 22.9 | 52.1 | 74.5 |
| II期 | 24 | 18 | 0 | | | | | 65.9 |
| III期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 72.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 72.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 68 | 22 | | | | | |
| % | 75.6 | 24.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 26 | 39 | 18 | | |
| % | | | 28.9 | 43.3 | 20.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 40 | 24 | 15 | (4-6) | (4-6) | (1-3) |
| | % | 44.4 | 26.7 | 16.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 24 | 39 | 10 | 11 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 26.7 | 43.3 | 11.1 | 12.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 59 | 31 | 28 | (1-3) | 0 | | |
| % | 65.6 | 34.4 | 31.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 43 | 44 | | | |
| % | | | 47.8 | 48.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 301 | 169 | (1-3) | 99.3 | 43.8 | 38.1 | 49.3 | 71.6 |
| I期 | 144 | 45 | (1-3) | 98.6 | 68.7 | 60.4 | 75.6 | 71.8 |
| II期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 77.2 |
| III期 | 80 | 61 | 0 | 100.0 | 23.8 | 15.1 | 33.5 | 69.6 |
| IV期 | 53 | 48 | 0 | 100.0 | 9.4 | 3.5 | 19.1 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 226 | 75 | 対象数 | | 21 | 280 |
| % | 75.1 | 24.9 | % | | 7.0 | 93.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 10 | 25 | 75 | 115 | 76 | |
| % | 3.3 | 8.3 | 24.9 | 38.2 | 25.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 144 | 15 | 80 | 53 | (7-9) | (1-3) |
| % | 47.8 | 5.0 | 26.6 | 17.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 159 | 142 | 133 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 52.8 | 47.2 | 44.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 54 | 17 | 82 | 148 | | |
| % | 17.9 | 5.6 | 27.2 | 49.2 | | |

115 県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 141 | 13 | (1-3) | 98.6 | 90.7 | 84.6 | 94.5 | 59.2 |
| I期 | 66 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.5 | 89.7 | 99.8 | 56.4 |
| II期 | 48 | (4-6) | (1-3) | 97.9 | 91.6 | 79.1 | 96.8 | 61.2 |
| III期 | 12 | 0 | (1-3) | | | | | 59.6 |
| IV期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 56.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 141 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 39 | 41 | 19 | 10 | | |
| % | 22.7 | 27.7 | 29.1 | 13.5 | 7.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 66 | 48 | 12 | 13 | (1-3) | 0 | |
| % | 46.8 | 34.0 | 8.5 | 9.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 121 | 110 | 10 | (1-3) | | |
| % | 14.2 | 85.8 | 78.0 | 7.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | (4-6) | 13 | 87 | | | |
| % | 25.5 | | 9.2 | 61.7 | | | |

116 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院
2010-2011年2力年

コメント:

5大がんにおける実測生存率は肝がんを除き、全国平均を上回る結果となった。
当院は新潟県内で大腸がんの取扱い数が最も多い施設であるが、総合病期IV期の生存率は全国平均、県内と比較しても高い割合であった。
予後判明率は2か年ともに99%と高く、県内外の市町村の予後調査支援事業への協力が判明率向上に繋がったものとする。

116 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 693 | 208 | 10 | 98.6 | 69.9 | 66.3 | 73.1 | 70.9 |
| I期 | 479 | 68 | (7-9) | 98.3 | 85.8 | 82.3 | 88.6 | 71.2 |
| II期 | 59 | 23 | (1-3) | 98.3 | 60.4 | 46.6 | 71.6 | 75.3 |
| III期 | 29 | 14 | 0 | | | | | 62.7 |
| IV期 | 119 | 100 | (1-3) | 99.2 | 15.4 | 9.5 | 22.5 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 492 | 201 | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 81 | 166 | 251 | 165 | | |
| % | 4.3 | 11.7 | 24.0 | 36.2 | 23.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 479 | 59 | 29 | 119 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 69.1 | 8.5 | 4.2 | 17.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 110 | 583 | 551 | 32 | 0 | | |
| % | 15.9 | 84.1 | 79.5 | 4.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 85 | 81 | 263 | 264 | | | |
| % | 12.3 | 11.7 | 38.0 | 38.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 401 | 132 | (1-3) | 99.8 | 67.1 | 62.3 | 71.4 | 70.3 |
| I期 | 122 | 19 | 0 | 100.0 | 84.4 | 76.7 | 89.8 | 69.8 |
| II期 | 102 | 33 | (1-3) | 99.0 | 67.6 | 57.6 | 75.8 | 75.5 |
| III期 | 106 | 30 | 0 | 100.0 | 71.7 | 62.1 | 79.3 | 70.8 |
| IV期 | 68 | 49 | 0 | 100.0 | 27.9 | 17.9 | 38.9 | 65.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 228 | 173 | | | | | |
| % | 56.9 | 43.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 48 | 106 | 139 | 88 | | |
| % | 5.0 | 12.0 | 26.4 | 34.7 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 122 | 102 | 106 | 68 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 30.4 | 25.4 | 26.4 | 17.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 44 | 357 | 322 | 35 | 0 | | |
| % | 11.0 | 89.0 | 80.3 | 8.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 44 | 39 | 96 | 222 | | | |
| % | 11.0 | 9.7 | 23.9 | 55.4 | | | |

116 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 76 | 57 | 0 | 100.0 | 25.0 | 16.0 | 35.1 | 70.8 |
| I期 | 29 | 16 | 0 | | | | | 75.5 |
| II期 | 16 | 13 | 0 | | | | | 78.4 |
| III期 | 16 | 13 | 0 | | | | | 62.8 |
| IV期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 46 | 30 | | | | | |
| % | 60.5 | 39.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 20 | 22 | 23 | | |
| % | | | 26.3 | 28.9 | 30.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 29 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| | % | 38.2 | 21.1 | 21.1 | 19.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 30 | 16 | 22 | (1-3) | 0 |
| | % | | 39.5 | 21.1 | 28.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 23 | 22 | (1-3) | 0 | | |
| % | 69.7 | 30.3 | 28.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 40 | 32 | | | |
| % | | | 52.6 | 42.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 327 | 197 | (1-3) | 99.7 | 39.6 | 34.3 | 44.8 | 71.6 |
| I期 | 156 | 55 | 0 | 100.0 | 64.7 | 56.7 | 71.7 | 72.3 |
| II期 | 28 | 16 | (1-3) | | | | | 71.3 |
| III期 | 61 | 52 | 0 | 100.0 | 14.8 | 7.3 | 24.8 | 68.6 |
| IV期 | 76 | 72 | 0 | 100.0 | 5.3 | 1.7 | 11.9 | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 254 | 73 | 対象数 | | 24 | 303 |
| % | 77.7 | 22.3 | % | | 7.3 | 92.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 85 | 129 | 74 | |
| % | | 9.5 | 26.0 | 39.4 | 22.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 156 | 28 | 61 | 76 | (1-3) | (4-6) |
| % | 47.7 | 8.6 | 18.7 | 23.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 133 | 194 | 189 | (4-6) | 0 | |
| % | 40.7 | 59.3 | 57.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 80 | 132 | 112 | | |
| % | | 24.5 | 40.4 | 34.3 | | |

116 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 180 | 16 | (1-3) | 98.3 | 91.1 | 85.9 | 94.4 | 60.7 |
| I期 | 72 | (4-6) | (1-3) | 98.6 | 94.4 | 85.8 | 97.9 | 64.5 |
| II期 | 79 | (1-3) | (1-3) | 98.7 | 98.7 | 91.4 | 99.8 | 57.3 |
| III期 | 20 | (4-6) | (1-3) | | | | | 56.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 60.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 180 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 39 | 43 | 50 | 30 | 18 | | |
| % | 21.7 | 23.9 | 27.8 | 16.7 | 10.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 72 | 79 | 20 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 40.0 | 43.9 | 11.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 173 | 170 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 96.1 | 94.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 40 | (4-6) | 13 | 122 | | | |
| % | 22.2 | | 7.2 | 67.8 | | | |

117 新潟大学医歯学総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

117 新潟大学医歯学総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 451 | 80 | 29 | 93.6 | 82.1 | 78.3 | 85.4 | 69.4 |
| I期 | 370 | 38 | 27 | 92.7 | 89.6 | 86.0 | 92.3 | 70.0 |
| II期 | 11 | (4-6) | (1-3) | | | | | 73.3 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 58.5 |
| IV期 | 33 | 27 | 0 | 100.0 | 18.2 | 7.4 | 32.8 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 332 | 119 | | | | | |
| % | 73.6 | 26.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 59 | 144 | 162 | 73 | | |
| % | 2.9 | 13.1 | 31.9 | 35.9 | 16.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 370 | 11 | (4-6) | 33 | (1-3) | 31 | |
| % | 82.0 | 2.4 | | 7.3 | | 6.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 411 | 390 | 17 | (4-6) | | |
| % | 8.9 | 91.1 | 86.5 | 3.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 81 | 62 | 232 | 76 | | | |
| % | 18.0 | 13.7 | 51.4 | 16.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 194 | 54 | (7-9) | 95.9 | 72.1 | 65.3 | 77.9 | 67.5 |
| I期 | 87 | 12 | (4-6) | 95.4 | 86.2 | 76.9 | 91.9 | 66.0 |
| II期 | 35 | (7-9) | (1-3) | 97.1 | 74.3 | 56.4 | 85.7 | 69.3 |
| III期 | 29 | (7-9) | 0 | | | | | 69.8 |
| IV期 | 30 | 23 | (1-3) | 96.7 | 23.3 | 10.3 | 39.4 | 64.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 119 | 75 | | | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 27 | 63 | 68 | 26 | | |
| % | 5.2 | 13.9 | 32.5 | 35.1 | 13.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 87 | 35 | 29 | 30 | (1-3) | 10 | |
| % | 44.8 | 18.0 | 14.9 | 15.5 | | 5.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 172 | 157 | 15 | 0 | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 80.9 | 7.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | 15 | 81 | 64 | | | |
| % | 17.5 | 7.7 | 41.8 | 33.0 | | | |

117 新潟大学医歯学総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 119 | 52 | (4-6) | 95.0 | 55.5 | 46.0 | 64.0 | 67.5 |
| I期 | 62 | 17 | (1-3) | 95.2 | 72.1 | 59.0 | 81.7 | 68.0 |
| II期 | 29 | 13 | (1-3) | | | | | 67.3 |
| III期 | 25 | 19 | (1-3) | | | | | 63.6 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 79 | 40 | | | | | | |
| % | 66.4 | 33.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 45 | 46 | (7-9) | | | |
| % | | 11.8 | 37.8 | 38.7 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 62 | 29 | 25 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 52.1 | 24.4 | 21.0 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 24 | 42 | 30 | 17 | (4-6) | 0 | |
| | % | 20.2 | 35.3 | 25.2 | 14.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 61 | 58 | 54 | (4-6) | 0 | | | |
| % | 51.3 | 48.7 | 45.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 91 | 23 | | | | |
| % | | | 76.5 | 19.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 220 | 118 | (7-9) | 95.9 | 45.6 | 38.9 | 52.1 | 68.2 |
| I期 | 121 | 39 | (4-6) | 95.0 | 67.4 | 58.2 | 75.0 | 69.6 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 64.8 |
| III期 | 30 | 20 | (1-3) | 96.7 | 33.0 | 17.2 | 49.8 | 67.7 |
| IV期 | 53 | 50 | (1-3) | 96.2 | 2.0 | 0.2 | 9.2 | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 156 | 64 | 対象数 | | 20 | 200 |
| % | 70.9 | 29.1 | % | | 9.1 | 90.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 39 | 67 | 85 | 23 | |
| % | | 17.7 | 30.5 | 38.6 | 10.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 121 | 11 | 30 | 53 | (1-3) | (1-3) |
| % | 55.0 | 5.0 | 13.6 | 24.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 88 | 132 | 123 | (7-9) | 0 | |
| % | 40.0 | 60.0 | 55.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 14 | 20 | 126 | 60 | | |
| % | 6.4 | 9.1 | 57.3 | 27.3 | | |

117 新潟大学医歯学総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 154 | 15 | (1-3) | 98.1 | 90.2 | 84.3 | 94.0 | 56.5 |
| I期 | 72 | (1-3) | (1-3) | 97.2 | 97.2 | 89.3 | 99.3 | 54.7 |
| II期 | 62 | (7-9) | (1-3) | 98.4 | 87.1 | 75.8 | 93.3 | 55.8 |
| III期 | 13 | (1-3) | 0 | | | | | 57.3 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 49.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 154 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 55 | 29 | 44 | 20 | (4-6) | | |
| % | 35.7 | 18.8 | 28.6 | 13.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 72 | 62 | 13 | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| % | 46.8 | 40.3 | 8.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 144 | 143 | (1-3) | 0 | | |
| % | 6.5 | 93.5 | 92.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | (7-9) | 25 | 93 | | | |
| % | 17.5 | | 16.2 | 60.4 | | | |

118

県立新発田病院

2010-2011年2力年

コメント:

新潟県全体としては比較的早期がんの症例が多い傾向が見られますが、当院においては他施設と比較すると進行がんの割合が多くなっており、相対生存率がやや低くなっている一因であるとも考えます。さらに高齢者の割合も高い為、他病死が多い傾向となり、生存率にも影響していると考えられます。

そんな中でも前回のデータと比べて主要5部位のうち肝がん以外は生存率が高くなっており、治療成績の向上を示す結果となっています。

118 県立新発田病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 455 | 171 | (4-6) | 99.1 | 62.3 | 57.7 | 66.6 | 70.9 |
| I期 | 311 | 55 | (1-3) | 99.0 | 82.3 | 77.6 | 86.1 | 71.8 |
| II期 | 38 | 22 | 0 | 100.0 | 42.1 | 26.4 | 57.0 | 69.8 |
| III期 | 25 | 19 | 0 | | | | | 69.9 |
| IV期 | 77 | 71 | (1-3) | 98.7 | 6.6 | 2.4 | 13.6 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 327 | 128 | | | | | |
| % | 71.9 | 28.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 44 | 131 | 174 | 94 | | |
| % | 2.6 | 9.7 | 28.8 | 38.2 | 20.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 311 | 38 | 25 | 77 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 68.4 | 8.4 | 5.5 | 16.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 403 | 360 | 39 | (4-6) | | |
| % | 11.4 | 88.6 | 79.1 | 8.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | 52 | 175 | 170 | | | |
| % | 12.7 | 11.4 | 38.5 | 37.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 339 | 131 | (4-6) | 98.5 | 61.3 | 55.9 | 66.2 | 71.8 |
| I期 | 77 | 15 | (1-3) | 98.7 | 80.5 | 69.8 | 87.8 | 72.1 |
| II期 | 111 | 31 | (1-3) | 97.3 | 72.1 | 62.7 | 79.5 | 71.8 |
| III期 | 91 | 32 | 0 | 100.0 | 64.8 | 54.1 | 73.7 | 70.4 |
| IV期 | 58 | 51 | (1-3) | 98.3 | 10.6 | 4.3 | 20.2 | 74.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 190 | 149 | | | | | |
| % | 56.0 | 44.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 91 | 114 | 93 | | |
| % | | 9.4 | 26.8 | 33.6 | 27.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 111 | 91 | 58 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.7 | 32.7 | 26.8 | 17.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 312 | 284 | 23 | (4-6) | | |
| % | 8.0 | 92.0 | 83.8 | 6.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 47 | 30 | 81 | 181 | | | |
| % | 13.9 | 8.8 | 23.9 | 53.4 | | | |

118 県立新発田病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 72 | 52 | 0 | 100.0 | 27.8 | 18.0 | 38.4 | 71.4 |
| I期 | 35 | 18 | 0 | 100.0 | 48.6 | 31.4 | 63.7 | 72.9 |
| II期 | 18 | 17 | 0 | | | | | 70.9 |
| III期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 72.6 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 81.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 53 | 19 | | | | | |
| % | 73.6 | 26.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 18 | 30 | 15 | | |
| % | | | 25.0 | 41.7 | 20.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 35 | 18 | 12 | (7-9) | 0 | 0 |
| | % | 48.6 | 25.0 | 16.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 20 | 26 | 14 | 11 | (1-3) | 0 |
| | % | 27.8 | 36.1 | 19.4 | 15.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 59 | 13 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 81.9 | 18.1 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 49 | 21 | | | |
| % | | | 68.1 | 29.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 258 | 167 | 0 | 100.0 | 35.3 | 29.5 | 41.1 | 72.3 |
| I期 | 100 | 31 | 0 | 100.0 | 69.0 | 58.9 | 77.1 | 73.8 |
| II期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | 64 | 55 | 0 | 100.0 | 14.1 | 6.9 | 23.7 | 72.6 |
| IV期 | 75 | 73 | 0 | 100.0 | 2.7 | 0.5 | 8.3 | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 198 | 60 | 対象数 | | 26 | 232 |
| % | 76.7 | 23.3 | % | | 10.1 | 89.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 63 | 121 | 55 | |
| % | | 6.6 | 24.4 | 46.9 | 21.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 100 | 15 | 64 | 75 | (1-3) | (1-3) |
| % | 38.8 | 5.8 | 24.8 | 29.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 133 | 125 | 41 | (4-6) | 80 | |
| % | 51.6 | 48.4 | 15.9 | | 31.0 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 12 | 42 | 101 | 103 | | |
| % | 4.7 | 16.3 | 39.1 | 39.9 | | |

118 県立新発田病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 13 | (1-3) | 99.2 | 90.1 | 83.5 | 94.1 | 62.2 |
| I期 | 63 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.2 | 86.0 | 98.4 | 58.1 |
| II期 | 42 | 0 | (1-3) | 97.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 |
| III期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 70.6 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 131 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 29 | 37 | 20 | 20 | | |
| % | 19.1 | 22.1 | 28.2 | 15.3 | 15.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 63 | 42 | 19 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 48.1 | 32.1 | 14.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 126 | 101 | 10 | 15 | | |
| % | | 96.2 | 77.1 | 7.6 | 11.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (7-9) | 16 | 77 | | | |
| % | 23.7 | | 12.2 | 58.8 | | | |

119 労働者健康安全機構新潟労災病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

119 労働者健康安全機構新潟労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 178 | 72 | (1-3) | 99.4 | 59.5 | 51.9 | 66.3 | 73.9 |
| I期 | 121 | 30 | (1-3) | 99.2 | 75.1 | 66.4 | 81.9 | 75.1 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 70.7 |
| III期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| IV期 | 27 | 25 | 0 | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 128 | 50 | | | | | |
| % | 71.9 | 28.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 42 | 58 | 63 | | |
| % | | 6.2 | 23.6 | 32.6 | 35.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | 13 | 15 | 27 | 0 | (1-3) | |
| % | 68.0 | 7.3 | 8.4 | 15.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 140 | 131 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 21.3 | 78.7 | 73.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 32 | 106 | 40 | | | |
| % | | 18.0 | 59.6 | 22.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 132 | 49 | (1-3) | 99.2 | 62.9 | 54.0 | 70.5 | 73.3 |
| I期 | 49 | 10 | (1-3) | 98.0 | 79.6 | 65.4 | 88.5 | 69.6 |
| II期 | 32 | (7-9) | 0 | 100.0 | 75.0 | 56.2 | 86.6 | 73.8 |
| III期 | 30 | 12 | 0 | 100.0 | 60.0 | 40.5 | 75.0 | 76.9 |
| IV期 | 21 | 19 | 0 | | | | | 80.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 80 | 52 | | | | | |
| % | 60.6 | 39.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 25 | 47 | 42 | | |
| % | | 11.4 | 18.9 | 35.6 | 31.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 32 | 30 | 21 | 0 | 0 | |
| % | 37.1 | 24.2 | 22.7 | 15.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 121 | 107 | 13 | (1-3) | | |
| % | 8.3 | 91.7 | 81.1 | 9.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 26 | 69 | 37 | | | |
| % | | 19.7 | 52.3 | 28.0 | | | |

119 労働者健康安全機構新潟労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 19 | 16 | 0 | | | | | 72.4 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 75.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 77.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 16 | (1-3) | | | | | | |
| % | 84.2 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 12 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 63.2 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 15 | (1-3) | | | | |
| % | | | 78.9 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 110 | 71 | (1-3) | 98.2 | 34.8 | 26.0 | 43.8 | 73.6 |
| I期 | 52 | 18 | (1-3) | 98.1 | 64.7 | 50.0 | 76.1 | 74.2 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 80.0 |
| III期 | 20 | 17 | 0 | | | | | 72.8 |
| IV期 | 33 | 31 | (1-3) | 97.0 | 4.6 | 0.4 | 17.4 | 74.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 78 | 32 | 対象数 | | (7-9) | 103 | | |
| % | 70.9 | 29.1 | % | | | 93.6 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 20 | 43 | 34 | | | |
| % | | 10.9 | 18.2 | 39.1 | 30.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 52 | (4-6) | 20 | 33 | 0 | 0 | | |
| % | 47.3 | | 18.2 | 30.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 73 | 37 | 37 | 0 | 0 | | | |
| % | 66.4 | 33.6 | 33.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 15 | 68 | 27 | | | | |
| % | | 13.6 | 61.8 | 24.5 | | | | |

119 労働者健康安全機構新潟労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 68.7 |
| I期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 78.0 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 60.4 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 87.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 20 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (7-9) | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 15 | 0 | 0 | | |
| % | | 75.0 | 75.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 16 | | | |
| % | | | | 80.0 | | | |

120

富山県立中央病院
2010－2011年2カ年

コメント:

当院は県内唯一の県立総合病院として、最先端の総合的がん医療を提供している。三次救急医療を担当する急性期病院であり、地域の医療機関と連携をとる地域医療支援病院として、集学的ながん治療を行っている。

高齢、併存疾患を持つなど、他施設で対応困難なリスクの高い症例についても多数受け入れしている。また、自覚症状のある進行したがん患者の紹介の割合も多く、がん種により、ステージの進んだ患者が多いことも生存率が低くなった要因と考える。

施設別生存率は、実測生存率であり、他死因を考慮されていないことに留意願います。

120 富山県立中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 697 | 232 | (4-6) | 99.1 | 66.6 | 63.0 | 70.0 | 70.0 |
| I期 | 474 | 69 | (4-6) | 98.7 | 85.4 | 81.8 | 88.3 | 70.9 |
| II期 | 44 | 16 | 0 | 100.0 | 63.6 | 47.7 | 75.9 | 68.2 |
| III期 | 37 | 23 | 0 | 100.0 | 37.8 | 22.6 | 53.0 | 69.5 |
| IV期 | 131 | 121 | 0 | 100.0 | 7.6 | 3.9 | 13.0 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 459 | 238 | | | | | |
| % | 65.9 | 34.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 35 | 69 | 202 | 249 | 142 | | |
| % | 5.0 | 9.9 | 29.0 | 35.7 | 20.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 474 | 44 | 37 | 131 | (1-3) | 10 | |
| % | 68.0 | 6.3 | 5.3 | 18.8 | | 1.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 110 | 587 | 544 | 43 | 0 | | |
| % | 15.8 | 84.2 | 78.0 | 6.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 155 | 58 | 272 | 212 | | | |
| % | 22.2 | 8.3 | 39.0 | 30.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 452 | 156 | (4-6) | 98.7 | 65.4 | 60.8 | 69.6 | 70.2 |
| I期 | 104 | (7-9) | (1-3) | 99.0 | 91.3 | 83.9 | 95.4 | 67.0 |
| II期 | 115 | 28 | (1-3) | 98.3 | 75.6 | 66.7 | 82.5 | 71.3 |
| III期 | 112 | 34 | (1-3) | 97.3 | 69.5 | 60.0 | 77.1 | 71.0 |
| IV期 | 108 | 81 | 0 | 100.0 | 25.0 | 17.3 | 33.5 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 239 | 213 | | | | | |
| % | 52.9 | 47.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 55 | 134 | 153 | 94 | | |
| % | 3.5 | 12.2 | 29.6 | 33.8 | 20.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 104 | 115 | 112 | 108 | (1-3) | 11 | |
| % | 23.0 | 25.4 | 24.8 | 23.9 | | 2.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 421 | 351 | 70 | 0 | | |
| % | 6.9 | 93.1 | 77.7 | 15.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 75 | 24 | 160 | 193 | | | |
| % | 16.6 | 5.3 | 35.4 | 42.7 | | | |

120 富山県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 138 | 85 | 0 | 100.0 | 38.4 | 30.3 | 46.4 | 70.9 |
| I期 | 50 | 18 | 0 | 100.0 | 64.0 | 49.1 | 75.6 | 73.3 |
| II期 | 45 | 25 | 0 | 100.0 | 44.4 | 29.7 | 58.2 | 68.9 |
| III期 | 32 | 31 | 0 | 100.0 | 3.1 | 0.2 | 13.7 | 72.2 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 77.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | 100 | 38 | | | | | |
| % | 72.5 | 27.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 41 | 40 | 36 | | |
| % | | 11.6 | 29.7 | 29.0 | 26.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 50 | 45 | 32 | 11 | 0 | 0 |
| | % | 36.2 | 32.6 | 23.2 | 8.0 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 30 | 47 | 25 | 36 | 0 | 0 |
| | % | 21.7 | 34.1 | 18.1 | 26.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 112 | 26 | 24 | (1-3) | 0 | | |
| % | 81.2 | 18.8 | 17.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 105 | 24 | | | |
| % | | | 76.1 | 17.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 371 | 225 | 0 | 100.0 | 39.4 | 34.4 | 44.3 | 70.5 |
| I期 | 144 | 44 | 0 | 100.0 | 69.4 | 61.2 | 76.3 | 71.3 |
| II期 | 36 | 20 | 0 | 100.0 | 44.4 | 28.0 | 59.6 | 70.8 |
| III期 | 87 | 64 | 0 | 100.0 | 26.4 | 17.7 | 36.0 | 72.2 |
| IV期 | 101 | 97 | 0 | 100.0 | 4.0 | 1.3 | 9.1 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 253 | 118 | 対象数 | | 19 | 352 |
| % | 68.2 | 31.8 | % | | 5.1 | 94.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 41 | 114 | 122 | 83 | |
| % | 3.0 | 11.1 | 30.7 | 32.9 | 22.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 144 | 36 | 87 | 101 | 0 | (1-3) |
| % | 38.8 | 9.7 | 23.5 | 27.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 170 | 201 | 173 | 25 | (1-3) | |
| % | 45.8 | 54.2 | 46.6 | 6.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 62 | 41 | 176 | 92 | | |
| % | 16.7 | 11.1 | 47.4 | 24.8 | | |

120 富山県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 283 | 25 | (1-3) | 98.9 | 91.1 | 87.1 | 93.9 | 59.3 |
| I期 | 108 | (4-6) | (1-3) | 98.1 | 95.3 | 89.1 | 98.0 | 60.0 |
| II期 | 120 | (4-6) | 0 | 100.0 | 96.7 | 91.4 | 98.7 | 59.2 |
| III期 | 44 | (7-9) | (1-3) | 97.7 | 79.2 | 63.8 | 88.6 | 58.6 |
| IV期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 53.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 283 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 70 | 69 | 88 | 35 | 21 | | |
| % | 24.7 | 24.4 | 31.1 | 12.4 | 7.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 108 | 120 | 44 | 11 | 0 | 0 | |
| % | 38.2 | 42.4 | 15.5 | 3.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 262 | 244 | 18 | 0 | | |
| % | 7.4 | 92.6 | 86.2 | 6.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 84 | 13 | 46 | 140 | | | |
| % | 29.7 | 4.6 | 16.3 | 49.5 | | | |

121 黒部市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

121 黒部市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 209 | 93 | (7-9) | 96.2 | 55.2 | 48.2 | 61.7 | 72.5 |
| I期 | 133 | 31 | (4-6) | 95.5 | 76.5 | 68.3 | 82.8 | 71.3 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 78.0 |
| III期 | 14 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.8 |
| IV期 | 42 | 40 | 0 | 100.0 | 4.8 | 0.9 | 14.2 | 75.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 136 | 73 | | | | | |
| % | 65.1 | 34.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 65 | 56 | 65 | | |
| % | | 9.6 | 31.1 | 26.8 | 31.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 133 | 12 | 14 | 42 | (7-9) | 0 | |
| % | 63.6 | 5.7 | 6.7 | 20.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 158 | 137 | 15 | (4-6) | | |
| % | 24.4 | 75.6 | 65.6 | 7.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | 15 | 141 | 22 | | | |
| % | 14.8 | 7.2 | 67.5 | 10.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 132 | 53 | (4-6) | 95.5 | 59.5 | 50.6 | 67.4 | 70.9 |
| I期 | 16 | (1-3) | (1-3) | | | | | 69.4 |
| II期 | 41 | 14 | (1-3) | 95.1 | 65.3 | 48.5 | 77.8 | 75.9 |
| III期 | 37 | (7-9) | (1-3) | 91.9 | 75.1 | 57.5 | 86.2 | 67.8 |
| IV期 | 27 | 23 | 0 | | | | | 67.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 75 | 57 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 36 | 35 | 39 | | |
| % | | 10.6 | 27.3 | 26.5 | 29.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | 41 | 37 | 27 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 12.1 | 31.1 | 28.0 | 20.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 110 | 98 | 11 | (1-3) | | |
| % | 16.7 | 83.3 | 74.2 | 8.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | 10 | 86 | 17 | | | |
| % | 14.4 | 7.6 | 65.2 | 12.9 | | | |

121 黒部市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 46 | 32 | 0 | 100.0 | 30.4 | 18.0 | 43.9 | 72.4 |
| I期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 66.5 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 32 | 14 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 11 | 21 | 10 | | |
| % | | | 23.9 | 45.7 | 21.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 14 | (7-9) | 12 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 30.4 | | 26.1 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 10 | 11 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 28.3 | 21.7 | 23.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | | |
| % | 93.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 44 | (1-3) | | | |
| % | | | 95.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 144 | 107 | (1-3) | 99.3 | 25.2 | 18.4 | 32.5 | 73.6 |
| I期 | 46 | 18 | 0 | 100.0 | 60.9 | 45.3 | 73.3 | 73.1 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.3 |
| III期 | 27 | 23 | (1-3) | | | | | 73.3 |
| IV期 | 58 | 55 | 0 | 100.0 | 5.2 | 1.4 | 13.0 | 73.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 101 | 43 | 対象数 | 11 | 133 | | |
| % | 70.1 | 29.9 | % | 7.6 | 92.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 36 | 55 | 44 | | |
| % | | | 25.0 | 38.2 | 30.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | (4-6) | 27 | 58 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 31.9 | | 18.8 | 40.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 99 | 45 | 41 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 68.8 | 31.3 | 28.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 18 | 95 | 15 | | | |
| % | 11.1 | 12.5 | 66.0 | 10.4 | | | |

121 黒部市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 67 | (7-9) | (4-6) | 94.0 | 86.5 | 75.6 | 92.7 | 62.8 |
| I期 | 27 | 0 | (1-3) | | | | | 70.3 |
| II期 | 27 | (1-3) | (1-3) | | | | | 66.5 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 85.5 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 47.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 67 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | (4-6) | 18 | 14 | 11 | | |
| % | 26.9 | | 26.9 | 20.9 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 27 | 27 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 40.3 | 40.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 55 | 45 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 17.9 | 82.1 | 67.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | (4-6) | 11 | 29 | | | |
| % | 32.8 | | 16.4 | 43.3 | | | |

122 富山労災病院
2010-2011年2カ年

コメント:

「特になし」

122 富山労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 44 | (4-6) | 94.4 | 49.5 | 38.6 | 59.4 | 73.7 |
| I期 | 55 | 16 | (1-3) | 96.4 | 70.4 | 56.2 | 80.7 | 72.5 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 74.3 |
| IV期 | 22 | 19 | (1-3) | | | | | 74.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 71 | 19 | | | | | |
| % | 78.9 | 21.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 30 | 26 | 29 | | |
| % | | | 33.3 | 28.9 | 32.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | (4-6) | (7-9) | 22 | 0 | 0 | |
| % | 61.1 | | | 24.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 75 | 61 | 14 | 0 | | |
| % | 16.7 | 83.3 | 67.8 | 15.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (4-6) | 32 | 34 | | | |
| % | 21.1 | | 35.6 | 37.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 18 | (1-3) | 96.7 | 69.8 | 56.4 | 79.8 | 72.2 |
| I期 | 26 | (4-6) | 0 | | | | | 71.2 |
| II期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 78.2 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 69.7 |
| IV期 | 12 | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 39 | 22 | | | | | |
| % | 63.9 | 36.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 12 | 25 | 14 | | |
| % | | | 19.7 | 41.0 | 23.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 17 | (4-6) | 12 | 0 | 0 | |
| % | 42.6 | 27.9 | | 19.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 54 | 43 | 11 | 0 | | |
| % | | 88.5 | 70.5 | 18.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | 25 | 28 | | | |
| % | | | 41.0 | 45.9 | | | |

122 富山労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 16 | 11 | (1-3) | | | | | 73.2 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.7 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 75.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 12 | (4-6) | | | | | | |
| % | 75.0 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 14 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 87.5 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 10 | (4-6) | | | | |
| % | | | 62.5 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 52 | 31 | 11 | 78.8 | 29.8 | 16.6 | 44.2 | 75.6 |
| I期 | 12 | (4-6) | (1-3) | | | | | 78.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 60.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.0 |
| IV期 | 27 | 18 | (7-9) | | | | | 75.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 35 | 17 | 対象数 | | (4-6) | 46 | | |
| % | 67.3 | 32.7 | % | | | 88.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 10 | 21 | 19 | | | |
| % | | | 19.2 | 40.4 | 36.5 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 12 | (4-6) | (7-9) | 27 | 0 | 0 | | |
| % | 23.1 | | | 51.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 40 | 12 | 10 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 76.9 | 23.1 | 19.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 21 | 21 | | | | |
| % | | | 40.4 | 40.4 | | | | |

122 富山労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 19 | (1-3) | (1-3) | | | | | 62.9 |
| I期 | (7-9) | 0 | (1-3) | | | | | 71.0 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 44.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 19 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 16 | 15 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 84.2 | 78.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 0 | 16 | | | |
| % | | | | 84.2 | | | |

123 富山大学附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

県内唯一の大学病院として難治例も含めた症例に対し、高度技術、先進的な取り組みをもって治療にあたっています。

123 富山大学附属病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 249 | 124 | (1-3) | 99.2 | 49.9 | 43.5 | 56.0 | 70.0 |
| I期 | 152 | 40 | (1-3) | 99.3 | 73.5 | 65.7 | 79.8 | 72.5 |
| II期 | 20 | (7-9) | (1-3) | | | | | 74.3 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.6 |
| IV期 | 65 | 65 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 189 | 60 | | | | | |
| % | 75.9 | 24.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 71 | 98 | 42 | | |
| % | | 12.0 | 28.5 | 39.4 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 152 | 20 | (7-9) | 65 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 61.0 | 8.0 | | 26.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 84 | 165 | 160 | (4-6) | 0 | | |
| % | 33.7 | 66.3 | 64.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | 21 | 66 | 130 | | | |
| % | 12.9 | 8.4 | 26.5 | 52.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 58 | (1-3) | 99.3 | 56.4 | 47.6 | 64.3 | 70.1 |
| I期 | 35 | (7-9) | 0 | 100.0 | 80.0 | 62.6 | 89.9 | 71.6 |
| II期 | 30 | (7-9) | 0 | 100.0 | 73.3 | 53.7 | 85.7 | 72.4 |
| III期 | 26 | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.8 |
| IV期 | 42 | 35 | 0 | 100.0 | 16.7 | 7.3 | 29.3 | 67.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 74 | 60 | | | | | |
| % | 55.2 | 44.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 53 | 47 | 22 | | |
| % | | | 39.6 | 35.1 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 35 | 30 | 26 | 42 | (1-3) | 0 | |
| % | 26.1 | 22.4 | 19.4 | 31.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 111 | 96 | 15 | 0 | | |
| % | 17.2 | 82.8 | 71.6 | 11.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (7-9) | 27 | 84 | | | |
| % | 11.2 | | 20.1 | 62.7 | | | |

123 富山大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 51 | (1-3) | 98.9 | 42.7 | 32.3 | 52.7 | 69.0 |
| I期 | 40 | 13 | 0 | 100.0 | 67.5 | 50.7 | 79.7 | 70.5 |
| II期 | 22 | 11 | 0 | | | | | 69.6 |
| III期 | 19 | 19 | 0 | | | | | 62.5 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|
| 対象数 | 57 | 33 | | | | | |
| % | 63.3 | 36.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 26 | 38 | 11 | | |
| % | | 12.2 | 28.9 | 42.2 | 12.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 40 | 22 | 19 | (7-9) | 0 | 0 |
| | % | 44.4 | 24.4 | 21.1 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 22 | 32 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| | % | 24.4 | 35.6 | 20.0 | 17.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | 24 | 22 | (1-3) | 0 | | |
| % | 73.3 | 26.7 | 24.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 22 | 64 | | | |
| % | | | 24.4 | 71.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 241 | 149 | (1-3) | 99.2 | 37.7 | 31.6 | 43.8 | 70.6 |
| I期 | 89 | 22 | 0 | 100.0 | 75.3 | 64.9 | 83.0 | 72.3 |
| II期 | 24 | 18 | 0 | | | | | 73.9 |
| III期 | 60 | 45 | (1-3) | 98.3 | 23.7 | 13.9 | 35.1 | 69.7 |
| IV期 | 66 | 62 | (1-3) | 98.5 | 4.7 | 1.2 | 11.8 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 177 | 64 | 対象数 | | 26 | 215 |
| % | 73.4 | 26.6 | % | | 10.8 | 89.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 66 | 97 | 43 | |
| % | | 11.2 | 27.4 | 40.2 | 17.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 89 | 24 | 60 | 66 | (1-3) | 0 |
| % | 36.9 | 10.0 | 24.9 | 27.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 126 | 115 | 109 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 52.3 | 47.7 | 45.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 23 | 31 | 40 | 147 | | |
| % | 9.5 | 12.9 | 16.6 | 61.0 | | |

123 富山大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 56 | 11 | (1-3) | 98.2 | 80.0 | 66.8 | 88.4 | 65.0 |
| I期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 64.0 |
| II期 | 23 | (4-6) | (1-3) | | | | | 59.6 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 60.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 56 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 11 | 19 | 10 | (7-9) | | |
| % | | 19.6 | 33.9 | 17.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 23 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 42.9 | 41.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 46 | 43 | (1-3) | 0 | | |
| % | 17.9 | 82.1 | 76.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 0 | 11 | 33 | | | |
| % | 21.4 | | 19.6 | 58.9 | | | |

124 厚生連高岡病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

124 厚生連高岡病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 331 | 125 | (1-3) | 99.7 | 62.2 | 56.7 | 67.1 | 71.6 |
| I期 | 216 | 32 | 0 | 100.0 | 85.2 | 79.7 | 89.3 | 71.4 |
| II期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 74.3 |
| III期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 73.6 |
| IV期 | 67 | 66 | 0 | 100.0 | 1.5 | 0.1 | 7.1 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 250 | 81 | | | | | |
| % | 75.5 | 24.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 35 | 86 | 121 | 79 | | |
| % | 3.0 | 10.6 | 26.0 | 36.6 | 23.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 216 | 17 | 18 | 67 | 12 | (1-3) | |
| % | 65.3 | 5.1 | 5.4 | 20.2 | 3.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 85 | 246 | 236 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 25.7 | 74.3 | 71.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 71 | 31 | 76 | 153 | | | |
| % | 21.5 | 9.4 | 23.0 | 46.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 88 | (1-3) | 98.8 | 63.1 | 56.6 | 68.9 | 71.5 |
| I期 | 61 | (7-9) | (1-3) | 96.7 | 88.4 | 77.2 | 94.3 | 70.8 |
| II期 | 82 | 25 | 0 | 100.0 | 69.5 | 58.3 | 78.3 | 74.7 |
| III期 | 45 | 14 | (1-3) | 97.8 | 68.3 | 52.4 | 79.8 | 71.8 |
| IV期 | 45 | 38 | 0 | 100.0 | 15.6 | 6.8 | 27.5 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 136 | 104 | | | | | |
| % | 56.7 | 43.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 28 | 61 | 76 | 66 | | |
| % | | 11.7 | 25.4 | 31.7 | 27.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | 82 | 45 | 45 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 25.4 | 34.2 | 18.8 | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 211 | 182 | 29 | 0 | | |
| % | 12.1 | 87.9 | 75.8 | 12.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | 22 | 41 | 143 | | | |
| % | 14.2 | 9.2 | 17.1 | 59.6 | | | |

124 厚生連高岡病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 44 | 0 | 100.0 | 36.2 | 25.1 | 47.4 | 73.7 |
| I期 | 30 | 12 | 0 | 100.0 | 60.0 | 40.5 | 75.0 | 72.8 |
| II期 | 14 | 11 | 0 | | | | | 75.2 |
| III期 | 14 | 11 | 0 | | | | | 74.1 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 44 | 25 | | | | | | |
| % | 63.8 | 36.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 19 | 36 | 13 | | | |
| % | | | 27.5 | 52.2 | 18.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 30 | 14 | 14 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| | % | 43.5 | 20.3 | 20.3 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 19 | 22 | (7-9) | 18 | (1-3) | 0 | |
| | % | 27.5 | 31.9 | | 26.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 52 | 17 | 16 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 75.4 | 24.6 | 23.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 47 | 20 | | | | |
| % | | | 68.1 | 29.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 332 | 207 | 0 | 100.0 | 37.7 | 32.5 | 42.8 | 72.0 |
| I期 | 136 | 44 | 0 | 100.0 | 67.7 | 59.1 | 74.8 | 72.4 |
| II期 | 23 | 15 | 0 | | | | | 68.1 |
| III期 | 75 | 61 | 0 | 100.0 | 18.7 | 10.8 | 28.2 | 71.4 |
| IV期 | 92 | 83 | 0 | 100.0 | 9.8 | 4.8 | 16.9 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 232 | 100 | 対象数 | 44 | 288 | | |
| % | 69.9 | 30.1 | % | 13.3 | 86.7 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 108 | 124 | 75 | | |
| % | | 6.3 | 32.5 | 37.3 | 22.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 136 | 23 | 75 | 92 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 41.0 | 6.9 | 22.6 | 27.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 168 | 164 | 158 | (4-6) | 0 | | |
| % | 50.6 | 49.4 | 47.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 63 | 19 | 113 | 137 | | | |
| % | 19.0 | 5.7 | 34.0 | 41.3 | | | |

124 厚生連高岡病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 120 | 17 | (1-3) | 98.3 | 85.7 | 77.9 | 90.8 | 62.1 |
| I期 | 61 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.4 | 83.5 | 97.5 | 60.5 |
| II期 | 38 | (1-3) | (1-3) | 97.4 | 97.3 | 82.3 | 99.6 | 62.7 |
| III期 | 12 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.4 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 120 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 31 | 36 | 23 | 11 | | |
| % | 15.8 | 25.8 | 30.0 | 19.2 | 9.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | 38 | 12 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 50.8 | 31.7 | 10.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 109 | 107 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 9.2 | 90.8 | 89.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | (1-3) | 18 | 74 | | | |
| % | 22.5 | | 15.0 | 61.7 | | | |

125 高岡市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

125 高岡市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 199 | 94 | (4-6) | 97.0 | 52.7 | 45.5 | 59.4 | 72.2 |
| I期 | 127 | 41 | (4-6) | 95.3 | 67.6 | 58.7 | 75.0 | 72.4 |
| II期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 73.6 |
| III期 | 21 | 17 | 0 | | | | | 69.8 |
| IV期 | 33 | 31 | 0 | 100.0 | 6.1 | 1.1 | 17.6 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 145 | 54 | | | | | |
| % | 72.9 | 27.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 51 | 65 | 58 | | |
| % | | 10.6 | 25.6 | 32.7 | 29.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 127 | 15 | 21 | 33 | (1-3) | 0 | |
| % | 63.8 | 7.5 | 10.6 | 16.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 165 | 153 | 11 | (1-3) | | |
| % | 17.1 | 82.9 | 76.9 | 5.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | 18 | 48 | 100 | | | |
| % | 16.6 | 9.0 | 24.1 | 50.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 189 | 75 | 12 | 93.7 | 60.0 | 52.6 | 66.6 | 72.7 |
| I期 | 42 | (7-9) | (4-6) | 88.1 | 80.8 | 65.3 | 89.9 | 71.2 |
| II期 | 67 | 21 | (4-6) | 94.0 | 68.4 | 55.7 | 78.1 | 75.5 |
| III期 | 42 | 16 | (1-3) | 97.6 | 61.9 | 45.5 | 74.7 | 73.8 |
| IV期 | 30 | 25 | (1-3) | 96.7 | 14.4 | 4.6 | 29.6 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 117 | 72 | | | | | |
| % | 61.9 | 38.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 43 | 71 | 54 | | |
| % | | 7.4 | 22.8 | 37.6 | 28.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 67 | 42 | 30 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 22.2 | 35.4 | 22.2 | 15.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 176 | 171 | (4-6) | 0 | | |
| % | 6.9 | 93.1 | 90.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (7-9) | 47 | 114 | | | |
| % | 10.1 | | 24.9 | 60.3 | | | |

125 高岡市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 50 | 37 | (4-6) | 92.0 | 23.5 | 12.4 | 36.7 | 72.7 |
| I期 | 26 | 14 | (4-6) | | | | | 72.4 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 75.9 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 64.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 33 | 17 | | | | | |
| % | 66.0 | 34.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 17 | 23 | (7-9) | | |
| % | | | 34.0 | 46.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 26 | 10 | (7-9) | (4-6) | 0 | 0 |
| | % | 52.0 | 20.0 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 14 | (4-6) | 11 | (1-3) | 0 |
| | % | 36.0 | 28.0 | | 22.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 44 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 88.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 38 | 12 | | | |
| % | | | 76.0 | 24.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 119 | 92 | 0 | 100.0 | 22.7 | 15.7 | 30.5 | 72.1 |
| I期 | 37 | 14 | 0 | 100.0 | 62.2 | 44.6 | 75.6 | 73.3 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 79.0 |
| III期 | 31 | 28 | 0 | 100.0 | 9.7 | 2.5 | 22.9 | 72.4 |
| IV期 | 45 | 45 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|
| 対象数 | 88 | 31 | 対象数 | | 10 | 109 | |
| % | 73.9 | 26.1 | % | | 8.4 | 91.6 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 36 | 39 | 34 | | |
| % | | | 30.3 | 32.8 | 28.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | (4-6) | 31 | 45 | (1-3) | 0 | |
| % | 31.1 | | 26.1 | 37.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 86 | 33 | 33 | 0 | 0 | | |
| % | 72.3 | 27.7 | 27.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 35 | 66 | | | |
| % | | | 29.4 | 55.5 | | | |

125 高岡市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 115 | 20 | (7-9) | 93.0 | 82.4 | 74.1 | 88.3 | 62.7 |
| I期 | 57 | (1-3) | (1-3) | 94.7 | 94.7 | 84.5 | 98.3 | 64.5 |
| II期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 60.1 |
| III期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 61.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 115 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 27 | 26 | 19 | 19 | | |
| % | 20.9 | 23.5 | 22.6 | 16.5 | 16.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 57 | 27 | 22 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 49.6 | 23.5 | 19.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 107 | 102 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 93.0 | 88.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | (1-3) | 11 | 69 | | | |
| % | 28.7 | | 9.6 | 60.0 | | | |

126 市立砺波総合病院
2011年のみ

コメント:

特になし

126 市立砺波総合病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 99 | 31 | 10 | 89.9 | 67.2 | 56.7 | 75.7 | 71.3 |
| I期 | 66 | 10 | (7-9) | 86.4 | 83.3 | 71.1 | 90.7 | 71.1 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 74.0 |
| III期 | 10 | (1-3) | (1-3) | | | | | 73.4 |
| IV期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 71 | 28 | | | | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 26 | 46 | 17 | | |
| % | | | 26.3 | 46.5 | 17.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 66 | (7-9) | 10 | 15 | 0 | (1-3) | |
| % | 66.7 | | 10.1 | 15.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 85 | 85 | 0 | 0 | | |
| % | 14.1 | 85.9 | 85.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (7-9) | 24 | 53 | | | |
| % | 14.1 | | 24.2 | 53.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | 30 | (7-9) | 90.7 | 58.0 | 45.6 | 68.5 | 71.8 |
| I期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | 65.1 |
| II期 | 25 | (7-9) | (1-3) | | | | | 73.8 |
| III期 | 20 | (7-9) | (4-6) | | | | | 74.8 |
| IV期 | 16 | 13 | 0 | | | | | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 38 | 37 | | | | | |
| % | 50.7 | 49.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 21 | 25 | 21 | | |
| % | | | 28.0 | 33.3 | 28.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 14 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | |
| % | 18.7 | 33.3 | 26.7 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 72 | 61 | 11 | 0 | | |
| % | | 96.0 | 81.3 | 14.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 0 | 10 | 51 | | | |
| % | 18.7 | | 13.3 | 68.0 | | | |

126 市立砺波総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 18 | 13 | 0 | | | | | 73.4 |
| I期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 73.2 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 75.8 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 73.7 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 64.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 14 | (4-6) | | | | | | |
| % | 77.8 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (7-9) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 15 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 83.3 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | 10 | | | | |
| % | | | | 55.6 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 75.0 |
| I期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | 0 | (1-3) | | | | | 75.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 対象数 | | (1-3) | (7-9) |
| % | | | % | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | |

126 市立砺波総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 42 | (4-6) | (1-3) | 97.6 | 85.5 | 70.6 | 93.2 | 60.7 |
| I期 | 16 | (1-3) | 0 | | | | | 61.1 |
| II期 | 21 | (1-3) | (1-3) | | | | | 57.9 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 42 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | 31.0 | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | 21 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 38.1 | 50.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 38 | 34 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 90.5 | 81.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | 11 | 18 | | | |
| % | 28.6 | | 26.2 | 42.9 | | | |

127 国立大学法人金沢大学附属病院
2011年のみ

コメント:

生存率公表について院内のコンセンサスが現時点で得られておらず、今回の公表は見送ります。

128 金沢医科大学病院
2010-2011年2カ年

コメント:

患者背景に基づかない生存率であることにご留意ください。
また、全体での状況把握割合が90%を超えていなくても、部位別で見ると把握率が90%を超えている部位がある施設データの公表も検討して欲しい。

128 金沢医科大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 270 | 92 | (7-9) | 97.0 | 65.3 | 59.2 | 70.7 | 70.2 |
| I期 | 185 | 29 | (7-9) | 95.7 | 83.9 | 77.6 | 88.5 | 70.9 |
| II期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 73.6 |
| III期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | 51 | 47 | 0 | 100.0 | 7.8 | 2.5 | 17.2 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 186 | 84 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 23 | 89 | 104 | 47 | | |
| % | | 8.5 | 33.0 | 38.5 | 17.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 185 | 15 | 16 | 51 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 68.5 | 5.6 | 5.9 | 18.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 227 | 210 | 16 | (1-3) | | |
| % | 15.9 | 84.1 | 77.8 | 5.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 23 | 104 | 108 | | | |
| % | 13.0 | 8.5 | 38.5 | 40.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 179 | 62 | (1-3) | 99.4 | 65.2 | 57.7 | 71.7 | 70.8 |
| I期 | 48 | (7-9) | 0 | 100.0 | 83.3 | 69.4 | 91.3 | 66.7 |
| II期 | 56 | (7-9) | (1-3) | 98.2 | 83.6 | 70.9 | 91.1 | 74.1 |
| III期 | 48 | 22 | 0 | 100.0 | 54.2 | 39.2 | 67.0 | 70.6 |
| IV期 | 24 | 22 | 0 | | | | | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 97 | 82 | | | | | |
| % | 54.2 | 45.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 26 | 34 | 63 | 48 | | |
| % | | 14.5 | 19.0 | 35.2 | 26.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 56 | 48 | 24 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 26.8 | 31.3 | 26.8 | 13.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 164 | 151 | 13 | 0 | | |
| % | 8.4 | 91.6 | 84.4 | 7.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (7-9) | 63 | 98 | | | |
| % | 6.1 | | 35.2 | 54.7 | | | |

128 金沢医科大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 34 | (1-3) | 98.4 | 43.9 | 31.2 | 55.9 | 70.1 |
| I期 | 22 | (7-9) | 0 | | | | | 70.8 |
| II期 | 25 | 15 | 0 | | | | | 76.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 40 | 21 | | | | | | |
| % | 65.6 | 34.4 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 18 | 24 | 12 | | | |
| % | | | 29.5 | 39.3 | 19.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 25 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 36.1 | 41.0 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 15 | 21 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 21.3 | 24.6 | 34.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 50 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 82.0 | 18.0 | 16.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 47 | 12 | | | | |
| % | | | 77.0 | 19.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 242 | 149 | (1-3) | 99.2 | 38.1 | 31.9 | 44.2 | 68.8 |
| I期 | 100 | 27 | 0 | 100.0 | 73.0 | 63.2 | 80.6 | 69.1 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 74.9 |
| III期 | 61 | 52 | 0 | 100.0 | 14.8 | 7.3 | 24.8 | 67.7 |
| IV期 | 61 | 57 | (1-3) | 96.7 | 3.7 | 0.7 | 11.2 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 169 | 73 | 対象数 | | 18 | 224 |
| % | 69.8 | 30.2 | % | | 7.4 | 92.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 91 | 93 | 27 | |
| % | | 9.9 | 37.6 | 38.4 | 11.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 100 | 14 | 61 | 61 | (4-6) | (1-3) |
| % | 41.3 | 5.8 | 25.2 | 25.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 115 | 127 | 117 | 10 | 0 | |
| % | 47.5 | 52.5 | 48.3 | 4.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 20 | 19 | 108 | 95 | | |
| % | 8.3 | 7.9 | 44.6 | 39.3 | | |

128 金沢医科大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 148 | 20 | (4-6) | 97.3 | 86.3 | 79.6 | 91.0 | 60.9 |
| I期 | 41 | (1-3) | (1-3) | 95.1 | 94.9 | 81.0 | 98.7 | 59.9 |
| II期 | 67 | (4-6) | (1-3) | 97.0 | 91.0 | 81.0 | 95.8 | 61.3 |
| III期 | 27 | (4-6) | 0 | | | | | 63.0 |
| IV期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 148 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 40 | 28 | 34 | 31 | 15 | | |
| % | 27.0 | 18.9 | 23.0 | 20.9 | 10.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 67 | 27 | 13 | 0 | 0 | |
| % | 27.7 | 45.3 | 18.2 | 8.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 141 | 125 | 16 | 0 | | |
| % | | 95.3 | 84.5 | 10.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (1-3) | 14 | 104 | | | |
| % | 18.9 | | 9.5 | 70.3 | | | |

129 小松市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

129 小松市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 201 | 80 | (1-3) | 98.5 | 59.9 | 52.7 | 66.3 | 71.3 |
| I期 | 121 | 17 | (1-3) | 99.2 | 85.9 | 78.2 | 91.0 | 72.0 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 65.0 |
| III期 | 15 | 10 | (1-3) | | | | | 70.6 |
| IV期 | 44 | 37 | (1-3) | 97.7 | 14.2 | 5.8 | 26.3 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 149 | 52 | | | | | |
| % | 74.1 | 25.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 55 | 76 | 43 | | |
| % | | 10.4 | 27.4 | 37.8 | 21.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | (7-9) | 15 | 44 | 13 | 0 | |
| % | 60.2 | | 7.5 | 21.9 | 6.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 156 | 133 | 19 | (4-6) | | |
| % | 22.4 | 77.6 | 66.2 | 9.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | 21 | 54 | 99 | | | |
| % | 13.4 | 10.4 | 26.9 | 49.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 162 | 72 | (1-3) | 99.4 | 55.5 | 47.5 | 62.8 | 72.7 |
| I期 | 42 | 13 | (1-3) | 97.6 | 68.8 | 52.4 | 80.6 | 71.2 |
| II期 | 45 | 12 | 0 | 100.0 | 73.3 | 57.9 | 83.9 | 73.8 |
| III期 | 40 | 16 | 0 | 100.0 | 60.0 | 43.2 | 73.3 | 73.3 |
| IV期 | 32 | 29 | 0 | 100.0 | 9.4 | 2.4 | 22.3 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 92 | 70 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 36 | 60 | 47 | | |
| % | | 8.0 | 22.2 | 37.0 | 29.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 45 | 40 | 32 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.9 | 27.8 | 24.7 | 19.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 133 | 109 | 20 | (4-6) | | |
| % | 17.9 | 82.1 | 67.3 | 12.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (7-9) | 30 | 108 | | | |
| % | 9.3 | | 18.5 | 66.7 | | | |

129 小松市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 40 | 30 | (1-3) | 97.5 | 23.1 | 11.5 | 37.2 | 71.2 |
| I期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 70.9 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 79.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 29 | 11 | | | | | |
| % | 72.5 | 27.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 16 | 15 | (7-9) | | |
| % | | | 40.0 | 37.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 12 | (7-9) | 12 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 30.0 | | 30.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | (7-9) | 12 | 11 | (4-6) | 0 |
| | % | | | 30.0 | 27.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | | |
| % | 82.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 19 | 21 | | | |
| % | | | 47.5 | 52.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 188 | 133 | (4-6) | 97.3 | 27.9 | 21.7 | 34.6 | 72.4 |
| I期 | 49 | 14 | (1-3) | 95.9 | 70.9 | 55.8 | 81.6 | 71.3 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 62.8 |
| III期 | 49 | 37 | (1-3) | 95.9 | 21.9 | 11.4 | 34.6 | 75.8 |
| IV期 | 69 | 68 | 0 | 100.0 | 1.5 | 0.1 | 6.9 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 135 | 53 | 対象数 | 22 | 166 | | |
| % | 71.8 | 28.2 | % | 11.7 | 88.3 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 56 | 62 | 53 | | |
| % | | 6.4 | 29.8 | 33.0 | 28.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 11 | 49 | 69 | 10 | 0 | |
| % | 26.1 | 5.9 | 26.1 | 36.7 | 5.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 110 | 78 | 67 | 11 | 0 | | |
| % | 58.5 | 41.5 | 35.6 | 5.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 15 | 60 | 95 | | | |
| % | 9.6 | 8.0 | 31.9 | 50.5 | | | |

129 小松市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 67 | 13 | (1-3) | 98.5 | 80.6 | 68.9 | 88.2 | 63.9 |
| I期 | 27 | (1-3) | (1-3) | | | | | 63.4 |
| II期 | 22 | (1-3) | 0 | | | | | 67.4 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 69.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 67 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 11 | 24 | 14 | (7-9) | | |
| % | 14.9 | 16.4 | 35.8 | 20.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 27 | 22 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 40.3 | 32.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 57 | 50 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 14.9 | 85.1 | 74.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | (7-9) | 44 | | | |
| % | 17.9 | | | 65.7 | | | |

130 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

130 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 19 | (1-3) | 98.6 | 72.4 | 60.2 | 81.4 | 68.3 |
| I期 | 51 | (4-6) | (1-3) | 98.0 | 88.2 | 75.5 | 94.5 | 68.7 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 75.7 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.5 |
| IV期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 64.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 52 | 17 | | | | | |
| % | 75.4 | 24.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 27 | 19 | 12 | | |
| % | | | 39.1 | 27.5 | 17.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | (1-3) | (1-3) | 13 | 0 | 0 | |
| % | 73.9 | | | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 56 | 54 | (1-3) | 0 | | |
| % | 18.8 | 81.2 | 78.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 12 | 43 | | | |
| % | | | 17.4 | 62.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 48 | 20 | (1-3) | 97.9 | 57.5 | 42.2 | 70.1 | 72.9 |
| I期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 74.6 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 73.7 |
| III期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 72.1 |
| IV期 | 13 | 10 | (1-3) | | | | | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 26 | 22 | | | | | |
| % | 54.2 | 45.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 11 | 22 | 11 | | |
| % | | | 22.9 | 45.8 | 22.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 14 | (7-9) | 14 | 13 | 0 | 0 | |
| % | 29.2 | | 29.2 | 27.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 46 | 41 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 95.8 | 85.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 37 | | | |
| % | | | | 77.1 | | | |

130 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.8 |
| I期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 70.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| % | | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | | | | |
| % | | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 28 | 26 | 0 | | | | | 72.8 |
| I期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 37.0 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 68.2 |
| IV期 | 20 | 19 | 0 | | | | | 75.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 22 | (4-6) | 対象数 | | (1-3) | 26 |
| % | 78.6 | | % | | | 92.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | (7-9) | 10 | |
| % | | | | | 35.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | 20 | (1-3) | 0 |
| % | | | | 71.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 18 | | |
| % | | | | 64.3 | | |

130 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 13 | 0 | 0 | | | | | 71.8 |
| I期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 75.8 |
| II期 | (7-9) | 0 | 0 | | | | | 68.9 |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 13 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 0 | 0 | (1-3) | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
| % | | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 10 | | | |
| % | | | | 76.9 | | | |

131

福井県立病院

2010-2011年2力年

コメント:

福井県立病院の5年生存率集計については、生存状況把握割合が99%以上の高い精度を有しており、がん患者さんの生存率の実情を正確に反映しているものと考えられます。

全体的な評価としては、当院で治療したがん患者の年齢構成が非常に高く、年齢要素による死亡を反映して全体的に5年実測生存率が低い結果となっています。

個々の臓器について考察すると、胃がんは早期診断症例が多いために他の施設と比較すると全体の生存率が高い傾向にありますが、今回の調査ではIV期の症例が増加したため生存率がやや低下しています。

大腸がんは高齢者が多いものの、I期とIV期の生存率向上が著しいため、全体の生存率が向上しています。

肝がんでも高齢者が多く、さらに病期の進行した症例が多いため、生存率が低くなっていますが、前年の調査よりも生存率は向上しています。

肺がんは前年と比較して生存率が5%以上向上していますが、他施設と比較すると未だ低い傾向にあります。その理由としては高齢者が多いこと、進行した症例が多いこと、観血的治療の実施率が低いことが挙げられます。とくに治療に関しては今後の問題点と考えられます。

乳がんは他施設と比較しても高い生存率を示しています。

当院としては、今回の結果をさらに詳細に分析して、今後のがん患者さんの診療に生かしていきたいと考えています。

131 福井県立病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 474 | 181 | (1-3) | 99.4 | 61.8 | 57.2 | 66.0 | 70.1 |
| I期 | 319 | 63 | (1-3) | 99.4 | 80.2 | 75.4 | 84.2 | 70.7 |
| II期 | 33 | 18 | (1-3) | 97.0 | 44.7 | 27.3 | 60.6 | 68.5 |
| III期 | 26 | 13 | 0 | | | | | 73.5 |
| IV期 | 91 | 87 | 0 | 100.0 | 4.4 | 1.4 | 10.0 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 330 | 144 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 56 | 136 | 163 | 97 | | |
| % | 4.6 | 11.8 | 28.7 | 34.4 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 319 | 33 | 26 | 91 | 0 | (4-6) | |
| % | 67.3 | 7.0 | 5.5 | 19.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 90 | 384 | 361 | 15 | (7-9) | | |
| % | 19.0 | 81.0 | 76.2 | 3.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 48 | 165 | 226 | | | |
| % | 7.4 | 10.1 | 34.8 | 47.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 311 | 108 | (1-3) | 99.4 | 65.3 | 59.7 | 70.3 | 69.0 |
| I期 | 74 | (4-6) | (1-3) | 98.6 | 94.6 | 86.1 | 97.9 | 66.5 |
| II期 | 79 | 29 | (1-3) | 98.7 | 63.3 | 51.6 | 72.8 | 70.2 |
| III期 | 91 | 31 | 0 | 100.0 | 65.9 | 55.2 | 74.7 | 68.7 |
| IV期 | 57 | 43 | 0 | 100.0 | 24.6 | 14.4 | 36.2 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 186 | 125 | | | | | |
| % | 59.8 | 40.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 35 | 98 | 98 | 60 | | |
| % | 6.4 | 11.3 | 31.5 | 31.5 | 19.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 74 | 79 | 91 | 57 | 0 | 10 | |
| % | 23.8 | 25.4 | 29.3 | 18.3 | | 3.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 253 | 235 | 16 | (1-3) | | |
| % | 18.6 | 81.4 | 75.6 | 5.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (7-9) | 70 | 203 | | | |
| % | 10.0 | | 22.5 | 65.3 | | | |

131 福井県立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 86 | 59 | (1-3) | 98.8 | 30.6 | 21.2 | 40.5 | 72.2 |
| I期 | 44 | 24 | 0 | 100.0 | 45.5 | 30.5 | 59.3 | 70.7 |
| II期 | 17 | 13 | 0 | | | | | 71.4 |
| III期 | 15 | 12 | (1-3) | | | | | 59.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 49 | 37 | | | | | |
| % | 57.0 | 43.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 19 | 35 | 23 | | |
| % | | | 22.1 | 40.7 | 26.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 44 | 17 | 15 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 51.2 | 19.8 | 17.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 28 | 14 | 20 | (1-3) | 0 |
| | % | 26.7 | 32.6 | 16.3 | 23.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 72 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| % | 83.7 | 16.3 | 16.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 61 | 24 | | | |
| % | | | 70.9 | 27.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 290 | 181 | (1-3) | 99.7 | 37.6 | 32.0 | 43.1 | 72.2 |
| I期 | 128 | 39 | (1-3) | 99.2 | 69.5 | 60.8 | 76.7 | 73.2 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 75.5 |
| III期 | 68 | 57 | 0 | 100.0 | 16.2 | 8.6 | 25.8 | 70.8 |
| IV期 | 79 | 75 | 0 | 100.0 | 5.1 | 1.6 | 11.5 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 185 | 105 | 対象数 | | 18 | 272 |
| % | 63.8 | 36.2 | % | | 6.2 | 93.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 79 | 105 | 73 | |
| % | | 9.3 | 27.2 | 36.2 | 25.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 128 | 13 | 68 | 79 | 0 | (1-3) |
| % | 44.1 | 4.5 | 23.4 | 27.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 200 | 90 | 85 | (4-6) | 0 | |
| % | 69.0 | 31.0 | 29.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 16 | 12 | 134 | 128 | | |
| % | 5.5 | 4.1 | 46.2 | 44.1 | | |

131 福井県立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 165 | (7-9) | (1-3) | 99.4 | 94.6 | 89.8 | 97.1 | 60.7 |
| I期 | 80 | (1-3) | (1-3) | 98.8 | 96.3 | 88.8 | 98.8 | 60.1 |
| II期 | 55 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| III期 | 21 | (1-3) | 0 | | | | | 62.9 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 165 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 47 | 51 | 33 | (4-6) | | |
| % | 17.0 | 28.5 | 30.9 | 20.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 80 | 55 | 21 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 48.5 | 33.3 | 12.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 150 | 148 | (1-3) | 0 | | |
| % | 9.1 | 90.9 | 89.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 40 | (7-9) | 20 | 97 | | | |
| % | 24.2 | | 12.1 | 58.8 | | | |

132 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

132 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 283 | 95 | (1-3) | 99.3 | 66.4 | 60.6 | 71.6 | 68.6 |
| I期 | 191 | 34 | (1-3) | 99.0 | 82.2 | 76.0 | 86.9 | 69.4 |
| II期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 67.2 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 65.8 |
| IV期 | 51 | 46 | 0 | 100.0 | 9.8 | 3.6 | 19.7 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 193 | 90 | | | | | |
| % | 68.2 | 31.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 55 | 89 | 72 | 58 | | |
| % | | 19.4 | 31.4 | 25.4 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 191 | 19 | 15 | 51 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 67.5 | 6.7 | 5.3 | 18.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 232 | 207 | 18 | (7-9) | | |
| % | 18.0 | 82.0 | 73.1 | 6.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 71 | 86 | 114 | | | |
| % | 4.2 | 25.1 | 30.4 | 40.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 265 | 94 | (1-3) | 98.9 | 64.3 | 58.1 | 69.7 | 68.2 |
| I期 | 62 | 10 | 0 | 100.0 | 83.9 | 72.1 | 91.0 | 69.8 |
| II期 | 70 | 16 | (1-3) | 97.1 | 76.7 | 64.8 | 85.0 | 70.2 |
| III期 | 57 | 14 | 0 | 100.0 | 75.4 | 62.1 | 84.7 | 69.6 |
| IV期 | 63 | 50 | (1-3) | 98.4 | 19.4 | 10.7 | 30.0 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 165 | 100 | | | | | |
| % | 62.3 | 37.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 50 | 71 | 82 | 45 | | |
| % | 6.4 | 18.9 | 26.8 | 30.9 | 17.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 62 | 70 | 57 | 63 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 23.4 | 26.4 | 21.5 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 253 | 194 | 57 | (1-3) | | |
| % | 4.5 | 95.5 | 73.2 | 21.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 36 | 65 | 144 | | | |
| % | 7.5 | 13.6 | 24.5 | 54.3 | | | |

132 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 162 | 110 | 0 | 100.0 | 32.1 | 25.1 | 39.3 | 71.3 |
| I期 | 77 | 42 | 0 | 100.0 | 45.5 | 34.1 | 56.1 | 71.2 |
| II期 | 43 | 32 | 0 | 100.0 | 25.6 | 13.8 | 39.1 | 73.3 |
| III期 | 31 | 25 | 0 | 100.0 | 19.4 | 7.9 | 34.6 | 75.3 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|
| 対象数 | 104 | 58 | | | | | |
| % | 64.2 | 35.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 46 | 71 | 29 | | |
| % | | 8.0 | 28.4 | 43.8 | 17.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 77 | 43 | 31 | 11 | 0 | 0 |
| | % | 47.5 | 26.5 | 19.1 | 6.8 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 47 | 47 | 38 | 30 | 0 | 0 |
| | % | 29.0 | 29.0 | 23.5 | 18.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 145 | 17 | 14 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 89.5 | 10.5 | 8.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 128 | 31 | | | |
| % | | | 79.0 | 19.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 346 | 189 | (1-3) | 99.7 | 45.4 | 40.0 | 50.5 | 68.1 |
| I期 | 169 | 39 | (1-3) | 99.4 | 76.9 | 69.8 | 82.6 | 66.1 |
| II期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 71.1 |
| III期 | 50 | 37 | 0 | 100.0 | 26.0 | 14.9 | 38.6 | 68.4 |
| IV期 | 102 | 99 | 0 | 100.0 | 2.9 | 0.8 | 7.7 | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 229 | 117 | 対象数 | | 18 | 328 |
| % | 66.2 | 33.8 | % | | 5.2 | 94.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 20 | 52 | 122 | 84 | 68 | |
| % | 5.8 | 15.0 | 35.3 | 24.3 | 19.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 169 | 16 | 50 | 102 | (7-9) | (1-3) |
| % | 48.8 | 4.6 | 14.5 | 29.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 188 | 158 | 150 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 54.3 | 45.7 | 43.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 21 | 52 | 150 | 123 | | |
| % | 6.1 | 15.0 | 43.4 | 35.5 | | |

132 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 257 | 19 | (1-3) | 99.6 | 92.6 | 88.6 | 95.2 | 55.6 |
| I期 | 134 | (4-6) | 0 | 100.0 | 96.3 | 91.3 | 98.4 | 56.9 |
| II期 | 86 | (4-6) | (1-3) | 98.8 | 94.1 | 86.5 | 97.5 | 52.8 |
| III期 | 28 | (4-6) | 0 | | | | | 52.6 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 62.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 257 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 102 | 62 | 52 | 22 | 19 | | |
| % | 39.7 | 24.1 | 20.2 | 8.6 | 7.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 134 | 86 | 28 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 52.1 | 33.5 | 10.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 246 | 233 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 4.3 | 95.7 | 90.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | 40 | 39 | 142 | | | |
| % | 14.0 | 15.6 | 15.2 | 55.3 | | | |

133

福井赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

(1) Stage I では再発が少ないにもかかわらず生存率が低く集計されているところがあります。これは当院が70歳以上の高齢患者が多いことが要因ではないかと考えています。

(2) Stage II 以上では、年齢よりもがんの進行具合とその治療によって生存率が左右されます。

特に(3) Stage III では治療による影響が強く、生存率には治療効果の良し悪しが現れていると考えます。

133 福井赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 345 | 127 | (7-9) | 97.4 | 63.1 | 57.8 | 68.0 | 71.4 |
| I期 | 246 | 49 | (7-9) | 96.7 | 80.0 | 74.4 | 84.5 | 71.5 |
| II期 | 20 | 12 | 0 | | | | | 68.5 |
| III期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 71.9 |
| IV期 | 54 | 51 | 0 | 100.0 | 5.6 | 1.5 | 13.9 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 230 | 115 | | | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 36 | 91 | 125 | 84 | | |
| % | | 10.4 | 26.4 | 36.2 | 24.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 246 | 20 | 18 | 54 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 71.3 | 5.8 | 5.2 | 15.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 76 | 269 | 237 | 18 | 14 | | |
| % | 22.0 | 78.0 | 68.7 | 5.2 | 4.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 47 | 125 | 157 | | | |
| % | 4.6 | 13.6 | 36.2 | 45.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 212 | 85 | (4-6) | 97.2 | 59.7 | 52.7 | 65.9 | 71.4 |
| I期 | 49 | 10 | (1-3) | 93.9 | 79.6 | 65.4 | 88.5 | 72.1 |
| II期 | 58 | 22 | 0 | 100.0 | 62.1 | 48.3 | 73.1 | 71.0 |
| III期 | 55 | 14 | (1-3) | 94.5 | 73.9 | 59.9 | 83.6 | 74.1 |
| IV期 | 44 | 38 | 0 | 100.0 | 13.6 | 5.5 | 25.4 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 108 | 104 | | | | | |
| % | 50.9 | 49.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | 55 | 80 | 52 | | |
| % | | 7.5 | 25.9 | 37.7 | 24.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 58 | 55 | 44 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 23.1 | 27.4 | 25.9 | 20.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 180 | 150 | 24 | (4-6) | | |
| % | 15.1 | 84.9 | 70.8 | 11.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 44 | 138 | | | |
| % | | 10.4 | 20.8 | 65.1 | | | |

133 福井赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 47 | 0 | 100.0 | 23.0 | 13.4 | 34.1 | 74.7 |
| I期 | 27 | 20 | 0 | | | | | 77.0 |
| II期 | 15 | 10 | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | 12 | 10 | 0 | | | | | 80.2 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 36 | 25 | | | | | |
| % | 59.0 | 41.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 12 | 24 | 21 | | |
| % | | | 19.7 | 39.3 | 34.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 27 | 15 | 12 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 44.3 | 24.6 | 19.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 17 | 18 | 14 | 11 | (1-3) | 0 |
| | % | 27.9 | 29.5 | 23.0 | 18.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 12 | 12 | 0 | 0 | | |
| % | 80.3 | 19.7 | 19.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 33 | 25 | | | |
| % | | | 54.1 | 41.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 282 | 178 | (7-9) | 97.5 | 36.7 | 31.1 | 42.4 | 72.8 |
| I期 | 122 | 38 | (7-9) | 94.3 | 68.5 | 59.3 | 76.0 | 72.5 |
| II期 | 14 | 10 | 0 | | | | | 72.6 |
| III期 | 61 | 47 | 0 | 100.0 | 23.0 | 13.4 | 34.1 | 72.6 |
| IV期 | 81 | 79 | 0 | 100.0 | 2.5 | 0.5 | 7.8 | 74.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 197 | 85 | 対象数 | 12 | 270 | | |
| % | 69.9 | 30.1 | % | 4.3 | 95.7 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 75 | 101 | 82 | | |
| % | | 7.1 | 26.6 | 35.8 | 29.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 122 | 14 | 61 | 81 | (4-6) | 0 | |
| % | 43.3 | 5.0 | 21.6 | 28.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 185 | 97 | 90 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 65.6 | 34.4 | 31.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 32 | 101 | 136 | | | |
| % | 4.6 | 11.3 | 35.8 | 48.2 | | | |

133 福井赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 126 | 16 | (1-3) | 97.6 | 87.2 | 80.0 | 92.0 | 61.3 |
| I期 | 60 | (1-3) | (1-3) | 96.7 | 94.9 | 85.1 | 98.3 | 62.6 |
| II期 | 43 | (4-6) | (1-3) | 97.7 | 88.4 | 74.3 | 95.0 | 59.9 |
| III期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 66.8 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 126 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 24 | 38 | 28 | (7-9) | | |
| % | 21.4 | 19.0 | 30.2 | 22.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 43 | 19 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 47.6 | 34.1 | 15.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 117 | 104 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | | 92.9 | 82.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | (4-6) | 16 | 81 | | | |
| % | 19.0 | | 12.7 | 64.3 | | | |

134 福井大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

福井大学では高齢者のみでなく、重度の併存疾患を有する患者さんの紹介が多いため、その後他病死されている方が多く、本来のがん死による生存率よりかなり低いデータになっています。
IV期の生存率データはどのがん種も他病院より良好であり、難治性がんに対する高度医療による効果ではないかと考えられます。

134 福井大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 266 | 106 | (4-6) | 98.1 | 59.7 | 53.5 | 65.3 | 70.8 |
| I期 | 161 | 33 | (4-6) | 97.5 | 79.2 | 72.1 | 84.8 | 70.7 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 64.5 |
| III期 | 25 | 13 | 0 | | | | | 77.2 |
| IV期 | 57 | 49 | (1-3) | 98.2 | 12.5 | 5.5 | 22.6 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 179 | 87 | | | | | |
| % | 67.3 | 32.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 28 | 69 | 87 | 70 | | |
| % | 4.5 | 10.5 | 25.9 | 32.7 | 26.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 161 | 19 | 25 | 57 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 60.5 | 7.1 | 9.4 | 21.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 214 | 211 | (1-3) | 0 | | |
| % | 19.5 | 80.5 | 79.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 28 | 106 | 120 | | | |
| % | 4.5 | 10.5 | 39.8 | 45.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 190 | 67 | (4-6) | 96.8 | 64.4 | 57.1 | 70.8 | 71.2 |
| I期 | 39 | (7-9) | 0 | 100.0 | 82.1 | 66.0 | 91.0 | 67.5 |
| II期 | 47 | (7-9) | (1-3) | 97.9 | 82.9 | 68.7 | 91.1 | 68.1 |
| III期 | 55 | 18 | (1-3) | 96.4 | 66.2 | 51.9 | 77.2 | 68.7 |
| IV期 | 36 | 27 | (1-3) | 91.7 | 25.0 | 12.4 | 39.8 | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 108 | 82 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 20 | 47 | 65 | 49 | | |
| % | | 10.5 | 24.7 | 34.2 | 25.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 47 | 55 | 36 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 20.5 | 24.7 | 28.9 | 18.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 177 | 172 | (4-6) | 0 | | |
| % | 6.8 | 93.2 | 90.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 18 | 61 | 100 | | | |
| % | 5.8 | 9.5 | 32.1 | 52.6 | | | |

134 福井大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 76 | 54 | 0 | 100.0 | 29.0 | 19.3 | 39.3 | 72.6 |
| I期 | 28 | 15 | 0 | | | | | 74.6 |
| II期 | 26 | 20 | 0 | | | | | 71.9 |
| III期 | 17 | 14 | 0 | | | | | 67.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 51 | 25 | | | | | | |
| % | 67.1 | 32.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 20 | 41 | 11 | | | |
| % | | | 26.3 | 53.9 | 14.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 26 | 17 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 36.8 | 34.2 | 22.4 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 21 | 24 | 18 | 0 | 0 | |
| | % | 17.1 | 27.6 | 31.6 | 23.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 59 | 17 | 16 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 77.6 | 22.4 | 21.1 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 62 | 13 | | | | |
| % | | | 81.6 | 17.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 218 | 127 | (1-3) | 99.1 | 41.5 | 34.9 | 47.9 | 70.2 |
| I期 | 98 | 30 | 0 | 100.0 | 69.4 | 59.2 | 77.5 | 68.8 |
| II期 | 14 | (7-9) | (1-3) | | | | | 75.6 |
| III期 | 45 | 35 | 0 | 100.0 | 22.2 | 11.5 | 35.1 | 71.9 |
| IV期 | 58 | 52 | (1-3) | 98.3 | 8.8 | 3.2 | 17.9 | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 162 | 56 | 対象数 | | 18 | 200 |
| % | 74.3 | 25.7 | % | | 8.3 | 91.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | 77 | 90 | 27 | |
| % | | 7.3 | 35.3 | 41.3 | 12.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 98 | 14 | 45 | 58 | (1-3) | 0 |
| % | 45.0 | 6.4 | 20.6 | 26.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 101 | 117 | 116 | (1-3) | 0 | |
| % | 46.3 | 53.7 | 53.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 27 | 112 | 77 | | |
| % | | 12.4 | 51.4 | 35.3 | | |

134 福井大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | 11 | 0 | 100.0 | 85.7 | 75.7 | 91.8 | 63.9 |
| I期 | 32 | (1-3) | 0 | 100.0 | 90.6 | 73.7 | 96.9 | 66.5 |
| II期 | 27 | (1-3) | 0 | | | | | 62.7 |
| III期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 62.8 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 66.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 77 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 13 | 24 | 17 | 10 | | |
| % | 16.9 | 16.9 | 31.2 | 22.1 | 13.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | 27 | 13 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 41.6 | 35.1 | 16.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 69 | 69 | 0 | 0 | | |
| % | | 89.6 | 89.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (1-3) | 19 | 42 | | | |
| % | 19.5 | | 24.7 | 54.5 | | | |

135 山梨県立中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

135 山梨県立中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 383 | 141 | (4-6) | 98.4 | 63.0 | 58.0 | 67.6 | 71.5 |
| I期 | 244 | 37 | (4-6) | 98.0 | 84.7 | 79.5 | 88.7 | 70.6 |
| II期 | 28 | 14 | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 20 | 10 | (1-3) | | | | | 71.0 |
| IV期 | 71 | 63 | 0 | 100.0 | 11.3 | 5.3 | 19.8 | 72.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 252 | 131 | | | | | |
| % | 65.8 | 34.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 44 | 93 | 144 | 91 | | |
| % | 2.9 | 11.5 | 24.3 | 37.6 | 23.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 244 | 28 | 20 | 71 | 19 | (1-3) | |
| % | 63.7 | 7.3 | 5.2 | 18.5 | 5.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 84 | 299 | 284 | 14 | (1-3) | | |
| % | 21.9 | 78.1 | 74.2 | 3.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 110 | 12 | 130 | 131 | | | |
| % | 28.7 | 3.1 | 33.9 | 34.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 334 | 131 | (7-9) | 97.6 | 60.3 | 54.8 | 65.3 | 70.6 |
| I期 | 79 | 17 | (1-3) | 97.5 | 78.0 | 67.1 | 85.7 | 69.9 |
| II期 | 98 | 22 | 0 | 100.0 | 77.6 | 67.9 | 84.6 | 73.2 |
| III期 | 81 | 34 | (1-3) | 96.3 | 57.0 | 45.3 | 67.0 | 71.7 |
| IV期 | 58 | 50 | (1-3) | 96.6 | 12.3 | 5.3 | 22.4 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 190 | 144 | | | | | |
| % | 56.9 | 43.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 30 | 82 | 125 | 75 | | |
| % | 6.6 | 9.0 | 24.6 | 37.4 | 22.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 79 | 98 | 81 | 58 | 10 | (7-9) | |
| % | 23.7 | 29.3 | 24.3 | 17.4 | 3.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 287 | 266 | 21 | 0 | | |
| % | 14.1 | 85.9 | 79.6 | 6.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 63 | (7-9) | 100 | 163 | | | |
| % | 18.9 | | 29.9 | 48.8 | | | |

135 山梨県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 137 | 98 | (1-3) | 97.8 | 27.7 | 20.4 | 35.4 | 72.1 |
| I期 | 69 | 41 | (1-3) | 98.6 | 40.0 | 28.4 | 51.3 | 73.8 |
| II期 | 23 | 16 | (1-3) | | | | | 70.2 |
| III期 | 30 | 27 | (1-3) | 96.7 | 8.0 | 1.5 | 22.0 | 67.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 61.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 97 | 40 | | | | | |
| % | 70.8 | 29.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 37 | 57 | 27 | | |
| % | | 10.9 | 27.0 | 41.6 | 19.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 69 | 23 | 30 | (7-9) | (7-9) | 0 |
| | % | 50.4 | 16.8 | 21.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 54 | 29 | 22 | (7-9) | 0 |
| | % | 18.2 | 39.4 | 21.2 | 16.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 119 | 18 | 18 | 0 | 0 | | |
| % | 86.9 | 13.1 | 13.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 90 | 29 | | | |
| % | | 10.2 | 65.7 | 21.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 249 | 193 | (1-3) | 99.2 | 22.3 | 17.3 | 27.7 | 71.1 |
| I期 | 62 | 21 | (1-3) | 98.4 | 65.9 | 52.6 | 76.2 | 66.6 |
| II期 | 16 | 10 | 0 | | | | | 66.8 |
| III期 | 56 | 51 | (1-3) | 98.2 | 8.3 | 2.8 | 17.7 | 73.5 |
| IV期 | 101 | 97 | 0 | 100.0 | 4.0 | 1.3 | 9.1 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 166 | 83 | 対象数 | 22 | 227 | | |
| % | 66.7 | 33.3 | % | 8.8 | 91.2 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 24 | 70 | 96 | 53 | | |
| % | | 9.6 | 28.1 | 38.6 | 21.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 62 | 16 | 56 | 101 | 12 | (1-3) | |
| % | 24.9 | 6.4 | 22.5 | 40.6 | 4.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 181 | 68 | 66 | (1-3) | 0 | | |
| % | 72.7 | 27.3 | 26.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 49 | (1-3) | 90 | 108 | | | |
| % | 19.7 | | 36.1 | 43.4 | | | |

135 山梨県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 271 | 23 | (7-9) | 96.7 | 91.4 | 87.3 | 94.2 | 57.1 |
| I期 | 119 | (1-3) | (4-6) | 95.0 | 97.4 | 92.2 | 99.2 | 55.6 |
| II期 | 104 | (4-6) | (1-3) | 98.1 | 94.2 | 87.5 | 97.4 | 55.4 |
| III期 | 34 | (1-3) | (1-3) | 97.1 | 91.0 | 74.6 | 97.0 | 53.5 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 60.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 271 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 86 | 69 | 65 | 37 | 14 | | |
| % | 31.7 | 25.5 | 24.0 | 13.7 | 5.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 119 | 104 | 34 | (7-9) | (4-6) | 0 | |
| % | 43.9 | 38.4 | 12.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 256 | 237 | 19 | 0 | | |
| % | 5.5 | 94.5 | 87.5 | 7.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 98 | (4-6) | 30 | 138 | | | |
| % | 36.2 | | 11.1 | 50.9 | | | |

136 山梨大学医学部附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

136 山梨大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 235 | 72 | (1-3) | 99.1 | 69.3 | 63.0 | 74.8 | 69.7 |
| I期 | 176 | 27 | (1-3) | 98.9 | 84.6 | 78.4 | 89.2 | 70.2 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 69.2 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 70.7 |
| IV期 | 39 | 35 | 0 | 100.0 | 10.3 | 3.3 | 22.0 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 186 | 49 | | | | | |
| % | 79.1 | 20.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 21 | 84 | 74 | 45 | | |
| % | 4.7 | 8.9 | 35.7 | 31.5 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 176 | 10 | (7-9) | 39 | 0 | (1-3) | |
| % | 74.9 | 4.3 | | 16.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 203 | 193 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 13.6 | 86.4 | 82.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 66 | 74 | 79 | | | |
| % | 6.8 | 28.1 | 31.5 | 33.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 173 | 56 | (1-3) | 99.4 | 67.6 | 60.1 | 74.0 | 67.2 |
| I期 | 53 | (7-9) | 0 | 100.0 | 84.9 | 72.1 | 92.2 | 70.2 |
| II期 | 49 | 14 | 0 | 100.0 | 71.4 | 56.6 | 82.0 | 67.1 |
| III期 | 37 | 10 | (1-3) | 97.3 | 72.9 | 55.4 | 84.4 | 62.7 |
| IV期 | 33 | 24 | 0 | 100.0 | 27.3 | 13.6 | 42.9 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 111 | 62 | | | | | |
| % | 64.2 | 35.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 33 | 42 | 46 | 36 | | |
| % | 9.2 | 19.1 | 24.3 | 26.6 | 20.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | 49 | 37 | 33 | 0 | (1-3) | |
| % | 30.6 | 28.3 | 21.4 | 19.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 161 | 141 | 17 | (1-3) | | |
| % | 6.9 | 93.1 | 81.5 | 9.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 31 | 61 | 67 | | | |
| % | 8.1 | 17.9 | 35.3 | 38.7 | | | |

136 山梨大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 197 | 95 | (1-3) | 99.5 | 51.7 | 44.5 | 58.4 | 69.4 |
| I期 | 98 | 36 | (1-3) | 99.0 | 63.1 | 52.7 | 71.8 | 71.2 |
| II期 | 62 | 31 | 0 | 100.0 | 50.0 | 37.1 | 61.6 | 69.3 |
| III期 | 25 | 19 | 0 | | | | | 65.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 73.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 135 | 62 | | | | | |
| % | 68.5 | 31.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 64 | 78 | 29 | | |
| % | | 10.7 | 32.5 | 39.6 | 14.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 98 | 62 | 25 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 49.7 | 31.5 | 12.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 52 | 67 | 47 | 19 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 26.4 | 34.0 | 23.9 | 9.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 134 | 63 | 56 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 68.0 | 32.0 | 28.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 151 | 24 | | | |
| % | | 10.2 | 76.6 | 12.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 229 | 122 | (1-3) | 99.1 | 46.3 | 39.7 | 52.7 | 72.2 |
| I期 | 139 | 46 | (1-3) | 98.6 | 66.5 | 57.9 | 73.7 | 72.2 |
| II期 | 14 | 10 | 0 | | | | | 79.3 |
| III期 | 49 | 40 | 0 | 100.0 | 18.4 | 9.1 | 30.2 | 69.8 |
| IV期 | 27 | 26 | 0 | | | | | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 149 | 80 | 対象数 | 15 | 214 | | |
| % | 65.1 | 34.9 | % | 6.6 | 93.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 58 | 82 | 65 | | |
| % | | 8.3 | 25.3 | 35.8 | 28.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 139 | 14 | 49 | 27 | 0 | 0 | |
| % | 60.7 | 6.1 | 21.4 | 11.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 120 | 109 | 101 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 52.4 | 47.6 | 44.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 42 | 102 | 65 | | | |
| % | 8.7 | 18.3 | 44.5 | 28.4 | | | |

136 山梨大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 172 | 18 | (1-3) | 99.4 | 89.5 | 83.9 | 93.3 | 58.4 |
| I期 | 94 | (4-6) | (1-3) | 98.9 | 95.7 | 89.0 | 98.4 | 57.8 |
| II期 | 48 | (4-6) | 0 | 100.0 | 87.5 | 74.3 | 94.2 | 64.7 |
| III期 | 20 | (1-3) | 0 | | | | | 55.8 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 60.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 172 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 54 | 37 | 37 | 29 | 15 | | |
| % | 31.4 | 21.5 | 21.5 | 16.9 | 8.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 94 | 48 | 20 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 54.7 | 27.9 | 11.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 161 | 141 | 12 | (7-9) | | |
| % | 6.4 | 93.6 | 82.0 | 7.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 48 | 26 | 24 | 74 | | | |
| % | 27.9 | 15.1 | 14.0 | 43.0 | | | |

137 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

137 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 612 | 158 | (4-6) | 99.0 | 74.0 | 70.4 | 77.3 | 71.8 |
| I期 | 490 | 72 | (4-6) | 99.2 | 85.2 | 81.8 | 88.1 | 71.5 |
| II期 | 31 | 16 | 0 | 100.0 | 48.4 | 30.2 | 64.4 | 75.0 |
| III期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 75.5 |
| IV期 | 60 | 53 | (1-3) | 96.7 | 9.1 | 3.4 | 18.2 | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 436 | 176 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 53 | 159 | 230 | 151 | | |
| % | 3.1 | 8.7 | 26.0 | 37.6 | 24.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 490 | 31 | 13 | 60 | (4-6) | 14 | |
| % | 80.1 | 5.1 | 2.1 | 9.8 | | 2.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | 542 | 513 | 27 | (1-3) | | |
| % | 11.4 | 88.6 | 83.8 | 4.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | 142 | 228 | 200 | | | |
| % | 6.9 | 23.2 | 37.3 | 32.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 386 | 132 | (4-6) | 98.4 | 65.5 | 60.6 | 70.1 | 70.3 |
| I期 | 119 | 17 | (1-3) | 98.3 | 85.5 | 77.8 | 90.8 | 69.1 |
| II期 | 124 | 33 | (4-6) | 96.8 | 73.0 | 64.2 | 80.0 | 72.7 |
| III期 | 75 | 27 | 0 | 100.0 | 64.0 | 52.1 | 73.7 | 72.1 |
| IV期 | 61 | 52 | 0 | 100.0 | 14.8 | 7.3 | 24.8 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 232 | 154 | | | | | |
| % | 60.1 | 39.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 53 | 115 | 105 | 97 | | |
| % | 4.1 | 13.7 | 29.8 | 27.2 | 25.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 119 | 124 | 75 | 61 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 30.8 | 32.1 | 19.4 | 15.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 370 | 331 | 38 | (1-3) | | |
| % | 4.1 | 95.9 | 85.8 | 9.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 52 | 105 | 215 | | | |
| % | 3.6 | 13.5 | 27.2 | 55.7 | | | |

137 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 88 | 62 | 0 | 100.0 | 29.6 | 20.4 | 39.2 | 71.9 |
| I期 | 41 | 28 | 0 | 100.0 | 31.7 | 18.3 | 46.0 | 74.3 |
| II期 | 23 | 15 | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 66.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 75.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 58 | 30 | | | | | |
| % | 65.9 | 34.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 19 | 37 | 21 | | |
| % | | | 21.6 | 42.0 | 23.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 41 | 23 | (7-9) | (7-9) | (7-9) | 0 |
| | % | 46.6 | 26.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 31 | 38 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | 0 |
| | % | 35.2 | 43.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 54 | 34 | 31 | (1-3) | 0 | | |
| % | 61.4 | 38.6 | 35.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 54 | 27 | | | |
| % | | | 61.4 | 30.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 332 | 201 | (4-6) | 98.2 | 39.0 | 33.7 | 44.2 | 72.8 |
| I期 | 151 | 45 | (4-6) | 96.7 | 69.8 | 61.8 | 76.5 | 71.8 |
| II期 | 33 | 19 | 0 | 100.0 | 42.4 | 25.6 | 58.3 | 70.8 |
| III期 | 60 | 52 | 0 | 100.0 | 13.3 | 6.2 | 23.2 | 71.3 |
| IV期 | 72 | 69 | (1-3) | 98.6 | 2.9 | 0.5 | 8.9 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 246 | 86 | 対象数 | 27 | 305 | | |
| % | 74.1 | 25.9 | % | 8.1 | 91.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 25 | 85 | 126 | 92 | | |
| % | | 7.5 | 25.6 | 38.0 | 27.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 151 | 33 | 60 | 72 | 16 | 0 | |
| % | 45.5 | 9.9 | 18.1 | 21.7 | 4.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 138 | 194 | 180 | 14 | 0 | | |
| % | 41.6 | 58.4 | 54.2 | 4.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | 46 | 128 | 135 | | | |
| % | 6.9 | 13.9 | 38.6 | 40.7 | | | |

137 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 245 | 36 | (1-3) | 99.2 | 85.2 | 80.1 | 89.1 | 60.0 |
| I期 | 110 | (4-6) | (1-3) | 99.1 | 96.3 | 90.5 | 98.6 | 60.1 |
| II期 | 87 | 11 | (1-3) | 98.9 | 87.3 | 78.3 | 92.8 | 57.4 |
| III期 | 27 | 12 | 0 | | | | | 70.3 |
| IV期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 56.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 245 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 68 | 54 | 58 | 41 | 24 | | |
| % | 27.8 | 22.0 | 23.7 | 16.7 | 9.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 110 | 87 | 27 | 14 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 44.9 | 35.5 | 11.0 | 5.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 220 | 211 | (7-9) | 0 | | |
| % | 10.2 | 89.8 | 86.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 50 | 23 | 32 | 140 | | | |
| % | 20.4 | 9.4 | 13.1 | 57.1 | | | |

138 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

138 国立大学法人 信州大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 236 | 67 | (1-3) | 98.7 | 71.5 | 65.3 | 76.8 | 70.2 |
| I期 | 177 | 29 | (1-3) | 98.9 | 83.6 | 77.3 | 88.3 | 70.2 |
| II期 | 17 | (7-9) | (1-3) | | | | | 73.2 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 72.8 |
| IV期 | 29 | 26 | 0 | | | | | 73.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 176 | 60 | | | | | |
| % | 74.6 | 25.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 25 | 56 | 94 | 49 | | |
| % | 5.1 | 10.6 | 23.7 | 39.8 | 20.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 177 | 17 | (7-9) | 29 | 0 | (4-6) | |
| % | 75.0 | 7.2 | | 12.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 204 | 180 | (7-9) | 17 | | |
| % | 13.6 | 86.4 | 76.3 | | 7.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 56 | 87 | 84 | | | |
| % | | 23.7 | 36.9 | 35.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 143 | 62 | 0 | 100.0 | 56.6 | 48.1 | 64.3 | 67.5 |
| I期 | 33 | (7-9) | 0 | 100.0 | 75.8 | 57.3 | 87.1 | 69.5 |
| II期 | 33 | (7-9) | 0 | 100.0 | 72.7 | 54.1 | 84.8 | 74.8 |
| III期 | 28 | (7-9) | 0 | | | | | 69.6 |
| IV期 | 38 | 32 | 0 | 100.0 | 15.8 | 6.4 | 28.9 | 65.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 88 | 55 | | | | | |
| % | 61.5 | 38.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 24 | 42 | 46 | 21 | | |
| % | 7.0 | 16.8 | 29.4 | 32.2 | 14.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 33 | 28 | 38 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 23.1 | 23.1 | 19.6 | 26.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 128 | 99 | 11 | 18 | | |
| % | 10.5 | 89.5 | 69.2 | 7.7 | 12.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 19 | 40 | 72 | | | |
| % | 8.4 | 13.3 | 28.0 | 50.3 | | | |

138 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 160 | 95 | (1-3) | 99.4 | 40.5 | 32.8 | 48.0 | 68.8 |
| I期 | 70 | 33 | (1-3) | 98.6 | 52.5 | 40.2 | 63.4 | 68.1 |
| II期 | 50 | 25 | 0 | 100.0 | 50.0 | 35.6 | 62.8 | 70.5 |
| III期 | 31 | 28 | 0 | 100.0 | 9.7 | 2.5 | 22.9 | 70.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 109 | 51 | | | | | |
| % | 68.1 | 31.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 29 | 45 | 62 | 20 | | |
| % | | 18.1 | 28.1 | 38.8 | 12.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 70 | 50 | 31 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 43.8 | 31.3 | 19.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 35 | 61 | 44 | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 21.9 | 38.1 | 27.5 | 10.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 89 | 71 | 60 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | 55.6 | 44.4 | 37.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 112 | 42 | | | |
| % | | | 70.0 | 26.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 360 | 171 | (1-3) | 99.7 | 52.5 | 47.2 | 57.5 | 69.3 |
| I期 | 191 | 38 | (1-3) | 99.5 | 80.1 | 73.7 | 85.1 | 70.7 |
| II期 | 24 | 11 | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | 60 | 45 | 0 | 100.0 | 25.0 | 14.9 | 36.4 | 67.3 |
| IV期 | 76 | 72 | 0 | 100.0 | 5.3 | 1.7 | 11.9 | 63.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 239 | 121 | 対象数 | | 23 | 337 |
| % | 66.4 | 33.6 | % | | 6.4 | 93.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 16 | 35 | 114 | 145 | 50 | |
| % | 4.4 | 9.7 | 31.7 | 40.3 | 13.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 191 | 24 | 60 | 76 | (1-3) | (4-6) |
| % | 53.1 | 6.7 | 16.7 | 21.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 153 | 207 | 189 | (1-3) | 16 | |
| % | 42.5 | 57.5 | 52.5 | | 4.4 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 48 | 51 | 145 | 116 | | |
| % | 13.3 | 14.2 | 40.3 | 32.2 | | |

138 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 196 | 18 | 0 | 100.0 | 90.8 | 85.8 | 94.1 | 58.1 |
| I期 | 80 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.0 | 87.2 | 98.1 | 60.3 |
| II期 | 84 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.9 | 84.8 | 96.7 | 58.6 |
| III期 | 25 | (4-6) | 0 | | | | | 52.4 |
| IV期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 56.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 196 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 58 | 48 | 41 | 35 | 14 | | |
| % | 29.6 | 24.5 | 20.9 | 17.9 | 7.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 80 | 84 | 25 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 40.8 | 42.9 | 12.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 155 | 135 | (1-3) | 17 | | |
| % | 20.9 | 79.1 | 68.9 | | 8.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | 33 | 19 | 112 | | | |
| % | 16.3 | 16.8 | 9.7 | 57.1 | | | |

139 諏訪赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

139 諏訪赤十字病院
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 193 | 74 | (4-6) | 97.9 | 61.5 | 54.2 | 67.9 | 72.5 |
| I期 | 125 | 27 | (4-6) | 96.8 | 78.2 | 69.8 | 84.5 | 75.1 |
| II期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 78.6 |
| III期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | 37 | 32 | 0 | 100.0 | 13.5 | 4.9 | 26.4 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 138 | 55 | | | | | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 13 | 42 | 68 | 60 | | |
| % | 5.2 | 6.7 | 21.8 | 35.2 | 31.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 125 | 15 | 11 | 37 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 64.8 | 7.8 | 5.7 | 19.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 162 | 154 | (7-9) | 0 | | |
| % | 16.1 | 83.9 | 79.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 25 | 54 | 101 | | | |
| % | 6.7 | 13.0 | 28.0 | 52.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 213 | 83 | (1-3) | 98.6 | 60.8 | 53.9 | 67.0 | 71.8 |
| I期 | 60 | (7-9) | (1-3) | 98.3 | 85.0 | 73.1 | 91.9 | 68.9 |
| II期 | 47 | 16 | (1-3) | 97.9 | 65.9 | 50.5 | 77.5 | 73.2 |
| III期 | 53 | 20 | 0 | 100.0 | 62.3 | 47.8 | 73.8 | 71.9 |
| IV期 | 45 | 36 | (1-3) | 97.8 | 18.2 | 8.5 | 30.8 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 119 | 94 | | | | | |
| % | 55.9 | 44.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 12 | 57 | 73 | 60 | | |
| % | 5.2 | 5.6 | 26.8 | 34.3 | 28.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 47 | 53 | 45 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 28.2 | 22.1 | 24.9 | 21.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 196 | 161 | 34 | (1-3) | | |
| % | 8.0 | 92.0 | 75.6 | 16.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 18 | 43 | 136 | | | |
| % | 7.5 | 8.5 | 20.2 | 63.8 | | | |

139 諏訪赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 36 | 0 | 100.0 | 41.0 | 28.6 | 52.9 | 71.5 |
| I期 | 22 | 10 | 0 | | | | | 68.1 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 71.6 |
| III期 | 13 | 10 | 0 | | | | | 71.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 37 | 24 | | | | | | |
| % | 60.7 | 39.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 19 | 27 | 11 | | | |
| % | | | 31.1 | 44.3 | 18.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 19 | 13 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 36.1 | 31.1 | 21.3 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 23 | 10 | 15 | (1-3) | 0 | |
| | % | 18.0 | 37.7 | 16.4 | 24.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | | | |
| % | 50.8 | 49.2 | 49.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 44 | 16 | | | | |
| % | | | 72.1 | 26.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 171 | 104 | (1-3) | 98.8 | 38.5 | 31.2 | 45.8 | 72.5 |
| I期 | 67 | 20 | 0 | 100.0 | 70.2 | 57.7 | 79.6 | 73.8 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 73.6 |
| III期 | 44 | 32 | (1-3) | 97.7 | 25.6 | 13.8 | 39.2 | 71.7 |
| IV期 | 46 | 42 | (1-3) | 97.8 | 6.7 | 1.7 | 16.5 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|--|
| 対象数 | 116 | 55 | 対象数 | | 13 | 158 | |
| % | 67.8 | 32.2 | % | | 7.6 | 92.4 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 40 | 69 | 44 | | |
| % | | 7.0 | 23.4 | 40.4 | 25.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 10 | 44 | 46 | (4-6) | 0 | |
| % | 39.2 | 5.8 | 25.7 | 26.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 101 | 70 | 69 | (1-3) | 0 | | |
| % | 59.1 | 40.9 | 40.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 13 | 57 | 83 | | | |
| % | 10.5 | 7.6 | 33.3 | 48.5 | | | |

139 諏訪赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 160 | 17 | (7-9) | 95.6 | 89.2 | 83.2 | 93.2 | 61.2 |
| I期 | 68 | 0 | (4-6) | 94.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| II期 | 63 | (4-6) | (1-3) | 96.8 | 90.3 | 79.6 | 95.5 | 60.7 |
| III期 | 20 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.9 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 54.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 160 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 40 | 31 | 41 | 32 | 16 | | |
| % | 25.0 | 19.4 | 25.6 | 20.0 | 10.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 68 | 63 | 20 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 42.5 | 39.4 | 12.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 148 | 147 | (1-3) | 0 | | |
| % | 7.5 | 92.5 | 91.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | 10 | 19 | 103 | | | |
| % | 17.5 | 6.3 | 11.9 | 64.4 | | | |

140 長野市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

140 長野市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 365 | 113 | (1-3) | 99.7 | 69.0 | 64.0 | 73.5 | 71.1 |
| I期 | 263 | 42 | (1-3) | 99.6 | 84.0 | 79.0 | 87.9 | 70.0 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 30 | 14 | 0 | 100.0 | 53.3 | 34.3 | 69.1 | 71.6 |
| IV期 | 49 | 47 | 0 | 100.0 | 4.1 | 0.8 | 12.3 | 75.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 253 | 112 | | | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 40 | 98 | 126 | 88 | | |
| % | 3.6 | 11.0 | 26.8 | 34.5 | 24.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 263 | 19 | 30 | 49 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 72.1 | 5.2 | 8.2 | 13.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 322 | 293 | 27 | (1-3) | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 80.3 | 7.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 78 | 125 | 145 | | | |
| % | 4.7 | 21.4 | 34.2 | 39.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 269 | 81 | (1-3) | 98.9 | 69.8 | 63.9 | 74.9 | 68.0 |
| I期 | 77 | 10 | (1-3) | 98.7 | 87.0 | 77.2 | 92.8 | 65.7 |
| II期 | 63 | 10 | (1-3) | 98.4 | 84.1 | 72.5 | 91.1 | 69.5 |
| III期 | 69 | 19 | (1-3) | 98.6 | 72.1 | 59.8 | 81.2 | 69.4 |
| IV期 | 49 | 41 | 0 | 100.0 | 16.3 | 7.6 | 27.9 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 165 | 104 | | | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 41 | 89 | 74 | 47 | | |
| % | 6.7 | 15.2 | 33.1 | 27.5 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 63 | 69 | 49 | (1-3) | 10 | |
| % | 28.6 | 23.4 | 25.7 | 18.2 | | 3.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 246 | 213 | 33 | 0 | | |
| % | 8.6 | 91.4 | 79.2 | 12.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 55 | 61 | 127 | | | |
| % | 9.7 | 20.4 | 22.7 | 47.2 | | | |

140 長野市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 43 | 31 | (1-3) | 97.7 | 27.9 | 15.6 | 41.7 | 72.5 |
| I期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.5 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 74.6 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|-------|
| 対象数 | 29 | 14 | | | | | |
| % | 67.4 | 32.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 14 | 17 | 10 | | |
| % | | | 32.6 | 39.5 | 23.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 10 | 14 | 12 | (4-6) | 0 | (1-3) |
| | % | 23.3 | 32.6 | 27.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 11 | 13 | 12 | 0 | (1-3) |
| | % | | 25.6 | 30.2 | 27.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 19 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 55.8 | 44.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 27 | 16 | | | |
| % | | | 62.8 | 37.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 257 | 136 | 0 | 100.0 | 47.1 | 40.9 | 53.0 | 71.2 |
| I期 | 122 | 19 | 0 | 100.0 | 84.4 | 76.7 | 89.8 | 70.9 |
| II期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 81.0 |
| III期 | 57 | 48 | 0 | 100.0 | 15.8 | 7.8 | 26.3 | 71.8 |
| IV期 | 67 | 65 | 0 | 100.0 | 3.0 | 0.6 | 9.3 | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 161 | 96 | 対象数 | | 17 | 240 |
| % | 62.6 | 37.4 | % | | 6.6 | 93.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 77 | 90 | 61 | |
| % | | 8.6 | 30.0 | 35.0 | 23.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 122 | 10 | 57 | 67 | (1-3) | 0 |
| % | 47.5 | 3.9 | 22.2 | 26.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 130 | 127 | 115 | 11 | (1-3) | |
| % | 50.6 | 49.4 | 44.7 | 4.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 30 | 45 | 63 | 119 | | |
| % | 11.7 | 17.5 | 24.5 | 46.3 | | |

140 長野市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 250 | 24 | (1-3) | 99.6 | 90.4 | 86.0 | 93.5 | 59.6 |
| I期 | 110 | (4-6) | (1-3) | 99.1 | 96.4 | 90.6 | 98.6 | 60.5 |
| II期 | 100 | (7-9) | 0 | 100.0 | 93.0 | 85.9 | 96.6 | 61.4 |
| III期 | 25 | (4-6) | 0 | | | | | 55.5 |
| IV期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 57.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 250 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 60 | 70 | 62 | 32 | 26 | | |
| % | 24.0 | 28.0 | 24.8 | 12.8 | 10.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 110 | 100 | 25 | 13 | 0 | (1-3) | |
| % | 44.0 | 40.0 | 10.0 | 5.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 233 | 195 | 37 | (1-3) | | |
| % | 6.8 | 93.2 | 78.0 | 14.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 56 | 24 | 25 | 145 | | | |
| % | 22.4 | 9.6 | 10.0 | 58.0 | | | |

141

長野赤十字病院

2010-2011年2カ年

コメント:

今回公表された2010-2011年症例の当院胃がん、大腸がん、肝がん、肺がんの生存率について、影響したと考えられる要因についてコメントさせていただきます。

・胃がんについては、総合ステージI期で5年以内に死亡された26症例の中で、胃がんの術後再発による死亡が確認されたのは3例のみで、ほとんどが別の疾病による死亡でした。全国平均と比べて高齢者が多く、70歳以上の患者さんの割合が66.8%と県内のがん診療連携拠点病院の中で高かったことも生存率に影響していると思われます。

・大腸がんについては、5年以内に死亡された総合ステージI期症例で死因が確定できた症例は、全て他の疾病による死亡でした。また、全国、長野県平均と比較してIV期症例の割合が高いことも全体の生存率に影響していると思われます。

・当院の肝がん治療の5年実測生存率は、40.9%と、全国（35.1%）、長野県全体（33.6%）の成績を上回りました。総合ステージI期の患者さんが多く、早期発見、早期治療が行えていると思います。

・肺がんについては、全体の実測生存率が低い原因として、当院は総合ステージIII期・IV期の進行肺がんの割合が高く、観血的治療ができた症例の割合が低いことが影響しています。

141 長野赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 205 | 89 | 0 | 100.0 | 56.6 | 49.5 | 63.1 | 73.3 |
| I期 | 129 | 26 | 0 | 100.0 | 79.8 | 71.8 | 85.8 | 71.6 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 76.8 |
| III期 | 14 | 11 | 0 | | | | | 78.0 |
| IV期 | 42 | 38 | 0 | 100.0 | 9.5 | 3.0 | 20.6 | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 147 | 58 | | | | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 55 | 79 | 58 | | |
| % | | 5.9 | 26.8 | 38.5 | 28.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 129 | 14 | 14 | 42 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 62.9 | 6.8 | 6.8 | 20.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 156 | 141 | 14 | (1-3) | | |
| % | 23.9 | 76.1 | 68.8 | 6.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 24 | 71 | 100 | | | |
| % | 4.9 | 11.7 | 34.6 | 48.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 207 | 88 | 0 | 100.0 | 57.5 | 50.5 | 63.9 | 70.0 |
| I期 | 51 | (7-9) | 0 | 100.0 | 84.3 | 71.1 | 91.8 | 68.2 |
| II期 | 40 | (7-9) | 0 | 100.0 | 82.5 | 66.8 | 91.3 | 69.6 |
| III期 | 53 | 18 | 0 | 100.0 | 66.0 | 51.6 | 77.1 | 66.4 |
| IV期 | 56 | 49 | 0 | 100.0 | 12.5 | 5.5 | 22.5 | 68.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 121 | 86 | | | | | |
| % | 58.5 | 41.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 71 | 60 | 46 | | |
| % | | 10.6 | 34.3 | 29.0 | 22.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | 40 | 53 | 56 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 24.6 | 19.3 | 25.6 | 27.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 177 | 155 | 21 | (1-3) | | |
| % | 14.5 | 85.5 | 74.9 | 10.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 14 | 32 | 135 | | | |
| % | 12.6 | 6.8 | 15.5 | 65.2 | | | |

141 長野赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 93 | 54 | (1-3) | 97.8 | 40.9 | 30.7 | 50.7 | 68.7 |
| I期 | 41 | 17 | 0 | 100.0 | 58.5 | 42.1 | 71.8 | 68.7 |
| II期 | 30 | 18 | (1-3) | 96.7 | 38.0 | 20.9 | 55.0 | 73.6 |
| III期 | 13 | 10 | (1-3) | | | | | 64.2 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 60 | 33 | | | | | |
| % | 64.5 | 35.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 10 | 26 | 37 | 13 | | |
| % | | 10.8 | 28.0 | 39.8 | 14.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 41 | 30 | 13 | (7-9) | 0 | 0 |
| | % | 44.1 | 32.3 | 14.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 20 | 36 | 21 | 12 | (1-3) | 0 |
| | % | 21.5 | 38.7 | 22.6 | 12.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 35 | 30 | (4-6) | 0 | | |
| % | 62.4 | 37.6 | 32.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 62 | 24 | | | |
| % | | | 66.7 | 25.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 213 | 158 | (1-3) | 99.5 | 25.6 | 19.9 | 31.6 | 69.8 |
| I期 | 48 | 15 | 0 | 100.0 | 68.8 | 53.6 | 79.8 | 68.0 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | 59 | 51 | (1-3) | 98.3 | 12.3 | 5.4 | 22.2 | 65.6 |
| IV期 | 81 | 76 | 0 | 100.0 | 6.2 | 2.3 | 12.8 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 156 | 57 | 対象数 | 40 | 173 | | |
| % | 73.2 | 26.8 | % | 18.8 | 81.2 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 27 | 61 | 65 | 48 | | |
| % | 5.6 | 12.7 | 28.6 | 30.5 | 22.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 12 | 59 | 81 | 13 | 0 | |
| % | 22.5 | 5.6 | 27.7 | 38.0 | 6.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 150 | 63 | 60 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 70.4 | 29.6 | 28.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 21 | 58 | 118 | | | |
| % | 7.5 | 9.9 | 27.2 | 55.4 | | | |

141 長野赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 224 | 25 | 0 | 100.0 | 88.8 | 83.9 | 92.3 | 59.8 |
| I期 | 90 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.7 | 90.0 | 98.9 | 57.3 |
| II期 | 94 | (7-9) | 0 | 100.0 | 91.5 | 83.7 | 95.7 | 56.8 |
| III期 | 26 | (1-3) | 0 | | | | | 62.3 |
| IV期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 57.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 224 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 63 | 50 | 54 | 29 | 28 | | |
| % | 28.1 | 22.3 | 24.1 | 12.9 | 12.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 94 | 26 | 12 | (1-3) | 0 | |
| % | 40.2 | 42.0 | 11.6 | 5.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 200 | 196 | (4-6) | 0 | | |
| % | 10.7 | 89.3 | 87.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 13 | 18 | 158 | | | |
| % | 15.6 | 5.8 | 8.0 | 70.5 | | | |

142 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

142 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 342 | 152 | (1-3) | 99.4 | 55.3 | 49.9 | 60.4 | 71.6 |
| I期 | 181 | 26 | 0 | 100.0 | 85.6 | 79.6 | 90.0 | 69.8 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 67.9 |
| III期 | 36 | 26 | 0 | 100.0 | 27.8 | 14.5 | 42.8 | 71.5 |
| IV期 | 64 | 56 | (1-3) | 98.4 | 11.3 | 5.0 | 20.4 | 74.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 237 | 105 | | | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 42 | 88 | 104 | 93 | | |
| % | 4.4 | 12.3 | 25.7 | 30.4 | 27.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 181 | 19 | 36 | 64 | 33 | (7-9) | |
| % | 52.9 | 5.6 | 10.5 | 18.7 | 9.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 92 | 250 | 226 | (7-9) | 16 | | |
| % | 26.9 | 73.1 | 66.1 | | 4.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 75 | 87 | 166 | | | |
| % | 4.1 | 21.9 | 25.4 | 48.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 363 | 165 | (1-3) | 99.7 | 54.4 | 49.2 | 59.4 | 72.1 |
| I期 | 66 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.9 | 80.9 | 95.8 | 66.8 |
| II期 | 95 | 26 | (1-3) | 98.9 | 72.4 | 62.1 | 80.3 | 74.3 |
| III期 | 81 | 33 | 0 | 100.0 | 59.3 | 47.8 | 69.0 | 71.2 |
| IV期 | 98 | 85 | 0 | 100.0 | 13.3 | 7.5 | 20.8 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 211 | 152 | | | | | |
| % | 58.1 | 41.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 39 | 78 | 125 | 106 | | |
| % | 4.1 | 10.7 | 21.5 | 34.4 | 29.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 66 | 95 | 81 | 98 | 17 | (4-6) | |
| % | 18.2 | 26.2 | 22.3 | 27.0 | 4.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 74 | 289 | 242 | 40 | (7-9) | | |
| % | 20.4 | 79.6 | 66.7 | 11.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 68 | 30 | 62 | 203 | | | |
| % | 18.7 | 8.3 | 17.1 | 55.9 | | | |

142 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 62 | 55 | (1-3) | 98.4 | 10.8 | 4.5 | 20.1 | 73.8 |
| I期 | 19 | 13 | (1-3) | | | | | 72.6 |
| II期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 72.6 |
| III期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 78.1 |
| IV期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 37 | 25 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 14 | 17 | 25 | | |
| % | | | 22.6 | 27.4 | 40.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 19 | 13 | 14 | 15 | (1-3) | 0 |
| | % | 30.6 | 21.0 | 22.6 | 24.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 14 | 15 | 21 | (1-3) | 0 |
| | % | 17.7 | 22.6 | 24.2 | 33.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 28 | 32 | | | |
| % | | | 45.2 | 51.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 222 | 140 | 0 | 100.0 | 36.9 | 30.6 | 43.3 | 72.2 |
| I期 | 95 | 26 | 0 | 100.0 | 72.6 | 62.5 | 80.5 | 69.3 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 79.1 |
| III期 | 32 | 24 | 0 | 100.0 | 25.0 | 11.8 | 40.7 | 71.1 |
| IV期 | 76 | 75 | 0 | 100.0 | 1.3 | 0.1 | 6.3 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 154 | 68 | 対象数 | 17 | 205 | | |
| % | 69.4 | 30.6 | % | 7.7 | 92.3 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 18 | 52 | 74 | 65 | | |
| % | 5.9 | 8.1 | 23.4 | 33.3 | 29.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 95 | 12 | 32 | 76 | (7-9) | 0 | |
| % | 42.8 | 5.4 | 14.4 | 34.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 116 | 106 | 95 | 10 | (1-3) | | |
| % | 52.3 | 47.7 | 42.8 | 4.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 25 | 80 | 96 | | | |
| % | 9.5 | 11.3 | 36.0 | 43.2 | | | |

142 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 157 | 21 | (4-6) | 96.8 | 86.6 | 80.2 | 91.0 | 60.5 |
| I期 | 68 | (4-6) | (1-3) | 95.6 | 91.1 | 81.2 | 95.9 | 56.8 |
| II期 | 46 | (1-3) | (1-3) | 95.7 | 93.5 | 81.1 | 97.9 | 60.1 |
| III期 | 27 | (4-6) | 0 | | | | | 58.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 74.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 157 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 45 | 28 | 41 | 24 | 19 | | |
| % | 28.7 | 17.8 | 26.1 | 15.3 | 12.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 68 | 46 | 27 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | |
| % | 43.3 | 29.3 | 17.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 141 | 127 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 10.2 | 89.8 | 80.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 21 | 19 | 91 | | | |
| % | 16.6 | 13.4 | 12.1 | 58.0 | | | |

143

伊那中央病院

2010-2011年2力年

コメント:

胃がん、大腸がんについては、70歳以上の高齢者の割合が大きいこと及びIV期の比率が高いことが5年生存率に反映していることが考えられる。

肺がんについては、70歳以上の高齢者の割合が、全国及び県より高いもののI期の比率が高く5年生存率も全国数値を上回っており、CTによる肺がん検診の普及が寄与しているものと考えられる。2017年に実施したPET-CTの新規導入や放射線治療装置の高精度化及び検診センターの拡充によりがん診療機能の向上が図られた。

今後も、各種がんの5年生存率など、長期予後のさらなる改善に取り組んでいく。

143 伊那中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 157 | 64 | 0 | 100.0 | 59.2 | 51.1 | 66.5 | 73.7 |
| I期 | 93 | 15 | 0 | 100.0 | 83.9 | 74.7 | 90.0 | 74.7 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 79.8 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | 38 | 35 | 0 | 100.0 | 7.9 | 2.0 | 19.1 | 74.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 108 | 49 | | | | | |
| % | 68.8 | 31.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 39 | 64 | 45 | | |
| % | | | 24.8 | 40.8 | 28.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 93 | 11 | 12 | 38 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 59.2 | 7.0 | 7.6 | 24.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 131 | 119 | 10 | (1-3) | | |
| % | 16.6 | 83.4 | 75.8 | 6.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 16 | 22 | 105 | | | |
| % | 8.9 | 10.2 | 14.0 | 66.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 186 | 72 | (7-9) | 95.7 | 60.3 | 52.7 | 67.0 | 71.2 |
| I期 | 29 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.0 |
| II期 | 63 | 17 | (1-3) | 95.2 | 72.0 | 58.8 | 81.6 | 72.3 |
| III期 | 49 | 15 | (1-3) | 95.9 | 68.8 | 53.7 | 79.9 | 70.4 |
| IV期 | 38 | 30 | (1-3) | 94.7 | 17.3 | 7.1 | 31.3 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 113 | 73 | | | | | |
| % | 60.8 | 39.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 25 | 52 | 48 | 54 | | |
| % | | 13.4 | 28.0 | 25.8 | 29.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 63 | 49 | 38 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 15.6 | 33.9 | 26.3 | 20.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 164 | 160 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 86.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (7-9) | 19 | 130 | | | |
| % | 15.1 | | 10.2 | 69.9 | | | |

143 伊那中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 34 | 24 | (1-3) | 97.1 | 27.3 | 13.6 | 42.9 | 75.9 |
| I期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 78.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 76.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 17 | 17 | | | | | |
| % | 50.0 | 50.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 16 | 12 | | |
| % | | | | 47.1 | 35.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 13 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 38.2 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 10 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 35.3 | 29.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | 73.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 15 | 19 | | | |
| % | | | 44.1 | 55.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 197 | 116 | (1-3) | 99.5 | 41.1 | 34.1 | 47.8 | 71.5 |
| I期 | 84 | 22 | 0 | 100.0 | 73.8 | 63.0 | 81.9 | 72.8 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 71.9 |
| III期 | 51 | 41 | (1-3) | 98.0 | 19.0 | 9.6 | 30.9 | 70.2 |
| IV期 | 47 | 47 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 131 | 66 | 対象数 | | 19 | 178 |
| % | 66.5 | 33.5 | % | | 9.6 | 90.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 58 | 73 | 43 | |
| % | | 10.2 | 29.4 | 37.1 | 21.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 84 | 10 | 51 | 47 | (1-3) | (1-3) |
| % | 42.6 | 5.1 | 25.9 | 23.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 102 | 95 | 94 | (1-3) | 0 | |
| % | 51.8 | 48.2 | 47.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 38 | 18 | 45 | 96 | | |
| % | 19.3 | 9.1 | 22.8 | 48.7 | | |

143 伊那中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 79 | 13 | (1-3) | 98.7 | 83.5 | 73.4 | 90.1 | 64.6 |
| I期 | 22 | (1-3) | (1-3) | | | | | 64.8 |
| II期 | 38 | (1-3) | 0 | 100.0 | 92.1 | 77.5 | 97.4 | 64.6 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 69.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 57.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 79 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 16 | 24 | 14 | 13 | | |
| % | 15.2 | 20.3 | 30.4 | 17.7 | 16.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 38 | 15 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 27.8 | 48.1 | 19.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 73 | 71 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 92.4 | 89.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (1-3) | (4-6) | 51 | | | |
| % | 25.3 | | | 64.6 | | | |

144 岐阜大学医学部附属病院
2011年のみ

コメント:

今回、公表されます院内がん登録の生存率集計は当院の場合は集計値が、2010年の予後判明率が90%未満のため、2011年だけの集計値となっております。生存率は年齢や併存症（例：重篤な糖尿病や心疾患など）によっても大きく変わってきます。ステージが同じでもがんの進行度や全身状態によっても異なるものです。注目度が高い予後に関連する数字を出す場合は 関連する要因（基礎疾患、年齢等）も加えた情報での公開が必要となってくると考えられます。

144 岐阜大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 209 | 77 | (4-6) | 97.1 | 62.4 | 55.4 | 68.6 | 69.1 |
| I期 | 130 | 21 | (1-3) | 97.7 | 83.7 | 76.0 | 89.0 | 69.3 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 69.5 |
| III期 | 17 | 12 | 0 | | | | | 72.8 |
| IV期 | 47 | 38 | (1-3) | 93.6 | 13.8 | 5.6 | 25.6 | 67.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 146 | 63 | | | | | |
| % | 69.9 | 30.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 70 | 73 | 33 | | |
| % | | 12.9 | 33.5 | 34.9 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 130 | 11 | 17 | 47 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 62.2 | 5.3 | 8.1 | 22.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 179 | 166 | 12 | (1-3) | | |
| % | 14.4 | 85.6 | 79.4 | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 17 | 73 | 105 | | | |
| % | 6.7 | 8.1 | 34.9 | 50.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 181 | 50 | (1-3) | 98.9 | 72.2 | 65.0 | 78.2 | 67.7 |
| I期 | 49 | (7-9) | 0 | 100.0 | 85.7 | 72.4 | 92.9 | 67.4 |
| II期 | 40 | (4-6) | (1-3) | 97.5 | 84.9 | 69.5 | 92.9 | 70.4 |
| III期 | 55 | 15 | 0 | 100.0 | 72.7 | 58.9 | 82.6 | 68.4 |
| IV期 | 27 | 21 | (1-3) | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 110 | 71 | | | | | |
| % | 60.8 | 39.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 22 | 57 | 63 | 25 | | |
| % | 7.7 | 12.2 | 31.5 | 34.8 | 13.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 40 | 55 | 27 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 27.1 | 22.1 | 30.4 | 14.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 167 | 140 | 27 | 0 | | |
| % | 7.7 | 92.3 | 77.3 | 14.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 19 | 51 | 102 | | | |
| % | | 10.5 | 28.2 | 56.4 | | | |

144 岐阜大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 48 | 27 | (4-6) | 91.7 | 41.1 | 26.8 | 54.8 | 70.4 |
| I期 | 20 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.6 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 71.9 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.1 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 37 | 11 | | | | | |
| % | 77.1 | 22.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | 20 | 10 | | |
| % | | | 22.9 | 41.7 | 20.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 20 | 11 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 41.7 | 22.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 17 | (4-6) | 11 | (1-3) | 0 |
| | % | 27.1 | 35.4 | | 22.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 21 | 18 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 56.3 | 43.8 | 37.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 36 | 10 | | | |
| % | | | 75.0 | 20.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 190 | 104 | (4-6) | 97.9 | 44.4 | 37.1 | 51.3 | 70.4 |
| I期 | 89 | 28 | (1-3) | 98.9 | 68.4 | 57.6 | 77.0 | 72.1 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 74.5 |
| III期 | 37 | 24 | (1-3) | 91.9 | 29.7 | 15.5 | 45.3 | 68.6 |
| IV期 | 48 | 44 | 0 | 100.0 | 8.3 | 2.7 | 18.2 | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 127 | 63 | 対象数 | | 19 | 171 |
| % | 66.8 | 33.2 | % | | 10.0 | 90.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 64 | 68 | 35 | |
| % | | 10.0 | 33.7 | 35.8 | 18.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 89 | 13 | 37 | 48 | (1-3) | (1-3) |
| % | 46.8 | 6.8 | 19.5 | 25.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 92 | 98 | 93 | (4-6) | 0 | |
| % | 48.4 | 51.6 | 48.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 11 | 14 | 91 | 74 | | |
| % | 5.8 | 7.4 | 47.9 | 38.9 | | |

144 岐阜大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 60 | 14 | (1-3) | 96.7 | 76.1 | 63.0 | 85.1 | 60.8 |
| I期 | 16 | (1-3) | 0 | | | | | 63.1 |
| II期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 58.6 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 69.4 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 55.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 60 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 16 | 16 | 12 | (4-6) | | |
| % | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 20.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | 27 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 26.7 | 45.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 50 | 43 | (7-9) | 0 | | |
| % | 16.7 | 83.3 | 71.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 16 | 35 | | | |
| % | | | 26.7 | 58.3 | | | |

145 高山赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

当院は飛騨地域の中核病院として幅広くがん患者を受け入れています。
胃・大腸・女性乳房に関しては、当院にて観血的手術を行っており、大腸・女性乳房については、観血的手術の実施率は85%を超えています。肺については、観血的手術は行っておらず、他施設へ紹介しています。
集計件数は岐阜県内のがん診療連携拠点病院の中では一番少ないですが、生存状況把握割合は2カ年平均で99%と高くなっています。
今回の2010-2011年診断例については、登録内容の精度も十分とは言えないため、集計値においては、あくまでも参考にしていただければと思います。

145 高山赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 110 | 53 | (1-3) | 99.1 | 51.8 | 42.1 | 60.7 | 71.8 |
| I期 | 55 | (7-9) | (1-3) | 98.2 | 83.6 | 70.9 | 91.1 | 70.3 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 67.6 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 59.3 |
| IV期 | 26 | 23 | 0 | | | | | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 74 | 36 | | | | | |
| % | 67.3 | 32.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 19 | 51 | 26 | | |
| % | | | 17.3 | 46.4 | 23.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | (7-9) | (7-9) | 26 | 14 | 0 | |
| % | 50.0 | | | 23.6 | 12.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 70 | 58 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 36.4 | 63.6 | 52.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (7-9) | 29 | 56 | | | |
| % | 16.4 | | 26.4 | 50.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 156 | 67 | (1-3) | 99.4 | 57.0 | 48.8 | 64.3 | 72.4 |
| I期 | 37 | (7-9) | (1-3) | 97.3 | 80.8 | 63.8 | 90.3 | 68.4 |
| II期 | 37 | 11 | 0 | 100.0 | 70.3 | 52.8 | 82.3 | 76.8 |
| III期 | 39 | 13 | 0 | 100.0 | 66.7 | 49.6 | 79.1 | 71.2 |
| IV期 | 38 | 32 | 0 | 100.0 | 15.8 | 6.4 | 28.9 | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 92 | 64 | | | | | |
| % | 59.0 | 41.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 39 | 49 | 49 | | |
| % | | 8.3 | 25.0 | 31.4 | 31.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 37 | 39 | 38 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 23.7 | 23.7 | 25.0 | 24.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 133 | 104 | 11 | 18 | | |
| % | 14.7 | 85.3 | 66.7 | 7.1 | 11.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (1-3) | 31 | 96 | | | |
| % | 17.9 | | 19.9 | 61.5 | | | |

145 高山赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 23 | 16 | 0 | | | | | 72.7 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 65.3 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 74.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 15 | (7-9) | | | | | |
| % | 65.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 14 | (1-3) | | |
| % | | | | 60.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 82.6 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 15 | (7-9) | | | |
| % | | | 65.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 51 | 48 | 0 | 100.0 | 5.9 | 1.5 | 14.6 | 75.6 |
| I期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 74.8 |
| IV期 | 23 | 23 | 0 | | | | | 73.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 41 | 10 | | | (7-9) | 43 |
| % | 80.4 | 19.6 | | | | 84.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 18 | 24 | |
| % | | | | 35.3 | 47.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 15 | 23 | 11 | 0 |
| % | | | 29.4 | 45.1 | 21.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 12 | 33 | | |
| % | | | 23.5 | 64.7 | | |

145 高山赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 58 | (7-9) | (1-3) | 98.3 | 86.1 | 74.1 | 92.8 | 60.4 |
| I期 | 29 | (1-3) | 0 | | | | | 61.3 |
| II期 | 23 | (1-3) | (1-3) | | | | | 57.7 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 55.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 58 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 12 | 12 | (7-9) | (7-9) | | |
| % | 31.0 | 20.7 | 20.7 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 23 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 50.0 | 39.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 55 | 48 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | 94.8 | 82.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 0 | 11 | 33 | | | |
| % | 24.1 | | 19.0 | 56.9 | | | |

146 岐阜県総合医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

当センターでは、循環器疾患、呼吸器疾患をはじめ、多くの併存疾患を有する患者、高齢者に対しても、がん治療が積極的に行われており、他病死の割合が多いと考えられる。また、重複癌の患者数も多い。胃癌、大腸癌Stage1症例の5生率が低いのはその表れと思われる。算出された生存率のみでの施設間比較は適切でなく、あくまでの参考値として取り扱っていただきたい。

146 岐阜県総合医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 295 | 130 | (7-9) | 97.6 | 55.1 | 49.2 | 60.6 | 70.1 |
| I期 | 172 | 42 | (4-6) | 97.7 | 75.1 | 67.8 | 80.9 | 70.9 |
| II期 | 31 | 12 | (1-3) | 96.8 | 61.3 | 42.0 | 75.9 | 69.3 |
| III期 | 15 | 10 | 0 | | | | | 68.9 |
| IV期 | 75 | 66 | (1-3) | 97.3 | 9.6 | 4.2 | 17.6 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 201 | 94 | | | | | |
| % | 68.1 | 31.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 27 | 87 | 101 | 63 | | |
| % | 5.8 | 9.2 | 29.5 | 34.2 | 21.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 172 | 31 | 15 | 75 | 0 | (1-3) | |
| % | 58.3 | 10.5 | 5.1 | 25.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 64 | 231 | 218 | 13 | 0 | | |
| % | 21.7 | 78.3 | 73.9 | 4.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 38 | 90 | 155 | | | |
| % | 4.1 | 12.9 | 30.5 | 52.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 337 | 131 | (4-6) | 98.8 | 61.0 | 55.5 | 66.0 | 70.2 |
| I期 | 72 | 22 | 0 | 100.0 | 69.4 | 57.4 | 78.7 | 72.0 |
| II期 | 84 | 20 | (1-3) | 98.8 | 76.0 | 65.3 | 83.8 | 73.0 |
| III期 | 101 | 27 | (1-3) | 98.0 | 73.2 | 63.4 | 80.8 | 70.6 |
| IV期 | 76 | 62 | (1-3) | 98.7 | 17.5 | 9.9 | 26.9 | 66.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 173 | 164 | | | | | |
| % | 51.3 | 48.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 29 | 110 | 124 | 62 | | |
| % | 3.6 | 8.6 | 32.6 | 36.8 | 18.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 72 | 84 | 101 | 76 | 0 | (4-6) | |
| % | 21.4 | 24.9 | 30.0 | 22.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 286 | 262 | 22 | (1-3) | | |
| % | 15.1 | 84.9 | 77.7 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | 15 | 88 | 198 | | | |
| % | 10.7 | 4.5 | 26.1 | 58.8 | | | |

146 岐阜県総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 103 | 67 | (4-6) | 95.1 | 32.0 | 23.0 | 41.3 | 71.6 |
| I期 | 29 | 14 | 0 | | | | | 73.7 |
| II期 | 35 | 25 | (1-3) | 97.1 | 26.5 | 13.2 | 41.8 | 73.0 |
| III期 | 27 | 19 | (1-3) | | | | | 68.9 |
| IV期 | 12 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 66 | 37 | | | | | |
| % | 64.1 | 35.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 30 | 44 | 20 | | |
| % | | | 29.1 | 42.7 | 19.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 29 | 35 | 27 | 12 | 0 | 0 |
| | % | 28.2 | 34.0 | 26.2 | 11.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 16 | 31 | 20 | 34 | (1-3) | 0 |
| | % | 15.5 | 30.1 | 19.4 | 33.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 84 | 19 | 16 | (1-3) | 0 | | |
| % | 81.6 | 18.4 | 15.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 60 | 37 | | | |
| % | | | 58.3 | 35.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 244 | 171 | (7-9) | 97.1 | 28.2 | 22.7 | 34.1 | 72.2 |
| I期 | 66 | 22 | (1-3) | 98.5 | 66.6 | 53.8 | 76.6 | 73.0 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 69.8 |
| III期 | 74 | 59 | (1-3) | 95.9 | 16.9 | 9.3 | 26.5 | 73.4 |
| IV期 | 91 | 83 | (1-3) | 96.7 | 5.9 | 2.2 | 12.2 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 170 | 74 | 対象数 | 12 | 232 | |
| % | 69.7 | 30.3 | % | 4.9 | 95.1 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 68 | 106 | 48 | |
| % | | 8.2 | 27.9 | 43.4 | 19.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 66 | 10 | 74 | 91 | 0 | (1-3) |
| % | 27.0 | 4.1 | 30.3 | 37.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 183 | 61 | 59 | (1-3) | 0 | |
| % | 75.0 | 25.0 | 24.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 93 | 132 | | |
| % | | 6.1 | 38.1 | 54.1 | | |

146 岐阜県総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 228 | 22 | (1-3) | 99.1 | 90.3 | 85.7 | 93.5 | 58.9 |
| I期 | 107 | (4-6) | (1-3) | 98.1 | 94.4 | 87.9 | 97.4 | 59.3 |
| II期 | 74 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.7 | 90.8 | 99.8 | 59.9 |
| III期 | 38 | (7-9) | 0 | 100.0 | 76.3 | 59.4 | 86.9 | 59.2 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 228 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 65 | 53 | 64 | 27 | 19 | | |
| % | 28.5 | 23.2 | 28.1 | 11.8 | 8.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 107 | 74 | 38 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 46.9 | 32.5 | 16.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 201 | 194 | (7-9) | 0 | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 85.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | (7-9) | 25 | 136 | | | |
| % | 25.4 | | 11.0 | 59.6 | | | |

147 岐阜県立多治見病院
2011年のみ

コメント:

胃がん、大腸がん、肝がんとも岐阜県全体に比べて80歳以上が多い傾向ですが、5年生存率に特別な差はありません。

胃がんは、全体の5年生存率は岐阜県の全体値と比べ、やや低値です。I期の対象数に比べ、II期・III期の対象数が極めて少なくなっており、術前病期診断が実際よりやや早期として診ている可能性があります。また、IV期の対象割合がやや多くなっています。

大腸がんは、全体の5年生存率は岐阜県の全体値と比べ、やや高値です。I期からIII期までは高値、IV期は同等です。今回は、どの病期も同じくらいの割合で分布しており、治療内容に偏りはないように思われます。

肝がんは、全体の5年生存率は岐阜県の全体値と比べ、やや低値ですが、2011年のみの集計のため、各病期とも対象数が少なく、分析しにくい結果となっています。

肺がんは、岐阜県のお施設と比較して各病期の割合、生存率ともほぼ同等の水準と考えます。乳がんは、乳癌治療はガイドラインにてほぼ標準化されていることもあり、当院の治療成績も全国的な数値と比して大きな隔たりはないもと考えます。

147 岐阜県立多治見病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 122 | 68 | (1-3) | 99.2 | 44.1 | 35.2 | 52.7 | 71.7 |
| I期 | 67 | 19 | 0 | 100.0 | 71.6 | 59.2 | 80.9 | 72.1 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 77.3 |
| III期 | 11 | (7-9) | (1-3) | | | | | 66.8 |
| IV期 | 37 | 34 | 0 | 100.0 | 8.1 | 2.1 | 19.6 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 88 | 34 | | | | | |
| % | 72.1 | 27.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 35 | 38 | 32 | | |
| % | | 10.7 | 28.7 | 31.1 | 26.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | (1-3) | 11 | 37 | (4-6) | 0 | |
| % | 54.9 | | 9.0 | 30.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 69 | 65 | (4-6) | 0 | | |
| % | 43.4 | 56.6 | 53.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 33 | 74 | | | |
| % | | | 27.0 | 60.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 49 | (1-3) | 98.6 | 66.4 | 58.1 | 73.4 | 66.9 |
| I期 | 33 | (4-6) | (1-3) | 97.0 | 87.8 | 70.6 | 95.2 | 65.3 |
| II期 | 30 | (4-6) | 0 | 100.0 | 83.3 | 64.5 | 92.7 | 69.2 |
| III期 | 46 | 13 | 0 | 100.0 | 71.7 | 56.4 | 82.5 | 68.1 |
| IV期 | 31 | 26 | 0 | 100.0 | 16.1 | 5.9 | 30.9 | 67.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 89 | 57 | | | | | |
| % | 61.0 | 39.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 18 | 46 | 50 | 18 | | |
| % | 9.6 | 12.3 | 31.5 | 34.2 | 12.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 30 | 46 | 31 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 22.6 | 20.5 | 31.5 | 21.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 126 | 124 | (1-3) | 0 | | |
| % | 13.7 | 86.3 | 84.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 15 | 25 | 95 | | | |
| % | 7.5 | 10.3 | 17.1 | 65.1 | | | |

147 岐阜県立多治見病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 35 | 24 | (1-3) | 94.3 | 27.8 | 13.9 | 43.5 | 71.0 |
| I期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 70.6 |
| II期 | 11 | (7-9) | (1-3) | | | | | 74.5 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.6 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 66.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 19 | 16 | | | | | | |
| % | 54.3 | 45.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 10 | 17 | (4-6) | | | |
| % | | | 28.6 | 48.6 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 12 | 11 | (4-6) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 34.3 | 31.4 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | 14 | (7-9) | 12 | 0 | 0 | |
| | % | | 40.0 | | 34.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 25 | 10 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | |
| % | 71.4 | 28.6 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 16 | 17 | | | | |
| % | | | 45.7 | 48.6 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 166 | 118 | (1-3) | 98.2 | 28.4 | 21.7 | 35.4 | 71.1 |
| I期 | 51 | 18 | (1-3) | 98.0 | 64.5 | 49.7 | 75.9 | 69.1 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 73.4 |
| III期 | 39 | 30 | (1-3) | 97.4 | 23.1 | 11.5 | 37.1 | 71.4 |
| IV期 | 68 | 63 | (1-3) | 98.5 | 6.0 | 2.0 | 13.5 | 72.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|--|
| 対象数 | 115 | 51 | 対象数 | 17 | 149 | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | % | 10.2 | 89.8 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 56 | 72 | 27 | | | |
| % | | | 33.7 | 43.4 | 16.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 51 | (7-9) | 39 | 68 | 0 | 0 | | |
| % | 30.7 | | 23.5 | 41.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 121 | 45 | 41 | (4-6) | 0 | | | |
| % | 72.9 | 27.1 | 24.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 38 | 35 | 90 | | | | |
| % | | 22.9 | 21.1 | 54.2 | | | | |

147 岐阜県立多治見病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 23 | 0 | 100.0 | 74.4 | 64.1 | 82.2 | 59.9 |
| I期 | 45 | (4-6) | 0 | 100.0 | 86.7 | 72.7 | 93.8 | 60.4 |
| II期 | 25 | (4-6) | 0 | | | | | 61.5 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 55.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 62.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 90 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 22 | 18 | 13 | 12 | | |
| % | 27.8 | 24.4 | 20.0 | 14.4 | 13.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 25 | 12 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 50.0 | 27.8 | 13.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 81 | 79 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 90.0 | 87.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | (4-6) | (4-6) | 54 | | | |
| % | 28.9 | | | 60.0 | | | |

148

大垣市民病院

2010-2011年2カ年

コメント:

肝臓

肝炎治療の進歩にともない、ウイルス性肝炎を伴わない脂肪肝、あるいは正常肝を背景とした大きな肝がんが見つかるようになり、ステージI期、II期の成績がわずかに逆転した。

女性乳房

I期の症例比率が全国平均に比し高いことは、地域の検診に関する意識、病院の早期診断に対する体制が充実していることを反映していると思われる。一方、II期の症例数は少ないものの、その予後がやや悪いことから全体の予後も前回よりは低下した、現在その原因を検索中である。

胃、大腸、肺

特にありません。

148 大垣市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 563 | 257 | (1-3) | 99.5 | 54.2 | 49.9 | 58.2 | 69.1 |
| I期 | 308 | 60 | (1-3) | 99.4 | 80.4 | 75.5 | 84.4 | 69.4 |
| II期 | 55 | 21 | 0 | 100.0 | 61.8 | 47.7 | 73.2 | 72.3 |
| III期 | 61 | 46 | 0 | 100.0 | 24.6 | 14.7 | 35.9 | 68.3 |
| IV期 | 132 | 128 | (1-3) | 99.2 | 2.3 | 0.6 | 6.0 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 409 | 154 | | | | | |
| % | 72.6 | 27.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 33 | 66 | 155 | 207 | 102 | | |
| % | 5.9 | 11.7 | 27.5 | 36.8 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 308 | 55 | 61 | 132 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 54.7 | 9.8 | 10.8 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 123 | 440 | 404 | 31 | (4-6) | | |
| % | 21.8 | 78.2 | 71.8 | 5.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 59 | 38 | 127 | 339 | | | |
| % | 10.5 | 6.7 | 22.6 | 60.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 511 | 209 | (4-6) | 98.8 | 58.8 | 54.4 | 63.0 | 70.1 |
| I期 | 100 | 21 | 0 | 100.0 | 79.0 | 69.6 | 85.8 | 71.0 |
| II期 | 141 | 26 | 0 | 100.0 | 81.6 | 74.1 | 87.1 | 71.5 |
| III期 | 136 | 59 | (1-3) | 97.8 | 56.0 | 47.2 | 63.9 | 70.6 |
| IV期 | 120 | 101 | (1-3) | 98.3 | 15.0 | 9.3 | 22.1 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 315 | 196 | | | | | |
| % | 61.6 | 38.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 56 | 144 | 170 | 115 | | |
| % | 5.1 | 11.0 | 28.2 | 33.3 | 22.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 100 | 141 | 136 | 120 | (1-3) | 13 | |
| % | 19.6 | 27.6 | 26.6 | 23.5 | | 2.5 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 76 | 435 | 372 | 59 | (4-6) | | |
| % | 14.9 | 85.1 | 72.8 | 11.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 51 | 25 | 102 | 333 | | | |
| % | 10.0 | 4.9 | 20.0 | 65.2 | | | |

148 大垣市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 176 | 114 | 0 | 100.0 | 35.2 | 28.3 | 42.3 | 70.9 |
| I期 | 81 | 45 | 0 | 100.0 | 44.4 | 33.5 | 54.9 | 70.8 |
| II期 | 41 | 21 | 0 | 100.0 | 48.8 | 32.9 | 62.9 | 72.3 |
| III期 | 35 | 30 | 0 | 100.0 | 14.3 | 5.2 | 27.7 | 71.4 |
| IV期 | 19 | 18 | 0 | | | | | 78.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | 120 | 56 | | | | | |
| % | 68.2 | 31.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 46 | 73 | 35 | | |
| % | | 11.4 | 26.1 | 41.5 | 19.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 81 | 41 | 35 | 19 | 0 | 0 |
| | % | 46.0 | 23.3 | 19.9 | 10.8 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 47 | 54 | 35 | 40 | 0 | 0 |
| | % | 26.7 | 30.7 | 19.9 | 22.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 103 | 73 | 70 | (1-3) | 0 | | |
| % | 58.5 | 41.5 | 39.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 116 | 57 | | | |
| % | | | 65.9 | 32.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 480 | 325 | (1-3) | 99.8 | 32.3 | 28.1 | 36.5 | 70.0 |
| I期 | 141 | 38 | 0 | 100.0 | 73.1 | 64.9 | 79.6 | 70.6 |
| II期 | 37 | 22 | 0 | 100.0 | 40.5 | 24.9 | 55.7 | 67.6 |
| III期 | 122 | 97 | 0 | 100.0 | 20.5 | 13.9 | 28.0 | 69.5 |
| IV期 | 179 | 168 | (1-3) | 99.4 | 5.8 | 3.0 | 10.0 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 353 | 127 | 対象数 | | 37 | 443 |
| % | 73.5 | 26.5 | % | | 7.7 | 92.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 29 | 50 | 124 | 186 | 91 | |
| % | 6.0 | 10.4 | 25.8 | 38.8 | 19.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 141 | 37 | 122 | 179 | 0 | (1-3) |
| % | 29.4 | 7.7 | 25.4 | 37.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 311 | 169 | 165 | (4-6) | 0 | |
| % | 64.8 | 35.2 | 34.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 40 | 56 | 166 | 218 | | |
| % | 8.3 | 11.7 | 34.6 | 45.4 | | |

148 大垣市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 249 | 26 | (1-3) | 98.8 | 89.5 | 84.9 | 92.7 | 59.8 |
| I期 | 131 | (1-3) | (1-3) | 98.5 | 97.7 | 93.0 | 99.3 | 57.4 |
| II期 | 81 | 11 | (1-3) | 98.8 | 86.3 | 76.6 | 92.2 | 60.3 |
| III期 | 31 | (7-9) | 0 | 100.0 | 74.2 | 55.0 | 86.2 | 60.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 55.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 249 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 56 | 71 | 66 | 33 | 23 | | |
| % | 22.5 | 28.5 | 26.5 | 13.3 | 9.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 131 | 81 | 31 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 52.6 | 32.5 | 12.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 244 | 241 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 98.0 | 96.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 75 | (1-3) | 27 | 145 | | | |
| % | 30.1 | | 10.8 | 58.2 | | | |

149 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院は地域医療支援病院であり地域の中核病院として、高齢者や基礎疾患のある患者、重症患者を多く治療しています。他疾患での死亡等の患者も含まれていることから生存率に影響があると考えます。患者数に対して常勤医師が不足している診療科もあり施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

「胃」

StageIVの症例割合が高い

「肺」

70歳以上の高齢者割合が高い

常勤医師が不足しているため、入院・手術ができないケースが多い

「乳房」

StageI、StageIIの症例割合が高く全国平均と比較して生存率が高い

149 社会医療法人厚生会 木沢記念病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 147 | 90 | (1-3) | 98.6 | 38.6 | 30.8 | 46.4 | 72.6 |
| I期 | 59 | 22 | (1-3) | 96.6 | 62.4 | 48.7 | 73.4 | 74.7 |
| II期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 73.8 |
| III期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 77.5 |
| IV期 | 50 | 47 | 0 | 100.0 | 6.0 | 1.6 | 14.9 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 100 | 47 | | | | | |
| % | 68.0 | 32.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 37 | 48 | 42 | | |
| % | | 11.6 | 25.2 | 32.7 | 28.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 17 | 15 | 50 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 40.1 | 11.6 | 10.2 | 34.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 44 | 103 | 88 | 15 | 0 | | |
| % | 29.9 | 70.1 | 59.9 | 10.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 11 | 30 | 97 | | | |
| % | | 7.5 | 20.4 | 66.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 182 | 71 | (1-3) | 98.9 | 60.9 | 53.3 | 67.5 | 71.7 |
| I期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.4 |
| II期 | 59 | 15 | (1-3) | 98.3 | 74.3 | 61.0 | 83.6 | 68.9 |
| III期 | 51 | 13 | 0 | 100.0 | 74.5 | 60.2 | 84.3 | 72.2 |
| IV期 | 42 | 36 | 0 | 100.0 | 14.3 | 5.8 | 26.5 | 73.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 94 | 88 | | | | | |
| % | 51.6 | 48.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 18 | 49 | 57 | 50 | | |
| % | | 9.9 | 26.9 | 31.3 | 27.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 27 | 59 | 51 | 42 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 14.8 | 32.4 | 28.0 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 164 | 148 | 15 | (1-3) | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 81.3 | 8.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 14 | 38 | 118 | | | |
| % | 6.6 | 7.7 | 20.9 | 64.8 | | | |

149 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 54 | 33 | 0 | 100.0 | 38.9 | 26.0 | 51.5 | 73.5 |
| I期 | 23 | 11 | 0 | | | | | 71.8 |
| II期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 73.9 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 78.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 31 | 23 | | | | | |
| % | 57.4 | 42.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 24 | 16 | | |
| % | | | | 44.4 | 29.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 23 | 15 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 42.6 | 27.8 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 11 | (7-9) | 11 | 0 | 0 |
| | % | 42.6 | 20.4 | | 20.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
| % | 75.9 | 24.1 | 24.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 39 | 12 | | | |
| % | | | 72.2 | 22.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 72 | 54 | 0 | 100.0 | 25.0 | 15.7 | 35.4 | 75.8 |
| I期 | 32 | 18 | 0 | 100.0 | 43.8 | 26.5 | 59.8 | 72.9 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 63.0 |
| III期 | 16 | 14 | 0 | | | | | 81.3 |
| IV期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 79.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 46 | 26 | 対象数 | (1-3) | 70 | | |
| % | 63.9 | 36.1 | % | | 97.2 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 16 | 28 | 25 | | |
| % | | | 22.2 | 38.9 | 34.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | (4-6) | 16 | 15 | (4-6) | 0 | |
| % | 44.4 | | 22.2 | 20.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 62 | 10 | 10 | 0 | 0 | | |
| % | 86.1 | 13.9 | 13.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 29 | 30 | | | |
| % | | | 40.3 | 41.7 | | | |

149 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 114 | 13 | 0 | 100.0 | 88.6 | 81.2 | 93.2 | 59.9 |
| I期 | 54 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.2 | 87.6 | 99.7 | 61.0 |
| II期 | 38 | (4-6) | 0 | 100.0 | 86.8 | 71.2 | 94.3 | 57.6 |
| III期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 56.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 50.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 114 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 36 | 15 | 32 | 25 | (4-6) | | |
| % | 31.6 | 13.2 | 28.1 | 21.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | 38 | 15 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 47.4 | 33.3 | 13.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 103 | 102 | (1-3) | 0 | | |
| % | 9.6 | 90.4 | 89.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | (1-3) | 10 | 75 | | | |
| % | 22.8 | | 8.8 | 65.8 | | | |

150 静岡県立静岡がんセンター
2010-2011年2カ年

コメント:

当院は50床の緩和病棟をそなえていることもあり、進行期のがん患者比率が都市圏のセンターに比して高い。
患者の平均年齢が2～4歳高いことも、5年実測生存率が低い要因として挙げられる。

150 静岡県立静岡がんセンター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1504 | 447 | 29 | 98.1 | 69.9 | 67.5 | 72.2 | 68.8 |
| I期 | 1059 | 148 | 24 | 97.7 | 85.8 | 83.5 | 87.8 | 69.7 |
| II期 | 94 | 29 | (1-3) | 98.9 | 68.9 | 58.4 | 77.2 | 67.1 |
| III期 | 88 | 45 | 0 | 100.0 | 48.9 | 38.1 | 58.8 | 68.5 |
| IV期 | 248 | 221 | (4-6) | 98.4 | 9.6 | 6.3 | 13.7 | 67.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 1097 | 407 | | | | | |
| % | 72.9 | 27.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 78 | 167 | 478 | 566 | 215 | | |
| % | 5.2 | 11.1 | 31.8 | 37.6 | 14.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 1059 | 94 | 88 | 248 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 70.4 | 6.3 | 5.9 | 16.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 226 | 1278 | 1205 | 73 | 0 | | |
| % | 15.0 | 85.0 | 80.1 | 4.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 277 | 211 | 356 | 660 | | | |
| % | 18.4 | 14.0 | 23.7 | 43.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 861 | 234 | (7-9) | 99.0 | 72.7 | 69.6 | 75.6 | 65.9 |
| I期 | 247 | 38 | (1-3) | 98.8 | 84.6 | 79.4 | 88.5 | 67.4 |
| II期 | 198 | 27 | (1-3) | 99.5 | 86.3 | 80.7 | 90.4 | 68.4 |
| III期 | 216 | 33 | (1-3) | 99.1 | 84.7 | 79.1 | 88.8 | 64.1 |
| IV期 | 160 | 129 | (1-3) | 99.4 | 18.9 | 13.3 | 25.4 | 64.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 511 | 350 | | | | | |
| % | 59.3 | 40.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 73 | 150 | 297 | 249 | 92 | | |
| % | 8.5 | 17.4 | 34.5 | 28.9 | 10.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 247 | 198 | 216 | 160 | 10 | 30 | |
| % | 28.7 | 23.0 | 25.1 | 18.6 | 1.2 | 3.5 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 133 | 728 | 686 | 42 | 0 | | |
| % | 15.4 | 84.6 | 79.7 | 4.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 202 | 81 | 142 | 436 | | | |
| % | 23.5 | 9.4 | 16.5 | 50.6 | | | |

150 静岡県立静岡がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 278 | 169 | (4-6) | 98.6 | 38.4 | 32.6 | 44.1 | 69.0 |
| I期 | 110 | 45 | (1-3) | 98.2 | 58.4 | 48.5 | 67.0 | 69.9 |
| II期 | 70 | 37 | (1-3) | 97.1 | 45.7 | 33.6 | 57.0 | 70.5 |
| III期 | 60 | 50 | 0 | 100.0 | 16.7 | 8.6 | 27.1 | 67.4 |
| IV期 | 32 | 31 | 0 | 100.0 | 3.1 | 0.2 | 13.7 | 66.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 199 | 79 | | | | | |
| % | 71.6 | 28.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 34 | 89 | 114 | 34 | | |
| % | | 12.2 | 32.0 | 41.0 | 12.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 110 | 70 | 60 | 32 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 39.6 | 25.2 | 21.6 | 11.5 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 33 | 104 | 66 | 60 | 13 | (1-3) |
| | % | 11.9 | 37.4 | 23.7 | 21.6 | 4.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 180 | 98 | 98 | 0 | 0 | | |
| % | 64.7 | 35.3 | 35.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 138 | 115 | | | |
| % | | 6.8 | 49.6 | 41.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 1182 | 741 | 14 | 98.8 | 36.9 | 34.1 | 39.6 | 69.3 |
| I期 | 440 | 139 | 10 | 97.7 | 67.9 | 63.3 | 72.1 | 72.2 |
| II期 | 101 | 58 | 0 | 100.0 | 42.6 | 32.9 | 52.0 | 69.2 |
| III期 | 265 | 195 | (1-3) | 99.2 | 26.3 | 21.1 | 31.7 | 68.1 |
| IV期 | 365 | 340 | (1-3) | 99.5 | 6.3 | 4.1 | 9.2 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 800 | 382 | 対象数 | | 109 | 1073 |
| % | 67.7 | 32.3 | % | | 9.2 | 90.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 43 | 134 | 383 | 450 | 172 | |
| % | 3.6 | 11.3 | 32.4 | 38.1 | 14.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 440 | 101 | 265 | 365 | (4-6) | (7-9) |
| % | 37.2 | 8.5 | 22.4 | 30.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 748 | 434 | 428 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 63.3 | 36.7 | 36.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 213 | 126 | 301 | 542 | | |
| % | 18.0 | 10.7 | 25.5 | 45.9 | | |

150 静岡県立静岡がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 589 | 57 | (7-9) | 98.5 | 90.2 | 87.5 | 92.4 | 57.0 |
| I期 | 260 | 11 | (1-3) | 99.2 | 95.8 | 92.5 | 97.6 | 58.7 |
| II期 | 222 | 15 | (1-3) | 98.6 | 93.2 | 88.9 | 95.8 | 56.6 |
| III期 | 69 | (7-9) | (1-3) | 95.7 | 87.9 | 77.3 | 93.8 | 58.3 |
| IV期 | 36 | 23 | (1-3) | 97.2 | 34.3 | 19.4 | 49.8 | 55.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 589 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 185 | 133 | 176 | 69 | 26 | | |
| % | 31.4 | 22.6 | 29.9 | 11.7 | 4.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 260 | 222 | 69 | 36 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 44.1 | 37.7 | 11.7 | 6.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | 547 | 540 | (7-9) | 0 | | |
| % | 7.1 | 92.9 | 91.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 171 | 24 | 51 | 343 | | | |
| % | 29.0 | 4.1 | 8.7 | 58.2 | | | |

151 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
2010-2011年2力年

コメント:

特にありません。

151 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 277 | 120 | (4-6) | 98.6 | 56.4 | 50.3 | 62.0 | 69.8 |
| I期 | 156 | 23 | (1-3) | 98.7 | 85.2 | 78.5 | 89.9 | 69.3 |
| II期 | 22 | (7-9) | 0 | | | | | 73.4 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 73.2 |
| IV期 | 69 | 66 | (1-3) | 98.6 | 3.3 | 0.6 | 9.9 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 208 | 69 | | | | | |
| % | 75.1 | 24.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 45 | 79 | 86 | 58 | | |
| % | | 16.2 | 28.5 | 31.0 | 20.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 156 | 22 | (7-9) | 69 | 16 | (4-6) | |
| % | 56.3 | 7.9 | | 24.9 | 5.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 75 | 202 | 187 | 13 | (1-3) | | |
| % | 27.1 | 72.9 | 67.5 | 4.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 60 | 90 | 102 | | | |
| % | 9.0 | 21.7 | 32.5 | 36.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 257 | 113 | (1-3) | 99.2 | 55.8 | 49.5 | 61.6 | 70.7 |
| I期 | 46 | (7-9) | 0 | 100.0 | 82.6 | 68.2 | 90.9 | 70.6 |
| II期 | 71 | 16 | 0 | 100.0 | 77.5 | 65.9 | 85.5 | 71.2 |
| III期 | 68 | 22 | 0 | 100.0 | 67.7 | 55.2 | 77.4 | 72.4 |
| IV期 | 58 | 55 | (1-3) | 98.3 | 3.6 | 0.7 | 10.9 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 154 | 103 | | | | | |
| % | 59.9 | 40.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 33 | 66 | 83 | 63 | | |
| % | 4.7 | 12.8 | 25.7 | 32.3 | 24.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | 71 | 68 | 58 | 13 | (1-3) | |
| % | 17.9 | 27.6 | 26.5 | 22.6 | 5.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 222 | 173 | 45 | (4-6) | | |
| % | 13.6 | 86.4 | 67.3 | 17.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 32 | 65 | 138 | | | |
| % | 8.6 | 12.5 | 25.3 | 53.7 | | | |

151 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | 58 | (1-3) | 97.4 | 22.7 | 14.0 | 32.7 | 72.3 |
| I期 | 24 | 15 | 0 | | | | | 76.7 |
| II期 | 19 | 14 | (1-3) | | | | | 69.4 |
| III期 | 21 | 17 | 0 | | | | | 72.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 61 | 16 | | | | | |
| % | 79.2 | 20.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 21 | 34 | 17 | | |
| % | | | 27.3 | 44.2 | 22.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 24 | 19 | 21 | (7-9) | (4-6) | 0 |
| | % | 31.2 | 24.7 | 27.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 19 | 19 | 21 | (4-6) | 0 |
| | % | 15.6 | 24.7 | 24.7 | 27.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 75 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | 97.4 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 55 | 18 | | | |
| % | | | 71.4 | 23.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 604 | 317 | 17 | 97.2 | 46.6 | 42.5 | 50.5 | 69.0 |
| I期 | 269 | 62 | (7-9) | 97.4 | 76.5 | 70.9 | 81.2 | 68.5 |
| II期 | 52 | 27 | (1-3) | 96.2 | 46.8 | 32.7 | 59.8 | 70.4 |
| III期 | 134 | 98 | (1-3) | 98.5 | 25.8 | 18.7 | 33.4 | 68.9 |
| IV期 | 124 | 112 | (4-6) | 96.0 | 6.7 | 3.1 | 12.1 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 414 | 190 | 対象数 | | 44 | 560 |
| % | 68.5 | 31.5 | % | | 7.3 | 92.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 33 | 66 | 202 | 208 | 95 | |
| % | 5.5 | 10.9 | 33.4 | 34.4 | 15.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 269 | 52 | 134 | 124 | 19 | (4-6) |
| % | 44.5 | 8.6 | 22.2 | 20.5 | 3.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 262 | 342 | 320 | 17 | (4-6) | |
| % | 43.4 | 56.6 | 53.0 | 2.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 26 | 146 | 220 | 212 | | |
| % | 4.3 | 24.2 | 36.4 | 35.1 | | |

151 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 145 | 21 | (4-6) | 95.9 | 85.1 | 78.1 | 90.0 | 61.5 |
| I期 | 73 | (1-3) | (4-6) | 93.2 | 97.2 | 89.1 | 99.3 | 57.4 |
| II期 | 44 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.8 | 66.9 | 90.5 | 64.3 |
| III期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.4 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 54.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 145 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 34 | 37 | 24 | 18 | | |
| % | 22.1 | 23.4 | 25.5 | 16.6 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 73 | 44 | 17 | 10 | 0 | (1-3) | |
| % | 50.3 | 30.3 | 11.7 | 6.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 131 | 121 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 9.7 | 90.3 | 83.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | 15 | 19 | 72 | | | |
| % | 26.9 | 10.3 | 13.1 | 49.7 | | | |

152 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

152 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 460 | 157 | (4-6) | 99.1 | 65.9 | 61.3 | 70.0 | 69.0 |
| I期 | 260 | 35 | (4-6) | 98.5 | 86.5 | 81.7 | 90.1 | 68.9 |
| II期 | 33 | 11 | 0 | 100.0 | 66.7 | 47.9 | 80.0 | 72.4 |
| III期 | 40 | 17 | 0 | 100.0 | 57.5 | 40.8 | 71.0 | 66.4 |
| IV期 | 103 | 87 | 0 | 100.0 | 15.5 | 9.3 | 23.2 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 339 | 121 | | | | | |
| % | 73.7 | 26.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 62 | 138 | 162 | 76 | | |
| % | 4.8 | 13.5 | 30.0 | 35.2 | 16.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 260 | 33 | 40 | 103 | (4-6) | 18 | |
| % | 56.5 | 7.2 | 8.7 | 22.4 | | 3.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 97 | 363 | 344 | 18 | (1-3) | | |
| % | 21.1 | 78.9 | 74.8 | 3.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | 101 | 110 | 218 | | | |
| % | 6.7 | 22.0 | 23.9 | 47.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 355 | 99 | (4-6) | 98.9 | 72.0 | 67.0 | 76.4 | 67.5 |
| I期 | 92 | (7-9) | (1-3) | 96.7 | 91.2 | 83.3 | 95.5 | 67.8 |
| II期 | 92 | (7-9) | 0 | 100.0 | 91.3 | 83.4 | 95.6 | 69.5 |
| III期 | 90 | 27 | 0 | 100.0 | 70.0 | 59.4 | 78.3 | 68.4 |
| IV期 | 62 | 51 | 0 | 100.0 | 17.7 | 9.5 | 28.1 | 65.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 212 | 143 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 53 | 105 | 105 | 60 | | |
| % | 9.0 | 14.9 | 29.6 | 29.6 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 92 | 92 | 90 | 62 | (4-6) | 15 | |
| % | 25.9 | 25.9 | 25.4 | 17.5 | | 4.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 326 | 315 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 8.2 | 91.8 | 88.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 56 | 37 | 83 | 179 | | | |
| % | 15.8 | 10.4 | 23.4 | 50.4 | | | |

152 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 85 | 55 | (1-3) | 96.5 | 33.9 | 24.0 | 44.2 | 67.8 |
| I期 | 31 | 10 | (1-3) | 96.8 | 67.5 | 47.9 | 81.0 | 69.7 |
| II期 | 20 | 15 | (1-3) | | | | | 65.0 |
| III期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 74.2 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 対象数 | 56 | 29 | | | | | | |
| % | 65.9 | 34.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 27 | 23 | 19 | | | |
| % | | | 31.8 | 27.1 | 22.4 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 31 | 20 | 15 | 14 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 36.5 | 23.5 | 17.6 | 16.5 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 19 | 16 | 20 | (4-6) | (1-3) | |
| | % | 29.4 | 22.4 | 18.8 | 23.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 74 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 87.1 | 12.9 | 11.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 53 | 30 | | | | |
| % | | | 62.4 | 35.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 349 | 206 | (1-3) | 99.1 | 40.9 | 35.7 | 46.0 | 70.5 |
| I期 | 153 | 43 | (1-3) | 98.7 | 71.9 | 64.0 | 78.3 | 69.0 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 74.4 |
| III期 | 63 | 50 | 0 | 100.0 | 20.6 | 11.7 | 31.3 | 66.0 |
| IV期 | 101 | 95 | (1-3) | 99.0 | 5.3 | 2.0 | 11.1 | 71.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 226 | 123 | 対象数 | | 22 | 327 | |
| % | 64.8 | 35.2 | % | | 6.3 | 93.7 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 34 | 109 | 120 | 73 | | |
| % | 3.7 | 9.7 | 31.2 | 34.4 | 20.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 153 | 20 | 63 | 101 | 10 | (1-3) | |
| % | 43.8 | 5.7 | 18.1 | 28.9 | 2.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 221 | 128 | 124 | (4-6) | 0 | | |
| % | 63.3 | 36.7 | 35.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 44 | 53 | 132 | 120 | | | |
| % | 12.6 | 15.2 | 37.8 | 34.4 | | | |

152 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 330 | 24 | (1-3) | 99.4 | 92.7 | 89.3 | 95.1 | 57.6 |
| I期 | 177 | (4-6) | (1-3) | 98.9 | 97.7 | 94.1 | 99.1 | 59.2 |
| II期 | 114 | (7-9) | 0 | 100.0 | 93.9 | 87.6 | 97.0 | 56.9 |
| III期 | 26 | (4-6) | 0 | | | | | 58.5 |
| IV期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 54.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 330 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 94 | 90 | 91 | 35 | 20 | | |
| % | 28.5 | 27.3 | 27.6 | 10.6 | 6.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 177 | 114 | 26 | 10 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 53.6 | 34.5 | 7.9 | 3.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 306 | 295 | 11 | 0 | | |
| % | 7.3 | 92.7 | 89.4 | 3.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 119 | 11 | 39 | 161 | | | |
| % | 36.1 | 3.3 | 11.8 | 48.8 | | | |

153 順天堂大学医学部附属静岡病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

153 順天堂大学医学部附属静岡病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 233 | 125 | 12 | 94.8 | 45.1 | 38.6 | 51.5 | 71.9 |
| I期 | 117 | 32 | (7-9) | 93.2 | 71.7 | 62.4 | 79.1 | 73.4 |
| II期 | 22 | 16 | 0 | | | | | 76.5 |
| III期 | 23 | 15 | (1-3) | | | | | 76.3 |
| IV期 | 50 | 45 | (1-3) | 96.0 | 6.6 | 1.7 | 16.3 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 167 | 66 | | | | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 65 | 95 | 51 | | |
| % | | 7.7 | 27.9 | 40.8 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 117 | 22 | 23 | 50 | 15 | (4-6) | |
| % | 50.2 | 9.4 | 9.9 | 21.5 | 6.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 73 | 160 | 150 | 10 | 0 | | |
| % | 31.3 | 68.7 | 64.4 | 4.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 16 | 89 | 104 | | | |
| % | 10.3 | 6.9 | 38.2 | 44.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 259 | 113 | 11 | 95.8 | 55.2 | 48.9 | 61.2 | 69.5 |
| I期 | 52 | 11 | (1-3) | 94.2 | 78.0 | 63.7 | 87.1 | 71.5 |
| II期 | 77 | 26 | (1-3) | 96.1 | 65.6 | 53.8 | 75.2 | 72.4 |
| III期 | 65 | 24 | (1-3) | 96.9 | 62.3 | 49.2 | 73.0 | 67.5 |
| IV期 | 48 | 44 | (1-3) | 95.8 | 5.2 | 1.0 | 14.9 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 147 | 112 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 25 | 86 | 85 | 48 | | |
| % | 5.8 | 9.7 | 33.2 | 32.8 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 52 | 77 | 65 | 48 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 20.1 | 29.7 | 25.1 | 18.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 222 | 194 | 28 | 0 | | |
| % | 14.3 | 85.7 | 74.9 | 10.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 10 | 80 | 148 | | | |
| % | 8.1 | 3.9 | 30.9 | 57.1 | | | |

153 順天堂大学医学部附属静岡病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 104 | 75 | (4-6) | 96.2 | 26.2 | 18.0 | 35.1 | 70.3 |
| I期 | 44 | 25 | (1-3) | 93.2 | 40.5 | 25.6 | 54.8 | 70.8 |
| II期 | 32 | 24 | (1-3) | 96.9 | 23.3 | 10.4 | 39.2 | 69.5 |
| III期 | 25 | 23 | 0 | | | | | 72.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 61.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 71 | 33 | | | | | | |
| % | 68.3 | 31.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 30 | 48 | 14 | | | |
| % | | 9.6 | 28.8 | 46.2 | 13.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 44 | 32 | 25 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 42.3 | 30.8 | 24.0 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 44 | 33 | 19 | 0 | 0 | |
| | % | | 42.3 | 31.7 | 18.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 83 | 21 | 21 | 0 | 0 | | | |
| % | 79.8 | 20.2 | 20.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 81 | 20 | | | | |
| % | | | 77.9 | 19.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 218 | 166 | (7-9) | 96.8 | 21.7 | 16.4 | 27.5 | 71.8 |
| I期 | 67 | 29 | (4-6) | 91.0 | 52.8 | 39.6 | 64.4 | 69.6 |
| II期 | 13 | 11 | 0 | | | | | 69.0 |
| III期 | 53 | 45 | 0 | 100.0 | 15.1 | 7.1 | 26.0 | 70.8 |
| IV期 | 80 | 77 | (1-3) | 98.8 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 73.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 147 | 71 | 対象数 | | 20 | 198 |
| % | 67.4 | 32.6 | % | | 9.2 | 90.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 62 | 94 | 43 | |
| % | | 6.4 | 28.4 | 43.1 | 19.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 67 | 13 | 53 | 80 | (4-6) | (1-3) |
| % | 30.7 | 6.0 | 24.3 | 36.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 139 | 79 | 74 | (4-6) | 0 | |
| % | 63.8 | 36.2 | 33.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 15 | 22 | 74 | 107 | | |
| % | 6.9 | 10.1 | 33.9 | 49.1 | | |

153 順天堂大学医学部附属静岡病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 155 | 24 | (4-6) | 97.4 | 84.3 | 77.6 | 89.2 | 62.6 |
| I期 | 59 | (1-3) | (1-3) | 98.3 | 94.9 | 84.9 | 98.3 | 66.8 |
| II期 | 62 | (7-9) | (1-3) | 98.4 | 88.7 | 77.8 | 94.5 | 59.3 |
| III期 | 25 | (7-9) | (1-3) | | | | | 63.7 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 62.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 155 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 40 | 45 | 33 | 15 | | |
| % | 14.2 | 25.8 | 29.0 | 21.3 | 9.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 62 | 25 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 38.1 | 40.0 | 16.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 106 | 106 | 0 | 0 | | |
| % | 31.6 | 68.4 | 68.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | (1-3) | 14 | 96 | | | |
| % | 27.1 | | 9.0 | 61.9 | | | |

154 静岡市立静岡病院
2011年のみ

コメント:

当院では70歳以上の高齢者で合併症（特に心臓疾患）を有する患者も多く受け入れており、必ずしも当該がんが死因とは限らないことにご留意ください。

154 静岡市立静岡病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 106 | 47 | (1-3) | 99.1 | 55.5 | 45.5 | 64.4 | 73.9 |
| I期 | 64 | 14 | (1-3) | 98.4 | 78.0 | 65.7 | 86.3 | 73.7 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.9 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.3 |
| IV期 | 24 | 21 | 0 | | | | | 73.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 73 | 33 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 19 | 57 | 24 | | |
| % | | | 17.9 | 53.8 | 22.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 64 | (7-9) | (7-9) | 24 | (1-3) | 0 | |
| % | 60.4 | | | 22.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 94 | 88 | (4-6) | 0 | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 83.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 20 | 77 | | | |
| % | | | 18.9 | 72.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 158 | 56 | 0 | 100.0 | 64.6 | 56.6 | 71.5 | 70.4 |
| I期 | 45 | 10 | 0 | 100.0 | 77.8 | 62.6 | 87.4 | 70.9 |
| II期 | 46 | 13 | 0 | 100.0 | 71.7 | 56.4 | 82.5 | 71.9 |
| III期 | 49 | 18 | 0 | 100.0 | 63.3 | 48.2 | 75.0 | 70.0 |
| IV期 | 17 | 14 | 0 | | | | | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 101 | 57 | | | | | |
| % | 63.9 | 36.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 39 | 62 | 32 | | |
| % | | 12.0 | 24.7 | 39.2 | 20.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 46 | 49 | 17 | (1-3) | 0 | |
| % | 28.5 | 29.1 | 31.0 | 10.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 148 | 145 | (1-3) | 0 | | |
| % | 6.3 | 93.7 | 91.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 18 | 19 | 120 | | | |
| % | | 11.4 | 12.0 | 75.9 | | | |

154 静岡市立静岡病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 59 | 34 | (1-3) | 98.3 | 41.8 | 29.1 | 54.1 | 70.3 |
| I期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 71.6 |
| II期 | 23 | 11 | (1-3) | | | | | 70.3 |
| III期 | 21 | 14 | 0 | | | | | 69.9 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 39 | 20 | | | | | | |
| % | 66.1 | 33.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 15 | 22 | 12 | | | |
| % | | | 25.4 | 37.3 | 20.3 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 12 | 23 | 21 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 20.3 | 39.0 | 35.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 23 | 15 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 20.3 | 39.0 | 25.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 44 | 15 | 15 | 0 | 0 | | | |
| % | 74.6 | 25.4 | 25.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 20 | 37 | | | | |
| % | | | 33.9 | 62.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 89 | (1-3) | 99.3 | 33.1 | 25.3 | 41.1 | 69.8 |
| I期 | 59 | 24 | 0 | 100.0 | 59.3 | 45.7 | 70.6 | 71.3 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | 23 | 20 | (1-3) | | | | | 67.3 |
| IV期 | 42 | 40 | 0 | 100.0 | 4.8 | 0.9 | 14.2 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 対象数 | 101 | 33 | 対象数 | | 18 | 116 |
| % | 75.4 | 24.6 | % | | 13.4 | 86.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 57 | 47 | 18 | |
| % | | 8.2 | 42.5 | 35.1 | 13.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 59 | 10 | 23 | 42 | 0 | 0 |
| % | 44.0 | 7.5 | 17.2 | 31.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 65 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
| % | 48.5 | 51.5 | 51.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 19 | 19 | 96 | | |
| % | | 14.2 | 14.2 | 71.6 | | |

154 静岡市立静岡病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 34 | (7-9) | (1-3) | 97.1 | 73.1 | 54.7 | 85.0 | 65.1 |
| I期 | 10 | 0 | 0 | | | | | 64.7 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 66.3 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 70.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 56.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 34 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 13 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | 38.2 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | (7-9) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 29.4 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 27 | 0 | 0 | | |
| % | | 79.4 | 79.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 25 | | | |
| % | | | | 73.5 | | | |

155 藤枝市立総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

155 藤枝市立総合病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 246 | 102 | (7-9) | 96.7 | 58.5 | 52.0 | 64.4 | 72.3 |
| I期 | 143 | 31 | (7-9) | 94.4 | 78.2 | 70.4 | 84.1 | 71.1 |
| II期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 75.0 |
| III期 | 22 | 15 | 0 | | | | | 68.1 |
| IV期 | 55 | 51 | 0 | 100.0 | 7.3 | 2.3 | 16.1 | 73.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 187 | 59 | | | | | |
| % | 76.0 | 24.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 58 | 106 | 57 | | |
| % | | 7.7 | 23.6 | 43.1 | 23.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 143 | 15 | 22 | 55 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 58.1 | 6.1 | 8.9 | 22.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 71 | 175 | 169 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 28.9 | 71.1 | 68.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | 20 | 77 | 117 | | | |
| % | 13.0 | 8.1 | 31.3 | 47.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 241 | 92 | (4-6) | 97.5 | 61.7 | 55.3 | 67.6 | 69.8 |
| I期 | 50 | (7-9) | (1-3) | 94.0 | 85.9 | 72.7 | 93.0 | 70.2 |
| II期 | 63 | 17 | (1-3) | 96.8 | 72.9 | 60.0 | 82.2 | 70.9 |
| III期 | 57 | 15 | (1-3) | 98.2 | 73.6 | 60.1 | 83.2 | 68.7 |
| IV期 | 61 | 49 | 0 | 100.0 | 19.7 | 10.9 | 30.4 | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 143 | 98 | | | | | |
| % | 59.3 | 40.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 26 | 62 | 72 | 64 | | |
| % | 7.1 | 10.8 | 25.7 | 29.9 | 26.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 50 | 63 | 57 | 61 | 0 | 10 | |
| % | 20.7 | 26.1 | 23.7 | 25.3 | | 4.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | 199 | 194 | (4-6) | 0 | | |
| % | 17.4 | 82.6 | 80.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 37 | 21 | 53 | 130 | | | |
| % | 15.4 | 8.7 | 22.0 | 53.9 | | | |

155 藤枝市立総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 70 | 47 | 0 | 100.0 | 32.9 | 22.2 | 43.9 | 75.5 |
| I期 | 36 | 18 | 0 | 100.0 | 50.0 | 32.9 | 64.9 | 75.6 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 79.0 |
| III期 | 19 | 18 | 0 | | | | | 77.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 75.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 47 | 23 | | | | | | |
| % | 67.1 | 32.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 11 | 37 | 20 | | | |
| % | | | 15.7 | 52.9 | 28.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 36 | (7-9) | 19 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 51.4 | | 27.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 22 | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | |
| | % | 31.4 | 27.1 | 18.6 | 22.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 55 | 15 | 14 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 78.6 | 21.4 | 20.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 49 | 19 | | | | |
| % | | | 70.0 | 27.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 164 | (1-3) | 99.6 | 31.4 | 25.6 | 37.3 | 72.2 |
| I期 | 85 | 25 | 0 | 100.0 | 70.6 | 59.7 | 79.1 | 70.3 |
| II期 | 17 | 14 | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | 51 | 41 | 0 | 100.0 | 19.6 | 10.1 | 31.4 | 72.9 |
| IV期 | 87 | 84 | (1-3) | 98.9 | 2.3 | 0.5 | 7.4 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 対象数 | 186 | 54 | 対象数 | | 25 | 215 |
| % | 77.5 | 22.5 | % | | 10.4 | 89.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 66 | 83 | 65 | |
| % | | 9.2 | 27.5 | 34.6 | 27.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 85 | 17 | 51 | 87 | 0 | 0 |
| % | 35.4 | 7.1 | 21.3 | 36.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 150 | 90 | 87 | (1-3) | 0 | |
| % | 62.5 | 37.5 | 36.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 16 | 30 | 92 | 102 | | |
| % | 6.7 | 12.5 | 38.3 | 42.5 | | |

155 藤枝市立総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 178 | 33 | (1-3) | 98.3 | 81.4 | 74.9 | 86.4 | 59.0 |
| I期 | 76 | 10 | (1-3) | 98.7 | 86.8 | 76.9 | 92.7 | 63.3 |
| II期 | 71 | 10 | (1-3) | 97.2 | 85.9 | 75.4 | 92.2 | 51.7 |
| III期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 60.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 75.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 178 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 47 | 46 | 44 | 27 | 14 | | |
| % | 26.4 | 25.8 | 24.7 | 15.2 | 7.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 76 | 71 | 25 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 42.7 | 39.9 | 14.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 169 | 163 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 94.9 | 91.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 54 | (1-3) | 15 | 107 | | | |
| % | 30.3 | | 8.4 | 60.1 | | | |

156

浜松医科大学医学部附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

| 発見経緯 | | | | |
|------|-------|-------|----------|-------|
| | がん検診 | 健康診断 | 他疾患経過観察中 | その他※ |
| 胃 | | | | |
| 浜松医大 | 12.2% | 7.2% | 34.5% | 46.0% |
| 全体 | 10.2% | 11.9% | 30.2% | 47.7% |
| 大腸 | | | | |
| 浜松医大 | 9.1% | 7.8% | 22.6% | 60.5% |
| 全体 | 9.9% | 8.3% | 23.4% | 58.4% |
| 肝 | | | | |
| 浜松医大 | | | 65.9% | 30.8% |
| 全体 | 0.6% | 3.7% | 64.1% | 31.6% |
| 肺 | | | | |
| 浜松医大 | | | 55.7% | 29.5% |
| 全体 | 7.3% | 13.3% | 35.8% | 43.8% |
| 女性乳房 | | | | |
| 浜松医大 | 18.5% | | 16.7% | 61.9% |
| 全体 | 22.9% | 5.1% | 12.0% | 59.9% |

※その他 には症状があり病院を受診した場合があります。

156 浜松医科大学医学部附属病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 278 | 110 | (1-3) | 98.9 | 60.3 | 54.3 | 65.8 | 69.7 |
| I期 | 178 | 32 | (1-3) | 98.9 | 81.9 | 75.4 | 86.9 | 71.2 |
| II期 | 19 | 11 | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 20 | 14 | (1-3) | | | | | 69.2 |
| IV期 | 56 | 52 | 0 | 100.0 | 7.1 | 2.3 | 15.8 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 216 | 62 | | | | | |
| % | 77.7 | 22.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 35 | 79 | 113 | 43 | | |
| % | | 12.6 | 28.4 | 40.6 | 15.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 178 | 19 | 20 | 56 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 64.0 | 6.8 | 7.2 | 20.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 230 | 137 | 11 | 82 | | |
| % | 17.3 | 82.7 | 49.3 | 4.0 | 29.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | 20 | 96 | 128 | | | |
| % | 12.2 | 7.2 | 34.5 | 46.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 243 | 81 | (7-9) | 97.1 | 66.1 | 59.7 | 71.7 | 67.1 |
| I期 | 60 | 11 | (1-3) | 98.3 | 81.4 | 69.0 | 89.3 | 67.9 |
| II期 | 71 | 12 | (1-3) | 97.2 | 82.7 | 71.5 | 89.8 | 69.4 |
| III期 | 56 | 16 | (1-3) | 94.6 | 70.1 | 55.9 | 80.5 | 69.9 |
| IV期 | 50 | 39 | (1-3) | 98.0 | 21.8 | 11.6 | 34.1 | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 154 | 89 | | | | | |
| % | 63.4 | 36.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 41 | 71 | 75 | 38 | | |
| % | 7.4 | 16.9 | 29.2 | 30.9 | 15.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 71 | 56 | 50 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 24.7 | 29.2 | 23.0 | 20.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 214 | 64 | 20 | 130 | | |
| % | 11.9 | 88.1 | 26.3 | 8.2 | 53.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 19 | 55 | 147 | | | |
| % | 9.1 | 7.8 | 22.6 | 60.5 | | | |

156 浜松医科大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 91 | 55 | 0 | 100.0 | 39.6 | 29.5 | 49.4 | 69.6 |
| I期 | 42 | 20 | 0 | 100.0 | 52.4 | 36.4 | 66.1 | 67.2 |
| II期 | 27 | 15 | 0 | | | | | 68.9 |
| III期 | 19 | 17 | 0 | | | | | 69.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 62 | 29 | | | | | |
| % | 68.1 | 31.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 32 | 36 | 14 | | |
| % | | | 35.2 | 39.6 | 15.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 42 | 27 | 19 | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | 46.2 | 29.7 | 20.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 37 | 22 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 27.5 | 40.7 | 24.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 43 | 23 | (1-3) | 18 | | |
| % | 52.7 | 47.3 | 25.3 | | 19.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 60 | 28 | | | |
| % | | | 65.9 | 30.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 122 | 82 | (1-3) | 99.2 | 32.4 | 24.3 | 40.8 | 69.8 |
| I期 | 54 | 22 | 0 | 100.0 | 59.3 | 45.0 | 71.0 | 70.9 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.7 |
| III期 | 21 | 18 | 0 | | | | | 70.2 |
| IV期 | 37 | 35 | (1-3) | 97.3 | 3.0 | 0.2 | 13.0 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 94 | 28 | | (4-6) | 116 | |
| % | 77.0 | 23.0 | | | 95.1 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 21 | 32 | 43 | 24 | |
| % | | 17.2 | 26.2 | 35.2 | 19.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 54 | (4-6) | 21 | 37 | (4-6) | (1-3) |
| % | 44.3 | | 17.2 | 30.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 55 | 67 | 26 | (4-6) | 37 | |
| % | 45.1 | 54.9 | 21.3 | | 30.3 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 68 | 36 | | |
| % | | | 55.7 | 29.5 | | |

156 浜松医科大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 168 | 15 | (1-3) | 99.4 | 91.0 | 85.5 | 94.5 | 57.5 |
| I期 | 81 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.1 | 87.4 | 98.1 | 57.7 |
| II期 | 59 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.3 | 88.6 | 99.8 | 57.9 |
| III期 | 23 | (7-9) | 0 | | | | | 58.6 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 53.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 168 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 54 | 46 | 31 | 26 | 11 | | |
| % | 32.1 | 27.4 | 18.5 | 15.5 | 6.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 81 | 59 | 23 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 48.2 | 35.1 | 13.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 152 | 39 | (4-6) | 109 | | |
| % | 9.5 | 90.5 | 23.2 | | 64.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (4-6) | 28 | 104 | | | |
| % | 18.5 | | 16.7 | 61.9 | | | |

157 浜松医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

157 浜松医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 222 | 98 | (4-6) | 98.2 | 55.1 | 48.3 | 61.4 | 71.4 |
| I期 | 129 | 28 | (1-3) | 99.2 | 78.1 | 69.9 | 84.4 | 69.5 |
| II期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 69.7 |
| III期 | 16 | 11 | 0 | | | | | 73.3 |
| IV期 | 52 | 50 | (1-3) | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 162 | 60 | | | | | |
| % | 73.0 | 27.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 20 | 61 | 75 | 56 | | |
| % | 4.5 | 9.0 | 27.5 | 33.8 | 25.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 129 | 18 | 16 | 52 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 58.1 | 8.1 | 7.2 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 65 | 157 | 146 | 10 | (1-3) | | |
| % | 29.3 | 70.7 | 65.8 | 4.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | 17 | 43 | 126 | | | |
| % | 16.2 | 7.7 | 19.4 | 56.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 197 | 81 | (4-6) | 98.0 | 58.5 | 51.2 | 65.0 | 70.6 |
| I期 | 54 | 12 | 0 | 100.0 | 77.8 | 64.2 | 86.7 | 69.7 |
| II期 | 58 | 13 | (1-3) | 96.6 | 77.4 | 64.2 | 86.2 | 74.7 |
| III期 | 45 | 21 | 0 | 100.0 | 53.3 | 37.9 | 66.6 | 70.6 |
| IV期 | 34 | 31 | (1-3) | 94.1 | 3.4 | 0.3 | 14.7 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 113 | 84 | | | | | |
| % | 57.4 | 42.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 14 | 54 | 75 | 44 | | |
| % | 5.1 | 7.1 | 27.4 | 38.1 | 22.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | 58 | 45 | 34 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 27.4 | 29.4 | 22.8 | 17.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 168 | 152 | 12 | (4-6) | | |
| % | 14.7 | 85.3 | 77.2 | 6.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 12 | 32 | 123 | | | |
| % | 15.2 | 6.1 | 16.2 | 62.4 | | | |

157 浜松医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 92 | 61 | 0 | 100.0 | 33.7 | 24.3 | 43.4 | 71.6 |
| I期 | 34 | 12 | 0 | 100.0 | 64.7 | 46.3 | 78.2 | 70.9 |
| II期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | 23 | 20 | 0 | | | | | 72.4 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 81.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 64 | 28 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 21 | 36 | 22 | | |
| % | | | 22.8 | 39.1 | 23.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 34 | 18 | 23 | 13 | (4-6) | 0 |
| | % | 37.0 | 19.6 | 25.0 | 14.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 21 | 16 | 28 | (4-6) | 0 |
| | % | 25.0 | 22.8 | 17.4 | 30.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 67 | 25 | 24 | (1-3) | 0 | | |
| % | 72.8 | 27.2 | 26.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 49 | 40 | | | |
| % | | | 53.3 | 43.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 198 | 141 | (7-9) | 96.5 | 27.2 | 21.1 | 33.7 | 72.0 |
| I期 | 57 | 15 | (1-3) | 94.7 | 73.3 | 59.6 | 83.0 | 71.9 |
| II期 | 15 | 11 | 0 | | | | | 66.6 |
| III期 | 45 | 42 | 0 | 100.0 | 6.7 | 1.7 | 16.4 | 71.6 |
| IV期 | 73 | 66 | (4-6) | 94.5 | 4.6 | 1.2 | 11.6 | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 139 | 59 | 対象数 | | 21 | 177 |
| % | 70.2 | 29.8 | % | | 10.6 | 89.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 45 | 87 | 45 | |
| % | | 7.1 | 22.7 | 43.9 | 22.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 57 | 15 | 45 | 73 | (7-9) | (1-3) |
| % | 28.8 | 7.6 | 22.7 | 36.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 140 | 58 | 54 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 70.7 | 29.3 | 27.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 25 | (7-9) | 68 | 97 | | |
| % | 12.6 | | 34.3 | 49.0 | | |

157 浜松医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 212 | 27 | (7-9) | 96.7 | 87.0 | 81.7 | 90.9 | 61.2 |
| I期 | 100 | (4-6) | (4-6) | 94.0 | 95.8 | 89.3 | 98.4 | 60.8 |
| II期 | 62 | (1-3) | (1-3) | 98.4 | 96.8 | 87.7 | 99.2 | 60.0 |
| III期 | 30 | (4-6) | 0 | 100.0 | 83.3 | 64.5 | 92.7 | 67.9 |
| IV期 | 19 | 16 | 0 | | | | | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 212 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 54 | 41 | 48 | 47 | 22 | | |
| % | 25.5 | 19.3 | 22.6 | 22.2 | 10.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 100 | 62 | 30 | 19 | 0 | (1-3) | |
| % | 47.2 | 29.2 | 14.2 | 9.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 181 | 173 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 81.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | (1-3) | 20 | 152 | | | |
| % | 18.4 | | 9.4 | 71.7 | | | |

158 磐田市立総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

158 磐田市立総合病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 130 | (1-3) | 99.2 | 45.8 | 39.4 | 52.0 | 73.4 |
| I期 | 107 | 22 | (1-3) | 98.1 | 79.4 | 70.5 | 86.0 | 71.6 |
| II期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 74.4 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 77.8 |
| IV期 | 91 | 83 | 0 | 100.0 | 8.8 | 4.1 | 15.7 | 75.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 174 | 66 | | | | | |
| % | 72.5 | 27.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 58 | 88 | 74 | | |
| % | | 5.8 | 24.2 | 36.7 | 30.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 107 | 15 | 12 | 91 | 12 | (1-3) | |
| % | 44.6 | 6.3 | 5.0 | 37.9 | 5.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 82 | 158 | 148 | 10 | 0 | | |
| % | 34.2 | 65.8 | 61.7 | 4.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 19 | 47 | 148 | | | |
| % | 10.8 | 7.9 | 19.6 | 61.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 275 | 108 | 0 | 100.0 | 60.7 | 54.7 | 66.2 | 70.7 |
| I期 | 53 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.6 | 78.8 | 96.0 | 67.7 |
| II期 | 84 | 22 | 0 | 100.0 | 73.8 | 63.0 | 81.9 | 72.8 |
| III期 | 62 | 27 | 0 | 100.0 | 56.5 | 43.3 | 67.7 | 68.4 |
| IV期 | 62 | 48 | 0 | 100.0 | 22.6 | 13.2 | 33.6 | 73.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 163 | 112 | | | | | |
| % | 59.3 | 40.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 35 | 75 | 80 | 72 | | |
| % | 4.7 | 12.7 | 27.3 | 29.1 | 26.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | 84 | 62 | 62 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 19.3 | 30.5 | 22.5 | 22.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 245 | 235 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 10.9 | 89.1 | 85.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 29 | 50 | 174 | | | |
| % | 8.0 | 10.5 | 18.2 | 63.3 | | | |

158 磐田市立総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 89 | 52 | (1-3) | 98.9 | 41.5 | 31.2 | 51.4 | 70.1 |
| I期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 69.6 |
| II期 | 32 | 13 | (1-3) | 96.9 | 58.9 | 39.9 | 73.7 | 71.7 |
| III期 | 25 | 22 | 0 | | | | | 74.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 57 | 32 | | | | | |
| % | 64.0 | 36.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 20 | 36 | 17 | | |
| % | | 11.2 | 22.5 | 40.4 | 19.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 21 | 32 | 25 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 23.6 | 36.0 | 28.1 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 24 | 29 | 19 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 11.2 | 27.0 | 32.6 | 21.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 38 | 37 | (1-3) | 0 | | |
| % | 57.3 | 42.7 | 41.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 59 | 26 | | | |
| % | | | 66.3 | 29.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 334 | 225 | (1-3) | 99.4 | 32.4 | 27.4 | 37.5 | 70.4 |
| I期 | 107 | 23 | (1-3) | 99.1 | 78.3 | 69.2 | 85.0 | 68.9 |
| II期 | 18 | 14 | 0 | | | | | 71.6 |
| III期 | 91 | 78 | 0 | 100.0 | 14.3 | 8.0 | 22.3 | 72.8 |
| IV期 | 108 | 103 | (1-3) | 99.1 | 4.3 | 1.5 | 9.5 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 254 | 80 | 対象数 | | 32 | 302 |
| % | 76.0 | 24.0 | % | | 9.6 | 90.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 15 | 34 | 99 | 116 | 70 | |
| % | 4.5 | 10.2 | 29.6 | 34.7 | 21.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 107 | 18 | 91 | 108 | (7-9) | (1-3) |
| % | 32.0 | 5.4 | 27.2 | 32.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 222 | 112 | 108 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 66.5 | 33.5 | 32.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 72 | 113 | 147 | | |
| % | | 21.6 | 33.8 | 44.0 | | |

158 磐田市立総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 127 | 21 | (4-6) | 96.9 | 83.3 | 75.6 | 88.8 | 60.1 |
| I期 | 61 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.2 | 79.4 | 95.5 | 62.3 |
| II期 | 42 | (4-6) | (1-3) | 95.2 | 85.7 | 70.9 | 93.3 | 57.9 |
| III期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 58.1 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 55.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 127 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 30 | 33 | 22 | 12 | | |
| % | 23.6 | 23.6 | 26.0 | 17.3 | 9.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | 42 | 17 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 48.0 | 33.1 | 13.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 112 | 112 | 0 | 0 | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 88.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | (1-3) | 13 | 78 | | | |
| % | 27.6 | | 10.2 | 61.4 | | | |

159 愛知県がんセンター中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

159 愛知県がんセンター中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 592 | 224 | 11 | 98.1 | 62.0 | 58.0 | 65.8 | 65.0 |
| I期 | 318 | 33 | (7-9) | 97.5 | 89.5 | 85.6 | 92.4 | 66.2 |
| II期 | 39 | 12 | (1-3) | 97.4 | 69.2 | 52.2 | 81.2 | 62.4 |
| III期 | 54 | 27 | (1-3) | 98.1 | 50.0 | 36.1 | 62.4 | 62.4 |
| IV期 | 164 | 149 | (1-3) | 99.4 | 8.6 | 5.0 | 13.6 | 65.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 407 | 185 | | | | | |
| % | 68.8 | 31.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 54 | 85 | 231 | 176 | 46 | | |
| % | 9.1 | 14.4 | 39.0 | 29.7 | 7.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 318 | 39 | 54 | 164 | (4-6) | 13 | |
| % | 53.7 | 6.6 | 9.1 | 27.7 | | 2.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 144 | 448 | 421 | 25 | (1-3) | | |
| % | 24.3 | 75.7 | 71.1 | 4.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 75 | 117 | 122 | 278 | | | |
| % | 12.7 | 19.8 | 20.6 | 47.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 483 | 129 | 11 | 97.7 | 73.1 | 68.9 | 76.8 | 62.9 |
| I期 | 147 | (4-6) | (1-3) | 99.3 | 96.6 | 92.0 | 98.6 | 65.5 |
| II期 | 77 | 12 | (1-3) | 98.7 | 84.3 | 74.0 | 90.8 | 63.7 |
| III期 | 135 | 33 | (4-6) | 97.0 | 75.4 | 67.2 | 81.8 | 61.2 |
| IV期 | 106 | 74 | (4-6) | 95.3 | 28.1 | 19.7 | 37.0 | 60.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 282 | 201 | | | | | |
| % | 58.4 | 41.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 65 | 83 | 190 | 115 | 30 | | |
| % | 13.5 | 17.2 | 39.3 | 23.8 | 6.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 147 | 77 | 135 | 106 | (1-3) | 15 | |
| % | 30.4 | 15.9 | 28.0 | 21.9 | | 3.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 56 | 427 | 391 | 32 | (4-6) | | |
| % | 11.6 | 88.4 | 81.0 | 6.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 57 | 71 | 93 | 262 | | | |
| % | 11.8 | 14.7 | 19.3 | 54.2 | | | |

159 愛知県がんセンター中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 83 | (4-6) | 95.4 | 35.4 | 27.2 | 43.7 | 67.0 |
| I期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 64.9 |
| II期 | 32 | 13 | (1-3) | 93.8 | 57.0 | 37.7 | 72.4 | 69.1 |
| III期 | 48 | 34 | (1-3) | 93.8 | 27.7 | 15.9 | 41.0 | 66.1 |
| IV期 | 27 | 27 | 0 | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 92 | 39 | | | | | | |
| % | 70.2 | 29.8 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 19 | 50 | 40 | 15 | | | |
| % | | 14.5 | 38.2 | 30.5 | 11.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 32 | 48 | 27 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 16.8 | 24.4 | 36.6 | 20.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 15 | 32 | 32 | 51 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 11.5 | 24.4 | 24.4 | 38.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 86 | 45 | 43 | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 65.6 | 34.4 | 32.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 69 | 50 | | | | |
| % | | 7.6 | 52.7 | 38.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 771 | 425 | 23 | 97.0 | 44.2 | 40.6 | 47.7 | 65.6 |
| I期 | 273 | 54 | 14 | 94.9 | 79.8 | 74.5 | 84.1 | 66.7 |
| II期 | 61 | 25 | (1-3) | 96.7 | 58.1 | 44.5 | 69.4 | 67.4 |
| III期 | 191 | 129 | (1-3) | 99.0 | 32.1 | 25.6 | 38.8 | 64.6 |
| IV期 | 240 | 214 | (4-6) | 97.9 | 9.3 | 6.0 | 13.4 | 64.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 485 | 286 | 対象数 | | 63 | 708 |
| % | 62.9 | 37.1 | % | | 8.2 | 91.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 51 | 125 | 309 | 237 | 49 | |
| % | 6.6 | 16.2 | 40.1 | 30.7 | 6.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 273 | 61 | 191 | 240 | (1-3) | (4-6) |
| % | 35.4 | 7.9 | 24.8 | 31.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 389 | 382 | 363 | 16 | (1-3) | |
| % | 50.5 | 49.5 | 47.1 | 2.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 51 | 155 | 210 | 355 | | |
| % | 6.6 | 20.1 | 27.2 | 46.0 | | |

159 愛知県がんセンター中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 696 | 53 | 15 | 97.8 | 92.4 | 90.1 | 94.1 | 54.9 |
| I期 | 366 | (7-9) | (7-9) | 98.1 | 97.5 | 95.3 | 98.7 | 55.2 |
| II期 | 215 | 15 | (4-6) | 98.1 | 93.0 | 88.6 | 95.7 | 53.7 |
| III期 | 91 | 18 | (4-6) | 95.6 | 80.2 | 70.4 | 87.0 | 54.0 |
| IV期 | 22 | 10 | 0 | | | | | 57.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 696 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 265 | 153 | 193 | 65 | 20 | | |
| % | 38.1 | 22.0 | 27.7 | 9.3 | 2.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 366 | 215 | 91 | 22 | (1-3) | 0 | |
| % | 52.6 | 30.9 | 13.1 | 3.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 647 | 605 | 37 | (4-6) | | |
| % | 7.0 | 93.0 | 86.9 | 5.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 192 | 54 | 64 | 386 | | | |
| % | 27.6 | 7.8 | 9.2 | 55.5 | | | |

160 安城更生病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

160 安城更生病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 384 | 211 | (1-3) | 99.5 | 45.0 | 39.9 | 49.9 | 68.8 |
| I期 | 186 | 47 | (1-3) | 99.5 | 74.7 | 67.8 | 80.4 | 68.6 |
| II期 | 37 | 21 | (1-3) | 97.3 | 42.1 | 26.0 | 57.4 | 74.9 |
| III期 | 30 | 19 | 0 | 100.0 | 36.7 | 20.1 | 53.4 | 67.2 |
| IV期 | 123 | 118 | 0 | 100.0 | 4.1 | 1.5 | 8.6 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 262 | 122 | | | | | |
| % | 68.2 | 31.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 58 | 114 | 116 | 76 | | |
| % | 5.2 | 15.1 | 29.7 | 30.2 | 19.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 186 | 37 | 30 | 123 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 48.4 | 9.6 | 7.8 | 32.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 135 | 249 | 235 | 12 | (1-3) | | |
| % | 35.2 | 64.8 | 61.2 | 3.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 69 | 78 | 221 | | | |
| % | 4.2 | 18.0 | 20.3 | 57.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 386 | 143 | (1-3) | 99.2 | 62.9 | 57.8 | 67.5 | 68.4 |
| I期 | 109 | 21 | 0 | 100.0 | 80.7 | 72.0 | 87.0 | 68.3 |
| II期 | 115 | 26 | (1-3) | 98.3 | 77.3 | 68.5 | 84.0 | 68.5 |
| III期 | 91 | 35 | (1-3) | 98.9 | 61.1 | 50.3 | 70.3 | 66.7 |
| IV期 | 65 | 59 | 0 | 100.0 | 9.2 | 3.8 | 17.7 | 66.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 220 | 166 | | | | | |
| % | 57.0 | 43.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 49 | 119 | 127 | 65 | | |
| % | 6.7 | 12.7 | 30.8 | 32.9 | 16.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 109 | 115 | 91 | 65 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 28.2 | 29.8 | 23.6 | 16.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 346 | 316 | 28 | (1-3) | | |
| % | 10.4 | 89.6 | 81.9 | 7.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 73 | 79 | 224 | | | |
| % | 2.6 | 18.9 | 20.5 | 58.0 | | | |

160 安城更生病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 124 | 80 | (1-3) | 98.4 | 34.8 | 26.5 | 43.2 | 70.2 |
| I期 | 67 | 33 | (1-3) | 97.0 | 49.7 | 37.1 | 61.0 | 69.4 |
| II期 | 28 | 19 | 0 | | | | | 72.9 |
| III期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 70.8 |
| IV期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 74.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 83 | 41 | | | | | |
| % | 66.9 | 33.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 42 | 54 | 16 | | |
| % | | | 33.9 | 43.5 | 12.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 67 | 28 | 16 | 12 | (1-3) | 0 |
| | % | 54.0 | 22.6 | 12.9 | 9.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 45 | 40 | 17 | 21 | (1-3) | 0 |
| | % | 36.3 | 32.3 | 13.7 | 16.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 113 | 11 | (7-9) | (1-3) | 0 | | |
| % | 91.1 | 8.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 85 | 34 | | | |
| % | | | 68.5 | 27.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 330 | 235 | (1-3) | 99.7 | 28.7 | 24.0 | 33.7 | 69.0 |
| I期 | 102 | 28 | (1-3) | 99.0 | 72.5 | 62.7 | 80.1 | 65.4 |
| II期 | 25 | 16 | 0 | | | | | 69.8 |
| III期 | 87 | 76 | 0 | 100.0 | 12.6 | 6.7 | 20.5 | 70.5 |
| IV期 | 108 | 108 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 240 | 90 | 対象数 | | 31 | 299 |
| % | 72.7 | 27.3 | % | | 9.4 | 90.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 18 | 34 | 118 | 103 | 57 | |
| % | 5.5 | 10.3 | 35.8 | 31.2 | 17.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 102 | 25 | 87 | 108 | (7-9) | (1-3) |
| % | 30.9 | 7.6 | 26.4 | 32.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 217 | 113 | 111 | (1-3) | 0 | |
| % | 65.8 | 34.2 | 33.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 70 | 100 | 157 | | |
| % | | 21.2 | 30.3 | 47.6 | | |

160 安城更生病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 204 | 27 | (1-3) | 99.5 | 86.7 | 81.2 | 90.7 | 60.0 |
| I期 | 113 | 10 | (1-3) | 99.1 | 91.1 | 84.0 | 95.1 | 57.9 |
| II期 | 50 | (1-3) | 0 | 100.0 | 94.0 | 82.5 | 98.0 | 58.4 |
| III期 | 33 | 10 | 0 | 100.0 | 69.7 | 51.0 | 82.4 | 62.9 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 204 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 50 | 47 | 60 | 36 | 11 | | |
| % | 24.5 | 23.0 | 29.4 | 17.6 | 5.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 113 | 50 | 33 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 55.4 | 24.5 | 16.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 186 | 163 | 23 | 0 | | |
| % | 8.8 | 91.2 | 79.9 | 11.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 56 | (7-9) | 30 | 110 | | | |
| % | 27.5 | | 14.7 | 53.9 | | | |

161 海南病院
2011年のみ

コメント:

特になし

161 海南病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 130 | 63 | (1-3) | 98.5 | 51.1 | 42.2 | 59.4 | 70.8 |
| I期 | 71 | 15 | (1-3) | 98.6 | 78.8 | 67.3 | 86.6 | 69.9 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 74.4 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.6 |
| IV期 | 34 | 33 | 0 | 100.0 | 2.9 | 0.2 | 13.0 | 68.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 104 | 26 | | | | | |
| % | 80.0 | 20.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 35 | 49 | 28 | | |
| % | | 10.0 | 26.9 | 37.7 | 21.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 71 | (7-9) | (7-9) | 34 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 54.6 | | | 26.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 90 | 85 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 30.8 | 69.2 | 65.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 20 | 34 | 61 | | | |
| % | 11.5 | 15.4 | 26.2 | 46.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 155 | 60 | (4-6) | 97.4 | 61.0 | 52.8 | 68.2 | 69.8 |
| I期 | 35 | (4-6) | (1-3) | 97.1 | 82.8 | 65.6 | 91.9 | 66.1 |
| II期 | 46 | (7-9) | (1-3) | 97.8 | 82.6 | 68.2 | 90.9 | 70.4 |
| III期 | 32 | 12 | (1-3) | 93.8 | 61.5 | 42.2 | 76.0 | 70.0 |
| IV期 | 36 | 29 | 0 | 100.0 | 19.4 | 8.6 | 33.6 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 102 | 53 | | | | | |
| % | 65.8 | 34.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 15 | 54 | 40 | 37 | | |
| % | | 9.7 | 34.8 | 25.8 | 23.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 35 | 46 | 32 | 36 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 22.6 | 29.7 | 20.6 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 123 | 114 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 20.6 | 79.4 | 73.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (7-9) | 35 | 94 | | | |
| % | 11.6 | | 22.6 | 60.6 | | | |

161 海南病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 27 | 24 | 0 | | | | | 69.7 |
| I期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 65.8 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.8 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 70.9 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 22 | (4-6) | | | | | |
| % | 81.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 10 | (4-6) | | |
| % | | | | 37.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (4-6) | (4-6) | 12 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | | | 44.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | | | 40.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | 92.6 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 17 | | | |
| % | | | | 63.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 104 | 88 | (1-3) | 98.1 | 14.5 | 8.5 | 22.1 | 72.2 |
| I期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 74.1 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 69.7 |
| III期 | 27 | 22 | 0 | | | | | 74.1 |
| IV期 | 54 | 51 | (1-3) | 98.1 | 3.9 | 0.7 | 11.7 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 85 | 19 | 対象数 | | 10 | 94 |
| % | 81.7 | 18.3 | % | | 9.6 | 90.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 30 | 34 | 29 | |
| % | | | 28.8 | 32.7 | 27.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 10 | (4-6) | 27 | 54 | (7-9) | 0 |
| % | 9.6 | | 26.0 | 51.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 97 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 93.3 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 40 | 55 | | |
| % | | | 38.5 | 52.9 | | |

161 海南病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 63 | (7-9) | 0 | 100.0 | 85.7 | 74.3 | 92.3 | 58.7 |
| I期 | 22 | (1-3) | 0 | | | | | 58.5 |
| II期 | 27 | (1-3) | 0 | | | | | 59.9 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 59.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 46.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 63 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 18 | 21 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 22.2 | 28.6 | 33.3 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 27 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 34.9 | 42.9 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 61 | 60 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 96.8 | 95.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | (4-6) | 45 | | | |
| % | 19.0 | | | 71.4 | | | |

162 小牧市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特にありません。

162 小牧市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 305 | 126 | 15 | 95.1 | 58.3 | 52.5 | 63.6 | 68.7 |
| I期 | 162 | 26 | 10 | 93.8 | 83.8 | 77.1 | 88.7 | 68.7 |
| II期 | 26 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.6 |
| III期 | 29 | 17 | (1-3) | | | | | 67.3 |
| IV期 | 83 | 71 | (1-3) | 97.6 | 13.5 | 7.2 | 21.8 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 226 | 79 | | | | | |
| % | 74.1 | 25.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 33 | 101 | 117 | 42 | | |
| % | 3.9 | 10.8 | 33.1 | 38.4 | 13.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 162 | 26 | 29 | 83 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 53.1 | 8.5 | 9.5 | 27.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 68 | 237 | 219 | 18 | 0 | | |
| % | 22.3 | 77.7 | 71.8 | 5.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 44 | 40 | 204 | | | |
| % | 5.6 | 14.4 | 13.1 | 66.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 363 | 105 | 22 | 93.9 | 70.6 | 65.6 | 75.1 | 67.4 |
| I期 | 83 | (4-6) | 10 | 88.0 | 92.2 | 83.5 | 96.4 | 67.5 |
| II期 | 108 | 20 | (4-6) | 95.4 | 81.2 | 72.4 | 87.5 | 70.4 |
| III期 | 101 | 28 | (4-6) | 96.0 | 72.1 | 62.2 | 79.8 | 66.9 |
| IV期 | 62 | 50 | (1-3) | 98.4 | 18.3 | 9.8 | 29.0 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 215 | 148 | | | | | |
| % | 59.2 | 40.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 45 | 140 | 111 | 43 | | |
| % | 6.6 | 12.4 | 38.6 | 30.6 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 83 | 108 | 101 | 62 | 0 | (7-9) | |
| % | 22.9 | 29.8 | 27.8 | 17.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 322 | 302 | 20 | 0 | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 83.2 | 5.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 56 | 63 | 234 | | | |
| % | 2.8 | 15.4 | 17.4 | 64.5 | | | |

162 小牧市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 62 | (4-6) | 94.4 | 30.0 | 20.7 | 39.9 | 71.4 |
| I期 | 24 | 12 | (1-3) | | | | | 71.6 |
| II期 | 33 | 21 | (1-3) | 97.0 | 35.9 | 20.1 | 52.0 | 69.7 |
| III期 | 24 | 20 | (1-3) | | | | | 70.9 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 67 | 23 | | | | | |
| % | 74.4 | 25.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 25 | 45 | 13 | | |
| % | | | 27.8 | 50.0 | 14.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 24 | 33 | 24 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 26.7 | 36.7 | 26.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 20 | 34 | 15 | 15 | (1-3) | 0 |
| | % | 22.2 | 37.8 | 16.7 | 16.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 12 | 10 | (1-3) | 0 | | |
| % | 86.7 | 13.3 | 11.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 38 | 52 | | | |
| % | | | 42.2 | 57.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 390 | 273 | 16 | 95.9 | 29.5 | 25.0 | 34.1 | 69.3 |
| I期 | 105 | 35 | (7-9) | 92.4 | 66.2 | 56.1 | 74.4 | 69.5 |
| II期 | 26 | 14 | (4-6) | | | | | 70.3 |
| III期 | 95 | 74 | (1-3) | 97.9 | 21.6 | 13.9 | 30.4 | 67.8 |
| IV期 | 149 | 139 | (1-3) | 99.3 | 6.5 | 3.3 | 11.3 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 287 | 103 | 対象数 | | 47 | 343 |
| % | 73.6 | 26.4 | % | | 12.1 | 87.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 14 | 37 | 127 | 162 | 50 | |
| % | 3.6 | 9.5 | 32.6 | 41.5 | 12.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 105 | 26 | 95 | 149 | 14 | (1-3) |
| % | 26.9 | 6.7 | 24.4 | 38.2 | 3.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 253 | 137 | 134 | (1-3) | 0 | |
| % | 64.9 | 35.1 | 34.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 18 | 53 | 91 | 228 | | |
| % | 4.6 | 13.6 | 23.3 | 58.5 | | |

162 小牧市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 215 | 25 | 13 | 94.0 | 88.2 | 83.0 | 91.8 | 58.7 |
| I期 | 114 | (4-6) | (4-6) | 96.5 | 96.5 | 90.9 | 98.7 | 56.6 |
| II期 | 59 | (7-9) | (7-9) | 88.1 | 87.3 | 75.2 | 93.7 | 56.4 |
| III期 | 29 | (4-6) | (1-3) | | | | | 54.9 |
| IV期 | 13 | 10 | 0 | | | | | 59.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 215 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 59 | 52 | 55 | 36 | 13 | | |
| % | 27.4 | 24.2 | 25.6 | 16.7 | 6.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 114 | 59 | 29 | 13 | 0 | 0 | |
| % | 53.0 | 27.4 | 13.5 | 6.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 189 | 181 | (7-9) | 0 | | |
| % | 12.1 | 87.9 | 84.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 55 | (1-3) | 18 | 140 | | | |
| % | 25.6 | | 8.4 | 65.1 | | | |

163 豊橋市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

163 豊橋市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 467 | 195 | (4-6) | 99.1 | 58.0 | 53.4 | 62.4 | 70.2 |
| I期 | 282 | 57 | (1-3) | 98.9 | 79.7 | 74.5 | 83.9 | 70.7 |
| II期 | 41 | 17 | 0 | 100.0 | 58.5 | 42.1 | 71.8 | 70.7 |
| III期 | 38 | 25 | 0 | 100.0 | 34.2 | 19.8 | 49.1 | 72.4 |
| IV期 | 97 | 90 | (1-3) | 99.0 | 6.3 | 2.6 | 12.3 | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 336 | 131 | | | | | |
| % | 71.9 | 28.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 49 | 137 | 186 | 81 | | |
| % | 3.0 | 10.5 | 29.3 | 39.8 | 17.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 282 | 41 | 38 | 97 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 60.4 | 8.8 | 8.1 | 20.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 102 | 365 | 327 | 27 | 11 | | |
| % | 21.8 | 78.2 | 70.0 | 5.8 | 2.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 82 | 32 | 116 | 237 | | | |
| % | 17.6 | 6.9 | 24.8 | 50.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 477 | 179 | (4-6) | 98.7 | 62.2 | 57.7 | 66.4 | 68.2 |
| I期 | 101 | 14 | (1-3) | 99.0 | 86.1 | 77.6 | 91.5 | 67.8 |
| II期 | 148 | 39 | (1-3) | 99.3 | 73.6 | 65.7 | 79.9 | 70.8 |
| III期 | 113 | 38 | (1-3) | 98.2 | 66.0 | 56.4 | 74.0 | 70.1 |
| IV期 | 96 | 78 | (1-3) | 99.0 | 18.0 | 11.0 | 26.3 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 262 | 215 | | | | | |
| % | 54.9 | 45.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 35 | 59 | 142 | 159 | 82 | | |
| % | 7.3 | 12.4 | 29.8 | 33.3 | 17.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 101 | 148 | 113 | 96 | 10 | (7-9) | |
| % | 21.2 | 31.0 | 23.7 | 20.1 | 2.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 60 | 417 | 349 | 42 | 26 | | |
| % | 12.6 | 87.4 | 73.2 | 8.8 | 5.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 72 | 29 | 56 | 320 | | | |
| % | 15.1 | 6.1 | 11.7 | 67.1 | | | |

163 豊橋市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 151 | 110 | 0 | 100.0 | 27.2 | 20.3 | 34.4 | 70.7 |
| I期 | 68 | 38 | 0 | 100.0 | 44.1 | 32.2 | 55.4 | 70.9 |
| II期 | 45 | 36 | 0 | 100.0 | 20.0 | 9.9 | 32.7 | 71.3 |
| III期 | 24 | 24 | 0 | | | | | 69.5 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 90 | 61 | | | | | |
| % | 59.6 | 40.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 40 | 68 | 23 | | |
| % | | 10.6 | 26.5 | 45.0 | 15.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 68 | 45 | 24 | 10 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 45.0 | 29.8 | 15.9 | 6.6 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 67 | 37 | 21 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 13.9 | 44.4 | 24.5 | 13.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 125 | 26 | 25 | (1-3) | 0 | | |
| % | 82.8 | 17.2 | 16.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 111 | 38 | | | |
| % | | | 73.5 | 25.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 431 | 322 | (1-3) | 99.3 | 24.8 | 20.9 | 29.0 | 69.3 |
| I期 | 119 | 39 | (1-3) | 99.2 | 67.0 | 57.7 | 74.7 | 68.8 |
| II期 | 26 | 16 | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 92 | 79 | (1-3) | 98.9 | 13.2 | 7.2 | 21.0 | 69.4 |
| IV期 | 178 | 173 | (1-3) | 99.4 | 2.3 | 0.8 | 5.3 | 68.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 301 | 130 | 対象数 | | 52 | 379 |
| % | 69.8 | 30.2 | % | | 12.1 | 87.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 16 | 50 | 145 | 157 | 63 | |
| % | 3.7 | 11.6 | 33.6 | 36.4 | 14.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 119 | 26 | 92 | 178 | 15 | (1-3) |
| % | 27.6 | 6.0 | 21.3 | 41.3 | 3.5 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 292 | 139 | 124 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 67.7 | 32.3 | 28.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 41 | 31 | 124 | 235 | | |
| % | 9.5 | 7.2 | 28.8 | 54.5 | | |

163 豊橋市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 156 | 31 | (1-3) | 98.7 | 80.0 | 72.7 | 85.5 | 61.6 |
| I期 | 60 | (7-9) | 0 | 100.0 | 88.3 | 77.1 | 94.3 | 59.8 |
| II期 | 57 | (4-6) | (1-3) | 98.2 | 91.2 | 80.1 | 96.2 | 60.1 |
| III期 | 22 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.8 |
| IV期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 61.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 156 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 31 | 33 | 46 | 35 | 11 | | |
| % | 19.9 | 21.2 | 29.5 | 22.4 | 7.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 57 | 22 | 15 | (1-3) | 0 | |
| % | 38.5 | 36.5 | 14.1 | 9.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 138 | (7-9) | (1-3) | 130 | | |
| % | 11.5 | 88.5 | | | 83.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | (1-3) | 11 | 118 | | | |
| % | 16.7 | | 7.1 | 75.6 | | | |

164 一宮市立市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

164 一宮市立市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 158 | 70 | 10 | 93.7 | 55.1 | 46.9 | 62.5 | 69.6 |
| I期 | 79 | 23 | (4-6) | 92.4 | 70.8 | 59.4 | 79.5 | 69.9 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | 35 | 13 | (1-3) | 91.4 | 61.6 | 43.2 | 75.7 | 69.1 |
| IV期 | 39 | 34 | (1-3) | 97.4 | 10.5 | 3.4 | 22.5 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 106 | 52 | | | | | |
| % | 67.1 | 32.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 17 | 38 | 63 | 30 | | |
| % | 6.3 | 10.8 | 24.1 | 39.9 | 19.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 79 | (1-3) | 35 | 39 | 0 | (1-3) | |
| % | 50.0 | | 22.2 | 24.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 122 | 115 | (7-9) | 0 | | |
| % | 22.8 | 77.2 | 72.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | 19 | 35 | 81 | | | |
| % | 14.6 | 12.0 | 22.2 | 51.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 172 | 69 | 16 | 90.7 | 59.2 | 51.4 | 66.2 | 69.8 |
| I期 | 57 | (7-9) | (4-6) | 89.5 | 84.2 | 71.9 | 91.5 | 70.5 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | |
| III期 | 85 | 35 | (7-9) | 89.4 | 57.4 | 45.9 | 67.3 | 71.5 |
| IV期 | 21 | 20 | 0 | | | | | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 105 | 67 | | | | | |
| % | 61.0 | 39.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 15 | 42 | 72 | 30 | | |
| % | 7.6 | 8.7 | 24.4 | 41.9 | 17.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 57 | (4-6) | 85 | 21 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 33.1 | | 49.4 | 12.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 145 | 138 | (7-9) | 0 | | |
| % | 15.7 | 84.3 | 80.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 12 | 34 | 96 | | | |
| % | 17.4 | 7.0 | 19.8 | 55.8 | | | |

164 一宮市立市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 41 | 28 | (1-3) | 92.7 | 30.6 | 17.2 | 45.2 | 70.6 |
| I期 | 12 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.6 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | 20 | 16 | 0 | | | | | 71.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 27 | 14 | | | | | |
| % | 65.9 | 34.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 15 | 18 | (4-6) | | |
| % | | | 36.6 | 43.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 12 | (1-3) | 20 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 29.3 | | 48.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | (1-3) | 20 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | | | 48.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | | |
| % | 70.7 | 29.3 | 29.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 29 | 11 | | | |
| % | | | 70.7 | 26.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 153 | 100 | 12 | 92.2 | 33.0 | 25.6 | 40.7 | 72.1 |
| I期 | 58 | 17 | (7-9) | 86.2 | 69.0 | 54.8 | 79.5 | 71.9 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | 40 | 29 | (1-3) | 92.5 | 25.7 | 13.4 | 40.0 | 71.3 |
| IV期 | 48 | 47 | (1-3) | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 119 | 34 | 対象数 | 11 | 142 | | |
| % | 77.8 | 22.2 | % | 7.2 | 92.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 42 | 71 | 30 | | |
| % | | | 27.5 | 46.4 | 19.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 58 | (1-3) | 40 | 48 | (4-6) | 0 | |
| % | 37.9 | | 26.1 | 31.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 132 | 21 | 21 | 0 | 0 | | |
| % | 86.3 | 13.7 | 13.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | 14 | 30 | 64 | | | |
| % | 29.4 | 9.2 | 19.6 | 41.8 | | | |

164 一宮市立市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 199 | 21 | 21 | 89.4 | 89.1 | 83.8 | 92.8 | 58.8 |
| I期 | 91 | (1-3) | (4-6) | 93.4 | 97.8 | 91.4 | 99.4 | 55.8 |
| II期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | 78 | (7-9) | 12 | 84.6 | 90.6 | 81.2 | 95.4 | 59.2 |
| IV期 | 12 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 199 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 61 | 37 | 49 | 41 | 11 | | |
| % | 30.7 | 18.6 | 24.6 | 20.6 | 5.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 91 | 14 | 78 | 12 | (4-6) | 0 | |
| % | 45.7 | 7.0 | 39.2 | 6.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 164 | 158 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 17.6 | 82.4 | 79.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | (1-3) | 12 | 146 | | | |
| % | 19.6 | | 6.0 | 73.4 | | | |

165 公立陶生病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

165 公立陶生病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 229 | 118 | (1-3) | 99.6 | 48.3 | 41.6 | 54.6 | 73.6 |
| I期 | 129 | 38 | 0 | 100.0 | 70.5 | 61.9 | 77.6 | 73.9 |
| II期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 74.1 |
| III期 | 13 | 10 | (1-3) | | | | | 76.9 |
| IV期 | 57 | 56 | 0 | 100.0 | 1.8 | 0.1 | 8.2 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 163 | 66 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 56 | 99 | 60 | | |
| % | | 5.7 | 24.5 | 43.2 | 26.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 129 | 21 | 13 | 57 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 56.3 | 9.2 | 5.7 | 24.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 62 | 167 | 144 | 21 | (1-3) | | |
| % | 27.1 | 72.9 | 62.9 | 9.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | 12 | 84 | 99 | | | |
| % | 14.8 | 5.2 | 36.7 | 43.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 331 | 120 | (1-3) | 99.4 | 63.5 | 58.1 | 68.5 | 71.0 |
| I期 | 96 | 17 | 0 | 100.0 | 82.3 | 73.1 | 88.6 | 70.5 |
| II期 | 90 | 24 | 0 | 100.0 | 73.3 | 62.9 | 81.3 | 71.9 |
| III期 | 73 | 18 | 0 | 100.0 | 75.3 | 63.8 | 83.7 | 72.0 |
| IV期 | 62 | 53 | (1-3) | 96.8 | 11.7 | 5.1 | 21.2 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 194 | 137 | | | | | |
| % | 58.6 | 41.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 30 | 94 | 122 | 73 | | |
| % | 3.6 | 9.1 | 28.4 | 36.9 | 22.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 96 | 90 | 73 | 62 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 29.0 | 27.2 | 22.1 | 18.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 291 | 243 | 40 | (7-9) | | |
| % | 12.1 | 87.9 | 73.4 | 12.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 65 | 19 | 94 | 153 | | | |
| % | 19.6 | 5.7 | 28.4 | 46.2 | | | |

165 公立陶生病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 62 | 42 | 0 | 100.0 | 32.3 | 21.1 | 43.9 | 71.9 |
| I期 | 22 | 10 | 0 | | | | | 76.1 |
| II期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 66.7 |
| III期 | 14 | 13 | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 44 | 18 | | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 17 | 24 | 15 | | | |
| % | | | 27.4 | 38.7 | 24.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 15 | 14 | (4-6) | (7-9) | 0 | |
| | % | 35.5 | 24.2 | 22.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 16 | 15 | 13 | (4-6) | 0 | |
| | % | 21.0 | 25.8 | 24.2 | 21.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 57 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | | | |
| % | 91.9 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 41 | 21 | | | | |
| % | | | 66.1 | 33.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 231 | 185 | (1-3) | 99.6 | 19.8 | 15.0 | 25.2 | 71.9 |
| I期 | 56 | 25 | 0 | 100.0 | 55.4 | 41.5 | 67.2 | 70.7 |
| II期 | 17 | 10 | (1-3) | | | | | 67.8 |
| III期 | 72 | 66 | 0 | 100.0 | 8.3 | 3.4 | 16.1 | 75.8 |
| IV期 | 82 | 80 | 0 | 100.0 | 2.4 | 0.5 | 7.7 | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 168 | 63 | 対象数 | | 30 | 201 |
| % | 72.7 | 27.3 | % | | 13.0 | 87.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 76 | 85 | 53 | |
| % | | 4.8 | 32.9 | 36.8 | 22.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 56 | 17 | 72 | 82 | (4-6) | 0 |
| % | 24.2 | 7.4 | 31.2 | 35.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 188 | 43 | 36 | 0 | (7-9) | |
| % | 81.4 | 18.6 | 15.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 34 | 11 | 88 | 98 | | |
| % | 14.7 | 4.8 | 38.1 | 42.4 | | |

165 公立陶生病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 19 | (1-3) | 99.2 | 84.2 | 76.4 | 89.6 | 63.0 |
| I期 | 57 | (1-3) | 0 | 100.0 | 94.7 | 84.6 | 98.3 | 59.1 |
| II期 | 43 | (4-6) | (1-3) | 97.7 | 85.8 | 71.1 | 93.4 | 61.8 |
| III期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 66.2 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 121 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 20 | 27 | 32 | 15 | | |
| % | 22.3 | 16.5 | 22.3 | 26.4 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 57 | 43 | 16 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 47.1 | 35.5 | 13.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 107 | 93 | 11 | (1-3) | | |
| % | 11.6 | 88.4 | 76.9 | 9.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (4-6) | 18 | 68 | | | |
| % | 25.6 | | 14.9 | 56.2 | | | |

166 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

166 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 277 | 135 | (4-6) | 97.8 | 50.6 | 44.5 | 56.4 | 70.5 |
| I期 | 152 | 42 | (1-3) | 98.7 | 72.1 | 64.1 | 78.5 | 71.2 |
| II期 | 27 | (7-9) | (1-3) | | | | | 67.7 |
| III期 | 23 | 14 | (1-3) | | | | | 73.7 |
| IV期 | 68 | 64 | (1-3) | 98.5 | 4.5 | 1.2 | 11.4 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 198 | 79 | | | | | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 25 | 88 | 105 | 50 | | |
| % | | 9.0 | 31.8 | 37.9 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 152 | 27 | 23 | 68 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 54.9 | 9.7 | 8.3 | 24.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 84 | 193 | 169 | 18 | (4-6) | | |
| % | 30.3 | 69.7 | 61.0 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 41 | 78 | 138 | | | |
| % | 7.2 | 14.8 | 28.2 | 49.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 309 | 120 | (7-9) | 97.4 | 60.8 | 55.1 | 66.0 | 69.2 |
| I期 | 90 | 14 | (1-3) | 98.9 | 84.4 | 75.0 | 90.4 | 70.2 |
| II期 | 76 | 17 | (1-3) | 96.1 | 77.6 | 66.4 | 85.4 | 68.7 |
| III期 | 52 | 12 | (1-3) | 98.1 | 76.8 | 62.8 | 86.1 | 67.1 |
| IV期 | 81 | 69 | (1-3) | 96.3 | 12.2 | 6.1 | 20.6 | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 181 | 128 | | | | | |
| % | 58.6 | 41.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 41 | 112 | 86 | 59 | | |
| % | 3.6 | 13.3 | 36.2 | 27.8 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 76 | 52 | 81 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 29.1 | 24.6 | 16.8 | 26.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 256 | 214 | 39 | (1-3) | | |
| % | 17.2 | 82.8 | 69.3 | 12.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 43 | 58 | 197 | | | |
| % | 3.6 | 13.9 | 18.8 | 63.8 | | | |

166 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 143 | 100 | (7-9) | 95.1 | 27.5 | 20.3 | 35.2 | 70.0 |
| I期 | 56 | 28 | (1-3) | 94.6 | 48.4 | 34.6 | 60.8 | 71.9 |
| II期 | 39 | 27 | (1-3) | 92.3 | 25.3 | 12.6 | 40.2 | 68.8 |
| III期 | 34 | 31 | (1-3) | 97.1 | 6.5 | 1.2 | 18.7 | 70.8 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 63.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|--|
| 対象数 | 87 | 56 | | | | | | |
| % | 60.8 | 39.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 42 | 72 | 13 | | | |
| % | | | 29.4 | 50.3 | 9.1 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 56 | 39 | 34 | 14 | 0 | 0 | |
| | % | 39.2 | 27.3 | 23.8 | 9.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 55 | 30 | 35 | (1-3) | 0 | |
| | % | 14.7 | 38.5 | 21.0 | 24.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 121 | 22 | 22 | 0 | 0 | | | |
| % | 84.6 | 15.4 | 15.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 106 | 31 | | | | |
| % | | | 74.1 | 21.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 289 | 193 | (4-6) | 98.6 | 32.6 | 27.3 | 38.1 | 69.7 |
| I期 | 105 | 32 | (1-3) | 99.0 | 69.4 | 59.6 | 77.3 | 67.9 |
| II期 | 17 | 12 | (1-3) | | | | | 61.5 |
| III期 | 64 | 51 | (1-3) | 96.9 | 18.1 | 9.7 | 28.6 | 71.2 |
| IV期 | 101 | 98 | 0 | 100.0 | 3.0 | 0.8 | 7.7 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 214 | 75 | 対象数 | | 39 | 250 |
| % | 74.0 | 26.0 | % | | 13.5 | 86.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 10 | 32 | 105 | 86 | 56 | |
| % | 3.5 | 11.1 | 36.3 | 29.8 | 19.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 105 | 17 | 64 | 101 | (1-3) | (1-3) |
| % | 36.3 | 5.9 | 22.1 | 34.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 168 | 121 | 116 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 58.1 | 41.9 | 40.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 21 | 50 | 88 | 130 | | |
| % | 7.3 | 17.3 | 30.4 | 45.0 | | |

166 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 170 | 28 | (1-3) | 98.8 | 83.5 | 77.0 | 88.3 | 61.0 |
| I期 | 82 | (4-6) | (1-3) | 98.8 | 93.9 | 86.0 | 97.4 | 64.5 |
| II期 | 58 | 12 | (1-3) | 98.3 | 79.2 | 66.3 | 87.6 | 61.6 |
| III期 | 17 | 0 | 0 | | | | | 59.1 |
| IV期 | 13 | 11 | 0 | | | | | 56.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 170 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 41 | 38 | 45 | 25 | 21 | | |
| % | 24.1 | 22.4 | 26.5 | 14.7 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 58 | 17 | 13 | 0 | 0 | |
| % | 48.2 | 34.1 | 10.0 | 7.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治療切除 | 非治療切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 147 | 130 | (7-9) | (7-9) | | |
| % | 13.5 | 86.5 | 76.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | (7-9) | (7-9) | 109 | | | |
| % | 26.5 | | | 64.1 | | | |

167 名古屋第一赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

167 名古屋第一赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 399 | 191 | 15 | 96.2 | 51.9 | 46.8 | 56.7 | 68.7 |
| I期 | 199 | 34 | 14 | 93.0 | 82.8 | 76.7 | 87.4 | 67.8 |
| II期 | 34 | 17 | 0 | 100.0 | 50.0 | 32.4 | 65.3 | 68.0 |
| III期 | 34 | 24 | 0 | 100.0 | 29.4 | 15.4 | 45.0 | 69.8 |
| IV期 | 124 | 111 | (1-3) | 99.2 | 10.2 | 5.6 | 16.3 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 284 | 115 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 41 | 139 | 148 | 52 | | |
| % | 4.8 | 10.3 | 34.8 | 37.1 | 13.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 199 | 34 | 34 | 124 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 49.9 | 8.5 | 8.5 | 31.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 117 | 282 | 267 | 15 | 0 | | |
| % | 29.3 | 70.7 | 66.9 | 3.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | 59 | 98 | 214 | | | |
| % | 7.0 | 14.8 | 24.6 | 53.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 438 | 178 | 12 | 97.3 | 59.1 | 54.3 | 63.5 | 69.4 |
| I期 | 109 | 16 | (4-6) | 94.5 | 85.1 | 76.8 | 90.6 | 68.7 |
| II期 | 115 | 36 | (1-3) | 97.4 | 68.5 | 59.1 | 76.2 | 69.6 |
| III期 | 117 | 48 | (1-3) | 99.1 | 59.0 | 49.5 | 67.2 | 69.2 |
| IV期 | 84 | 70 | (1-3) | 97.6 | 15.6 | 8.8 | 24.2 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 278 | 160 | | | | | |
| % | 63.5 | 36.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 44 | 139 | 162 | 69 | | |
| % | 5.5 | 10.0 | 31.7 | 37.0 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 109 | 115 | 117 | 84 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 24.9 | 26.3 | 26.7 | 19.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 385 | 363 | 21 | (1-3) | | |
| % | 12.1 | 87.9 | 82.9 | 4.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | 43 | 129 | 221 | | | |
| % | 10.3 | 9.8 | 29.5 | 50.5 | | | |

167 名古屋第一赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 117 | 83 | (4-6) | 95.7 | 27.1 | 19.3 | 35.6 | 68.1 |
| I期 | 50 | 29 | (4-6) | 92.0 | 38.8 | 25.0 | 52.5 | 70.5 |
| II期 | 34 | 23 | 0 | 100.0 | 32.4 | 17.6 | 48.0 | 66.7 |
| III期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 65.3 |
| IV期 | 14 | 13 | (1-3) | | | | | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 84 | 33 | | | | | |
| % | 71.8 | 28.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 38 | 47 | 12 | | |
| % | | 13.7 | 32.5 | 40.2 | 10.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 50 | 34 | 17 | 14 | (1-3) | 0 |
| | % | 42.7 | 29.1 | 14.5 | 12.0 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 35 | 43 | 12 | 23 | (4-6) | 0 |
| | % | 29.9 | 36.8 | 10.3 | 19.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 88 | 29 | 27 | (1-3) | 0 | | |
| % | 75.2 | 24.8 | 23.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 70 | 42 | | | |
| % | | | 59.8 | 35.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 672 | 431 | 29 | 95.7 | 35.3 | 31.7 | 38.9 | 69.7 |
| I期 | 247 | 62 | 22 | 91.1 | 74.4 | 68.4 | 79.4 | 68.6 |
| II期 | 40 | 22 | (4-6) | 87.5 | 41.8 | 25.9 | 57.0 | 71.1 |
| III期 | 177 | 150 | (1-3) | 99.4 | 15.2 | 10.3 | 20.9 | 70.0 |
| IV期 | 202 | 193 | (1-3) | 99.5 | 4.4 | 2.1 | 7.9 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 474 | 198 | 対象数 | | 42 | 630 |
| % | 70.5 | 29.5 | % | | 6.3 | 93.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 19 | 55 | 249 | 256 | 93 | |
| % | 2.8 | 8.2 | 37.1 | 38.1 | 13.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 247 | 40 | 177 | 202 | (1-3) | (1-3) |
| % | 36.8 | 6.0 | 26.3 | 30.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 327 | 345 | 333 | 10 | (1-3) | |
| % | 48.7 | 51.3 | 49.6 | 1.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 33 | 125 | 194 | 320 | | |
| % | 4.9 | 18.6 | 28.9 | 47.6 | | |

167 名古屋第一赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 237 | 42 | 11 | 95.4 | 82.1 | 76.5 | 86.4 | 62.2 |
| I期 | 114 | 14 | (4-6) | 94.7 | 87.6 | 79.9 | 92.5 | 59.7 |
| II期 | 70 | (4-6) | (4-6) | 94.3 | 92.7 | 83.3 | 96.9 | 64.2 |
| III期 | 28 | (7-9) | 0 | | | | | 60.7 |
| IV期 | 24 | 15 | (1-3) | | | | | 64.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 237 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 54 | 41 | 55 | 65 | 22 | | |
| % | 22.8 | 17.3 | 23.2 | 27.4 | 9.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 114 | 70 | 28 | 24 | (1-3) | 0 | |
| % | 48.1 | 29.5 | 11.8 | 10.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 204 | 203 | (1-3) | 0 | | |
| % | 13.9 | 86.1 | 85.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | (4-6) | 32 | 155 | | | |
| % | 19.0 | | 13.5 | 65.4 | | | |

168 名古屋第二赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

168 名古屋第二赤十字病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 455 | 205 | 32 | 93.0 | 53.6 | 48.8 | 58.1 | 70.9 |
| I期 | 253 | 57 | 19 | 92.5 | 76.8 | 71.0 | 81.6 | 71.1 |
| II期 | 35 | 17 | (1-3) | 94.3 | 49.1 | 31.4 | 64.6 | 70.3 |
| III期 | 43 | 23 | (1-3) | 93.0 | 45.9 | 30.5 | 60.0 | 70.0 |
| IV期 | 105 | 95 | (4-6) | 94.3 | 4.6 | 1.5 | 10.5 | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 316 | 139 | | | | | |
| % | 69.5 | 30.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 39 | 121 | 174 | 98 | | |
| % | 5.1 | 8.6 | 26.6 | 38.2 | 21.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 253 | 35 | 43 | 105 | 14 | (4-6) | |
| % | 55.6 | 7.7 | 9.5 | 23.1 | 3.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 128 | 327 | 313 | 11 | (1-3) | | |
| % | 28.1 | 71.9 | 68.8 | 2.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 51 | 137 | 253 | | | |
| % | 3.1 | 11.2 | 30.1 | 55.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 547 | 187 | 39 | 92.9 | 65.0 | 60.8 | 68.9 | 70.4 |
| I期 | 149 | 22 | 11 | 92.6 | 84.7 | 77.7 | 89.7 | 70.7 |
| II期 | 139 | 25 | 12 | 91.4 | 81.7 | 74.1 | 87.3 | 71.5 |
| III期 | 144 | 49 | 13 | 91.0 | 64.9 | 56.3 | 72.2 | 71.2 |
| IV期 | 87 | 78 | (1-3) | 97.7 | 8.7 | 3.9 | 16.0 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 301 | 246 | | | | | |
| % | 55.0 | 45.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 63 | 153 | 187 | 119 | | |
| % | 4.6 | 11.5 | 28.0 | 34.2 | 21.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 149 | 139 | 144 | 87 | 14 | 14 | |
| % | 27.2 | 25.4 | 26.3 | 15.9 | 2.6 | 2.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 76 | 471 | 447 | 22 | (1-3) | | |
| % | 13.9 | 86.1 | 81.7 | 4.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 65 | 105 | 351 | | | |
| % | 4.8 | 11.9 | 19.2 | 64.2 | | | |

168 名古屋第二赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 98 | 64 | (4-6) | 95.9 | 32.8 | 23.6 | 42.3 | 71.5 |
| I期 | 38 | 19 | (1-3) | 94.7 | 48.9 | 32.1 | 63.7 | 70.8 |
| II期 | 20 | 11 | 0 | | | | | 71.1 |
| III期 | 21 | 17 | 0 | | | | | 73.8 |
| IV期 | 12 | 10 | (1-3) | | | | | 73.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 62 | 36 | | | | | |
| % | 63.3 | 36.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 33 | 41 | 17 | | |
| % | | | 33.7 | 41.8 | 17.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 38 | 20 | 21 | 12 | (7-9) | 0 |
| | % | 38.8 | 20.4 | 21.4 | 12.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 14 | 34 | 23 | 20 | (7-9) | 0 |
| | % | 14.3 | 34.7 | 23.5 | 20.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 83 | 15 | 15 | 0 | 0 | | |
| % | 84.7 | 15.3 | 15.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 67 | 29 | | | |
| % | | | 68.4 | 29.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 450 | 300 | 18 | 96.0 | 32.3 | 28.0 | 36.7 | 70.9 |
| I期 | 144 | 33 | 10 | 93.1 | 76.6 | 68.7 | 82.7 | 72.1 |
| II期 | 31 | 19 | (1-3) | 96.8 | 38.0 | 21.3 | 54.7 | 69.3 |
| III期 | 105 | 89 | (4-6) | 96.2 | 13.6 | 7.8 | 21.1 | 73.0 |
| IV期 | 150 | 141 | (1-3) | 98.0 | 4.2 | 1.8 | 8.5 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 312 | 138 | 対象数 | | 34 | 416 |
| % | 69.3 | 30.7 | % | | 7.6 | 92.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 40 | 135 | 168 | 96 | |
| % | 2.4 | 8.9 | 30.0 | 37.3 | 21.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 144 | 31 | 105 | 150 | 19 | (1-3) |
| % | 32.0 | 6.9 | 23.3 | 33.3 | 4.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 295 | 155 | 152 | (1-3) | 0 | |
| % | 65.6 | 34.4 | 33.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 13 | 72 | 139 | 226 | | |
| % | 2.9 | 16.0 | 30.9 | 50.2 | | |

168 名古屋第二赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 185 | 26 | 12 | 93.5 | 85.6 | 79.6 | 90.0 | 62.6 |
| I期 | 77 | (1-3) | (7-9) | 90.9 | 95.9 | 87.8 | 98.7 | 63.3 |
| II期 | 67 | (4-6) | (1-3) | 97.0 | 92.5 | 82.9 | 96.8 | 62.8 |
| III期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 68.7 |
| IV期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 65.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 185 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 40 | 29 | 53 | 40 | 23 | | |
| % | 21.6 | 15.7 | 28.6 | 21.6 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 67 | 22 | 12 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 41.6 | 36.2 | 11.9 | 6.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 152 | 147 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 17.8 | 82.2 | 79.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | 11 | 25 | 126 | | | |
| % | 12.4 | 5.9 | 13.5 | 68.1 | | | |

169 藤田保健衛生大学病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

169 藤田保健衛生大学病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 578 | 243 | 11 | 98.1 | 57.5 | 53.4 | 61.5 | 69.0 |
| I期 | 333 | 65 | (7-9) | 97.9 | 80.2 | 75.5 | 84.1 | 69.2 |
| II期 | 71 | 34 | (1-3) | 98.6 | 51.5 | 39.3 | 62.4 | 70.2 |
| III期 | 42 | 27 | (1-3) | 97.6 | 34.6 | 20.6 | 49.0 | 71.8 |
| IV期 | 118 | 114 | (1-3) | 99.2 | 2.6 | 0.7 | 6.7 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 404 | 174 | | | | | |
| % | 69.9 | 30.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 65 | 204 | 206 | 81 | | |
| % | 3.8 | 11.2 | 35.3 | 35.6 | 14.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 333 | 71 | 42 | 118 | (4-6) | 10 | |
| % | 57.6 | 12.3 | 7.3 | 20.4 | | 1.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 137 | 441 | 426 | 13 | (1-3) | | |
| % | 23.7 | 76.3 | 73.7 | 2.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 59 | 104 | 133 | 282 | | | |
| % | 10.2 | 18.0 | 23.0 | 48.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 529 | 180 | (7-9) | 98.7 | 65.7 | 61.5 | 69.6 | 66.1 |
| I期 | 134 | 26 | (1-3) | 98.5 | 80.5 | 72.7 | 86.3 | 64.1 |
| II期 | 137 | 24 | (1-3) | 99.3 | 82.4 | 74.9 | 87.8 | 68.0 |
| III期 | 143 | 42 | (1-3) | 98.6 | 70.4 | 62.1 | 77.2 | 66.5 |
| IV期 | 104 | 85 | (1-3) | 98.1 | 16.8 | 10.3 | 24.7 | 66.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 314 | 215 | | | | | |
| % | 59.4 | 40.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 55 | 71 | 187 | 154 | 62 | | |
| % | 10.4 | 13.4 | 35.3 | 29.1 | 11.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 134 | 137 | 143 | 104 | (1-3) | 10 | |
| % | 25.3 | 25.9 | 27.0 | 19.7 | | 1.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 482 | 444 | 38 | 0 | | |
| % | 8.9 | 91.1 | 83.9 | 7.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 78 | 47 | 90 | 314 | | | |
| % | 14.7 | 8.9 | 17.0 | 59.4 | | | |

169 藤田保健衛生大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 192 | 132 | (1-3) | 98.4 | 30.5 | 24.0 | 37.1 | 68.4 |
| I期 | 57 | 26 | (1-3) | 98.2 | 54.1 | 40.4 | 66.0 | 69.0 |
| II期 | 59 | 39 | (1-3) | 98.3 | 32.8 | 21.2 | 44.8 | 65.6 |
| III期 | 59 | 51 | 0 | 100.0 | 13.6 | 6.3 | 23.5 | 68.1 |
| IV期 | 16 | 15 | (1-3) | | | | | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 138 | 54 | | | | | |
| % | 71.9 | 28.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 19 | 64 | 81 | 19 | | |
| % | | 9.9 | 33.3 | 42.2 | 9.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 57 | 59 | 59 | 16 | 0 | (1-3) |
| | % | 29.7 | 30.7 | 30.7 | 8.3 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 61 | 48 | 53 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 12.0 | 31.8 | 25.0 | 27.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 87 | 105 | 94 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 45.3 | 54.7 | 49.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 120 | 68 | | | |
| % | | | 62.5 | 35.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 378 | 217 | (4-6) | 98.4 | 42.3 | 37.2 | 47.2 | 69.0 |
| I期 | 158 | 32 | (4-6) | 97.5 | 79.6 | 72.4 | 85.1 | 69.7 |
| II期 | 21 | 10 | 0 | | | | | 70.1 |
| III期 | 73 | 58 | (1-3) | 98.6 | 19.5 | 11.3 | 29.3 | 72.9 |
| IV期 | 122 | 115 | (1-3) | 99.2 | 5.0 | 2.1 | 9.9 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 262 | 116 | 対象数 | | 16 | 362 | |
| % | 69.3 | 30.7 | % | | 4.2 | 95.8 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 38 | 128 | 148 | 47 | | |
| % | 4.5 | 10.1 | 33.9 | 39.2 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 158 | 21 | 73 | 122 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 41.8 | 5.6 | 19.3 | 32.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 164 | 214 | 202 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 43.4 | 56.6 | 53.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | 70 | 126 | 144 | | | |
| % | 10.1 | 18.5 | 33.3 | 38.1 | | | |

169 藤田保健衛生大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 356 | 38 | (4-6) | 98.9 | 89.2 | 85.5 | 92.1 | 58.2 |
| I期 | 155 | (7-9) | (1-3) | 99.4 | 95.5 | 90.7 | 97.8 | 59.8 |
| II期 | 142 | 13 | (1-3) | 98.6 | 90.8 | 84.6 | 94.5 | 55.5 |
| III期 | 41 | (7-9) | (1-3) | 97.6 | 82.5 | 66.8 | 91.3 | 56.2 |
| IV期 | 16 | 11 | 0 | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 356 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 114 | 70 | 90 | 56 | 26 | | |
| % | 32.0 | 19.7 | 25.3 | 15.7 | 7.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 155 | 142 | 41 | 16 | 0 | (1-3) | |
| % | 43.5 | 39.9 | 11.5 | 4.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 320 | 278 | 26 | 16 | | |
| % | 10.1 | 89.9 | 78.1 | 7.3 | 4.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 95 | 10 | 21 | 230 | | | |
| % | 26.7 | 2.8 | 5.9 | 64.6 | | | |

170 日本赤十字社 伊勢赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

170 日本赤十字社 伊勢赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 352 | 193 | (1-3) | 99.1 | 44.9 | 39.6 | 50.0 | 72.8 |
| I期 | 185 | 55 | (1-3) | 98.9 | 70.1 | 62.9 | 76.2 | 73.4 |
| II期 | 23 | 12 | 0 | | | | | 66.3 |
| III期 | 29 | 18 | 0 | | | | | 70.3 |
| IV期 | 93 | 86 | (1-3) | 98.9 | 6.6 | 2.7 | 12.9 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 240 | 112 | | | | | |
| % | 68.2 | 31.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 28 | 78 | 144 | 91 | | |
| % | 3.1 | 8.0 | 22.2 | 40.9 | 25.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 185 | 23 | 29 | 93 | 21 | (1-3) | |
| % | 52.6 | 6.5 | 8.2 | 26.4 | 6.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 107 | 245 | 241 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 30.4 | 69.6 | 68.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 35 | 82 | 209 | | | |
| % | 7.4 | 9.9 | 23.3 | 59.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 342 | 136 | (7-9) | 97.7 | 60.0 | 54.6 | 65.0 | 71.9 |
| I期 | 67 | 10 | (1-3) | 97.0 | 85.0 | 73.9 | 91.6 | 70.9 |
| II期 | 98 | 28 | (1-3) | 96.9 | 71.2 | 61.0 | 79.1 | 73.7 |
| III期 | 89 | 31 | (1-3) | 96.6 | 64.6 | 53.6 | 73.6 | 70.9 |
| IV期 | 67 | 56 | 0 | 100.0 | 16.4 | 8.8 | 26.2 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 195 | 147 | | | | | |
| % | 57.0 | 43.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 36 | 89 | 111 | 97 | | |
| % | | 10.5 | 26.0 | 32.5 | 28.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 98 | 89 | 67 | 11 | 10 | |
| % | 19.6 | 28.7 | 26.0 | 19.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 292 | 286 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 83.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 28 | 63 | 226 | | | |
| % | 7.3 | 8.2 | 18.4 | 66.1 | | | |

170 日本赤十字社 伊勢赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 96 | 67 | 0 | 100.0 | 30.2 | 21.4 | 39.5 | 71.2 |
| I期 | 32 | 15 | 0 | 100.0 | 53.1 | 34.7 | 68.5 | 76.2 |
| II期 | 27 | 19 | 0 | | | | | 69.5 |
| III期 | 27 | 23 | 0 | | | | | 73.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 67 | 29 | | | | | |
| % | 69.8 | 30.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 22 | 45 | 18 | | |
| % | | | 22.9 | 46.9 | 18.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 32 | 27 | 27 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 33.3 | 28.1 | 28.1 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 17 | 30 | 25 | 22 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 17.7 | 31.3 | 26.0 | 22.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 85 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | |
| % | 88.5 | 11.5 | 10.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 70 | 22 | | | |
| % | | | 72.9 | 22.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 312 | 243 | (4-6) | 98.4 | 21.2 | 16.9 | 26.0 | 73.3 |
| I期 | 79 | 30 | (1-3) | 97.5 | 61.6 | 49.9 | 71.4 | 72.9 |
| II期 | 16 | 10 | 0 | | | | | 69.0 |
| III期 | 92 | 85 | 0 | 100.0 | 7.6 | 3.4 | 14.2 | 75.3 |
| IV期 | 118 | 111 | (1-3) | 97.5 | 3.5 | 1.2 | 8.2 | 75.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 221 | 91 | 対象数 | | 24 | 288 |
| % | 70.8 | 29.2 | % | | 7.7 | 92.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 28 | 58 | 124 | 94 | |
| % | | 9.0 | 18.6 | 39.7 | 30.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 79 | 16 | 92 | 118 | (7-9) | 0 |
| % | 25.3 | 5.1 | 29.5 | 37.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 229 | 83 | 78 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 73.4 | 26.6 | 25.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 10 | 34 | 86 | 182 | | |
| % | 3.2 | 10.9 | 27.6 | 58.3 | | |

170 日本赤十字社 伊勢赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 182 | 28 | (1-3) | 98.4 | 84.5 | 78.4 | 89.0 | 60.8 |
| I期 | 86 | (4-6) | (1-3) | 98.8 | 94.2 | 86.6 | 97.5 | 61.2 |
| II期 | 71 | 11 | (1-3) | 97.2 | 84.2 | 73.3 | 90.9 | 61.5 |
| III期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 60.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 79.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 182 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 42 | 42 | 48 | 32 | 18 | | |
| % | 23.1 | 23.1 | 26.4 | 17.6 | 9.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 86 | 71 | 19 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 47.3 | 39.0 | 10.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 166 | 166 | 0 | 0 | | |
| % | 8.8 | 91.2 | 91.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | (4-6) | 23 | 118 | | | |
| % | 19.2 | | 12.6 | 64.8 | | | |

171 市立長浜病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特記なし

171 市立長浜病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 71 | (1-3) | 98.6 | 51.0 | 42.6 | 58.8 | 72.7 |
| I期 | 85 | 20 | (1-3) | 97.6 | 76.1 | 65.4 | 83.8 | 74.0 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 67.8 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.3 |
| IV期 | 33 | 32 | 0 | 100.0 | 3.0 | 0.2 | 13.4 | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 107 | 39 | | | | | |
| % | 73.3 | 26.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 30 | 50 | 47 | | |
| % | | 10.3 | 20.5 | 34.2 | 32.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 85 | 14 | (7-9) | 33 | (4-6) | 0 | |
| % | 58.2 | 9.6 | | 22.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 111 | 103 | (7-9) | 0 | | |
| % | 24.0 | 76.0 | 70.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 47 | 72 | | | |
| % | | 14.4 | 32.2 | 49.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 50 | (1-3) | 99.2 | 61.8 | 52.9 | 69.5 | 70.6 |
| I期 | 42 | (7-9) | 0 | 100.0 | 78.6 | 62.9 | 88.2 | 69.3 |
| II期 | 40 | 15 | (1-3) | 97.5 | 62.5 | 45.7 | 75.4 | 70.8 |
| III期 | 27 | 10 | 0 | | | | | 65.2 |
| IV期 | 20 | 15 | 0 | | | | | 77.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 78 | 53 | | | | | |
| % | 59.5 | 40.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 37 | 38 | 34 | | |
| % | | 12.2 | 28.2 | 29.0 | 26.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 40 | 27 | 20 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 32.1 | 30.5 | 20.6 | 15.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 121 | 110 | 11 | 0 | | |
| % | 7.6 | 92.4 | 84.0 | 8.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | 33 | 77 | | | |
| % | | 9.9 | 25.2 | 58.8 | | | |

171 市立長浜病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 31 | 24 | (1-3) | 93.5 | 17.8 | 6.5 | 33.6 | 73.7 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 70.8 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 75.3 |
| III期 | 11 | 10 | (1-3) | | | | | 77.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 17 | 14 | | | | | | |
| % | 54.8 | 45.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 12 | (7-9) | | | |
| % | | | | 38.7 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (4-6) | 11 | (4-6) | (1-3) | 0 | | |
| | % | | 35.5 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (7-9) | 10 | (7-9) | (1-3) | 0 | | |
| | % | | 32.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 28 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 90.3 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 16 | 15 | | | | |
| % | | | 51.6 | 48.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 232 | 155 | (1-3) | 99.1 | 33.0 | 27.0 | 39.1 | 72.0 |
| I期 | 84 | 28 | (1-3) | 97.6 | 66.3 | 55.0 | 75.3 | 73.5 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 67.3 |
| III期 | 54 | 42 | 0 | 100.0 | 22.2 | 12.3 | 34.0 | 71.0 |
| IV期 | 80 | 77 | 0 | 100.0 | 3.8 | 1.0 | 9.6 | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 対象数 | 172 | 60 | 対象数 | | 27 | 205 |
| % | 74.1 | 25.9 | % | | 11.6 | 88.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 26 | 50 | 88 | 59 | |
| % | | 11.2 | 21.6 | 37.9 | 25.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 84 | 14 | 54 | 80 | 0 | 0 |
| % | 36.2 | 6.0 | 23.3 | 34.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 120 | 112 | 101 | 11 | 0 | |
| % | 51.7 | 48.3 | 43.5 | 4.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 38 | 77 | 114 | | |
| % | | 16.4 | 33.2 | 49.1 | | |

171 市立長浜病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 89 | 12 | 0 | 100.0 | 86.5 | 77.5 | 92.1 | 61.7 |
| I期 | 34 | (1-3) | 0 | 100.0 | 91.2 | 75.1 | 97.1 | 54.3 |
| II期 | 42 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.5 | 76.6 | 96.3 | 57.4 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 70.2 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 89 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 13 | 15 | 13 | 18 | | |
| % | 33.7 | 14.6 | 16.9 | 14.6 | 20.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | 42 | (7-9) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 38.2 | 47.2 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 86 | 80 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 96.6 | 89.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | (1-3) | 13 | 47 | | | |
| % | 30.3 | | 14.6 | 52.8 | | | |

172 滋賀県立総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

172 滋賀県立総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 291 | 119 | 10 | 96.6 | 58.6 | 52.7 | 64.1 | 69.5 |
| I期 | 156 | 27 | (4-6) | 97.4 | 82.6 | 75.6 | 87.7 | 67.3 |
| II期 | 23 | (4-6) | (1-3) | | | | | 71.4 |
| III期 | 23 | 14 | (1-3) | | | | | 72.1 |
| IV期 | 77 | 68 | (1-3) | 98.7 | 10.6 | 4.9 | 18.7 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 202 | 89 | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 36 | 89 | 105 | 51 | | |
| % | 3.4 | 12.4 | 30.6 | 36.1 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 156 | 23 | 23 | 77 | (1-3) | 10 | |
| % | 53.6 | 7.9 | 7.9 | 26.5 | | 3.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 255 | 218 | 37 | 0 | | |
| % | 12.4 | 87.6 | 74.9 | 12.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | 26 | 94 | 152 | | | |
| % | 6.5 | 8.9 | 32.3 | 52.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 216 | 71 | (7-9) | 96.8 | 66.7 | 60.0 | 72.6 | 69.6 |
| I期 | 61 | (1-3) | (1-3) | 98.4 | 95.1 | 85.5 | 98.4 | 67.3 |
| II期 | 67 | 28 | (1-3) | 95.5 | 57.3 | 44.4 | 68.2 | 73.6 |
| III期 | 49 | 14 | (1-3) | 98.0 | 71.4 | 56.6 | 82.0 | 67.8 |
| IV期 | 32 | 24 | (1-3) | 96.9 | 22.8 | 10.1 | 38.5 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 126 | 90 | | | | | |
| % | 58.3 | 41.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 23 | 61 | 66 | 52 | | |
| % | 6.5 | 10.6 | 28.2 | 30.6 | 24.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | 67 | 49 | 32 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 28.2 | 31.0 | 22.7 | 14.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 204 | 176 | 27 | (1-3) | | |
| % | 5.6 | 94.4 | 81.5 | 12.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | 22 | 46 | 129 | | | |
| % | 8.8 | 10.2 | 21.3 | 59.7 | | | |

172 滋賀県立総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | 51 | 0 | 100.0 | 32.0 | 21.8 | 42.6 | 70.7 |
| I期 | 34 | 14 | 0 | 100.0 | 58.8 | 40.6 | 73.2 | 71.1 |
| II期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 70.9 |
| III期 | 19 | 18 | 0 | | | | | 70.4 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 57 | 18 | | | | | |
| % | 76.0 | 24.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 27 | 32 | 10 | | |
| % | | | 36.0 | 42.7 | 13.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 34 | 11 | 19 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 45.3 | 14.7 | 25.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 24 | 17 | 16 | 15 | (1-3) | 0 |
| | % | 32.0 | 22.7 | 21.3 | 20.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 36 | 32 | (4-6) | 0 | | |
| % | 52.0 | 48.0 | 42.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 45 | 25 | | | |
| % | | | 60.0 | 33.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 311 | 213 | (4-6) | 98.1 | 30.9 | 25.8 | 36.1 | 70.6 |
| I期 | 98 | 29 | (1-3) | 98.0 | 70.0 | 59.8 | 78.1 | 70.4 |
| II期 | 25 | 17 | (1-3) | | | | | 70.9 |
| III期 | 91 | 73 | (1-3) | 97.8 | 18.9 | 11.6 | 27.6 | 73.3 |
| IV期 | 87 | 85 | (1-3) | 98.9 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 対象数 | 224 | 87 | 対象数 | | 19 | 292 |
| % | 72.0 | 28.0 | % | | 6.1 | 93.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 102 | 107 | 64 | |
| % | | 9.6 | 32.8 | 34.4 | 20.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 98 | 25 | 91 | 87 | 10 | 0 |
| % | 31.5 | 8.0 | 29.3 | 28.0 | 3.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 190 | 121 | 113 | (7-9) | 0 | |
| % | 61.1 | 38.9 | 36.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 69 | 109 | 128 | | |
| % | | 22.2 | 35.0 | 41.2 | | |

172 滋賀県立総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 106 | 16 | (4-6) | 95.3 | 84.5 | 75.9 | 90.2 | 60.7 |
| I期 | 44 | (4-6) | (1-3) | 95.5 | 90.6 | 76.8 | 96.4 | 63.1 |
| II期 | 35 | (1-3) | (1-3) | 94.3 | 97.1 | 80.9 | 99.6 | 56.5 |
| III期 | 23 | (7-9) | 0 | | | | | 61.8 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | | | | 64.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 106 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 29 | 34 | 15 | (7-9) | | |
| % | 18.9 | 27.4 | 32.1 | 14.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | 35 | 23 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 41.5 | 33.0 | 21.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 102 | 89 | 12 | (1-3) | | |
| % | | 96.2 | 84.0 | 11.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (1-3) | 20 | 68 | | | |
| % | 15.1 | | 18.9 | 64.2 | | | |

173

大津赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

がんの医療の質を評価するためには、がん判明後の生存、あるいはがんによる死亡を把握することが必要です。

ここに掲載されている「実測生存率」はがんに基づく死亡のみではなく、全ての死因を含めて生存が減数され、計算されています。

がんの医療の質の評価には、本来はがん以外の他因死の影響を補正した「補正生存率」や「相対生存率」を用います。

よって、掲載されている実測生存率は他因死をも含めた、あくまでも参考値であるという観点から御覧ください。

例えばですが、当院の胃癌1期において、200人中44人が経過中に死亡されておられますが、元々の胃癌1期という病状に鑑みても、多数の他因死が含まれていることが容易に推察されます。

本来は、そういった誤差なしのデータの提示が望ましいですが、そこまでの解析には、より多くの労力を伴い、近年開始された全国的ながん登録からの結果としては、そこまで詳細な結果を公表しておらず、今回は他因死を含めたおおまかな参考データと御理解ください。

173 大津赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 330 | 146 | 16 | 95.2 | 55.3 | 49.8 | 60.6 | 71.3 |
| I期 | 200 | 44 | 12 | 94.0 | 77.7 | 71.2 | 82.9 | 71.8 |
| II期 | 23 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.1 |
| III期 | 28 | 19 | (1-3) | | | | | 70.4 |
| IV期 | 78 | 74 | 0 | 100.0 | 5.1 | 1.7 | 11.6 | 71.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 223 | 107 | | | | | |
| % | 67.6 | 32.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 21 | 100 | 116 | 79 | | |
| % | 4.2 | 6.4 | 30.3 | 35.2 | 23.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 200 | 23 | 28 | 78 | 0 | (1-3) | |
| % | 60.6 | 7.0 | 8.5 | 23.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 252 | 227 | 22 | (1-3) | | |
| % | 23.6 | 76.4 | 68.8 | 6.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 41 | 113 | 166 | | | |
| % | 3.0 | 12.4 | 34.2 | 50.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 290 | 110 | 21 | 92.8 | 61.4 | 55.5 | 66.8 | 70.8 |
| I期 | 54 | (4-6) | (7-9) | 83.3 | 88.5 | 76.1 | 94.7 | 69.3 |
| II期 | 78 | 23 | (1-3) | 96.2 | 70.4 | 59.0 | 79.3 | 74.9 |
| III期 | 85 | 28 | (4-6) | 92.9 | 66.4 | 55.1 | 75.4 | 70.9 |
| IV期 | 62 | 49 | (1-3) | 95.2 | 18.4 | 9.8 | 29.1 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 173 | 117 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 28 | 86 | 85 | 75 | | |
| % | 5.5 | 9.7 | 29.7 | 29.3 | 25.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | 78 | 85 | 62 | (1-3) | 10 | |
| % | 18.6 | 26.9 | 29.3 | 21.4 | | 3.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 252 | 213 | 34 | (4-6) | | |
| % | 13.1 | 86.9 | 73.4 | 11.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | 16 | 52 | 189 | | | |
| % | 11.4 | 5.5 | 17.9 | 65.2 | | | |

173 大津赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 97 | 64 | (4-6) | 93.8 | 31.7 | 22.5 | 41.3 | 73.3 |
| I期 | 50 | 28 | (1-3) | 96.0 | 42.9 | 28.9 | 56.1 | 72.4 |
| II期 | 18 | 10 | (1-3) | | | | | 66.8 |
| III期 | 20 | 19 | 0 | | | | | 79.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|-------|
| 対象数 | 62 | 35 | | | | | |
| % | 63.9 | 36.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 20 | 37 | 31 | | |
| % | | | 20.6 | 38.1 | 32.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 50 | 18 | 20 | (7-9) | 0 | (1-3) |
| | % | 51.5 | 18.6 | 20.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 30 | 32 | 11 | 24 | 0 | (1-3) |
| | % | 30.9 | 33.0 | 11.3 | 24.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 83 | 14 | 12 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 85.6 | 14.4 | 12.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 72 | 23 | | | |
| % | | | 74.2 | 23.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 261 | 185 | 10 | 96.2 | 28.3 | 22.9 | 33.9 | 73.1 |
| I期 | 81 | 30 | (4-6) | 92.6 | 62.7 | 51.2 | 72.3 | 72.9 |
| II期 | 17 | 11 | (1-3) | | | | | 71.3 |
| III期 | 72 | 57 | (1-3) | 95.8 | 17.9 | 9.9 | 27.8 | 70.6 |
| IV期 | 88 | 87 | 0 | 100.0 | 1.1 | 0.1 | 5.5 | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 183 | 78 | 対象数 | | 34 | 227 |
| % | 70.1 | 29.9 | % | | 13.0 | 87.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | 64 | 97 | 77 | |
| % | | 6.1 | 24.5 | 37.2 | 29.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 81 | 17 | 72 | 88 | 0 | (1-3) |
| % | 31.0 | 6.5 | 27.6 | 33.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 162 | 99 | 96 | (1-3) | 0 | |
| % | 62.1 | 37.9 | 36.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 11 | 40 | 94 | 116 | | |
| % | 4.2 | 15.3 | 36.0 | 44.4 | | |

173 大津赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 112 | 18 | (4-6) | 95.5 | 83.7 | 75.4 | 89.4 | 63.0 |
| I期 | 33 | (1-3) | (1-3) | 93.9 | 93.8 | 77.5 | 98.4 | 66.8 |
| II期 | 57 | (7-9) | (1-3) | 94.7 | 85.7 | 73.5 | 92.6 | 60.5 |
| III期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 57.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 112 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 17 | 34 | 22 | 15 | | |
| % | 21.4 | 15.2 | 30.4 | 19.6 | 13.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 57 | 17 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 29.5 | 50.9 | 15.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 95 | 95 | 0 | 0 | | |
| % | 15.2 | 84.8 | 84.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (4-6) | 13 | 77 | | | |
| % | 14.3 | | 11.6 | 68.8 | | | |

174

彦根市立病院

2010-2011年2力年

コメント:

当院は70歳以上、特に80歳以上の患者さんの占める割合が全国平均と比べて高く、胃がん、大腸がん、肺がんは80歳以上の患者さんが30%以上と、高齢の患者さんが多い傾向がみられます。また、肺がんについては、IV期の割合が48.5%と全国平均と比べて高い傾向がみられます。

これらの要因により、がんと診断されても手術や化学療法などの標準的治療が行えない患者さんが多くなり、生存率に影響を与えたと考えられます。

当院では、地域がん診療連携拠点病院として、がんの高度専門医療の提供はもとより、併存症や年齢的、体力的な理由により、がんの標準的治療が行えない患者さんも受け入れています。

174 彦根市立病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 156 | 81 | (4-6) | 96.2 | 47.3 | 39.2 | 55.0 | 73.2 |
| I期 | 95 | 27 | (4-6) | 95.8 | 71.1 | 60.7 | 79.2 | 73.7 |
| II期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 74.8 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 68.7 |
| IV期 | 35 | 33 | (1-3) | 97.1 | 5.7 | 1.0 | 16.7 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 108 | 48 | | | | | |
| % | 69.2 | 30.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 39 | 53 | 48 | | |
| % | | 8.3 | 25.0 | 34.0 | 30.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 95 | 15 | (7-9) | 35 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 60.9 | 9.6 | | 22.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | 107 | 93 | (1-3) | 12 | | |
| % | 31.4 | 68.6 | 59.6 | | 7.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 69 | 64 | | | |
| % | | 11.5 | 44.2 | 41.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 57 | (1-3) | 97.8 | 57.7 | 48.9 | 65.5 | 72.4 |
| I期 | 36 | (7-9) | (1-3) | 97.2 | 74.6 | 56.9 | 85.9 | 72.5 |
| II期 | 33 | 10 | 0 | 100.0 | 69.7 | 51.0 | 82.4 | 75.3 |
| III期 | 37 | 12 | (1-3) | 97.3 | 67.6 | 50.0 | 80.1 | 73.9 |
| IV期 | 27 | 24 | (1-3) | | | | | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 73 | 63 | | | | | |
| % | 53.7 | 46.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 34 | 38 | 44 | | |
| % | | 10.3 | 25.0 | 27.9 | 32.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 33 | 37 | 27 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 26.5 | 24.3 | 27.2 | 19.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 119 | 101 | 17 | (1-3) | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 74.3 | 12.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 51 | 77 | | | |
| % | | | 37.5 | 56.6 | | | |

174 彦根市立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 27 | 24 | 0 | | | | | 77.1 |
| I期 | 13 | 10 | 0 | | | | | 76.2 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 13 | 14 | | | | | | |
| % | 48.1 | 51.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (4-6) | 10 | 11 | | | |
| % | | | | 37.0 | 40.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 13 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | 48.1 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | (7-9) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 24 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | | | |
| % | 88.9 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 15 | 12 | | | | |
| % | | | 55.6 | 44.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 103 | 88 | 0 | 100.0 | 14.6 | 8.6 | 22.1 | 74.9 |
| I期 | 21 | 10 | 0 | | | | | 76.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 23 | 21 | 0 | | | | | 75.3 |
| IV期 | 50 | 50 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 83 | 20 | | (7-9) | 95 | |
| % | 80.6 | 19.4 | | | 92.2 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 25 | 35 | 38 | |
| % | | | 24.3 | 34.0 | 36.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 21 | (7-9) | 23 | 50 | (1-3) | 0 |
| % | 20.4 | | 22.3 | 48.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 87 | 16 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | |
| % | 84.5 | 15.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 46 | 47 | | |
| % | | 9.7 | 44.7 | 45.6 | | |

174 彦根市立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | (7-9) | 0 | 100.0 | 90.7 | 81.4 | 95.4 | 63.3 |
| I期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 57.6 |
| II期 | 39 | (1-3) | 0 | 100.0 | 94.9 | 81.0 | 98.7 | 59.6 |
| III期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 59.6 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 88.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 75 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | | |
| % | 20.0 | 24.0 | 17.3 | 24.0 | 14.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 39 | 10 | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 32.0 | 52.0 | 13.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 67 | 54 | (1-3) | 10 | | |
| % | | 89.3 | 72.0 | | 13.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (1-3) | 15 | 46 | | | |
| % | 14.7 | | 20.0 | 61.3 | | | |

175 滋賀医科大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

数年では生存率集計を算出する症例数が少なく、信頼区間の幅が広いことから、全国集計値、他施設との比較には慎重を要する。今後、症例を蓄積することで信頼性の高いデータを提供していきたいと考える。また、胃、大腸、乳房等については上皮内癌の比率が高いため、終診後5年までの追跡が困難な症例がある。

175 滋賀医科大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 296 | 80 | 35 | 88.2 | 71.7 | 66.0 | 76.6 | 67.7 |
| I期 | 219 | 25 | 34 | 84.5 | 87.7 | 82.3 | 91.5 | 69.1 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 64.0 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 66.5 |
| IV期 | 53 | 42 | (1-3) | 98.1 | 19.6 | 10.1 | 31.3 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 211 | 85 | | | | | |
| % | 71.3 | 28.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 38 | 99 | 104 | 37 | | |
| % | 6.1 | 12.8 | 33.4 | 35.1 | 12.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 219 | 12 | 12 | 53 | 0 | 0 | |
| % | 74.0 | 4.1 | 4.1 | 17.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 265 | 243 | 20 | (1-3) | | |
| % | 10.5 | 89.5 | 82.1 | 6.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 35 | 85 | 156 | | | |
| % | 6.8 | 11.8 | 28.7 | 52.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 34 | (7-9) | 94.0 | 74.0 | 65.5 | 80.6 | 68.2 |
| I期 | 40 | (1-3) | (4-6) | 90.0 | 94.9 | 81.0 | 98.7 | 73.1 |
| II期 | 39 | (7-9) | (1-3) | 92.3 | 78.8 | 62.1 | 88.8 | 71.8 |
| III期 | 28 | (7-9) | 0 | | | | | 66.1 |
| IV期 | 25 | 15 | (1-3) | | | | | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 80 | 54 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 17 | 40 | 54 | 15 | | |
| % | | 12.7 | 29.9 | 40.3 | 11.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 40 | 39 | 28 | 25 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 29.9 | 29.1 | 20.9 | 18.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 129 | 108 | 21 | 0 | | |
| % | | 96.3 | 80.6 | 15.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 11 | 38 | 74 | | | |
| % | 8.2 | 8.2 | 28.4 | 55.2 | | | |

175 滋賀医科大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 37 | (1-3) | 98.6 | 45.9 | 33.8 | 57.2 | 68.9 |
| I期 | 28 | 12 | (1-3) | | | | | 69.5 |
| II期 | 25 | 14 | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 75.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 73.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|-------|
| 対象数 | 51 | 18 | | | | | |
| % | 73.9 | 26.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 20 | 30 | (7-9) | | |
| % | | | 29.0 | 43.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 25 | 10 | (4-6) | 0 | (1-3) |
| | % | 40.6 | 36.2 | 14.5 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 14 | 35 | (7-9) | 10 | 0 | (1-3) |
| | % | 20.3 | 50.7 | | 14.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 29 | 27 | (1-3) | 0 | | |
| % | 58.0 | 42.0 | 39.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 43 | 18 | | | |
| % | | | 62.3 | 26.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 242 | 143 | (7-9) | 96.3 | 40.0 | 33.7 | 46.2 | 69.6 |
| I期 | 90 | 24 | (4-6) | 93.3 | 73.0 | 62.5 | 81.0 | 71.1 |
| II期 | 15 | (4-6) | (1-3) | | | | | 71.5 |
| III期 | 61 | 43 | (1-3) | 98.4 | 28.4 | 17.7 | 40.0 | 67.9 |
| IV期 | 73 | 69 | (1-3) | 98.6 | 4.2 | 1.1 | 10.6 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 167 | 75 | 対象数 | 24 | 218 | | |
| % | 69.0 | 31.0 | % | 9.9 | 90.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 26 | 82 | 87 | 40 | | |
| % | | 10.7 | 33.9 | 36.0 | 16.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 15 | 61 | 73 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 37.2 | 6.2 | 25.2 | 30.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 110 | 132 | 122 | 10 | 0 | | |
| % | 45.5 | 54.5 | 50.4 | 4.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 44 | 91 | 105 | | | |
| % | | 18.2 | 37.6 | 43.4 | | | |

175 滋賀医科大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 125 | (7-9) | 12 | 90.4 | 92.5 | 86.1 | 96.0 | 59.8 |
| I期 | 56 | (1-3) | (7-9) | 85.7 | 97.9 | 86.1 | 99.7 | 60.1 |
| II期 | 52 | (1-3) | (1-3) | 94.2 | 98.1 | 87.1 | 99.7 | 59.7 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 62.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 125 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 28 | 43 | 19 | (7-9) | | |
| % | 22.4 | 22.4 | 34.4 | 15.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 56 | 52 | (7-9) | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 44.8 | 41.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 121 | 112 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | 96.8 | 89.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (1-3) | 19 | 86 | | | |
| % | 13.6 | | 15.2 | 68.8 | | | |

176 草津総合病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし。

176 草津総合病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 60 | 35 | (1-3) | 96.7 | 40.7 | 28.2 | 52.9 | 70.4 |
| I期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.7 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 77.3 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | 24 | 23 | (1-3) | | | | | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 42 | 18 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 17 | 14 | 18 | | |
| % | | | 28.3 | 23.3 | 30.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 27 | (1-3) | (4-6) | 24 | (1-3) | 0 | |
| % | 45.0 | | | 40.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 43 | 42 | (1-3) | 0 | | |
| % | 28.3 | 71.7 | 70.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 22 | 32 | | | |
| % | | | 36.7 | 53.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 68 | 29 | (4-6) | 94.1 | 56.2 | 43.4 | 67.2 | 70.3 |
| I期 | 15 | (1-3) | (1-3) | | | | | 68.7 |
| II期 | 11 | (4-6) | (1-3) | | | | | 76.1 |
| III期 | 13 | (1-3) | (1-3) | | | | | 73.2 |
| IV期 | 26 | 17 | 0 | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 33 | 35 | | | | | |
| % | 48.5 | 51.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 12 | 26 | 16 | | |
| % | | 14.7 | 17.6 | 38.2 | 23.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 15 | 11 | 13 | 26 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.1 | 16.2 | 19.1 | 38.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 60 | 56 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 88.2 | 82.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 21 | 37 | | | |
| % | | | 30.9 | 54.4 | | | |

176 草津総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 15 | 11 | 0 | | | | | 68.5 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 65.7 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 74.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 64.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 12 | (1-3) | | | | | | |
| % | 80.0 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 80.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | (4-6) | | | | |
| % | | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 56 | 31 | (4-6) | 89.3 | 40.6 | 27.2 | 53.6 | 71.8 |
| I期 | 24 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.4 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 75.5 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 67.0 |
| IV期 | 20 | 17 | (1-3) | | | | | 73.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 37 | 19 | 対象数 | | (4-6) | 51 | | |
| % | 66.1 | 33.9 | % | | | 91.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 12 | 26 | 11 | | | |
| % | | | 21.4 | 46.4 | 19.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 24 | (1-3) | 10 | 20 | 0 | 0 | | |
| % | 42.9 | | 17.9 | 35.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 24 | 32 | 32 | 0 | 0 | | | |
| % | 42.9 | 57.1 | 57.1 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 28 | 18 | | | | |
| % | | | 50.0 | 32.1 | | | | |

176 草津総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 68.9 |
| I期 | (1-3) | 0 | (1-3) | | | | | 74.0 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 71.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 45.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | (7-9) | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | (7-9) | | | |
| % | | | | | | | |

177 京都市立病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

177 京都市立病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 193 | 83 | (7-9) | 96.4 | 56.2 | 48.9 | 63.0 | 71.7 |
| I期 | 129 | 30 | (7-9) | 94.6 | 75.9 | 67.4 | 82.5 | 70.1 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 77.1 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 82.7 |
| IV期 | 43 | 41 | 0 | 100.0 | 4.7 | 0.9 | 13.9 | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 147 | 46 | | | | | |
| % | 76.2 | 23.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 19 | 50 | 77 | 44 | | |
| % | | 9.8 | 25.9 | 39.9 | 22.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 129 | 11 | (4-6) | 43 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 66.8 | 5.7 | | 22.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 143 | 131 | 12 | 0 | | |
| % | 25.9 | 74.1 | 67.9 | 6.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 33 | 78 | 80 | | | |
| % | | 17.1 | 40.4 | 41.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 211 | 76 | (4-6) | 97.2 | 63.5 | 56.5 | 69.6 | 68.9 |
| I期 | 47 | (7-9) | (1-3) | 95.7 | 85.0 | 71.1 | 92.6 | 69.7 |
| II期 | 59 | (4-6) | (4-6) | 93.2 | 91.0 | 79.7 | 96.2 | 65.9 |
| III期 | 55 | 16 | 0 | 100.0 | 70.9 | 57.0 | 81.1 | 70.1 |
| IV期 | 46 | 45 | 0 | 100.0 | 2.2 | 0.2 | 10.0 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 107 | 104 | | | | | |
| % | 50.7 | 49.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 25 | 73 | 72 | 30 | | |
| % | 5.2 | 11.8 | 34.6 | 34.1 | 14.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 47 | 59 | 55 | 46 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.3 | 28.0 | 26.1 | 21.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 181 | 155 | 24 | (1-3) | | |
| % | 14.2 | 85.8 | 73.5 | 11.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 69 | 116 | | | |
| % | | 9.5 | 32.7 | 55.0 | | | |

177 京都市立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | 58 | (1-3) | 97.4 | 23.3 | 14.5 | 33.4 | 72.2 |
| I期 | 27 | 16 | (1-3) | | | | | 72.4 |
| II期 | 19 | 13 | 0 | | | | | 71.0 |
| III期 | 23 | 21 | 0 | | | | | 69.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 85.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 48 | 29 | | | | | | |
| % | 62.3 | 37.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 17 | 40 | 14 | | | |
| % | | | 22.1 | 51.9 | 18.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 27 | 19 | 23 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 35.1 | 24.7 | 29.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 14 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | |
| | % | 18.2 | 31.2 | 26.0 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 65 | 12 | 12 | 0 | 0 | | | |
| % | 84.4 | 15.6 | 15.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 54 | 19 | | | | |
| % | | | 70.1 | 24.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 238 | 154 | 13 | 94.5 | 32.7 | 26.7 | 38.9 | 71.7 |
| I期 | 88 | 27 | (7-9) | 90.9 | 67.0 | 55.6 | 76.0 | 70.5 |
| II期 | 13 | (7-9) | (1-3) | | | | | 74.7 |
| III期 | 43 | 32 | 0 | 100.0 | 25.6 | 13.8 | 39.1 | 72.8 |
| IV期 | 88 | 83 | (1-3) | 96.6 | 2.4 | 0.5 | 7.5 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 174 | 64 | 対象数 | | 25 | 213 |
| % | 73.1 | 26.9 | % | | 10.5 | 89.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 65 | 106 | 45 | |
| % | | 6.7 | 27.3 | 44.5 | 18.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 88 | 13 | 43 | 88 | (4-6) | (1-3) |
| % | 37.0 | 5.5 | 18.1 | 37.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 146 | 92 | 88 | (4-6) | 0 | |
| % | 61.3 | 38.7 | 37.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 29 | 111 | 96 | | |
| % | | 12.2 | 46.6 | 40.3 | | |

177 京都市立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 132 | 22 | (7-9) | 93.2 | 82.8 | 75.1 | 88.4 | 62.8 |
| I期 | 62 | (4-6) | (4-6) | 93.5 | 89.9 | 78.9 | 95.3 | 59.5 |
| II期 | 42 | (7-9) | (1-3) | 92.9 | 82.8 | 67.3 | 91.4 | 64.5 |
| III期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 62.8 |
| IV期 | 12 | (4-6) | (1-3) | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 132 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 31 | 20 | 39 | 18 | 24 | | |
| % | 23.5 | 15.2 | 29.5 | 13.6 | 18.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 62 | 42 | 15 | 12 | 0 | (1-3) | |
| % | 47.0 | 31.8 | 11.4 | 9.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 115 | 107 | (7-9) | 0 | | |
| % | 12.9 | 87.1 | 81.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | (4-6) | 26 | 74 | | | |
| % | 20.5 | | 19.7 | 56.1 | | | |

178 京都第一赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

178 京都第一赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 433 | 134 | 26 | 94.0 | 68.0 | 63.3 | 72.2 | 71.3 |
| I期 | 330 | 63 | 17 | 94.8 | 80.4 | 75.6 | 84.3 | 72.0 |
| II期 | 27 | 12 | (1-3) | | | | | 74.1 |
| III期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 75.4 |
| IV期 | 57 | 48 | (4-6) | 91.2 | 8.3 | 2.7 | 18.0 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 299 | 134 | | | | | |
| % | 69.1 | 30.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 43 | 126 | 177 | 80 | | |
| % | | 9.9 | 29.1 | 40.9 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 330 | 27 | 13 | 57 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 76.2 | 6.2 | 3.0 | 13.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 73 | 360 | 348 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 16.9 | 83.1 | 80.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 65 | 136 | 197 | | | |
| % | 8.1 | 15.0 | 31.4 | 45.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 304 | 108 | (7-9) | 97.4 | 63.9 | 58.1 | 69.0 | 69.7 |
| I期 | 77 | (7-9) | (1-3) | 98.7 | 90.8 | 81.7 | 95.5 | 67.9 |
| II期 | 82 | 20 | (1-3) | 97.6 | 75.0 | 64.0 | 83.1 | 74.0 |
| III期 | 63 | 24 | (1-3) | 95.2 | 61.0 | 47.7 | 71.9 | 71.4 |
| IV期 | 71 | 56 | (1-3) | 97.2 | 19.8 | 11.4 | 29.9 | 68.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 174 | 130 | | | | | |
| % | 57.2 | 42.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 37 | 88 | 118 | 50 | | |
| % | 3.6 | 12.2 | 28.9 | 38.8 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 82 | 63 | 71 | (1-3) | 10 | |
| % | 25.3 | 27.0 | 20.7 | 23.4 | | 3.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 263 | 245 | 17 | (1-3) | | |
| % | 13.5 | 86.5 | 80.6 | 5.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 13 | 73 | 189 | | | |
| % | 9.5 | 4.3 | 24.0 | 62.2 | | | |

178 京都第一赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 127 | 76 | (7-9) | 93.7 | 37.3 | 28.7 | 45.9 | 70.8 |
| I期 | 67 | 29 | (4-6) | 94.0 | 55.0 | 42.1 | 66.2 | 70.7 |
| II期 | 24 | 15 | (1-3) | | | | | 68.6 |
| III期 | 27 | 23 | (1-3) | | | | | 72.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 87 | 40 | | | | | |
| % | 68.5 | 31.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 36 | 52 | 23 | | |
| % | | 9.4 | 28.3 | 40.9 | 18.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 67 | 24 | 27 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 52.8 | 18.9 | 21.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 38 | 37 | 20 | 30 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 29.9 | 29.1 | 15.7 | 23.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 105 | 22 | 22 | 0 | 0 | | |
| % | 82.7 | 17.3 | 17.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 93 | 30 | | | |
| % | | | 73.2 | 23.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 241 | 143 | 17 | 92.9 | 37.3 | 31.0 | 43.6 | 70.7 |
| I期 | 79 | 15 | (1-3) | 97.5 | 80.7 | 70.1 | 87.9 | 70.4 |
| II期 | 17 | 13 | 0 | | | | | 72.3 |
| III期 | 57 | 43 | (4-6) | 89.5 | 17.5 | 8.5 | 29.2 | 72.0 |
| IV期 | 80 | 68 | (7-9) | 88.8 | 5.0 | 1.4 | 12.4 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 147 | 94 | 対象数 | 24 | 217 | | |
| % | 61.0 | 39.0 | % | 10.0 | 90.0 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 79 | 94 | 43 | | |
| % | | 8.3 | 32.8 | 39.0 | 17.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 79 | 17 | 57 | 80 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 32.8 | 7.1 | 23.7 | 33.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 141 | 100 | 98 | (1-3) | 0 | | |
| % | 58.5 | 41.5 | 40.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 28 | 99 | 114 | | | |
| % | | 11.6 | 41.1 | 47.3 | | | |

178 京都第一赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 171 | 18 | (4-6) | 97.1 | 89.3 | 83.5 | 93.1 | 59.8 |
| I期 | 82 | (1-3) | (1-3) | 97.6 | 97.5 | 90.4 | 99.4 | 60.6 |
| II期 | 63 | (7-9) | (1-3) | 98.4 | 87.3 | 76.2 | 93.4 | 61.1 |
| III期 | 19 | (1-3) | (1-3) | | | | | 61.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 62.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 171 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 45 | 35 | 45 | 32 | 14 | | |
| % | 26.3 | 20.5 | 26.3 | 18.7 | 8.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 63 | 19 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 48.0 | 36.8 | 11.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 163 | 161 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 95.3 | 94.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | (7-9) | 22 | 105 | | | |
| % | 20.5 | | 12.9 | 61.4 | | | |

179 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

2009-2010年5年生存率集計結果と比較すると、当院は5部位全てにおいて生存率が上がっている。また大腸・肝・肺・乳房にいたっては、京都府の平均値より生存率が高かった。ただし、この結果は主たる死因にがん以外も含まれていることをご留意頂きたい。

179 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 401 | 139 | 12 | 97.0 | 64.9 | 59.9 | 69.3 | 70.1 |
| I期 | 264 | 38 | (7-9) | 97.0 | 85.4 | 80.5 | 89.2 | 71.5 |
| II期 | 31 | 16 | (1-3) | 96.8 | 48.0 | 29.7 | 64.1 | 66.3 |
| III期 | 21 | 12 | 0 | | | | | 67.0 |
| IV期 | 78 | 68 | (1-3) | 97.4 | 10.7 | 5.0 | 18.8 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 270 | 131 | | | | | |
| % | 67.3 | 32.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 35 | 125 | 173 | 56 | | |
| % | 3.0 | 8.7 | 31.2 | 43.1 | 14.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 264 | 31 | 21 | 78 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 65.8 | 7.7 | 5.2 | 19.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 92 | 309 | 296 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 22.9 | 77.1 | 73.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 34 | 117 | 225 | | | |
| % | 6.2 | 8.5 | 29.2 | 56.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 325 | 109 | 16 | 95.1 | 66.1 | 60.6 | 70.9 | 68.8 |
| I期 | 79 | 15 | (4-6) | 94.9 | 80.9 | 70.3 | 88.0 | 69.9 |
| II期 | 77 | 10 | (7-9) | 90.9 | 86.8 | 76.9 | 92.7 | 69.6 |
| III期 | 93 | 23 | (1-3) | 97.8 | 75.2 | 65.1 | 82.8 | 67.1 |
| IV期 | 68 | 58 | (1-3) | 97.1 | 12.2 | 5.7 | 21.4 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 181 | 144 | | | | | |
| % | 55.7 | 44.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 53 | 97 | 104 | 56 | | |
| % | 4.6 | 16.3 | 29.8 | 32.0 | 17.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 79 | 77 | 93 | 68 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 24.3 | 23.7 | 28.6 | 20.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 275 | 252 | 21 | (1-3) | | |
| % | 15.4 | 84.6 | 77.5 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 14 | 78 | 212 | | | |
| % | 6.5 | 4.3 | 24.0 | 65.2 | | | |

179 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 132 | 77 | (4-6) | 97.0 | 41.4 | 32.9 | 49.7 | 70.3 |
| I期 | 66 | 30 | (1-3) | 98.5 | 54.3 | 41.5 | 65.4 | 73.6 |
| II期 | 26 | 11 | (1-3) | | | | | 68.9 |
| III期 | 31 | 27 | (1-3) | 93.5 | 10.8 | 2.5 | 26.2 | 67.5 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 60.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 96 | 36 | | | | | | |
| % | 72.7 | 27.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 39 | 53 | 24 | | | |
| % | | | 29.5 | 40.2 | 18.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 66 | 26 | 31 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 50.0 | 19.7 | 23.5 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 39 | 40 | 21 | 28 | (1-3) | 0 | |
| | % | 29.5 | 30.3 | 15.9 | 21.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 75 | 57 | 53 | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | 40.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 62 | 67 | | | | |
| % | | | 47.0 | 50.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 374 | 242 | 15 | 96.0 | 33.4 | 28.6 | 38.3 | 70.8 |
| I期 | 109 | 26 | (1-3) | 97.2 | 75.8 | 66.5 | 82.8 | 71.7 |
| II期 | 25 | 11 | (1-3) | | | | | 72.0 |
| III期 | 113 | 89 | (4-6) | 94.7 | 17.8 | 11.2 | 25.6 | 70.1 |
| IV期 | 119 | 110 | (4-6) | 96.6 | 4.5 | 1.7 | 9.5 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 254 | 120 | 対象数 | | 57 | 317 |
| % | 67.9 | 32.1 | % | | 15.2 | 84.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 30 | 132 | 139 | 67 | |
| % | | 8.0 | 35.3 | 37.2 | 17.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 109 | 25 | 113 | 119 | (4-6) | (1-3) |
| % | 29.1 | 6.7 | 30.2 | 31.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 235 | 139 | 126 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 62.8 | 37.2 | 33.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 14 | 26 | 121 | 213 | | |
| % | 3.7 | 7.0 | 32.4 | 57.0 | | |

179 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 122 | 12 | (7-9) | 94.3 | 90.0 | 83.1 | 94.2 | 61.8 |
| I期 | 49 | (1-3) | (1-3) | 95.9 | 97.9 | 85.8 | 99.7 | 63.1 |
| II期 | 44 | (4-6) | (1-3) | 95.5 | 90.6 | 76.9 | 96.4 | 64.9 |
| III期 | 25 | (4-6) | (1-3) | | | | | 59.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 37.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 122 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 26 | 36 | 13 | 19 | | |
| % | 23.0 | 21.3 | 29.5 | 10.7 | 15.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 44 | 25 | (1-3) | 0 | (1-3) | |
| % | 40.2 | 36.1 | 20.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 119 | 117 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 97.5 | 95.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (4-6) | 17 | 88 | | | |
| % | 9.0 | | 13.9 | 72.1 | | | |

コメント:

【全体】

全体を通して、地域性もあり、症例数が少ない病院である。高齢者の割合が高い事もあり、生存率の数値のみでの比較には、注意が必要である。

【胃】

性別では、男性が7割以上を占めた。診断時の年齢は70歳代が最も多く次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の6割近くとなった。UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期が7割次いでIV期が2割弱となった。年齢層が高いこと、UICC TNM分類総合ステージのIV期が多いことから観血的治療がない症例の割合が少し高めであった。

【大腸】

性別では、男女ほぼ同じ件数であった。年齢は、70歳代が最も多く次いで80歳代となり、平均年齢が71.7歳と高かった。UICC TNM分類総合ステージはIV期の割合が一番高かった。高年齢の割合の多いこととIV期の割合が多いことから生存率が低くなったと見られた。

【肝】

当院の症例数が少なく、公表に至っていない項目が多かった。性別では、男性が6割を占めた。年齢は、70歳代が最も多く4割で、平均年齢は71.6歳であった。観血的治療は、15%と低かった。発見経緯は他疾患経過観察中が64%（全国値＝64%）であった。

【肺】

当院は、呼吸器外科がないので、観血的治療は、ゼロとなる。UICC TNM分類総合ステージはIV期が半数近くを占めており、年齢は、70歳代・80歳代で全体の6割以上で、平均年齢も74.5歳（全国平均年齢＝70.1歳）と高く、これらのことからやはり生存率は低かった。

【女性乳房】

診断時の年齢を見ると、60歳代が32%で最も多く、次いで50歳未満が28%であった。特徴として80歳代が15%と高かった。平均年齢は60.2歳（全国平均年齢＝59.2歳）でやや高かった。発見経緯は、その他の症状受診等が8割近くあり高かったが、がん検診が低かった。観血的治療は、全国値と同じ9割であった。

180 市立福知山市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 178 | 65 | (1-3) | 99.4 | 63.4 | 55.9 | 70.0 | 69.5 |
| I期 | 129 | 26 | (1-3) | 99.2 | 79.8 | 71.7 | 85.8 | 69.3 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 67.4 |
| IV期 | 31 | 27 | 0 | 100.0 | 12.9 | 4.1 | 27.0 | 65.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 127 | 51 | | | | | |
| % | 71.3 | 28.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 26 | 47 | 59 | 38 | | |
| % | | 14.6 | 26.4 | 33.1 | 21.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 129 | (7-9) | (7-9) | 31 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 72.5 | | | 17.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 138 | 130 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 22.5 | 77.5 | 73.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 43 | 43 | 85 | | | |
| % | | 24.2 | 24.2 | 47.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 128 | 52 | (1-3) | 99.2 | 59.2 | 50.1 | 67.2 | 71.7 |
| I期 | 33 | (7-9) | (1-3) | 97.0 | 75.2 | 56.5 | 86.8 | 69.6 |
| II期 | 31 | 12 | 0 | 100.0 | 61.3 | 42.0 | 75.9 | 73.5 |
| III期 | 27 | (7-9) | 0 | | | | | 70.7 |
| IV期 | 34 | 25 | 0 | 100.0 | 26.5 | 13.2 | 41.8 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 66 | 62 | | | | | |
| % | 51.6 | 48.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 21 | 45 | 39 | | |
| % | | 10.9 | 16.4 | 35.2 | 30.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 31 | 27 | 34 | 0 | (1-3) | |
| % | 25.8 | 24.2 | 21.1 | 26.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 110 | 107 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 14.1 | 85.9 | 83.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 12 | 24 | 85 | | | |
| % | | 9.4 | 18.8 | 66.4 | | | |

180 市立福知山市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 45 | (1-3) | 98.1 | 13.6 | 6.0 | 24.3 | 71.6 |
| I期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 72.1 |
| II期 | 13 | 11 | (1-3) | | | | | 71.8 |
| III期 | 17 | 17 | 0 | | | | | 66.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 32 | 21 | | | | | | |
| % | 60.4 | 39.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 14 | 22 | 10 | | | |
| % | | | 26.4 | 41.5 | 18.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 18 | 13 | 17 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 34.0 | 24.5 | 32.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 23 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
| | % | | 43.4 | 26.4 | 20.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 45 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 84.9 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 34 | 17 | | | | |
| % | | | 64.2 | 32.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | 67 | (1-3) | 98.7 | 11.9 | 5.8 | 20.2 | 74.5 |
| I期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 79.6 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 78.8 |
| III期 | 23 | 21 | 0 | | | | | 77.3 |
| IV期 | 34 | 33 | (1-3) | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 57 | 20 | 対象数 | | 10 | 67 |
| % | 74.0 | 26.0 | % 13.0 | | 13.0 | 87.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 20 | 25 | 27 | |
| % | | | 26.0 | 32.5 | 35.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 12 | (7-9) | 23 | 34 | (1-3) | 0 |
| % | 15.6 | | 29.9 | 44.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 23 | 46 | | |
| % | | | 29.9 | 59.7 | | |

180 市立福知山市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 85 | (7-9) | (1-3) | 98.8 | 90.5 | 81.9 | 95.1 | 60.2 |
| I期 | 36 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 |
| II期 | 30 | (1-3) | 0 | 100.0 | 93.3 | 75.9 | 98.3 | 54.4 |
| III期 | 12 | (1-3) | (1-3) | | | | | 51.2 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 60.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 85 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 16 | 27 | (4-6) | 13 | | |
| % | 28.2 | 18.8 | 31.8 | | 15.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 30 | 12 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 42.4 | 35.3 | 14.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 77 | 70 | (7-9) | 0 | | |
| % | | 90.6 | 82.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 66 | | | |
| % | | | | 77.6 | | | |

181 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

181 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 384 | 192 | 16 | 95.8 | 49.7 | 44.5 | 54.6 | 71.7 |
| I期 | 236 | 70 | 15 | 93.6 | 69.8 | 63.4 | 75.3 | 72.0 |
| II期 | 28 | 15 | (1-3) | | | | | 73.1 |
| III期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 66.1 |
| IV期 | 98 | 93 | 0 | 100.0 | 5.1 | 1.9 | 10.7 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 279 | 105 | | | | | |
| % | 72.7 | 27.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 37 | 92 | 143 | 99 | | |
| % | 3.4 | 9.6 | 24.0 | 37.2 | 25.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 236 | 28 | 14 | 98 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 61.5 | 7.3 | 3.6 | 25.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 98 | 286 | 269 | 17 | 0 | | |
| % | 25.5 | 74.5 | 70.1 | 4.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 176 | 182 | | | |
| % | | 5.2 | 45.8 | 47.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 366 | 150 | 24 | 93.4 | 58.4 | 53.1 | 63.3 | 70.6 |
| I期 | 105 | 23 | (7-9) | 92.4 | 77.8 | 68.5 | 84.6 | 72.6 |
| II期 | 105 | 31 | (7-9) | 92.4 | 69.6 | 59.6 | 77.6 | 72.1 |
| III期 | 80 | 31 | (4-6) | 92.5 | 60.5 | 48.7 | 70.3 | 68.7 |
| IV期 | 70 | 63 | 0 | 100.0 | 10.0 | 4.4 | 18.3 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 213 | 153 | | | | | |
| % | 58.2 | 41.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 32 | 93 | 143 | 79 | | |
| % | 5.2 | 8.7 | 25.4 | 39.1 | 21.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 105 | 105 | 80 | 70 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 28.7 | 28.7 | 21.9 | 19.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 329 | 291 | 38 | 0 | | |
| % | 10.1 | 89.9 | 79.5 | 10.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 14 | 114 | 225 | | | |
| % | 3.6 | 3.8 | 31.1 | 61.5 | | | |

181 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 138 | 101 | (1-3) | 98.6 | 26.3 | 19.2 | 33.9 | 72.8 |
| I期 | 74 | 45 | (1-3) | 98.6 | 39.1 | 28.1 | 50.0 | 73.8 |
| II期 | 30 | 24 | 0 | 100.0 | 20.0 | 8.1 | 35.6 | 71.2 |
| III期 | 26 | 24 | (1-3) | | | | | 65.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 93 | 45 | | | | | |
| % | 67.4 | 32.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 33 | 61 | 35 | | |
| % | | | 23.9 | 44.2 | 25.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 74 | 30 | 26 | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 53.6 | 21.7 | 18.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 45 | 42 | 26 | 23 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 32.6 | 30.4 | 18.8 | 16.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 127 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | |
| % | 92.0 | 8.0 | 7.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 103 | 33 | | | |
| % | | | 74.6 | 23.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 311 | 252 | (4-6) | 98.4 | 18.7 | 14.6 | 23.2 | 72.5 |
| I期 | 83 | 42 | (1-3) | 96.4 | 48.8 | 37.7 | 59.1 | 76.5 |
| II期 | 24 | 15 | (1-3) | | | | | 72.9 |
| III期 | 99 | 93 | (1-3) | 99.0 | 6.1 | 2.5 | 11.9 | 71.4 |
| IV期 | 104 | 101 | 0 | 100.0 | 2.9 | 0.8 | 7.5 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 209 | 102 | 対象数 | 28 | 283 | | |
| % | 67.2 | 32.8 | % | 9.0 | 91.0 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 77 | 124 | 79 | | |
| % | | 7.7 | 24.8 | 39.9 | 25.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 83 | 24 | 99 | 104 | 0 | (1-3) | |
| % | 26.7 | 7.7 | 31.8 | 33.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 256 | 55 | 54 | 0 | (1-3) | | |
| % | 82.3 | 17.7 | 17.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 18 | 118 | 174 | | | |
| % | | 5.8 | 37.9 | 55.9 | | | |

181 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 162 | 29 | (7-9) | 95.7 | 81.8 | 74.8 | 87.0 | 66.0 |
| I期 | 75 | (4-6) | (1-3) | 96.0 | 93.1 | 84.2 | 97.1 | 64.1 |
| II期 | 50 | (7-9) | (1-3) | 94.0 | 85.8 | 72.4 | 92.9 | 63.1 |
| III期 | 16 | (1-3) | (1-3) | | | | | 61.1 |
| IV期 | 20 | 14 | 0 | | | | | 68.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 162 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 24 | 53 | 46 | 21 | | |
| % | 11.1 | 14.8 | 32.7 | 28.4 | 13.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 75 | 50 | 16 | 20 | 0 | (1-3) | |
| % | 46.3 | 30.9 | 9.9 | 12.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 141 | 138 | (1-3) | 0 | | |
| % | 13.0 | 87.0 | 85.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 21 | 130 | | | |
| % | | | 13.0 | 80.2 | | | |

182 市立岸和田市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

182 市立岸和田市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 119 | (1-3) | 99.6 | 50.4 | 43.9 | 56.5 | 70.9 |
| I期 | 138 | 37 | (1-3) | 99.3 | 73.2 | 64.9 | 79.8 | 69.7 |
| II期 | 27 | 16 | 0 | | | | | 73.4 |
| III期 | 14 | 11 | 0 | | | | | 72.6 |
| IV期 | 57 | 53 | 0 | 100.0 | 7.0 | 2.3 | 15.5 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 169 | 71 | | | | | |
| % | 70.4 | 29.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 21 | 64 | 79 | 62 | | |
| % | 5.8 | 8.8 | 26.7 | 32.9 | 25.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 138 | 27 | 14 | 57 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 57.5 | 11.3 | 5.8 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 188 | 181 | (7-9) | 0 | | |
| % | 21.7 | 78.3 | 75.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 17 | 59 | 151 | | | |
| % | 5.4 | 7.1 | 24.6 | 62.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 216 | 105 | (1-3) | 99.5 | 51.4 | 44.5 | 57.8 | 69.7 |
| I期 | 54 | 12 | 0 | 100.0 | 77.8 | 64.2 | 86.7 | 67.8 |
| II期 | 47 | 15 | 0 | 100.0 | 68.1 | 52.8 | 79.4 | 68.1 |
| III期 | 61 | 29 | (1-3) | 98.4 | 52.4 | 39.2 | 64.0 | 69.8 |
| IV期 | 50 | 47 | 0 | 100.0 | 6.0 | 1.6 | 14.9 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 131 | 85 | | | | | |
| % | 60.6 | 39.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 21 | 65 | 78 | 40 | | |
| % | 5.6 | 9.7 | 30.1 | 36.1 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | 47 | 61 | 50 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.0 | 21.8 | 28.2 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 173 | 156 | 17 | 0 | | |
| % | 19.9 | 80.1 | 72.2 | 7.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (4-6) | 40 | 151 | | | |
| % | 8.8 | | 18.5 | 69.9 | | | |

182 市立岸和田市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 109 | 70 | (1-3) | 99.1 | 35.5 | 26.6 | 44.4 | 71.2 |
| I期 | 49 | 19 | (1-3) | 98.0 | 60.7 | 45.5 | 72.8 | 69.8 |
| II期 | 30 | 25 | 0 | 100.0 | 16.7 | 6.1 | 31.8 | 76.1 |
| III期 | 20 | 16 | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | 63 | 46 | | | | | |
| % | 57.8 | 42.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 29 | 45 | 24 | | |
| % | | | 26.6 | 41.3 | 22.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 49 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| | % | 45.0 | 27.5 | 18.3 | 9.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 27 | 37 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| | % | 24.8 | 33.9 | 22.0 | 19.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 87 | 22 | 22 | 0 | 0 | | |
| % | 79.8 | 20.2 | 20.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 84 | 25 | | | |
| % | | | 77.1 | 22.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 419 | 322 | (4-6) | 98.8 | 22.4 | 18.5 | 26.5 | 71.0 |
| I期 | 105 | 49 | (1-3) | 99.0 | 52.9 | 42.9 | 61.9 | 71.0 |
| II期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 68.0 |
| III期 | 130 | 113 | (1-3) | 98.5 | 11.8 | 6.9 | 18.0 | 70.8 |
| IV期 | 152 | 146 | (1-3) | 98.7 | 2.9 | 1.0 | 6.7 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 298 | 121 | 対象数 | | 51 | 368 |
| % | 71.1 | 28.9 | % | | 12.2 | 87.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 133 | 161 | 85 | |
| % | | 7.6 | 31.7 | 38.4 | 20.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 105 | 25 | 130 | 152 | (4-6) | (1-3) |
| % | 25.1 | 6.0 | 31.0 | 36.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 307 | 112 | 105 | (7-9) | 0 | |
| % | 73.3 | 26.7 | 25.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 48 | 119 | 245 | | |
| % | | 11.5 | 28.4 | 58.5 | | |

182 市立岸和田市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 161 | 34 | (1-3) | 99.4 | 78.8 | 71.6 | 84.3 | 60.9 |
| I期 | 51 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.2 | 80.4 | 97.0 | 61.5 |
| II期 | 66 | 11 | (1-3) | 98.5 | 83.1 | 71.6 | 90.3 | 59.8 |
| III期 | 28 | (7-9) | 0 | | | | | 67.5 |
| IV期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 161 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 35 | 40 | 46 | 22 | 18 | | |
| % | 21.7 | 24.8 | 28.6 | 13.7 | 11.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | 66 | 28 | 15 | 0 | (1-3) | |
| % | 31.7 | 41.0 | 17.4 | 9.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 135 | 124 | 11 | 0 | | |
| % | 16.1 | 83.9 | 77.0 | 6.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | (4-6) | 14 | 114 | | | |
| % | 16.8 | | 8.7 | 70.8 | | | |

183 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

183 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 293 | 144 | 10 | 96.6 | 50.0 | 44.1 | 55.6 | 70.0 |
| I期 | 140 | 34 | (7-9) | 95.0 | 74.8 | 66.6 | 81.3 | 69.9 |
| II期 | 24 | 10 | (1-3) | | | | | 62.4 |
| III期 | 28 | 14 | 0 | | | | | 70.6 |
| IV期 | 86 | 78 | (1-3) | 98.8 | 8.3 | 3.7 | 15.4 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 208 | 85 | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 13 | 107 | 105 | 53 | | |
| % | 5.1 | 4.4 | 36.5 | 35.8 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 140 | 24 | 28 | 86 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 47.8 | 8.2 | 9.6 | 29.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 85 | 208 | 192 | 16 | 0 | | |
| % | 29.0 | 71.0 | 65.5 | 5.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 36 | 70 | 181 | | | |
| % | | 12.3 | 23.9 | 61.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 296 | 105 | (7-9) | 97.0 | 63.8 | 57.9 | 69.0 | 70.1 |
| I期 | 78 | 16 | (1-3) | 98.7 | 79.3 | 68.5 | 86.8 | 70.7 |
| II期 | 94 | 16 | (4-6) | 94.7 | 82.2 | 72.6 | 88.7 | 70.8 |
| III期 | 69 | 29 | (1-3) | 97.1 | 57.2 | 44.6 | 68.0 | 70.8 |
| IV期 | 51 | 42 | (1-3) | 98.0 | 16.1 | 7.5 | 27.5 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 177 | 119 | | | | | |
| % | 59.8 | 40.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 21 | 103 | 118 | 44 | | |
| % | 3.4 | 7.1 | 34.8 | 39.9 | 14.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 78 | 94 | 69 | 51 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 26.4 | 31.8 | 23.3 | 17.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 266 | 249 | 17 | 0 | | |
| % | 10.1 | 89.9 | 84.1 | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | (4-6) | 53 | 205 | | | |
| % | 10.8 | | 17.9 | 69.3 | | | |

183 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 105 | 73 | (7-9) | 92.4 | 26.2 | 17.9 | 35.3 | 70.6 |
| I期 | 36 | 22 | (4-6) | 88.9 | 31.9 | 16.8 | 48.1 | 74.5 |
| II期 | 43 | 25 | (4-6) | 90.7 | 37.9 | 23.0 | 52.7 | 70.6 |
| III期 | 16 | 16 | 0 | | | | | 63.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 74 | 31 | | | | | |
| % | 70.5 | 29.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 35 | 48 | 14 | | |
| % | | | 33.3 | 45.7 | 13.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 36 | 43 | 16 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 34.3 | 41.0 | 15.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 24 | 43 | 19 | 18 | (1-3) | 0 |
| | % | 22.9 | 41.0 | 18.1 | 17.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 94 | 11 | (7-9) | (1-3) | 0 | | |
| % | 89.5 | 10.5 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 69 | 31 | | | |
| % | | | 65.7 | 29.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 133 | 101 | (4-6) | 95.5 | 20.7 | 14.1 | 28.2 | 72.2 |
| I期 | 36 | 14 | (1-3) | 97.2 | 60.1 | 42.1 | 74.1 | 73.2 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 80.0 |
| III期 | 29 | 27 | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | 49 | 44 | (4-6) | 91.8 | 2.3 | 0.2 | 10.5 | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 94 | 39 | 対象数 | | 13 | 120 |
| % | 70.7 | 29.3 | % | | 9.8 | 90.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 40 | 51 | 32 | |
| % | | | 30.1 | 38.3 | 24.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 36 | 10 | 29 | 49 | (7-9) | (1-3) |
| % | 27.1 | 7.5 | 21.8 | 36.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 81 | 52 | 44 | (7-9) | 0 | |
| % | 60.9 | 39.1 | 33.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 52 | 71 | | |
| % | | | 39.1 | 53.4 | | |

183 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 185 | 29 | (4-6) | 97.8 | 84.2 | 78.0 | 88.7 | 61.3 |
| I期 | 68 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.7 | 83.2 | 96.9 | 63.6 |
| II期 | 77 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 92.1 | 83.3 | 96.4 | 58.0 |
| III期 | 28 | (7-9) | (1-3) | | | | | 66.4 |
| IV期 | 12 | (7-9) | (1-3) | | | | | 65.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 185 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 39 | 39 | 61 | 30 | 16 | | |
| % | 21.1 | 21.1 | 33.0 | 16.2 | 8.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 68 | 77 | 28 | 12 | 0 | 0 | |
| % | 36.8 | 41.6 | 15.1 | 6.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 158 | 157 | (1-3) | 0 | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 84.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (4-6) | 16 | 137 | | | |
| % | 15.1 | | 8.6 | 74.1 | | | |

184

市立豊中病院

2010-2011年2カ年

コメント:

当院における肺癌の生存率は、全体と比較し低値を示しておりますが、当院で診療を行った肺癌患者の特徴として他の疾患を併存した症例の割合が高いため、ステージⅠ期でも手術の適応とならない症例や、手術後の死因が肺癌以外の併存症である症例が、多くを占めていたためです。

184 市立豊中病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 523 | 190 | 19 | 96.4 | 63.2 | 58.8 | 67.2 | 71.3 |
| I期 | 337 | 62 | 13 | 96.1 | 81.4 | 76.8 | 85.2 | 71.7 |
| II期 | 35 | 11 | (1-3) | 94.3 | 67.0 | 48.4 | 80.2 | 70.7 |
| III期 | 32 | 19 | (1-3) | 96.9 | 38.8 | 22.0 | 55.2 | 70.1 |
| IV期 | 106 | 90 | (1-3) | 97.2 | 13.8 | 7.9 | 21.2 | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 365 | 158 | | | | | |
| % | 69.8 | 30.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 40 | 162 | 206 | 103 | | |
| % | 2.3 | 7.6 | 31.0 | 39.4 | 19.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 337 | 35 | 32 | 106 | (1-3) | 12 | |
| % | 64.4 | 6.7 | 6.1 | 20.3 | | 2.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 103 | 420 | 383 | 32 | (4-6) | | |
| % | 19.7 | 80.3 | 73.2 | 6.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 60 | 164 | 273 | | | |
| % | 5.0 | 11.5 | 31.4 | 52.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 480 | 147 | (7-9) | 98.3 | 69.1 | 64.7 | 73.0 | 69.2 |
| I期 | 117 | 12 | 0 | 100.0 | 89.7 | 82.7 | 94.0 | 69.1 |
| II期 | 129 | 20 | (1-3) | 98.4 | 84.4 | 76.8 | 89.6 | 70.4 |
| III期 | 133 | 43 | (1-3) | 97.7 | 67.1 | 58.3 | 74.4 | 70.5 |
| IV期 | 88 | 69 | (1-3) | 97.7 | 20.6 | 12.9 | 29.7 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 286 | 194 | | | | | |
| % | 59.6 | 40.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 53 | 151 | 182 | 72 | | |
| % | 4.6 | 11.0 | 31.5 | 37.9 | 15.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 117 | 129 | 133 | 88 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 24.4 | 26.9 | 27.7 | 18.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 447 | 388 | 54 | (4-6) | | |
| % | 6.9 | 93.1 | 80.8 | 11.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 87 | 19 | 92 | 282 | | | |
| % | 18.1 | 4.0 | 19.2 | 58.8 | | | |

184 市立豊中病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 86 | (4-6) | 97.1 | 36.9 | 28.8 | 45.0 | 72.9 |
| I期 | 58 | 26 | (1-3) | 96.6 | 53.8 | 40.0 | 65.8 | 72.2 |
| II期 | 36 | 21 | (1-3) | 97.2 | 41.2 | 25.1 | 56.6 | 72.5 |
| III期 | 31 | 25 | (1-3) | 96.8 | 16.9 | 6.2 | 32.2 | 71.5 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 97 | 42 | | | | | |
| % | 69.8 | 30.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | 12 | 35 | 62 | 30 | | |
| % | | 8.6 | 25.2 | 44.6 | 21.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 58 | 36 | 31 | 14 | 0 | 0 |
| | % | 41.7 | 25.9 | 22.3 | 10.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 28 | 41 | 38 | 31 | (1-3) | 0 |
| | % | 20.1 | 29.5 | 27.3 | 22.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 93 | 46 | 43 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 66.9 | 33.1 | 30.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 86 | 48 | | | |
| % | | | 61.9 | 34.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 202 | 156 | (4-6) | 98.0 | 21.9 | 16.4 | 27.9 | 72.3 |
| I期 | 49 | 25 | (1-3) | 98.0 | 48.3 | 33.7 | 61.4 | 74.1 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 53 | 40 | (1-3) | 96.2 | 24.0 | 13.5 | 36.2 | 70.0 |
| IV期 | 81 | 79 | (1-3) | 98.8 | 1.3 | 0.1 | 6.0 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 139 | 63 | 対象数 | 12 | 190 | | |
| % | 68.8 | 31.2 | % | 5.9 | 94.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 62 | 70 | 53 | | |
| % | | 6.9 | 30.7 | 34.7 | 26.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 14 | 53 | 81 | (4-6) | 0 | |
| % | 24.3 | 6.9 | 26.2 | 40.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 147 | 55 | 46 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 72.8 | 27.2 | 22.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 77 | 106 | | | |
| % | | 7.4 | 38.1 | 52.5 | | | |

184 市立豊中病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 277 | 42 | 14 | 94.9 | 84.4 | 79.5 | 88.3 | 63.6 |
| I期 | 115 | (7-9) | (4-6) | 96.5 | 92.0 | 85.2 | 95.8 | 63.4 |
| II期 | 91 | 12 | (4-6) | 93.4 | 86.4 | 77.2 | 92.0 | 63.4 |
| III期 | 51 | 10 | (1-3) | 96.1 | 80.2 | 66.3 | 88.8 | 66.1 |
| IV期 | 17 | (7-9) | (1-3) | | | | | 58.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 277 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 39 | 60 | 94 | 48 | 36 | | |
| % | 14.1 | 21.7 | 33.9 | 17.3 | 13.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 115 | 91 | 51 | 17 | 0 | (1-3) | |
| % | 41.5 | 32.9 | 18.4 | 6.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 250 | 221 | 26 | (1-3) | | |
| % | 9.7 | 90.3 | 79.8 | 9.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 60 | (7-9) | 41 | 167 | | | |
| % | 21.7 | | 14.8 | 60.3 | | | |

185 大阪国際がんセンター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

185 大阪国際がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 764 | 197 | (7-9) | 99.0 | 74.1 | 70.8 | 77.0 | 67.6 |
| I期 | 611 | 93 | (7-9) | 98.7 | 84.7 | 81.5 | 87.3 | 68.8 |
| II期 | 24 | (7-9) | 0 | | | | | 60.7 |
| III期 | 28 | 20 | 0 | | | | | 68.6 |
| IV期 | 77 | 73 | 0 | 100.0 | 5.2 | 1.7 | 11.7 | 64.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 569 | 195 | | | | | |
| % | 74.5 | 25.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 44 | 84 | 285 | 268 | 83 | | |
| % | 5.8 | 11.0 | 37.3 | 35.1 | 10.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 611 | 24 | 28 | 77 | (1-3) | 23 | |
| % | 80.0 | 3.1 | 3.7 | 10.1 | | 3.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 97 | 667 | 655 | 10 | (1-3) | | |
| % | 12.7 | 87.3 | 85.7 | 1.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | 102 | 246 | 393 | | | |
| % | 3.0 | 13.4 | 32.2 | 51.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 340 | 87 | (1-3) | 99.4 | 74.4 | 69.4 | 78.7 | 64.6 |
| I期 | 138 | 17 | 0 | 100.0 | 87.7 | 80.9 | 92.2 | 67.6 |
| II期 | 57 | (1-3) | (1-3) | 98.2 | 96.5 | 86.7 | 99.1 | 62.4 |
| III期 | 85 | 28 | 0 | 100.0 | 67.1 | 56.0 | 75.9 | 62.7 |
| IV期 | 47 | 39 | (1-3) | 97.9 | 15.8 | 7.0 | 27.8 | 61.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 203 | 137 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 56 | 134 | 99 | 19 | | |
| % | 9.4 | 16.5 | 39.4 | 29.1 | 5.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 138 | 57 | 85 | 47 | 0 | 13 | |
| % | 40.6 | 16.8 | 25.0 | 13.8 | | 3.8 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 307 | 293 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 9.7 | 90.3 | 86.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 29 | 71 | 229 | | | |
| % | 3.2 | 8.5 | 20.9 | 67.4 | | | |

185 大阪国際がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 195 | 101 | (1-3) | 99.0 | 47.8 | 40.7 | 54.7 | 68.7 |
| I期 | 99 | 27 | (1-3) | 99.0 | 72.6 | 62.6 | 80.3 | 68.4 |
| II期 | 51 | 35 | 0 | 100.0 | 31.4 | 19.3 | 44.2 | 66.9 |
| III期 | 31 | 26 | (1-3) | 96.8 | 13.3 | 4.2 | 27.8 | 69.2 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 対象数 | 142 | 53 | | | | | |
| % | 72.8 | 27.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 20 | 66 | 77 | 20 | | |
| % | 6.2 | 10.3 | 33.8 | 39.5 | 10.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 99 | 51 | 31 | 13 | 0 | (1-3) |
| | % | 50.8 | 26.2 | 15.9 | 6.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 51 | 70 | 48 | 25 | 0 | (1-3) |
| | % | 26.2 | 35.9 | 24.6 | 12.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 146 | 49 | 49 | 0 | 0 | | |
| % | 74.9 | 25.1 | 25.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 124 | 61 | | | |
| % | | 5.1 | 63.6 | 31.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 748 | 358 | (7-9) | 99.1 | 52.0 | 48.3 | 55.5 | 67.2 |
| I期 | 378 | 76 | (4-6) | 98.7 | 79.8 | 75.4 | 83.5 | 68.5 |
| II期 | 55 | 27 | 0 | 100.0 | 50.9 | 37.1 | 63.2 | 68.1 |
| III期 | 166 | 126 | (1-3) | 99.4 | 24.0 | 17.8 | 30.7 | 64.6 |
| IV期 | 144 | 129 | (1-3) | 99.3 | 9.8 | 5.6 | 15.4 | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 509 | 239 | 対象数 | | 47 | 701 |
| % | 68.0 | 32.0 | % | | 6.3 | 93.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 48 | 87 | 283 | 251 | 79 | |
| % | 6.4 | 11.6 | 37.8 | 33.6 | 10.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 378 | 55 | 166 | 144 | (1-3) | (4-6) |
| % | 50.5 | 7.4 | 22.2 | 19.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 343 | 405 | 384 | 10 | 11 | |
| % | 45.9 | 54.1 | 51.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 20 | 106 | 209 | 413 | | |
| % | 2.7 | 14.2 | 27.9 | 55.2 | | |

185 大阪国際がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 513 | 35 | (4-6) | 99.2 | 93.1 | 90.6 | 95.0 | 55.9 |
| I期 | 208 | (7-9) | (1-3) | 99.0 | 96.1 | 92.4 | 98.1 | 57.2 |
| II期 | 230 | (7-9) | (1-3) | 99.1 | 96.5 | 93.1 | 98.2 | 52.2 |
| III期 | 56 | 11 | 0 | 100.0 | 80.4 | 67.3 | 88.6 | 55.1 |
| IV期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 53.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 513 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 173 | 115 | 156 | 57 | 12 | | |
| % | 33.7 | 22.4 | 30.4 | 11.1 | 2.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 208 | 230 | 56 | 16 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 40.5 | 44.8 | 10.9 | 3.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 483 | 427 | 48 | (7-9) | | |
| % | 5.8 | 94.2 | 83.2 | 9.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 59 | 52 | 52 | 350 | | | |
| % | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 68.2 | | | |

186

地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

全がん施設別の生存率の値は、純粋ながんの進行度や治療法以外に地域性や施設の特性など様々な要素に影響を受けると考えられます。例えば高齢患者の多い地域では、PS（患者さんの日常生活の制限の程度の状態を示す指標）低下等により、根治的がん治療が困難であったり、他病死等のため生存率が下がると考えられます。また、全身状態不良な患者を多く受け入れている場合や併存症により、生存率に影響を与える可能性があります。

186 胃
 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 590 | 243 | 11 | 98.1 | 58.5 | 54.4 | 62.4 | 67.2 |
| I期 | 354 | 73 | (7-9) | 98.0 | 79.2 | 74.6 | 83.1 | 67.1 |
| II期 | 57 | 24 | 0 | 100.0 | 57.9 | 44.1 | 69.5 | 70.7 |
| III期 | 53 | 37 | (1-3) | 98.1 | 29.8 | 18.1 | 42.4 | 67.1 |
| IV期 | 117 | 106 | (1-3) | 97.4 | 7.1 | 3.3 | 12.7 | 63.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 419 | 171 | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 50 | 71 | 183 | 210 | 76 | | |
| % | 8.5 | 12.0 | 31.0 | 35.6 | 12.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 354 | 57 | 53 | 117 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 60.0 | 9.7 | 9.0 | 19.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 113 | 477 | 453 | 24 | 0 | | |
| % | 19.2 | 80.8 | 76.8 | 4.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 77 | 125 | 375 | | | |
| % | 2.2 | 13.1 | 21.2 | 63.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 438 | 155 | 12 | 97.3 | 64.3 | 59.6 | 68.6 | 67.7 |
| I期 | 103 | 20 | (1-3) | 97.1 | 80.5 | 71.4 | 86.9 | 67.3 |
| II期 | 132 | 30 | (1-3) | 97.7 | 77.1 | 68.9 | 83.4 | 71.8 |
| III期 | 115 | 42 | (4-6) | 96.5 | 63.0 | 53.4 | 71.2 | 67.2 |
| IV期 | 75 | 59 | (1-3) | 98.7 | 20.4 | 12.1 | 30.2 | 65.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 244 | 194 | | | | | |
| % | 55.7 | 44.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 51 | 149 | 142 | 64 | | |
| % | 7.3 | 11.6 | 34.0 | 32.4 | 14.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 103 | 132 | 115 | 75 | 0 | 13 | |
| % | 23.5 | 30.1 | 26.3 | 17.1 | | 3.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 398 | 363 | 33 | (1-3) | | |
| % | 9.1 | 90.9 | 82.9 | 7.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | 28 | 92 | 291 | | | |
| % | 6.2 | 6.4 | 21.0 | 66.4 | | | |

186 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 230 | 135 | (1-3) | 98.7 | 40.8 | 34.4 | 47.1 | 69.2 |
| I期 | 101 | 39 | (1-3) | 99.0 | 61.2 | 51.0 | 70.0 | 72.7 |
| II期 | 65 | 44 | 0 | 100.0 | 32.3 | 21.4 | 43.7 | 72.9 |
| III期 | 39 | 33 | 0 | 100.0 | 15.4 | 6.2 | 28.3 | 66.5 |
| IV期 | 21 | 18 | (1-3) | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 152 | 78 | | | | | |
| % | 66.1 | 33.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 27 | 58 | 100 | 35 | | |
| % | 4.3 | 11.7 | 25.2 | 43.5 | 15.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 101 | 65 | 39 | 21 | 0 | (4-6) |
| | % | 43.9 | 28.3 | 17.0 | 9.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 58 | 83 | 38 | 46 | (1-3) | (4-6) |
| | % | 25.2 | 36.1 | 16.5 | 20.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 135 | 95 | 91 | (4-6) | 0 | | |
| % | 58.7 | 41.3 | 39.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 140 | 87 | | | |
| % | | | 60.9 | 37.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 775 | 495 | 18 | 97.7 | 34.9 | 31.5 | 38.3 | 68.2 |
| I期 | 259 | 72 | (4-6) | 98.5 | 71.9 | 66.0 | 77.0 | 69.3 |
| II期 | 55 | 33 | (1-3) | 98.2 | 38.9 | 26.0 | 51.5 | 68.4 |
| III期 | 180 | 138 | (4-6) | 97.2 | 21.4 | 15.7 | 27.8 | 69.0 |
| IV期 | 271 | 248 | (7-9) | 97.4 | 6.1 | 3.6 | 9.4 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 520 | 255 | 対象数 | | 78 | 697 |
| % | 67.1 | 32.9 | % | | 10.1 | 89.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 41 | 81 | 285 | 270 | 98 | |
| % | 5.3 | 10.5 | 36.8 | 34.8 | 12.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 259 | 55 | 180 | 271 | 0 | 10 |
| % | 33.4 | 7.1 | 23.2 | 35.0 | | 1.3 |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 427 | 348 | 332 | 13 | (1-3) | |
| % | 55.1 | 44.9 | 42.8 | 1.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 33 | 66 | 206 | 470 | | |
| % | 4.3 | 8.5 | 26.6 | 60.6 | | |

186 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 295 | 30 | (7-9) | 96.9 | 89.7 | 85.5 | 92.7 | 59.1 |
| I期 | 125 | (4-6) | (4-6) | 96.8 | 96.7 | 91.4 | 98.8 | 57.5 |
| II期 | 122 | 12 | (1-3) | 98.4 | 90.1 | 83.2 | 94.2 | 58.0 |
| III期 | 37 | (7-9) | (1-3) | 97.3 | 77.9 | 60.6 | 88.3 | 56.7 |
| IV期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 58.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 295 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 84 | 65 | 77 | 47 | 22 | | |
| % | 28.5 | 22.0 | 26.1 | 15.9 | 7.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 125 | 122 | 37 | 10 | 0 | (1-3) | |
| % | 42.4 | 41.4 | 12.5 | 3.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 262 | 256 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 11.2 | 88.8 | 86.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 51 | (7-9) | 26 | 211 | | | |
| % | 17.3 | | 8.8 | 71.5 | | | |

187

大阪赤十字病院

2010-2011年2力年

コメント:

当院は、年間の新入院患者のうち、約3割が、がん患者であり、入院精査・加療を要するすべての疾患の中で「がん」が多い傾向にあります。

がんを部位別にみると、胃がん・大腸がん・肺がん・乳がんについては全国平均と同じ程度の発生率となっており、実測生存率についても大きな差異は見られません。肝がんについては、発生頻度や実測生存率からみてやや高い傾向にあり、内科・外科・放射線科の連携による集学的治療が功を奏しているものと推定されます。

当院は、地域の急性期総合病院として、高度な専門医療のもと総合的ながん診療を行っています。総合的な診療体制を活かし、複数の診療科・多職種チームによって治療方針の検討を行うことで、がん診療の充実および最善の治療を行うように努めています。

187 大阪赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 567 | 190 | 15 | 97.4 | 66.1 | 62.0 | 69.9 | 70.1 |
| I期 | 374 | 64 | 11 | 97.1 | 82.6 | 78.4 | 86.1 | 70.8 |
| II期 | 29 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.9 |
| III期 | 30 | 17 | 0 | 100.0 | 43.3 | 25.6 | 59.9 | 71.5 |
| IV期 | 108 | 92 | (1-3) | 99.1 | 14.1 | 8.3 | 21.4 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 365 | 202 | | | | | |
| % | 64.4 | 35.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 64 | 166 | 215 | 102 | | |
| % | 3.5 | 11.3 | 29.3 | 37.9 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 374 | 29 | 30 | 108 | 16 | 10 | |
| % | 66.0 | 5.1 | 5.3 | 19.0 | 2.8 | 1.8 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 100 | 467 | 439 | (7-9) | 20 | | |
| % | 17.6 | 82.4 | 77.4 | | 3.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 70 | 208 | 286 | | | |
| % | | 12.3 | 36.7 | 50.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 470 | 172 | 10 | 97.9 | 63.2 | 58.6 | 67.4 | 69.8 |
| I期 | 95 | 14 | (1-3) | 97.9 | 85.2 | 76.3 | 91.0 | 69.5 |
| II期 | 122 | 27 | (4-6) | 96.7 | 77.6 | 69.0 | 84.1 | 70.1 |
| III期 | 134 | 45 | (1-3) | 99.3 | 66.3 | 57.5 | 73.6 | 71.5 |
| IV期 | 95 | 76 | (1-3) | 96.8 | 19.0 | 11.8 | 27.6 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 269 | 201 | | | | | |
| % | 57.2 | 42.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 43 | 141 | 175 | 85 | | |
| % | 5.5 | 9.1 | 30.0 | 37.2 | 18.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 95 | 122 | 134 | 95 | 12 | 12 | |
| % | 20.2 | 26.0 | 28.5 | 20.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | 404 | 353 | 33 | 18 | | |
| % | 14.0 | 86.0 | 75.1 | 7.0 | 3.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 33 | 208 | 220 | | | |
| % | | 7.0 | 44.3 | 46.8 | | | |

187 大阪赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 339 | 212 | (4-6) | 98.8 | 36.9 | 31.8 | 42.1 | 70.6 |
| I期 | 128 | 71 | (1-3) | 98.4 | 43.9 | 35.1 | 52.3 | 72.4 |
| II期 | 111 | 52 | (1-3) | 98.2 | 52.4 | 42.6 | 61.2 | 70.5 |
| III期 | 67 | 56 | 0 | 100.0 | 16.4 | 8.8 | 26.2 | 68.2 |
| IV期 | 26 | 26 | 0 | | | | | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 200 | 139 | | | | | |
| % | 59.0 | 41.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 25 | 108 | 142 | 53 | | |
| % | 3.2 | 7.4 | 31.9 | 41.9 | 15.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 128 | 111 | 67 | 26 | (7-9) | 0 |
| | % | 37.8 | 32.7 | 19.8 | 7.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 75 | 114 | 86 | 44 | (7-9) | 0 |
| | % | 22.1 | 33.6 | 25.4 | 13.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 246 | 93 | 84 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 72.6 | 27.4 | 24.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 268 | 65 | | | |
| % | | | 79.1 | 19.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 465 | 337 | (4-6) | 98.9 | 26.9 | 23.0 | 31.1 | 69.9 |
| I期 | 102 | 33 | 0 | 100.0 | 67.7 | 57.6 | 75.8 | 68.8 |
| II期 | 42 | 28 | (1-3) | 97.6 | 32.0 | 18.5 | 46.3 | 68.4 |
| III期 | 110 | 83 | 0 | 100.0 | 24.6 | 17.0 | 32.9 | 67.9 |
| IV期 | 186 | 172 | (4-6) | 97.8 | 5.9 | 3.1 | 10.0 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 317 | 148 | 対象数 | | 42 | 423 |
| % | 68.2 | 31.8 | % | | 9.0 | 91.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 30 | 170 | 208 | 46 | |
| % | 2.4 | 6.5 | 36.6 | 44.7 | 9.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 102 | 42 | 110 | 186 | 23 | (1-3) |
| % | 21.9 | 9.0 | 23.7 | 40.0 | 4.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 310 | 155 | 121 | (4-6) | 29 | |
| % | 66.7 | 33.3 | 26.0 | | 6.2 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 51 | 192 | 222 | | |
| % | | 11.0 | 41.3 | 47.7 | | |

187 大阪赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 235 | 28 | (1-3) | 99.1 | 88.0 | 83.1 | 91.6 | 60.5 |
| I期 | 102 | (1-3) | (1-3) | 99.0 | 99.0 | 93.2 | 99.9 | 61.0 |
| II期 | 90 | 11 | 0 | 100.0 | 87.8 | 79.0 | 93.0 | 60.2 |
| III期 | 18 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.9 |
| IV期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 59.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 235 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 62 | 45 | 67 | 42 | 19 | | |
| % | 26.4 | 19.1 | 28.5 | 17.9 | 8.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 102 | 90 | 18 | 13 | 11 | (1-3) | |
| % | 43.4 | 38.3 | 7.7 | 5.5 | 4.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 190 | 149 | (1-3) | 39 | | |
| % | 19.1 | 80.9 | 63.4 | | 16.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 27 | 184 | | | |
| % | | 8.5 | 11.5 | 78.3 | | | |

188 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

188 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 284 | 116 | 12 | 95.8 | 58.5 | 52.5 | 64.0 | 70.8 |
| I期 | 161 | 28 | 11 | 93.2 | 82.1 | 75.1 | 87.3 | 71.6 |
| II期 | 27 | 10 | (1-3) | | | | | 69.4 |
| III期 | 15 | 10 | 0 | | | | | 72.8 |
| IV期 | 71 | 65 | 0 | 100.0 | 8.5 | 3.4 | 16.3 | 67.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 193 | 91 | | | | | |
| % | 68.0 | 32.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 89 | 113 | 49 | | |
| % | | 9.5 | 31.3 | 39.8 | 17.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 161 | 27 | 15 | 71 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 56.7 | 9.5 | 5.3 | 25.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 69 | 215 | 202 | 10 | (1-3) | | |
| % | 24.3 | 75.7 | 71.1 | 3.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | 16 | 92 | 149 | | | |
| % | 9.5 | 5.6 | 32.4 | 52.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 93 | (4-6) | 97.5 | 60.6 | 54.1 | 66.5 | 69.5 |
| I期 | 59 | 11 | (4-6) | 93.2 | 80.6 | 67.6 | 88.7 | 70.0 |
| II期 | 61 | 16 | (1-3) | 96.7 | 73.2 | 60.0 | 82.6 | 69.7 |
| III期 | 72 | 30 | 0 | 100.0 | 58.3 | 46.1 | 68.7 | 70.8 |
| IV期 | 41 | 33 | 0 | 100.0 | 19.5 | 9.2 | 32.7 | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 129 | 111 | | | | | |
| % | 53.8 | 46.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 27 | 75 | 81 | 45 | | |
| % | 5.0 | 11.3 | 31.3 | 33.8 | 18.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 61 | 72 | 41 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 24.6 | 25.4 | 30.0 | 17.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 210 | 195 | 14 | (1-3) | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 81.3 | 5.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | 10 | 62 | 137 | | | |
| % | 12.9 | 4.2 | 25.8 | 57.1 | | | |

188 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 91 | 61 | (1-3) | 96.7 | 31.8 | 22.4 | 41.6 | 72.5 |
| I期 | 31 | 15 | (1-3) | 93.5 | 50.3 | 31.5 | 66.4 | 74.7 |
| II期 | 34 | 22 | (1-3) | 97.1 | 33.3 | 18.2 | 49.3 | 73.6 |
| III期 | 17 | 15 | 0 | | | | | 74.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 61 | 30 | | | | | |
| % | 67.0 | 33.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 22 | 47 | 14 | | |
| % | | | 24.2 | 51.6 | 15.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 31 | 34 | 17 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 34.1 | 37.4 | 18.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 22 | 29 | 16 | (1-3) | 0 |
| | % | 25.3 | 24.2 | 31.9 | 17.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 77 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| % | 84.6 | 15.4 | 15.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 64 | 24 | | | |
| % | | | 70.3 | 26.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 74 | 62 | (4-6) | 94.6 | 11.9 | 5.6 | 20.8 | 72.4 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 62.5 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 88.0 |
| III期 | 29 | 24 | (1-3) | | | | | 70.1 |
| IV期 | 36 | 31 | (1-3) | 91.7 | 7.0 | 1.3 | 19.7 | 72.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 47 | 27 | 対象数 | (7-9) | 67 | | |
| % | 63.5 | 36.5 | % | | 90.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 20 | 29 | 18 | | |
| % | | | 27.0 | 39.2 | 24.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 29 | 36 | 0 | 0 | |
| % | | | 39.2 | 48.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 23 | 49 | | | |
| % | | | 31.1 | 66.2 | | | |

188 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 62 | 11 | (1-3) | 98.4 | 82.2 | 70.2 | 89.7 | 63.0 |
| I期 | 28 | (1-3) | 0 | | | | | 62.8 |
| II期 | 19 | (1-3) | (1-3) | | | | | 62.2 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 63.7 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 62 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 15 | 13 | 13 | (7-9) | | |
| % | 19.4 | 24.2 | 21.0 | 21.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 28 | 19 | (4-6) | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 45.2 | 30.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 52 | 47 | (4-6) | 0 | | |
| % | 16.1 | 83.9 | 75.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 42 | | | |
| % | | | | 67.7 | | | |

189 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
2011年のみ

コメント:

特になし

189 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 181 | 81 | (4-6) | 97.2 | 54.9 | 47.4 | 61.9 | 71.0 |
| I期 | 93 | 13 | (4-6) | 95.7 | 85.9 | 76.9 | 91.6 | 70.2 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | 20 | 11 | 0 | | | | | 74.8 |
| IV期 | 54 | 50 | (1-3) | 98.1 | 6.3 | 1.7 | 15.2 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 126 | 55 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 46 | 78 | 35 | | |
| % | | 9.9 | 25.4 | 43.1 | 19.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 93 | 13 | 20 | 54 | 0 | (1-3) | |
| % | 51.4 | 7.2 | 11.0 | 29.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 131 | 114 | 17 | 0 | | |
| % | 27.6 | 72.4 | 63.0 | 9.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 17 | 38 | 116 | | | |
| % | 5.5 | 9.4 | 21.0 | 64.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 165 | 53 | (1-3) | 98.2 | 67.6 | 59.8 | 74.2 | 68.9 |
| I期 | 45 | 10 | (1-3) | 97.8 | 77.6 | 62.4 | 87.3 | 67.2 |
| II期 | 36 | (4-6) | (1-3) | 97.2 | 83.2 | 66.4 | 92.1 | 67.2 |
| III期 | 47 | 12 | 0 | 100.0 | 74.5 | 59.4 | 84.6 | 71.1 |
| IV期 | 33 | 24 | (1-3) | 97.0 | 25.1 | 11.8 | 40.8 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 103 | 62 | | | | | |
| % | 62.4 | 37.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 67 | 51 | 26 | | |
| % | | 10.3 | 40.6 | 30.9 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 36 | 47 | 33 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 27.3 | 21.8 | 28.5 | 20.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 144 | 133 | 11 | 0 | | |
| % | 12.7 | 87.3 | 80.6 | 6.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 18 | 41 | 91 | | | |
| % | 9.1 | 10.9 | 24.8 | 55.2 | | | |

189 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 79 | 49 | (1-3) | 98.7 | 37.4 | 26.8 | 48.0 | 70.1 |
| I期 | 26 | 16 | 0 | | | | | 71.4 |
| II期 | 30 | 14 | 0 | 100.0 | 53.3 | 34.3 | 69.1 | 70.5 |
| III期 | 14 | 10 | (1-3) | | | | | 71.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 62.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 58 | 21 | | | | | | |
| % | 73.4 | 26.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 24 | 43 | (4-6) | | | |
| % | | | 30.4 | 54.4 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 26 | 30 | 14 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 32.9 | 38.0 | 17.7 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 30 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
| | % | 22.8 | 38.0 | 20.3 | 19.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 55 | 24 | 23 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | 29.1 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 58 | 16 | | | | |
| % | | | 73.4 | 20.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 26 | 17 | 0 | | | | | 74.4 |
| I期 | 19 | 11 | 0 | | | | | 74.5 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 対象数 | 19 | (7-9) | | 対象数 | (1-3) | 25 | | | |
| % | 73.1 | | | % | | 96.2 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | 13 | (7-9) | | | | |
| % | | | | 50.0 | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | | |
| 対象数 | 19 | (1-3) | 0 | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 73.1 | | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | | |
| 対象数 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| % | 100.0 | | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 16 | (7-9) | | | | | |
| % | | | 61.5 | | | | | | |

189 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 149 | 13 | (4-6) | 96.0 | 91.1 | 85.1 | 94.7 | 59.9 |
| I期 | 66 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.9 | 84.7 | 97.7 | 61.0 |
| II期 | 61 | (1-3) | (4-6) | 90.2 | 96.5 | 86.6 | 99.1 | 58.3 |
| III期 | 13 | (1-3) | 0 | | | | | 59.9 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 61.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 149 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 32 | 58 | 17 | 10 | | |
| % | 21.5 | 21.5 | 38.9 | 11.4 | 6.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 66 | 61 | 13 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 44.3 | 40.9 | 8.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 138 | 133 | (4-6) | 0 | | |
| % | 7.4 | 92.6 | 89.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 37 | 11 | 10 | 91 | | | |
| % | 24.8 | 7.4 | 6.7 | 61.1 | | | |

コメント:

当院における2010-2011年診断症例5年生存率の対象者数は3,348例、そのうち打ち切り数は105例、2力年の生存状況把握割合は96.9%であった。尚、病期の集計についてはUICC TNM分類総合ステージを用い集計されており、0期は集計対象外となっている。(2010-2011年5年生存率報告書・調査方法より)

【胃】

対象者数：490例、生存状況把握割合96.7%。

性別にみると、男性が7割近くを占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。

総合ステージでは、I期が最も多く約7割を占めていた。

がんの発見経緯としては、症状受診（その他含む）が5割であった。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて約9割に実施された。

【大腸】

対象者数：551例、生存状況把握割合94.9%。

性別にみると、男女比は男性が多く占めていた。

診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで70歳代となっており、60歳・70歳代で全体の約6割を占めた。

総合ステージでは、III期が最も多く約3割で、I期およびII期がそれぞれ2割であった。

がんの発見経緯としては、症状受診（その他含む）が6割に、次いで検診・健康診断等が約3割を占めた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて約9割において実施された。

【肝】

対象者数：90例、生存状況把握割合100%。

性別にみると、男性が6割に占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。

総合ステージでは、I期が4割を占めた。

がんの発見経緯としては、他疾患経過観察中が7割を占めた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて約4割に実施された。

【肺】

対象者数：322例、生存状況把握割合97.5%。

性別にみると、男性が7割を占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の7割を占め、80歳以上も2割近くであった。

総合ステージでは、I期が最も多く、4割を占めた。次いでIII期およびIV期は2割を占めていた。

がんの発見経緯は、他疾患経過観察中が3割強を占めており、がん検診・健康診断等が2割を占めていた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて5割に実施された。

?

【女性乳房】

対象者数：223例、生存状況把握割合97.9%。

診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで50歳未満となっており、全体の約5割を占めた。

総合ステージでは、II期が最も多く、約5割を占めた。

がんの発見経緯は、症状受診（その他含む）が6割を占めた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて約9割近くに実施された。

190 大阪医科大学附属病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 490 | 157 | 16 | 96.7 | 67.4 | 63.0 | 71.4 | 68.0 |
| I期 | 333 | 53 | 11 | 96.7 | 83.8 | 79.4 | 87.4 | 69.0 |
| II期 | 34 | (7-9) | (1-3) | 94.1 | 78.7 | 60.4 | 89.2 | 70.9 |
| III期 | 37 | 18 | (1-3) | 94.6 | 49.0 | 31.8 | 64.1 | 68.0 |
| IV期 | 82 | 77 | (1-3) | 98.8 | 5.0 | 1.6 | 11.2 | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 341 | 149 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 56 | 169 | 175 | 62 | | |
| % | 5.7 | 11.4 | 34.5 | 35.7 | 12.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 333 | 34 | 37 | 82 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 68.0 | 6.9 | 7.6 | 16.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 432 | 393 | 38 | (1-3) | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 80.2 | 7.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 63 | 84 | 90 | 253 | | | |
| % | 12.9 | 17.1 | 18.4 | 51.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 551 | 133 | 28 | 94.9 | 75.2 | 71.3 | 78.6 | 65.6 |
| I期 | 150 | 11 | (7-9) | 94.7 | 92.4 | 86.7 | 95.7 | 65.5 |
| II期 | 146 | 22 | (4-6) | 97.3 | 84.7 | 77.6 | 89.6 | 66.8 |
| III期 | 161 | 37 | (7-9) | 95.0 | 76.4 | 69.0 | 82.3 | 64.9 |
| IV期 | 80 | 61 | (4-6) | 92.5 | 18.9 | 10.9 | 28.6 | 64.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 313 | 238 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 52 | 91 | 190 | 173 | 45 | | |
| % | 9.4 | 16.5 | 34.5 | 31.4 | 8.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 150 | 146 | 161 | 80 | (1-3) | 11 | |
| % | 27.2 | 26.5 | 29.2 | 14.5 | | 2.0 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 66 | 485 | 454 | 30 | (1-3) | | |
| % | 12.0 | 88.0 | 82.4 | 5.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 88 | 61 | 48 | 354 | | | |
| % | 16.0 | 11.1 | 8.7 | 64.2 | | | |

190 大阪医科大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 59 | 0 | 100.0 | 34.4 | 24.8 | 44.2 | 69.3 |
| I期 | 42 | 22 | 0 | 100.0 | 47.6 | 32.1 | 61.6 | 72.3 |
| II期 | 32 | 22 | 0 | 100.0 | 31.3 | 16.4 | 47.3 | 65.8 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 68.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 75.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|-------|--|
| 対象数 | 60 | 30 | | | | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 25 | 44 | (7-9) | | | |
| % | | 11.1 | 27.8 | 48.9 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 42 | 32 | 10 | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| | % | 46.7 | 35.6 | 11.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 14 | 40 | 25 | 11 | 0 | (1-3) | |
| | % | 15.6 | 44.4 | 27.8 | 12.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 53 | 37 | 34 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 58.9 | 41.1 | 37.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 63 | 22 | | | | |
| % | | | 70.0 | 24.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 322 | 166 | (7-9) | 97.5 | 48.0 | 42.4 | 53.3 | 70.8 |
| I期 | 135 | 26 | (1-3) | 99.3 | 80.6 | 72.9 | 86.4 | 72.5 |
| II期 | 22 | 10 | (1-3) | | | | | 69.4 |
| III期 | 74 | 50 | (1-3) | 95.9 | 31.9 | 21.6 | 42.7 | 70.6 |
| IV期 | 90 | 79 | (1-3) | 97.8 | 10.4 | 5.1 | 17.9 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 223 | 99 | 対象数 | | 37 | 285 |
| % | 69.3 | 30.7 | % | | 11.5 | 88.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 107 | 129 | 55 | |
| % | | 7.5 | 33.2 | 40.1 | 17.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 135 | 22 | 74 | 90 | (1-3) | 0 |
| % | 41.9 | 6.8 | 23.0 | 28.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 149 | 173 | 164 | (7-9) | 0 | |
| % | 46.3 | 53.7 | 50.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 28 | 47 | 122 | 125 | | |
| % | 8.7 | 14.6 | 37.9 | 38.8 | | |

190 大阪医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 233 | 32 | (4-6) | 97.9 | 86.1 | 81.0 | 90.0 | 59.8 |
| I期 | 63 | (4-6) | (1-3) | 98.4 | 93.6 | 83.8 | 97.6 | 58.2 |
| II期 | 125 | 11 | (1-3) | 97.6 | 91.1 | 84.6 | 95.0 | 59.5 |
| III期 | 33 | 11 | (1-3) | 97.0 | 66.0 | 47.0 | 79.5 | 58.9 |
| IV期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 54.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 233 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 59 | 48 | 69 | 42 | 15 | | |
| % | 25.3 | 20.6 | 29.6 | 18.0 | 6.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 63 | 125 | 33 | 12 | 0 | 0 | |
| % | 27.0 | 53.6 | 14.2 | 5.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 209 | 204 | (4-6) | 0 | | |
| % | 10.3 | 89.7 | 87.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | 11 | 23 | 157 | | | |
| % | 18.0 | 4.7 | 9.9 | 67.4 | | | |

191 大阪市立大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

地域特性として転居される患者が多く、治療後の状況把握が難しい症例が多い。

191 大阪市立大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 497 | 175 | 13 | 97.4 | 64.4 | 60.0 | 68.5 | 67.8 |
| I期 | 346 | 78 | 10 | 97.1 | 77.2 | 72.4 | 81.3 | 68.3 |
| II期 | 39 | 14 | (1-3) | 97.4 | 63.6 | 46.4 | 76.6 | 67.7 |
| III期 | 37 | 19 | 0 | 100.0 | 48.7 | 32.0 | 63.4 | 66.4 |
| IV期 | 67 | 63 | (1-3) | 98.5 | 4.6 | 1.2 | 11.5 | 66.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 351 | 146 | | | | | |
| % | 70.6 | 29.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 34 | 60 | 170 | 163 | 70 | | |
| % | 6.8 | 12.1 | 34.2 | 32.8 | 14.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 346 | 39 | 37 | 67 | 0 | (7-9) | |
| % | 69.6 | 7.8 | 7.4 | 13.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 439 | 390 | 26 | 23 | | |
| % | 11.7 | 88.3 | 78.5 | 5.2 | 4.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 60 | 158 | 271 | | | |
| % | | 12.1 | 31.8 | 54.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 305 | 92 | 16 | 94.8 | 69.2 | 63.6 | 74.1 | 66.6 |
| I期 | 87 | 10 | (4-6) | 94.3 | 88.2 | 79.1 | 93.5 | 66.3 |
| II期 | 83 | 14 | (1-3) | 97.6 | 83.0 | 73.0 | 89.6 | 69.4 |
| III期 | 74 | 26 | (1-3) | 95.9 | 64.4 | 52.3 | 74.2 | 62.6 |
| IV期 | 48 | 40 | (1-3) | 95.8 | 13.9 | 5.8 | 25.6 | 64.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 174 | 131 | | | | | |
| % | 57.0 | 43.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 48 | 95 | 95 | 40 | | |
| % | 8.9 | 15.7 | 31.1 | 31.1 | 13.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 87 | 83 | 74 | 48 | (1-3) | 11 | |
| % | 28.5 | 27.2 | 24.3 | 15.7 | | 3.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 281 | 221 | 40 | 20 | | |
| % | 7.9 | 92.1 | 72.5 | 13.1 | 6.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 29 | 91 | 177 | | | |
| % | | 9.5 | 29.8 | 58.0 | | | |

191 大阪市立大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 347 | 194 | 16 | 95.4 | 42.2 | 36.8 | 47.4 | 69.7 |
| I期 | 179 | 86 | 10 | 94.4 | 50.1 | 42.4 | 57.3 | 70.2 |
| II期 | 104 | 54 | (4-6) | 96.2 | 46.0 | 36.1 | 55.4 | 69.5 |
| III期 | 52 | 42 | (1-3) | 96.2 | 16.5 | 7.8 | 28.0 | 68.4 |
| IV期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 63.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | 240 | 107 | | | | | |
| % | 69.2 | 30.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 35 | 105 | 161 | 36 | | |
| % | 2.9 | 10.1 | 30.3 | 46.4 | 10.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 179 | 104 | 52 | 12 | 0 | 0 |
| | % | 51.6 | 30.0 | 15.0 | 3.5 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 74 | 142 | 84 | 46 | 0 | 0 |
| | % | 21.3 | 40.9 | 24.2 | 13.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 220 | 127 | 103 | (7-9) | 15 | | |
| % | 63.4 | 36.6 | 29.7 | | 4.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 282 | 54 | | | |
| % | | 2.9 | 81.3 | 15.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 478 | 337 | 16 | 96.7 | 28.0 | 24.0 | 32.2 | 68.5 |
| I期 | 135 | 47 | (4-6) | 97.0 | 64.8 | 56.0 | 72.2 | 66.1 |
| II期 | 32 | 21 | (1-3) | 93.8 | 32.0 | 16.6 | 48.5 | 70.3 |
| III期 | 161 | 130 | (4-6) | 96.3 | 16.9 | 11.5 | 23.2 | 66.8 |
| IV期 | 144 | 135 | (1-3) | 97.9 | 4.3 | 1.8 | 8.6 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 340 | 138 | 対象数 | | 58 | 420 |
| % | 71.1 | 28.9 | % | | 12.1 | 87.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 49 | 195 | 185 | 38 | |
| % | 2.3 | 10.3 | 40.8 | 38.7 | 7.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 135 | 32 | 161 | 144 | (1-3) | (1-3) |
| % | 28.2 | 6.7 | 33.7 | 30.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 294 | 184 | 147 | 13 | 24 | |
| % | 61.5 | 38.5 | 30.8 | 2.7 | 5.0 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 48 | 197 | 229 | | |
| % | | 10.0 | 41.2 | 47.9 | | |

191 大阪市立大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 294 | 35 | 13 | 95.6 | 87.9 | 83.6 | 91.2 | 61.7 |
| I期 | 121 | (7-9) | (4-6) | 95.0 | 92.5 | 86.1 | 96.0 | 62.3 |
| II期 | 110 | (7-9) | (4-6) | 96.4 | 91.7 | 84.6 | 95.6 | 59.3 |
| III期 | 50 | 13 | (1-3) | 94.0 | 73.2 | 58.3 | 83.5 | 62.3 |
| IV期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 58.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 294 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 64 | 60 | 80 | 68 | 22 | | |
| % | 21.8 | 20.4 | 27.2 | 23.1 | 7.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | 110 | 50 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 41.2 | 37.4 | 17.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 259 | 197 | 22 | 40 | | |
| % | 11.9 | 88.1 | 67.0 | 7.5 | 13.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | 12 | 47 | 199 | | | |
| % | 12.2 | 4.1 | 16.0 | 67.7 | | | |

192 国立病院機構大阪医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

192 国立病院機構大阪医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 347 | 143 | (1-3) | 99.4 | 58.8 | 53.4 | 63.8 | 68.7 |
| I期 | 196 | 39 | (1-3) | 99.5 | 80.1 | 73.8 | 85.0 | 70.3 |
| II期 | 28 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.1 |
| III期 | 33 | 19 | 0 | 100.0 | 42.4 | 25.6 | 58.3 | 71.8 |
| IV期 | 86 | 75 | 0 | 100.0 | 12.8 | 6.8 | 20.8 | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 243 | 104 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 41 | 113 | 132 | 46 | | |
| % | 4.3 | 11.8 | 32.6 | 38.0 | 13.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 196 | 28 | 33 | 86 | 0 | (4-6) | |
| % | 56.5 | 8.1 | 9.5 | 24.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 294 | 280 | 14 | 0 | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 80.7 | 4.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 71 | 45 | 140 | 91 | | | |
| % | 20.5 | 13.0 | 40.3 | 26.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 351 | 110 | (4-6) | 98.6 | 68.4 | 63.2 | 73.0 | 67.7 |
| I期 | 105 | 16 | (1-3) | 98.1 | 84.6 | 76.2 | 90.3 | 66.9 |
| II期 | 78 | 16 | (1-3) | 98.7 | 79.2 | 68.3 | 86.7 | 67.7 |
| III期 | 98 | 26 | 0 | 100.0 | 73.5 | 63.5 | 81.1 | 67.6 |
| IV期 | 68 | 52 | (1-3) | 97.1 | 21.9 | 12.9 | 32.5 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 205 | 146 | | | | | |
| % | 58.4 | 41.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 46 | 123 | 125 | 38 | | |
| % | 5.4 | 13.1 | 35.0 | 35.6 | 10.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 105 | 78 | 98 | 68 | 0 | (1-3) | |
| % | 29.9 | 22.2 | 27.9 | 19.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 316 | 301 | 15 | 0 | | |
| % | 10.0 | 90.0 | 85.8 | 4.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 95 | 53 | 105 | 98 | | | |
| % | 27.1 | 15.1 | 29.9 | 27.9 | | | |

192 国立病院機構大阪医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 73 | (1-3) | 98.6 | 47.1 | 38.6 | 55.2 | 68.2 |
| I期 | 55 | 19 | (1-3) | 98.2 | 64.9 | 50.7 | 76.0 | 67.9 |
| II期 | 44 | 21 | (1-3) | 97.7 | 51.7 | 36.1 | 65.3 | 70.0 |
| III期 | 35 | 28 | 0 | 100.0 | 20.0 | 8.8 | 34.4 | 69.9 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 64.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|
| 対象数 | 98 | 41 | | | | | |
| % | 70.5 | 29.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 52 | 44 | 19 | | |
| % | | 12.9 | 37.4 | 31.7 | 13.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 55 | 44 | 35 | (4-6) | 0 | 0 |
| | % | 39.6 | 31.7 | 25.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 45 | 41 | 32 | 21 | 0 | 0 |
| | % | 32.4 | 29.5 | 23.0 | 15.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 94 | 45 | 43 | (1-3) | 0 | | |
| % | 67.6 | 32.4 | 30.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 99 | 34 | | | |
| % | | | 71.2 | 24.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 84 | 0 | 100.0 | 42.5 | 34.4 | 50.3 | 69.0 |
| I期 | 59 | 13 | 0 | 100.0 | 78.0 | 65.1 | 86.6 | 69.8 |
| II期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 76.2 |
| III期 | 31 | 24 | 0 | 100.0 | 22.6 | 10.0 | 38.3 | 72.1 |
| IV期 | 43 | 42 | 0 | 100.0 | 2.3 | 0.2 | 10.6 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 86 | 60 | 対象数 | 15 | 131 | |
| % | 58.9 | 41.1 | % | 10.3 | 89.7 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 52 | 63 | 15 | |
| % | | | 35.6 | 43.2 | 10.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 59 | 13 | 31 | 43 | 0 | 0 |
| % | 40.4 | 8.9 | 21.2 | 29.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 74 | 72 | 71 | 0 | (1-3) | |
| % | 50.7 | 49.3 | 48.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 25 | 74 | 42 | | |
| % | | 17.1 | 50.7 | 28.8 | | |

192 国立病院機構大阪医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 375 | 24 | (4-6) | 98.7 | 93.6 | 90.6 | 95.6 | 57.5 |
| I期 | 150 | (1-3) | (1-3) | 98.7 | 98.0 | 93.9 | 99.4 | 59.3 |
| II期 | 195 | 13 | (1-3) | 98.5 | 93.3 | 88.8 | 96.1 | 56.2 |
| III期 | 18 | (1-3) | 0 | | | | | 57.1 |
| IV期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 61.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 375 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 126 | 71 | 103 | 57 | 18 | | |
| % | 33.6 | 18.9 | 27.5 | 15.2 | 4.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 150 | 195 | 18 | 11 | 0 | (1-3) | |
| % | 40.0 | 52.0 | 4.8 | 2.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 362 | 350 | 12 | 0 | | |
| % | 3.5 | 96.5 | 93.3 | 3.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 131 | 41 | 42 | 161 | | | |
| % | 34.9 | 10.9 | 11.2 | 42.9 | | | |

193

八尾市立病院

2010-2011年2力年

コメント:

総評

この治療成績は約10年前の治療によるものです。現在行われている最新の治療法を反映したものではありません。また、各施設により患者背景が異なると考えられるため、施設間で単純に治療成績を比較できるものではありません。

肺

八尾市立病院に呼吸器外科が開設されたのは2011年4月3日です。それまでは、腫瘍内科で化学療法だけ行われていました。したがって、2010から2011年の肺癌5年生存率は手術不能進行がん化学療法が大部分を占め、その成績は不良です。

呼吸器外科開設後は他院に手術を紹介した手術症例はゼロで、早期から進行肺がんまで全て当院で手術してまいりました。その結果2011年以降の集計で、IV期も含めた手術症例全体の5年生存率は70パーセントとなっています。

193 八尾市立病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 180 | 82 | (7-9) | 96.1 | 53.7 | 46.0 | 60.7 | 70.3 |
| I期 | 87 | 12 | (4-6) | 95.4 | 85.9 | 76.5 | 91.8 | 69.5 |
| II期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | 18 | 11 | 0 | | | | | 70.2 |
| IV期 | 53 | 46 | (1-3) | 94.3 | 8.9 | 3.0 | 19.1 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 113 | 67 | | | | | |
| % | 62.8 | 37.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 15 | 56 | 69 | 31 | | |
| % | | 8.3 | 31.1 | 38.3 | 17.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 87 | 15 | 18 | 53 | (7-9) | 0 | |
| % | 48.3 | 8.3 | 10.0 | 29.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 122 | 96 | (7-9) | 17 | | |
| % | 32.2 | 67.8 | 53.3 | | 9.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 21 | 145 | | | |
| % | | | 11.7 | 80.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 223 | 78 | (4-6) | 97.8 | 64.8 | 58.1 | 70.7 | 68.7 |
| I期 | 38 | (1-3) | (1-3) | 92.1 | 94.6 | 80.0 | 98.6 | 68.9 |
| II期 | 68 | 10 | (1-3) | 98.5 | 85.1 | 74.1 | 91.7 | 67.5 |
| III期 | 67 | 23 | (1-3) | 98.5 | 65.3 | 52.5 | 75.4 | 67.8 |
| IV期 | 43 | 38 | 0 | 100.0 | 11.6 | 4.3 | 23.1 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 112 | 111 | | | | | |
| % | 50.2 | 49.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 20 | 76 | 87 | 24 | | |
| % | 7.2 | 9.0 | 34.1 | 39.0 | 10.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 68 | 67 | 43 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 17.0 | 30.5 | 30.0 | 19.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 191 | 154 | 11 | 26 | | |
| % | 14.3 | 85.7 | 69.1 | 4.9 | 11.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 22 | 187 | | | |
| % | | | 9.9 | 83.9 | | | |

193 八尾市立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 59 | 0 | 100.0 | 34.4 | 24.8 | 44.2 | 72.4 |
| I期 | 27 | 11 | 0 | | | | | 74.1 |
| II期 | 27 | 17 | 0 | | | | | 74.4 |
| III期 | 21 | 17 | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 68 | 22 | | | | | |
| % | 75.6 | 24.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 30 | 43 | 13 | | |
| % | | | 33.3 | 47.8 | 14.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 27 | 27 | 21 | 10 | (4-6) | 0 |
| | % | 30.0 | 30.0 | 23.3 | 11.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 26 | 21 | 17 | (4-6) | 0 |
| | % | 23.3 | 28.9 | 23.3 | 18.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 63 | 27 | 21 | 0 | (4-6) | | |
| % | 70.0 | 30.0 | 23.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 24 | 66 | | | |
| % | | | 26.7 | 73.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 64 | 44 | (1-3) | 98.4 | 31.0 | 20.2 | 42.5 | 71.4 |
| I期 | 21 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.7 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 59.0 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.7 |
| IV期 | 22 | 22 | 0 | | | | | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 43 | 21 | | (7-9) | 57 | |
| % | 67.2 | 32.8 | | | 89.1 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 14 | 30 | 12 | |
| % | | | 21.9 | 46.9 | 18.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 21 | (4-6) | (7-9) | 22 | (7-9) | 0 |
| % | 32.8 | | | 34.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 37 | 27 | 20 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 57.8 | 42.2 | 31.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 15 | 46 | | |
| % | | | 23.4 | 71.9 | | |

193 八尾市立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 218 | 31 | (4-6) | 97.7 | 85.6 | 80.1 | 89.6 | 60.7 |
| I期 | 99 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 91.8 | 84.4 | 95.8 | 58.7 |
| II期 | 94 | 13 | (1-3) | 96.8 | 85.9 | 76.9 | 91.5 | 62.7 |
| III期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 61.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 51.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 218 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 54 | 40 | 65 | 41 | 18 | | |
| % | 24.8 | 18.3 | 29.8 | 18.8 | 8.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 99 | 94 | 15 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 45.4 | 43.1 | 6.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 182 | 149 | 14 | 19 | | |
| % | 16.5 | 83.5 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | (4-6) | (4-6) | 171 | | | |
| % | 17.4 | | | 78.4 | | | |

194 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

194 地方独立行政法人 市立吹田市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 54 | 24 | (4-6) | 92.6 | 55.2 | 41.0 | 67.3 | 72.1 |
| I期 | 32 | (7-9) | (4-6) | 87.5 | 74.5 | 55.5 | 86.4 | 71.7 |
| II期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 78.8 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 38 | 16 | | | | | |
| % | 70.4 | 29.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 15 | 16 | 16 | | |
| % | | | 27.8 | 29.6 | 29.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | (4-6) | (4-6) | 14 | 0 | 0 | |
| % | 59.3 | | | 25.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 43 | 43 | 0 | 0 | | |
| % | 20.4 | 79.6 | 79.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 11 | 35 | | | |
| % | | | 20.4 | 64.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 87 | 30 | (7-9) | 89.7 | 63.2 | 51.7 | 72.7 | 70.7 |
| I期 | 25 | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.4 |
| II期 | 27 | 10 | (4-6) | | | | | 71.4 |
| III期 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 15 | 11 | (1-3) | | | | | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 59 | 28 | | | | | |
| % | 67.8 | 32.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 24 | 32 | 19 | | |
| % | | | 27.6 | 36.8 | 21.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 27 | 20 | 15 | 0 | 0 | |
| % | 28.7 | 31.0 | 23.0 | 17.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 81 | 79 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 93.1 | 90.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | 17 | 53 | | | |
| % | 11.5 | | 19.5 | 60.9 | | | |

194 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 15 | 11 | (1-3) | | | | | 74.9 |
| I期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 77.4 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.4 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | | | | 83.3 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 11 | (4-6) | | | |
| % | | | 73.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 67 | 41 | (4-6) | 91.0 | 34.8 | 23.1 | 46.6 | 70.7 |
| I期 | 24 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.2 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 69.2 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 67.7 |
| IV期 | 27 | 22 | (4-6) | | | | | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 41 | 26 | 対象数 | | (7-9) | 60 |
| % | 61.2 | 38.8 | % | | | 89.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 21 | 26 | 11 | |
| % | | | 31.3 | 38.8 | 16.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 24 | (4-6) | 10 | 27 | 0 | 0 |
| % | 35.8 | | 14.9 | 40.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 31 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| % | 46.3 | 53.7 | 53.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 31 | 22 | | |
| % | | | 46.3 | 32.8 | | |

194 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 57 | (7-9) | (4-6) | 93.0 | 85.4 | 72.8 | 92.4 | 60.8 |
| I期 | 34 | (1-3) | (1-3) | 91.2 | 96.9 | 79.8 | 99.6 | 57.2 |
| II期 | 19 | (4-6) | (1-3) | | | | | 66.6 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 57 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 13 | (7-9) | 12 | (7-9) | | |
| % | 28.1 | 22.8 | | 21.1 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | 19 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 59.6 | 33.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 52 | 52 | 0 | 0 | | |
| % | | 91.2 | 91.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 42 | | | |
| % | | | | 73.7 | | | |

195 **ベルランド総合病院**
 2011年のみ
 都道府県推薦病院

コメント:

特になし

195 ベルランド総合病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 135 | 63 | 14 | 89.6 | 50.5 | 41.5 | 58.9 | 71.9 |
| I期 | 74 | 20 | (7-9) | 87.8 | 70.9 | 58.6 | 80.2 | 71.3 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 69.4 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 74.0 |
| IV期 | 39 | 34 | (1-3) | 97.4 | 10.6 | 3.4 | 22.6 | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 101 | 34 | | | | | |
| % | 74.8 | 25.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 34 | 55 | 34 | | |
| % | | | 25.2 | 40.7 | 25.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 74 | (7-9) | (7-9) | 39 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 54.8 | | | 28.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 104 | 91 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 23.0 | 77.0 | 67.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 19 | 35 | 78 | | | |
| % | | 14.1 | 25.9 | 57.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 161 | 62 | (7-9) | 94.4 | 60.4 | 52.2 | 67.6 | 69.5 |
| I期 | 46 | (7-9) | (1-3) | 95.7 | 79.8 | 64.8 | 89.0 | 69.4 |
| II期 | 29 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.3 |
| III期 | 43 | 13 | (1-3) | 95.3 | 68.4 | 51.8 | 80.3 | 68.5 |
| IV期 | 38 | 29 | (1-3) | 94.7 | 22.8 | 10.9 | 37.3 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 103 | 58 | | | | | |
| % | 64.0 | 36.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 28 | 50 | 54 | 26 | | |
| % | | 17.4 | 31.1 | 33.5 | 16.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | 29 | 43 | 38 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 28.6 | 18.0 | 26.7 | 23.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 155 | 136 | 13 | (4-6) | | |
| % | | 96.3 | 84.5 | 8.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 32 | 113 | | | |
| % | | 6.2 | 19.9 | 70.2 | | | |

195 ベルランド総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 51 | 36 | (1-3) | 96.1 | 27.1 | 15.6 | 40.0 | 74.3 |
| I期 | 21 | 13 | (1-3) | | | | | 75.6 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 72.6 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 28 | 23 | | | | | |
| % | 54.9 | 45.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 17 | 20 | | |
| % | | | | 33.3 | 39.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 21 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 0 |
| | % | 41.2 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 14 | (1-3) | 10 | 15 | 0 |
| | % | 19.6 | 27.5 | | 19.6 | 29.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 | | |
| % | 76.5 | 23.5 | 23.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 29 | 21 | | | |
| % | | | 56.9 | 41.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 120 | 89 | (1-3) | 98.3 | 24.7 | 17.3 | 32.7 | 73.9 |
| I期 | 33 | 16 | 0 | 100.0 | 51.5 | 33.5 | 66.9 | 74.4 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 70.9 |
| III期 | 35 | 31 | 0 | 100.0 | 11.4 | 3.6 | 24.2 | 71.0 |
| IV期 | 29 | 27 | (1-3) | | | | | 75.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 94 | 26 | 対象数 | 13 | 107 | |
| % | 78.3 | 21.7 | % | 10.8 | 89.2 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 29 | 42 | 38 | |
| % | | | 24.2 | 35.0 | 31.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 33 | 11 | 35 | 29 | 10 | (1-3) |
| % | 27.5 | 9.2 | 29.2 | 24.2 | 8.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 78 | 42 | 40 | 0 | (1-3) | |
| % | 65.0 | 35.0 | 33.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 41 | 70 | | |
| % | | | 34.2 | 58.3 | | |

195 ベルランド総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 66 | 11 | (1-3) | 98.5 | 83.3 | 71.8 | 90.4 | 61.0 |
| I期 | 32 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.9 | 79.8 | 99.6 | 59.6 |
| II期 | 24 | (4-6) | (1-3) | | | | | 62.9 |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 54.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 63.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 66 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 15 | 20 | 10 | (4-6) | | |
| % | 22.7 | 22.7 | 30.3 | 15.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | 24 | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 48.5 | 36.4 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 59 | 58 | 0 | (1-3) | | |
| % | | 89.4 | 87.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (4-6) | (4-6) | 43 | | | |
| % | 18.2 | | | 65.2 | | | |

196 兵庫県立がんセンター
2010-2011年2カ年

コメント:

病期判明率、生存状況把握割合は高く、質の高いがん登録制度管理が行われている。また、各疾患における実測生存率は全国平均を上回る良好な治療成績であった。

196 兵庫県立がんセンター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 706 | 222 | (4-6) | 99.2 | 68.4 | 64.8 | 71.7 | 67.3 |
| I期 | 454 | 64 | (1-3) | 99.3 | 85.9 | 82.3 | 88.8 | 67.1 |
| II期 | 54 | 15 | 0 | 100.0 | 72.2 | 58.2 | 82.2 | 64.9 |
| III期 | 46 | 20 | 0 | 100.0 | 56.5 | 41.1 | 69.4 | 66.1 |
| IV期 | 140 | 122 | (1-3) | 97.9 | 11.0 | 6.5 | 16.9 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 496 | 210 | | | | | |
| % | 70.3 | 29.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 41 | 100 | 246 | 251 | 68 | | |
| % | 5.8 | 14.2 | 34.8 | 35.6 | 9.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 454 | 54 | 46 | 140 | 0 | 12 | |
| % | 64.3 | 7.6 | 6.5 | 19.8 | | 1.7 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 108 | 598 | 565 | 32 | (1-3) | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 80.0 | 4.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 81 | 193 | 403 | | | |
| % | 4.1 | 11.5 | 27.3 | 57.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 403 | 141 | 0 | 100.0 | 65.0 | 60.1 | 69.5 | 65.4 |
| I期 | 94 | 14 | 0 | 100.0 | 85.1 | 76.2 | 90.9 | 67.0 |
| II期 | 95 | 11 | 0 | 100.0 | 88.4 | 80.1 | 93.4 | 65.8 |
| III期 | 106 | 28 | 0 | 100.0 | 73.6 | 64.1 | 80.9 | 65.8 |
| IV期 | 102 | 88 | 0 | 100.0 | 13.7 | 7.9 | 21.1 | 63.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 219 | 184 | | | | | |
| % | 54.3 | 45.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 78 | 137 | 116 | 40 | | |
| % | 7.9 | 19.4 | 34.0 | 28.8 | 9.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 94 | 95 | 106 | 102 | 0 | (4-6) | |
| % | 23.3 | 23.6 | 26.3 | 25.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 352 | 314 | 37 | (1-3) | | |
| % | 12.7 | 87.3 | 77.9 | 9.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 51 | 85 | 252 | | | |
| % | 3.7 | 12.7 | 21.1 | 62.5 | | | |

196 兵庫県立がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 199 | 118 | 0 | 100.0 | 40.7 | 33.9 | 47.4 | 70.1 |
| I期 | 81 | 27 | 0 | 100.0 | 66.7 | 55.3 | 75.8 | 69.4 |
| II期 | 77 | 52 | 0 | 100.0 | 32.5 | 22.4 | 43.0 | 70.3 |
| III期 | 33 | 31 | 0 | 100.0 | 6.1 | 1.1 | 17.6 | 73.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 57.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 130 | 69 | | | | | | |
| % | 65.3 | 34.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 11 | 16 | 51 | 88 | 33 | | | |
| % | 5.5 | 8.0 | 25.6 | 44.2 | 16.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 81 | 77 | 33 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 40.7 | 38.7 | 16.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 39 | 89 | 47 | 22 | 0 | 0 | |
| | % | 19.6 | 44.7 | 23.6 | 11.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 125 | 74 | 65 | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | 62.8 | 37.2 | 32.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 130 | 68 | | | | |
| % | | | 65.3 | 34.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 789 | 449 | (4-6) | 99.5 | 42.9 | 39.4 | 46.3 | 67.6 |
| I期 | 328 | 91 | (1-3) | 99.7 | 72.2 | 67.0 | 76.7 | 69.5 |
| II期 | 66 | 34 | 0 | 100.0 | 48.5 | 36.0 | 59.8 | 67.5 |
| III期 | 176 | 126 | (1-3) | 99.4 | 28.0 | 21.6 | 34.8 | 67.7 |
| IV期 | 213 | 197 | (1-3) | 99.1 | 6.7 | 3.8 | 10.5 | 62.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 556 | 233 | 対象数 | | 66 | 723 | |
| % | 70.5 | 29.5 | % | | 8.4 | 91.6 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 38 | 104 | 285 | 287 | 75 | | |
| % | 4.8 | 13.2 | 36.1 | 36.4 | 9.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 328 | 66 | 176 | 213 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 41.6 | 8.4 | 22.3 | 27.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 348 | 441 | 422 | 18 | (1-3) | | |
| % | 44.1 | 55.9 | 53.5 | 2.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | 113 | 270 | 374 | | | |
| % | 4.1 | 14.3 | 34.2 | 47.4 | | | |

196 兵庫県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 360 | 40 | (1-3) | 99.2 | 88.9 | 85.1 | 91.7 | 57.9 |
| I期 | 150 | (7-9) | 0 | 100.0 | 94.0 | 88.8 | 96.8 | 58.6 |
| II期 | 149 | 14 | (1-3) | 99.3 | 90.6 | 84.6 | 94.3 | 60.0 |
| III期 | 39 | (7-9) | (1-3) | 97.4 | 81.8 | 65.5 | 90.9 | 51.7 |
| IV期 | 20 | 10 | (1-3) | | | | | 60.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 360 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 109 | 85 | 95 | 50 | 21 | | |
| % | 30.3 | 23.6 | 26.4 | 13.9 | 5.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 150 | 149 | 39 | 20 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 41.7 | 41.4 | 10.8 | 5.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 333 | 317 | 12 | (4-6) | | |
| % | 7.5 | 92.5 | 88.1 | 3.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 59 | 13 | 31 | 257 | | | |
| % | 16.4 | 3.6 | 8.6 | 71.4 | | | |

197 神戸大学医学部附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

197 神戸大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 545 | 153 | 11 | 98.0 | 71.6 | 67.6 | 75.2 | 70.3 |
| I期 | 460 | 95 | 11 | 97.6 | 79.1 | 75.0 | 82.5 | 70.8 |
| II期 | 25 | 11 | 0 | | | | | 68.6 |
| III期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |
| IV期 | 40 | 37 | 0 | 100.0 | 7.5 | 1.9 | 18.2 | 62.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 422 | 123 | | | | | |
| % | 77.4 | 22.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 48 | 165 | 216 | 95 | | |
| % | 3.9 | 8.8 | 30.3 | 39.6 | 17.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 460 | 25 | 11 | 40 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 84.4 | 4.6 | 2.0 | 7.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 56 | 489 | 402 | 35 | 52 | | |
| % | 10.3 | 89.7 | 73.8 | 6.4 | 9.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 80 | 261 | 193 | | | |
| % | 2.0 | 14.7 | 47.9 | 35.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 244 | 84 | (1-3) | 99.6 | 65.5 | 59.1 | 71.1 | 66.8 |
| I期 | 86 | 16 | (1-3) | 98.8 | 81.2 | 71.2 | 88.0 | 66.4 |
| II期 | 41 | (7-9) | 0 | 100.0 | 78.1 | 62.1 | 87.9 | 68.4 |
| III期 | 45 | 15 | 0 | 100.0 | 66.7 | 50.9 | 78.4 | 73.2 |
| IV期 | 53 | 41 | 0 | 100.0 | 22.6 | 12.5 | 34.6 | 64.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 134 | 110 | | | | | |
| % | 54.9 | 45.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 34 | 82 | 73 | 34 | | |
| % | 8.6 | 13.9 | 33.6 | 29.9 | 13.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 86 | 41 | 45 | 53 | (1-3) | 16 | |
| % | 35.2 | 16.8 | 18.4 | 21.7 | | 6.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 215 | 151 | 17 | 47 | | |
| % | 11.9 | 88.1 | 61.9 | 7.0 | 19.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 39 | 97 | 107 | | | |
| % | | 16.0 | 39.8 | 43.9 | | | |

197 神戸大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 279 | 179 | (1-3) | 99.3 | 35.8 | 30.2 | 41.4 | 68.8 |
| I期 | 97 | 40 | (1-3) | 99.0 | 58.7 | 48.3 | 67.8 | 68.9 |
| II期 | 70 | 40 | (1-3) | 98.6 | 42.7 | 31.0 | 53.9 | 74.2 |
| III期 | 92 | 79 | 0 | 100.0 | 14.1 | 8.0 | 22.0 | 66.7 |
| IV期 | 16 | 16 | 0 | | | | | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 対象数 | 197 | 82 | | | | | | |
| % | 70.6 | 29.4 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 11 | 34 | 88 | 112 | 34 | | | |
| % | 3.9 | 12.2 | 31.5 | 40.1 | 12.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 97 | 70 | 92 | 16 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 34.8 | 25.1 | 33.0 | 5.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 42 | 83 | 74 | 70 | (4-6) | (1-3) | |
| | % | 15.1 | 29.7 | 26.5 | 25.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 171 | 108 | 41 | 23 | 44 | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | 14.7 | 8.2 | 15.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 185 | 79 | | | | |
| % | | 5.0 | 66.3 | 28.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 366 | 220 | (4-6) | 98.9 | 39.4 | 34.4 | 44.4 | 68.4 |
| I期 | 145 | 39 | (1-3) | 99.3 | 72.9 | 64.9 | 79.4 | 69.3 |
| II期 | 27 | 15 | (1-3) | | | | | 70.2 |
| III期 | 81 | 64 | (1-3) | 97.5 | 19.9 | 12.0 | 29.3 | 68.7 |
| IV期 | 102 | 95 | 0 | 100.0 | 6.9 | 3.0 | 12.9 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 260 | 106 | 対象数 | | 35 | 331 |
| % | 71.0 | 29.0 | % | | 9.6 | 90.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 13 | 46 | 140 | 120 | 47 | |
| % | 3.6 | 12.6 | 38.3 | 32.8 | 12.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 145 | 27 | 81 | 102 | (7-9) | (4-6) |
| % | 39.6 | 7.4 | 22.1 | 27.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 197 | 169 | 107 | (1-3) | 60 | |
| % | 53.8 | 46.2 | 29.2 | | 16.4 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 65 | 152 | 145 | | |
| % | | 17.8 | 41.5 | 39.6 | | |

197 神戸大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 99 | 11 | (1-3) | 98.0 | 88.8 | 80.7 | 93.6 | 61.2 |
| I期 | 39 | (1-3) | 0 | 100.0 | 92.3 | 78.0 | 97.5 | 60.4 |
| II期 | 42 | (1-3) | (1-3) | 95.2 | 95.1 | 81.8 | 98.8 | 59.0 |
| III期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 99 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 19 | 29 | 20 | (7-9) | | |
| % | 23.2 | 19.2 | 29.3 | 20.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 42 | 10 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 39.4 | 42.4 | 10.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 84 | 36 | (1-3) | 46 | | |
| % | 15.2 | 84.8 | 36.4 | | 46.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 10 | 26 | 54 | | | |
| % | | 10.1 | 26.3 | 54.5 | | | |

198 神戸市立医療センター中央市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

治療方法だけでなく、患者背景も影響することを留意されたい。

ここでいう患者背景とは、年齢や心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病などの合併症に加えて、がんのタイプも含まれる。特に肝臓がんにおいては肝硬変合併症例が多く、肝機能によって患者の予後は大きく異なるが、本集計結果においては肝機能が考慮されていない。また、健康診断による発見割合が低く、他疾患経過観察中に発見されるものが多い場合は、同じ病期であっても合併症のため治療成績が悪くなる傾向にある。

同じステージでも予後不良のタイプがあり、それらの症例がどの程度含まれているかによって生存率は大きくかわってくる。本集計結果においては、それら背景因子が不明であり、また癌以外の他病死も癌による死亡と同等にカウントされており、あくまで参考程度にみていただきたい。

198 神戸市立医療センター中央市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 435 | 151 | 13 | 97.0 | 65.0 | 60.3 | 69.3 | 69.1 |
| I期 | 304 | 58 | 11 | 96.4 | 80.7 | 75.8 | 84.7 | 69.6 |
| II期 | 29 | 14 | (1-3) | | | | | 64.5 |
| III期 | 30 | 18 | 0 | 100.0 | 40.0 | 22.8 | 56.7 | 67.1 |
| IV期 | 69 | 61 | (1-3) | 98.6 | 11.1 | 5.0 | 19.9 | 64.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 327 | 108 | | | | | |
| % | 75.2 | 24.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 44 | 147 | 158 | 68 | | |
| % | 4.1 | 10.1 | 33.8 | 36.3 | 15.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 304 | 29 | 30 | 69 | 0 | (1-3) | |
| % | 69.9 | 6.7 | 6.9 | 15.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 388 | 358 | 20 | 10 | | |
| % | 10.8 | 89.2 | 82.3 | 4.6 | 2.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 52 | 210 | 158 | | | |
| % | 3.4 | 12.0 | 48.3 | 36.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 349 | 123 | (4-6) | 98.6 | 64.7 | 59.4 | 69.5 | 69.4 |
| I期 | 91 | 12 | (1-3) | 97.8 | 86.7 | 77.8 | 92.2 | 69.5 |
| II期 | 93 | 30 | (1-3) | 96.8 | 67.7 | 57.2 | 76.2 | 71.0 |
| III期 | 91 | 26 | 0 | 100.0 | 71.4 | 61.0 | 79.6 | 68.8 |
| IV期 | 68 | 55 | 0 | 100.0 | 19.1 | 10.8 | 29.2 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 203 | 146 | | | | | |
| % | 58.2 | 41.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 44 | 110 | 103 | 74 | | |
| % | 5.2 | 12.6 | 31.5 | 29.5 | 21.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 91 | 93 | 91 | 68 | 0 | (4-6) | |
| % | 26.1 | 26.6 | 26.1 | 19.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 331 | 282 | 35 | 14 | | |
| % | 5.2 | 94.8 | 80.8 | 10.0 | 4.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 24 | 123 | 181 | | | |
| % | 6.0 | 6.9 | 35.2 | 51.9 | | | |

198 神戸市立医療センター中央市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 168 | 97 | (1-3) | 99.4 | 42.0 | 34.5 | 49.4 | 69.3 |
| I期 | 69 | 26 | 0 | 100.0 | 62.3 | 49.8 | 72.6 | 69.0 |
| II期 | 51 | 28 | (1-3) | 98.0 | 44.1 | 30.2 | 57.2 | 70.7 |
| III期 | 35 | 32 | 0 | 100.0 | 8.6 | 2.2 | 20.6 | 73.5 |
| IV期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 80.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|-------|
| 対象数 | 110 | 58 | | | | | |
| % | 65.5 | 34.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 19 | 50 | 64 | 26 | | |
| % | | 11.3 | 29.8 | 38.1 | 15.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 69 | 51 | 35 | 11 | 0 | (1-3) |
| | % | 41.1 | 30.4 | 20.8 | 6.5 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 45 | 57 | 41 | 22 | 0 | (1-3) |
| | % | 26.8 | 33.9 | 24.4 | 13.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 128 | 40 | 35 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 76.2 | 23.8 | 20.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 11 | 140 | 17 | | | |
| % | | 6.5 | 83.3 | 10.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 413 | 216 | 11 | 97.3 | 47.3 | 42.4 | 52.1 | 69.1 |
| I期 | 159 | 19 | (4-6) | 96.2 | 88.0 | 81.8 | 92.2 | 69.8 |
| II期 | 38 | 19 | (1-3) | 94.7 | 49.1 | 32.3 | 63.9 | 70.6 |
| III期 | 90 | 67 | (1-3) | 98.9 | 24.8 | 16.4 | 34.1 | 70.5 |
| IV期 | 120 | 109 | (1-3) | 98.3 | 8.0 | 4.0 | 13.8 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 256 | 157 | 対象数 | | 38 | 375 |
| % | 62.0 | 38.0 | % | | 9.2 | 90.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 15 | 46 | 144 | 148 | 60 | |
| % | 3.6 | 11.1 | 34.9 | 35.8 | 14.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 159 | 38 | 90 | 120 | 0 | (4-6) |
| % | 38.5 | 9.2 | 21.8 | 29.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 195 | 218 | 183 | 27 | (7-9) | |
| % | 47.2 | 52.8 | 44.3 | 6.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 72 | 186 | 146 | | |
| % | | 17.4 | 45.0 | 35.4 | | |

198 神戸市立医療センター中央市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 149 | 22 | (7-9) | 94.0 | 85.0 | 78.1 | 89.9 | 62.7 |
| I期 | 70 | (4-6) | (4-6) | 91.4 | 94.0 | 84.9 | 97.7 | 65.3 |
| II期 | 60 | 10 | (1-3) | 95.0 | 83.1 | 70.9 | 90.6 | 64.7 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 56.0 |
| IV期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 61.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 149 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 26 | 46 | 36 | 13 | | |
| % | 18.8 | 17.4 | 30.9 | 24.2 | 8.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 70 | 60 | (7-9) | 11 | 0 | 0 | |
| % | 47.0 | 40.3 | | 7.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 130 | 98 | 15 | 17 | | |
| % | 12.8 | 87.2 | 65.8 | 10.1 | 11.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | (1-3) | 21 | 93 | | | |
| % | 21.5 | | 14.1 | 62.4 | | | |

199 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

199 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 294 | 138 | (4-6) | 98.6 | 52.7 | 46.8 | 58.2 | 70.1 |
| I期 | 164 | 42 | (1-3) | 98.2 | 74.1 | 66.6 | 80.1 | 70.2 |
| II期 | 22 | (4-6) | 0 | | | | | 69.4 |
| III期 | 25 | 16 | 0 | | | | | 72.8 |
| IV期 | 77 | 71 | (1-3) | 98.7 | 6.7 | 2.5 | 13.9 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 197 | 97 | | | | | |
| % | 67.0 | 33.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 25 | 92 | 114 | 50 | | |
| % | 4.4 | 8.5 | 31.3 | 38.8 | 17.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 164 | 22 | 25 | 77 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 55.8 | 7.5 | 8.5 | 26.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 69 | 225 | 212 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 23.5 | 76.5 | 72.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 35 | 68 | 191 | | | |
| % | | 11.9 | 23.1 | 65.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 303 | 106 | (7-9) | 97.7 | 64.5 | 58.8 | 69.6 | 69.5 |
| I期 | 77 | 16 | (1-3) | 98.7 | 79.1 | 68.1 | 86.6 | 68.7 |
| II期 | 83 | 22 | (1-3) | 98.8 | 73.4 | 62.5 | 81.6 | 68.2 |
| III期 | 78 | 17 | (1-3) | 96.2 | 77.6 | 66.4 | 85.4 | 69.1 |
| IV期 | 54 | 47 | (1-3) | 98.1 | 11.3 | 4.6 | 21.4 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 173 | 130 | | | | | |
| % | 57.1 | 42.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 26 | 105 | 103 | 53 | | |
| % | 5.3 | 8.6 | 34.7 | 34.0 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 83 | 78 | 54 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 25.4 | 27.4 | 25.7 | 17.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 262 | 243 | 16 | (1-3) | | |
| % | 13.5 | 86.5 | 80.2 | 5.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 60 | 221 | | | |
| % | | 6.6 | 19.8 | 72.9 | | | |

199 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 73 | (1-3) | 98.5 | 44.3 | 35.6 | 52.5 | 71.6 |
| I期 | 70 | 25 | 0 | 100.0 | 64.3 | 51.9 | 74.3 | 72.2 |
| II期 | 31 | 20 | (1-3) | 93.5 | 35.5 | 19.4 | 51.9 | 76.9 |
| III期 | 25 | 23 | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 87 | 44 | | | | | | |
| % | 66.4 | 33.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 34 | 63 | 21 | | | |
| % | | 9.2 | 26.0 | 48.1 | 16.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 70 | 31 | 25 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 53.4 | 23.7 | 19.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 28 | 57 | 26 | 18 | (1-3) | 0 | |
| | % | 21.4 | 43.5 | 19.8 | 13.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 83 | 48 | 45 | 0 | (1-3) | | | |
| % | 63.4 | 36.6 | 34.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 107 | 22 | | | | |
| % | | | 81.7 | 16.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 184 | 130 | (4-6) | 97.8 | 28.2 | 21.8 | 34.8 | 71.4 |
| I期 | 61 | 21 | 0 | 100.0 | 65.6 | 52.2 | 76.0 | 70.5 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 33 | 28 | 0 | 100.0 | 15.2 | 5.5 | 29.2 | 74.7 |
| IV期 | 79 | 73 | (4-6) | 94.9 | 3.1 | 0.6 | 9.4 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 125 | 59 | 対象数 | | 10 | 174 | |
| % | 67.9 | 32.1 | % | | 5.4 | 94.6 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 62 | 71 | 38 | | |
| % | | 6.0 | 33.7 | 38.6 | 20.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | (7-9) | 33 | 79 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 33.2 | | 17.9 | 42.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 109 | 75 | 74 | 0 | (1-3) | | |
| % | 59.2 | 40.8 | 40.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 16 | 85 | 82 | | | |
| % | | 8.7 | 46.2 | 44.6 | | | |

199 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 291 | 22 | 13 | 95.5 | 92.3 | 88.5 | 94.8 | 57.2 |
| I期 | 88 | (1-3) | (1-3) | 96.6 | 96.5 | 89.7 | 98.9 | 56.8 |
| II期 | 135 | (4-6) | (4-6) | 96.3 | 97.0 | 92.1 | 98.9 | 57.9 |
| III期 | 48 | (4-6) | (1-3) | 93.8 | 89.4 | 76.3 | 95.4 | 59.6 |
| IV期 | 19 | 10 | (1-3) | | | | | 60.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 291 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 95 | 71 | 67 | 40 | 18 | | |
| % | 32.6 | 24.4 | 23.0 | 13.7 | 6.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 88 | 135 | 48 | 19 | 0 | (1-3) | |
| % | 30.2 | 46.4 | 16.5 | 6.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 267 | 244 | 20 | (1-3) | | |
| % | 8.2 | 91.8 | 83.8 | 6.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 47 | (7-9) | 19 | 218 | | | |
| % | 16.2 | | 6.5 | 74.9 | | | |

200 公立学校共済組合近畿中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

200 胃
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 174 | 62 | (4-6) | 97.7 | 63.9 | 56.2 | 70.5 | 70.9 |
| I期 | 103 | 14 | (1-3) | 98.1 | 86.2 | 77.7 | 91.6 | 69.2 |
| II期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 71.3 |
| III期 | 16 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.6 |
| IV期 | 41 | 37 | 0 | 100.0 | 9.8 | 3.1 | 21.0 | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 124 | 50 | | | | | |
| % | 71.3 | 28.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 16 | 49 | 58 | 41 | | |
| % | 5.7 | 9.2 | 28.2 | 33.3 | 23.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 103 | 11 | 16 | 41 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 59.2 | 6.3 | 9.2 | 23.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 44 | 130 | 124 | (4-6) | 0 | | |
| % | 25.3 | 74.7 | 71.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 34 | 48 | 81 | | | |
| % | 6.3 | 19.5 | 27.6 | 46.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 208 | 69 | (1-3) | 98.6 | 66.5 | 59.6 | 72.5 | 70.2 |
| I期 | 69 | 11 | 0 | 100.0 | 84.1 | 73.1 | 90.8 | 72.1 |
| II期 | 43 | 10 | (1-3) | 95.3 | 76.1 | 60.1 | 86.4 | 71.8 |
| III期 | 56 | 16 | (1-3) | 98.2 | 71.0 | 57.0 | 81.1 | 65.8 |
| IV期 | 34 | 30 | 0 | 100.0 | 11.8 | 3.7 | 24.9 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 112 | 96 | | | | | |
| % | 53.8 | 46.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 21 | 56 | 71 | 47 | | |
| % | 6.3 | 10.1 | 26.9 | 34.1 | 22.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 69 | 43 | 56 | 34 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 33.2 | 20.7 | 26.9 | 16.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 172 | 157 | 14 | (1-3) | | |
| % | 17.3 | 82.7 | 75.5 | 6.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 22 | 66 | 104 | | | |
| % | 7.7 | 10.6 | 31.7 | 50.0 | | | |

200 公立学校共済組合近畿中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 63 | 47 | 0 | 100.0 | 25.4 | 15.5 | 36.6 | 73.4 |
| I期 | 30 | 21 | 0 | 100.0 | 30.0 | 15.0 | 46.6 | 78.2 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 74.0 |
| III期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 73.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 41 | 22 | | | | | |
| % | 65.1 | 34.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 15 | 26 | 16 | | |
| % | | | 23.8 | 41.3 | 25.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 30 | 10 | 13 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 47.6 | 15.9 | 20.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 16 | (7-9) | 12 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 39.7 | 25.4 | | 19.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 57 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 90.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 43 | 18 | | | |
| % | | | 68.3 | 28.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 197 | 149 | (1-3) | 99.0 | 23.6 | 17.9 | 29.8 | 71.6 |
| I期 | 45 | 18 | 0 | 100.0 | 60.0 | 44.3 | 72.6 | 72.3 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.5 |
| III期 | 33 | 27 | (1-3) | 93.9 | 13.0 | 4.1 | 27.1 | 68.0 |
| IV期 | 97 | 88 | 0 | 100.0 | 9.3 | 4.6 | 16.0 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 147 | 50 | 対象数 | | 18 | 179 |
| % | 74.6 | 25.4 | % | | 9.1 | 90.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 63 | 72 | 43 | |
| % | | 6.6 | 32.0 | 36.5 | 21.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 45 | (7-9) | 33 | 97 | 14 | 0 |
| % | 22.8 | | 16.8 | 49.2 | 7.1 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 150 | 47 | 42 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 76.1 | 23.9 | 21.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 76 | 98 | | |
| % | | 9.1 | 38.6 | 49.7 | | |

200 公立学校共済組合近畿中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 126 | 17 | (7-9) | 93.7 | 85.9 | 78.3 | 91.0 | 58.7 |
| I期 | 43 | 0 | (4-6) | 90.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| II期 | 49 | (4-6) | (1-3) | 95.9 | 89.4 | 76.4 | 95.5 | 56.8 |
| III期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 60.4 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 52.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 126 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 35 | 27 | 37 | 21 | (4-6) | | |
| % | 27.8 | 21.4 | 29.4 | 16.7 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 43 | 49 | 13 | 10 | 11 | 0 | |
| % | 34.1 | 38.9 | 10.3 | 7.9 | 8.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 114 | 111 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 9.5 | 90.5 | 88.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (7-9) | 17 | 86 | | | |
| % | 11.9 | | 13.5 | 68.3 | | | |

201 姫路赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

201 姫路赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 347 | 134 | 14 | 96.0 | 60.5 | 55.1 | 65.5 | 68.7 |
| I期 | 196 | 32 | (7-9) | 95.4 | 83.3 | 77.1 | 87.9 | 68.8 |
| II期 | 28 | 10 | (1-3) | | | | | 67.1 |
| III期 | 32 | 12 | 0 | 100.0 | 62.5 | 43.5 | 76.7 | 63.6 |
| IV期 | 87 | 77 | (4-6) | 95.4 | 7.4 | 3.0 | 14.4 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 239 | 108 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 46 | 108 | 131 | 47 | | |
| % | 4.3 | 13.3 | 31.1 | 37.8 | 13.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 196 | 28 | 32 | 87 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.5 | 8.1 | 9.2 | 25.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 292 | 238 | 34 | 20 | | |
| % | 15.9 | 84.1 | 68.6 | 9.8 | 5.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 37 | 87 | 199 | | | |
| % | 6.9 | 10.7 | 25.1 | 57.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 309 | 101 | (4-6) | 98.4 | 67.1 | 61.5 | 72.0 | 68.5 |
| I期 | 65 | (7-9) | (1-3) | 96.9 | 87.6 | 76.7 | 93.6 | 66.8 |
| II期 | 78 | 10 | 0 | 100.0 | 87.2 | 77.5 | 92.9 | 69.1 |
| III期 | 106 | 35 | (1-3) | 99.1 | 66.7 | 56.8 | 74.8 | 69.9 |
| IV期 | 57 | 45 | (1-3) | 96.5 | 19.1 | 10.0 | 30.4 | 68.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 173 | 136 | | | | | |
| % | 56.0 | 44.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 39 | 100 | 107 | 45 | | |
| % | 5.8 | 12.6 | 32.4 | 34.6 | 14.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 65 | 78 | 106 | 57 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 21.0 | 25.2 | 34.3 | 18.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 293 | 205 | 51 | 37 | | |
| % | 5.2 | 94.8 | 66.3 | 16.5 | 12.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 61 | 207 | | | |
| % | | 10.4 | 19.7 | 67.0 | | | |

201 姫路赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 256 | 142 | (4-6) | 97.7 | 43.3 | 37.1 | 49.4 | 70.3 |
| I期 | 112 | 40 | (1-3) | 99.1 | 64.0 | 54.3 | 72.1 | 71.6 |
| II期 | 84 | 55 | (1-3) | 97.6 | 33.0 | 23.1 | 43.2 | 69.5 |
| III期 | 41 | 31 | (1-3) | 95.1 | 20.6 | 9.7 | 34.4 | 68.6 |
| IV期 | 14 | 12 | (1-3) | | | | | 63.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 177 | 79 | | | | | |
| % | 69.1 | 30.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 76 | 122 | 30 | | |
| % | | 8.2 | 29.7 | 47.7 | 11.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 112 | 84 | 41 | 14 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 43.8 | 32.8 | 16.0 | 5.5 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 69 | 82 | 58 | 43 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 27.0 | 32.0 | 22.7 | 16.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 175 | 81 | 65 | 12 | (4-6) | | |
| % | 68.4 | 31.6 | 25.4 | 4.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 172 | 75 | | | |
| % | | | 67.2 | 29.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 60 | 36 | (1-3) | 95.0 | 38.6 | 26.2 | 50.8 | 67.4 |
| I期 | 21 | (4-6) | (1-3) | | | | | 42.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 72.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 51.0 |
| IV期 | 25 | 21 | (1-3) | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 36 | 24 | 対象数 | (7-9) | 51 | | |
| % | 60.0 | 40.0 | % | | 85.0 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 21 | 19 | (7-9) | | |
| % | | | 35.0 | 31.7 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 21 | (1-3) | (7-9) | 25 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 35.0 | | | 41.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 25 | 21 | 0 | (4-6) | | |
| % | 58.3 | 41.7 | 35.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 25 | 27 | | | |
| % | | | 41.7 | 45.0 | | | |

201 姫路赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 274 | 24 | 15 | 94.5 | 91.0 | 86.8 | 93.9 | 58.4 |
| I期 | 104 | (4-6) | (4-6) | 94.2 | 95.1 | 88.6 | 97.9 | 55.8 |
| II期 | 115 | (4-6) | (4-6) | 95.7 | 95.6 | 89.7 | 98.1 | 56.9 |
| III期 | 42 | (7-9) | (1-3) | 97.6 | 78.2 | 62.3 | 88.0 | 58.4 |
| IV期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 274 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 83 | 60 | 74 | 41 | 16 | | |
| % | 30.3 | 21.9 | 27.0 | 15.0 | 5.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 104 | 115 | 42 | 13 | 0 | 0 | |
| % | 38.0 | 42.0 | 15.3 | 4.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 259 | 231 | 12 | 16 | | |
| % | 5.5 | 94.5 | 84.3 | 4.4 | 5.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 57 | 15 | 29 | 173 | | | |
| % | 20.8 | 5.5 | 10.6 | 63.1 | | | |

202 赤穂市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

202 赤穂市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 190 | 68 | (1-3) | 98.9 | 64.1 | 56.8 | 70.5 | 71.2 |
| I期 | 121 | 18 | (1-3) | 99.2 | 85.1 | 77.4 | 90.4 | 72.7 |
| II期 | 12 | (1-3) | (1-3) | | | | | 65.5 |
| III期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 67.6 |
| IV期 | 34 | 31 | 0 | 100.0 | 8.8 | 2.3 | 21.1 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 141 | 49 | | | | | |
| % | 74.2 | 25.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 60 | 65 | 43 | | |
| % | | 8.9 | 31.6 | 34.2 | 22.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | 12 | 11 | 34 | 12 | 0 | |
| % | 63.7 | 6.3 | 5.8 | 17.9 | 6.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 145 | 137 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 23.7 | 76.3 | 72.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (7-9) | 81 | 84 | | | |
| % | 9.5 | | 42.6 | 44.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 130 | 49 | (1-3) | 99.2 | 62.1 | 53.1 | 69.8 | 72.0 |
| I期 | 40 | (7-9) | 0 | 100.0 | 82.5 | 66.8 | 91.3 | 68.8 |
| II期 | 36 | (7-9) | (1-3) | 97.2 | 80.0 | 62.6 | 89.9 | 75.6 |
| III期 | 28 | 10 | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 22 | 21 | 0 | | | | | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 80 | 50 | | | | | |
| % | 61.5 | 38.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 35 | 46 | 32 | | |
| % | | 10.8 | 26.9 | 35.4 | 24.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 40 | 36 | 28 | 22 | (4-6) | 0 | |
| % | 30.8 | 27.7 | 21.5 | 16.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 112 | 108 | (4-6) | 0 | | |
| % | 13.8 | 86.2 | 83.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (4-6) | 29 | 68 | | | |
| % | 21.5 | | 22.3 | 52.3 | | | |

202 赤穂市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 50 | 38 | 0 | 100.0 | 24.0 | 13.3 | 36.4 | 70.1 |
| I期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 67.1 |
| II期 | 13 | 11 | 0 | | | | | 69.0 |
| III期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 79.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 29 | 21 | | | | | |
| % | 58.0 | 42.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 18 | 18 | (7-9) | | |
| % | | | 36.0 | 36.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | 13 | 12 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 34.0 | 26.0 | 24.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 10 | 11 | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 34.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 92.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 34 | 14 | | | |
| % | | | 68.0 | 28.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 46 | 37 | 0 | 100.0 | 19.6 | 9.7 | 32.0 | 74.2 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |
| III期 | 15 | 11 | 0 | | | | | |
| IV期 | 19 | 19 | 0 | | | | | 78.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 33 | 13 | | (4-6) | 41 | | |
| % | 71.7 | 28.3 | | | 89.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 11 | 15 | 16 | | |
| % | | | 23.9 | 32.6 | 34.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 15 | 19 | (1-3) | 0 | |
| % | | | 32.6 | 41.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 91.3 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 25 | 17 | | | |
| % | | | 54.3 | 37.0 | | | |

202 赤穂市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | 12 | 0 | 100.0 | 83.6 | 72.9 | 90.3 | 61.5 |
| I期 | 31 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.8 | 79.2 | 99.5 | 63.9 |
| II期 | 27 | (4-6) | 0 | | | | | 60.7 |
| III期 | (7-9) | 0 | 0 | | | | | 68.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 73 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 15 | 24 | 13 | (4-6) | | |
| % | 20.5 | 20.5 | 32.9 | 17.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 31 | 27 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 42.5 | 37.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 68 | 67 | 0 | (1-3) | | |
| % | | 93.2 | 91.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (1-3) | (7-9) | 48 | | | |
| % | 23.3 | | | 65.8 | | | |

203 公立豊岡病院組合立豊岡病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

203 公立豊岡病院組合立豊岡病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 262 | 117 | (1-3) | 98.9 | 55.1 | 48.8 | 60.9 | 72.0 |
| I期 | 142 | 33 | (1-3) | 99.3 | 76.6 | 68.7 | 82.8 | 74.0 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 67.8 |
| III期 | 28 | 16 | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | 63 | 54 | (1-3) | 98.4 | 14.1 | 6.9 | 23.9 | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 178 | 84 | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 61 | 100 | 67 | | |
| % | | 10.3 | 23.3 | 38.2 | 25.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 142 | 20 | 28 | 63 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 54.2 | 7.6 | 10.7 | 24.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 79 | 183 | 152 | 19 | 12 | | |
| % | 30.2 | 69.8 | 58.0 | 7.3 | 4.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | 19 | 54 | 156 | | | |
| % | 12.6 | 7.3 | 20.6 | 59.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 203 | 98 | (4-6) | 98.0 | 51.4 | 44.3 | 58.1 | 71.7 |
| I期 | 29 | (4-6) | (1-3) | | | | | 78.6 |
| II期 | 62 | 21 | (1-3) | 98.4 | 66.1 | 52.9 | 76.4 | 74.5 |
| III期 | 59 | 24 | 0 | 100.0 | 59.3 | 45.7 | 70.6 | 65.8 |
| IV期 | 46 | 40 | (1-3) | 95.7 | 10.2 | 3.4 | 21.6 | 72.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 121 | 82 | | | | | |
| % | 59.6 | 40.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 53 | 62 | 59 | | |
| % | | 10.8 | 26.1 | 30.5 | 29.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 62 | 59 | 46 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 14.3 | 30.5 | 29.1 | 22.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 157 | 134 | 20 | (1-3) | | |
| % | 22.7 | 77.3 | 66.0 | 9.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 12 | 46 | 133 | | | |
| % | 5.9 | 5.9 | 22.7 | 65.5 | | | |

203 公立豊岡病院組合立豊岡病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 44 | 29 | 0 | 100.0 | 34.1 | 20.7 | 48.0 | 73.0 |
| I期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 67.8 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 72.2 |
| III期 | 16 | 14 | 0 | | | | | 73.9 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 31 | 13 | | | | | | |
| % | 70.5 | 29.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | (7-9) | 21 | 11 | | | |
| % | | | | 47.7 | 25.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 11 | 12 | 16 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 25.0 | 27.3 | 36.4 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | 18 | (7-9) | 14 | 0 | 0 | |
| | % | | 40.9 | | 31.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 33 | 11 | 10 | 0 | (1-3) | | | |
| % | 75.0 | 25.0 | 22.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 11 | 29 | | | | |
| % | | | 25.0 | 65.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 176 | 127 | 0 | 100.0 | 27.8 | 21.4 | 34.6 | 73.2 |
| I期 | 56 | 21 | 0 | 100.0 | 62.5 | 48.5 | 73.7 | 72.2 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 76.2 |
| III期 | 39 | 33 | 0 | 100.0 | 15.4 | 6.2 | 28.3 | 72.9 |
| IV期 | 60 | 59 | 0 | 100.0 | 1.7 | 0.1 | 7.8 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 139 | 37 | 対象数 | | 14 | 162 | | |
| % | 79.0 | 21.0 | % | | 8.0 | 92.0 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | 18 | 39 | 70 | 49 | | | |
| % | | 10.2 | 22.2 | 39.8 | 27.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 56 | 14 | 39 | 60 | (7-9) | 0 | | |
| % | 31.8 | 8.0 | 22.2 | 34.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 109 | 67 | 54 | (1-3) | 10 | | | |
| % | 61.9 | 38.1 | 30.7 | | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 15 | 12 | 66 | 83 | | | | |
| % | 8.5 | 6.8 | 37.5 | 47.2 | | | | |

203 公立豊岡病院組合立豊岡病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 90 | 12 | (1-3) | 98.9 | 86.7 | 77.7 | 92.2 | 64.8 |
| I期 | 37 | (1-3) | (1-3) | 97.3 | 94.6 | 80.1 | 98.6 | 67.7 |
| II期 | 31 | (1-3) | 0 | 100.0 | 96.8 | 79.2 | 99.5 | 71.2 |
| III期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 66.0 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 58.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 90 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 21 | 21 | 20 | 15 | | |
| % | 14.4 | 23.3 | 23.3 | 22.2 | 16.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 31 | 12 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 41.1 | 34.4 | 13.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 80 | 69 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 11.1 | 88.9 | 76.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (4-6) | (7-9) | 68 | | | |
| % | 12.2 | | | 75.6 | | | |

204 兵庫県立淡路医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

204 兵庫県立淡路医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 177 | 95 | (7-9) | 95.5 | 44.8 | 37.2 | 52.0 | 73.7 |
| I期 | 91 | 26 | (4-6) | 94.5 | 70.6 | 60.0 | 79.0 | 73.3 |
| II期 | 20 | 12 | 0 | | | | | 76.7 |
| III期 | 13 | (7-9) | (1-3) | | | | | 79.0 |
| IV期 | 50 | 47 | (1-3) | 96.0 | 2.1 | 0.2 | 9.6 | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 119 | 58 | | | | | |
| % | 67.2 | 32.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 38 | 62 | 61 | | |
| % | | 6.2 | 21.5 | 35.0 | 34.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 91 | 20 | 13 | 50 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 51.4 | 11.3 | 7.3 | 28.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 129 | 110 | (1-3) | 18 | | |
| % | 27.1 | 72.9 | 62.1 | | 10.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 61 | 88 | | | |
| % | | 12.4 | 34.5 | 49.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 181 | 81 | (7-9) | 95.0 | 53.9 | 46.2 | 60.9 | 71.9 |
| I期 | 34 | (1-3) | (1-3) | 94.1 | 93.9 | 77.9 | 98.5 | 69.6 |
| II期 | 47 | 20 | (1-3) | 95.7 | 56.2 | 40.6 | 69.1 | 72.7 |
| III期 | 60 | 29 | (1-3) | 95.0 | 50.4 | 37.0 | 62.4 | 71.7 |
| IV期 | 37 | 30 | (1-3) | 94.6 | 14.8 | 5.4 | 28.6 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 104 | 77 | | | | | |
| % | 57.5 | 42.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 17 | 45 | 63 | 49 | | |
| % | | 9.4 | 24.9 | 34.8 | 27.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | 47 | 60 | 37 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 18.8 | 26.0 | 33.1 | 20.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 158 | 120 | (1-3) | 36 | | |
| % | 12.7 | 87.3 | 66.3 | | 19.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 49 | 117 | | | |
| % | | | 27.1 | 64.6 | | | |

204 兵庫県立淡路医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 39 | 23 | (1-3) | 94.9 | 40.1 | 24.7 | 55.1 | 71.7 |
| I期 | 17 | (7-9) | (1-3) | | | | | 78.3 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 72.5 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 73.7 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 51.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 25 | 14 | | | | | | |
| % | 64.1 | 35.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 11 | 13 | 11 | | | |
| % | | | 28.2 | 33.3 | 28.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | 11 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | 43.6 | 28.2 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 14 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| | % | 28.2 | 35.9 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 31 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 79.5 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 33 | (4-6) | | | | |
| % | | | 84.6 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 166 | 125 | (1-3) | 98.2 | 23.4 | 17.2 | 30.1 | 75.2 |
| I期 | 58 | 30 | (1-3) | 98.3 | 47.5 | 34.1 | 59.6 | 78.1 |
| II期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 76.6 |
| III期 | 38 | 30 | (1-3) | 97.4 | 18.9 | 8.3 | 32.8 | 73.5 |
| IV期 | 52 | 49 | (1-3) | 98.1 | 4.0 | 0.7 | 12.1 | 74.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 127 | 39 | 対象数 | 17 | 149 | | |
| % | 76.5 | 23.5 | % | 10.2 | 89.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 28 | 62 | 66 | | |
| % | | | 16.9 | 37.3 | 39.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 58 | 11 | 38 | 52 | (7-9) | 0 | |
| % | 34.9 | 6.6 | 22.9 | 31.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 98 | 68 | 53 | 0 | 15 | | |
| % | 59.0 | 41.0 | 31.9 | | 9.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 77 | 75 | | | |
| % | | 6.6 | 46.4 | 45.2 | | | |

204 兵庫県立淡路医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 32 | 13 | (4-6) | 87.5 | 57.9 | 38.6 | 73.1 | 71.9 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 88.0 |
| II期 | 13 | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.6 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 69.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 62.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 32 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 10 | 10 | | |
| % | | | | 31.3 | 31.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | | 40.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 22 | 0 | (4-6) | | |
| % | | 81.3 | 68.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | 26 | | | |
| % | | | | 81.3 | | | |

205 兵庫医科大学病院
2010-2011年2力年

コメント:

施設の特性、患者背景・治療等に違いがあるが、それらの情報が十分考慮されておらず、生存率の解釈に留意点が数多くあること、また医療関係者はこのデータだけでは各施設のがん医療の優劣の評価が出来ない事が理解出来るが、患者さんには難しく、単純に掲載内容をそのまま比較・評価してしまう可能性が非常に高いため前回同様、今回も公表を差し控える。

206 兵庫県立柏原病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

206 兵庫県立柏原病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 83 | 40 | 0 | 100.0 | 51.8 | 40.6 | 61.9 | 74.1 |
| I期 | 39 | 10 | 0 | 100.0 | 74.4 | 57.6 | 85.3 | 73.9 |
| II期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 74.0 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 75.3 |
| IV期 | 16 | 16 | 0 | | | | | 73.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 57 | 26 | | | | | |
| % | 68.7 | 31.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 16 | 37 | 23 | | |
| % | | | 19.3 | 44.6 | 27.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 21 | (7-9) | 16 | 0 | 0 | |
| % | 47.0 | 25.3 | | 19.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 66 | 61 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 20.5 | 79.5 | 73.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 32 | 46 | | | |
| % | | | 38.6 | 55.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | 22 | 0 | 100.0 | 69.9 | 57.9 | 79.0 | 70.5 |
| I期 | 24 | (4-6) | 0 | | | | | 72.6 |
| II期 | 21 | (4-6) | 0 | | | | | 74.5 |
| III期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 58.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 34 | 39 | | | | | |
| % | 46.6 | 53.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 17 | 23 | 19 | | |
| % | | | 23.3 | 31.5 | 26.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 21 | 19 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 32.9 | 28.8 | 26.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 65 | 60 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 89.0 | 82.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | 19 | 40 | | | |
| % | 13.7 | | 26.0 | 54.8 | | | |

206 兵庫県立柏原病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 15 | 13 | 0 | | | | | 70.9 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.7 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 69.5 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 52.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 79.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 10 | (4-6) | | | | | | |
| % | 66.7 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | | | | |
| % | | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 24 | 24 | 0 | | | | | 76.5 |
| I期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 78.5 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.1 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 81.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 20 | (4-6) | 対象数 | | 0 | 24 |
| % | 83.3 | | % | | | 100.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | 10 | |
| % | | | | | 41.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (4-6) | 0 | (7-9) | 13 | 0 | 0 |
| % | | | | 54.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 14 | | |
| % | | | | 58.3 | | |

206 兵庫県立柏原病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 63.4 |
| I期 | (7-9) | 0 | 0 | | | | | 58.7 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.3 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 56.3 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 16 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | 16 | 14 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 100.0 | 87.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (7-9) | | | |
| % | | | | | | | |

207 奈良県立医科大学附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

本報告書における当院のデータは、年齢や病期等、患者背景の詳細も不明なため、当院全体の状況を正確に反映しているとはいえ、あくまでも参考データとして扱われたい。

207 奈良県立医科大学附属病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 353 | 113 | (4-6) | 98.6 | 67.9 | 62.7 | 72.5 | 69.2 |
| I期 | 249 | 42 | (1-3) | 98.8 | 83.1 | 77.8 | 87.2 | 69.3 |
| II期 | 28 | 11 | (1-3) | | | | | 68.0 |
| III期 | 24 | 14 | (1-3) | | | | | 69.8 |
| IV期 | 49 | 45 | 0 | 100.0 | 8.2 | 2.6 | 17.9 | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 258 | 95 | | | | | |
| % | 73.1 | 26.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 45 | 104 | 141 | 51 | | |
| % | 3.4 | 12.7 | 29.5 | 39.9 | 14.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 249 | 28 | 24 | 49 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 70.5 | 7.9 | 6.8 | 13.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 307 | 299 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 13.0 | 87.0 | 84.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 54 | 126 | 138 | | | |
| % | 9.9 | 15.3 | 35.7 | 39.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 83 | (4-6) | 97.9 | 65.1 | 58.7 | 70.8 | 67.7 |
| I期 | 67 | (7-9) | 0 | 100.0 | 89.6 | 79.3 | 94.9 | 67.9 |
| II期 | 53 | 17 | (1-3) | 96.2 | 67.1 | 52.5 | 78.1 | 69.8 |
| III期 | 57 | 14 | (1-3) | 98.2 | 75.2 | 61.8 | 84.5 | 71.2 |
| IV期 | 49 | 40 | 0 | 100.0 | 18.4 | 9.1 | 30.2 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 136 | 104 | | | | | |
| % | 56.7 | 43.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 34 | 81 | 76 | 35 | | |
| % | 5.8 | 14.2 | 33.8 | 31.7 | 14.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 53 | 57 | 49 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 27.9 | 22.1 | 23.8 | 20.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 213 | 209 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 11.3 | 88.8 | 87.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 20 | 76 | 126 | | | |
| % | 7.5 | 8.3 | 31.7 | 52.5 | | | |

207 奈良県立医科大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 183 | 100 | (1-3) | 99.5 | 45.1 | 37.8 | 52.2 | 71.0 |
| I期 | 64 | 22 | 0 | 100.0 | 65.6 | 52.6 | 75.8 | 69.9 |
| II期 | 72 | 39 | 0 | 100.0 | 45.8 | 34.1 | 56.8 | 69.8 |
| III期 | 41 | 33 | (1-3) | 97.6 | 17.9 | 7.9 | 31.1 | 68.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 73.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 126 | 57 | | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 15 | 38 | 96 | 27 | | | |
| % | | 8.2 | 20.8 | 52.5 | 14.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 64 | 72 | 41 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 35.0 | 39.3 | 22.4 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 32 | 71 | 56 | 22 | (1-3) | 0 | |
| | % | 17.5 | 38.8 | 30.6 | 12.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 122 | 61 | 58 | 0 | (1-3) | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | 31.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 132 | 44 | | | | |
| % | | | 72.1 | 24.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 521 | 319 | (4-6) | 98.8 | 38.5 | 34.3 | 42.6 | 70.2 |
| I期 | 221 | 75 | (4-6) | 98.2 | 65.9 | 59.2 | 71.8 | 70.7 |
| II期 | 37 | 23 | 0 | 100.0 | 37.8 | 22.6 | 53.0 | 72.5 |
| III期 | 142 | 108 | (1-3) | 99.3 | 23.5 | 16.9 | 30.7 | 69.6 |
| IV期 | 114 | 109 | (1-3) | 99.1 | 3.6 | 1.2 | 8.2 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 379 | 142 | 対象数 | | 27 | 494 | |
| % | 72.7 | 27.3 | % | | 5.2 | 94.8 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 49 | 177 | 199 | 85 | | |
| % | 2.1 | 9.4 | 34.0 | 38.2 | 16.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 221 | 37 | 142 | 114 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 42.4 | 7.1 | 27.3 | 21.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 281 | 240 | 223 | 16 | (1-3) | | |
| % | 53.9 | 46.1 | 42.8 | 3.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | 42 | 229 | 212 | | | |
| % | 7.3 | 8.1 | 44.0 | 40.7 | | | |

207 奈良県立医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 18 | 0 | 100.0 | 85.1 | 77.4 | 90.4 | 61.6 |
| I期 | 51 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.2 | 80.4 | 97.0 | 60.7 |
| II期 | 50 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.0 | 75.2 | 94.4 | 62.2 |
| III期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 66.8 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 50.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 121 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 24 | 37 | 27 | (7-9) | | |
| % | 19.8 | 19.8 | 30.6 | 22.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | 50 | 16 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 42.1 | 41.3 | 13.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 108 | 106 | (1-3) | 0 | | |
| % | 10.7 | 89.3 | 87.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (4-6) | 20 | 82 | | | |
| % | 12.4 | | 16.5 | 67.8 | | | |

208 市立奈良病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

208 市立奈良病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 71 | (4-6) | 97.1 | 46.9 | 38.2 | 55.1 | 71.3 |
| I期 | 75 | 19 | (1-3) | 96.0 | 74.0 | 62.2 | 82.5 | 72.4 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 68.5 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 68.5 |
| IV期 | 45 | 41 | (1-3) | 97.8 | 7.0 | 1.8 | 17.1 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 101 | 35 | | | | | |
| % | 74.3 | 25.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 16 | 35 | 61 | 23 | | |
| % | | 11.8 | 25.7 | 44.9 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 75 | (7-9) | (7-9) | 45 | 0 | 0 | |
| % | 55.1 | | | 33.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 95 | 88 | (7-9) | 0 | | |
| % | 30.1 | 69.9 | 64.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | 29 | 94 | | | |
| % | 7.4 | | 21.3 | 69.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 110 | 41 | (1-3) | 97.3 | 62.4 | 52.6 | 70.8 | 72.1 |
| I期 | 29 | (4-6) | 0 | | | | | 77.3 |
| II期 | 37 | 11 | (1-3) | 97.3 | 70.2 | 52.6 | 82.2 | 73.5 |
| III期 | 30 | 15 | (1-3) | 96.7 | 48.8 | 29.9 | 65.2 | 70.4 |
| IV期 | 14 | 11 | (1-3) | | | | | 73.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 53 | 57 | | | | | |
| % | 48.2 | 51.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 27 | 39 | 30 | | |
| % | | 10.0 | 24.5 | 35.5 | 27.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 37 | 30 | 14 | 0 | 0 | |
| % | 26.4 | 33.6 | 27.3 | 12.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 102 | 94 | (7-9) | 0 | | |
| % | | 92.7 | 85.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | (1-3) | 20 | 66 | | | |
| % | 19.1 | | 18.2 | 60.0 | | | |

208 市立奈良病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 36 | 27 | 0 | 100.0 | 25.0 | 12.4 | 39.8 | 69.4 |
| I期 | 20 | 13 | 0 | | | | | 68.7 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 67.6 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 39.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 26 | 10 | | | | | | |
| % | 72.2 | 27.8 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 11 | 12 | (7-9) | | | |
| % | | | 30.6 | 33.3 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 20 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 55.6 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 17 | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | | 47.2 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | 33.3 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 26 | (7-9) | | | | |
| % | | | 72.2 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 71 | 63 | (1-3) | 98.6 | 10.0 | 4.4 | 18.3 | 74.0 |
| I期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 76.4 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | 25 | 25 | 0 | | | | | 69.5 |
| IV期 | 34 | 32 | (1-3) | 97.1 | 3.0 | 0.2 | 13.4 | 74.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 51 | 20 | 対象数 | | (4-6) | 65 | |
| % | 71.8 | 28.2 | % | | | 91.5 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 18 | 22 | 26 | | |
| % | | | 25.4 | 31.0 | 36.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | 25 | 34 | 0 | (1-3) | |
| % | 14.1 | | 35.2 | 47.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 65 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 91.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 23 | 46 | | | |
| % | | | 32.4 | 64.8 | | | |

208 市立奈良病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 311 | 25 | (7-9) | 97.1 | 91.9 | 88.3 | 94.5 | 59.0 |
| I期 | 139 | (1-3) | (1-3) | 98.6 | 99.3 | 95.0 | 99.9 | 60.7 |
| II期 | 121 | 13 | (1-3) | 97.5 | 89.2 | 82.1 | 93.6 | 61.7 |
| III期 | 40 | (4-6) | (4-6) | 90.0 | 87.2 | 71.9 | 94.5 | 60.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 311 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 78 | 89 | 81 | 38 | 25 | | |
| % | 25.1 | 28.6 | 26.0 | 12.2 | 8.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 139 | 121 | 40 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 44.7 | 38.9 | 12.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 295 | 270 | 25 | 0 | | |
| % | 5.1 | 94.9 | 86.8 | 8.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 66 | (4-6) | 18 | 222 | | | |
| % | 21.2 | | 5.8 | 71.4 | | | |

209 紀南病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特にありません

209 紀南病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 116 | 61 | 0 | 100.0 | 47.4 | 38.1 | 56.1 | 70.8 |
| I期 | 53 | 10 | 0 | 100.0 | 81.1 | 67.8 | 89.4 | 73.5 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 74.5 |
| III期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 69.0 |
| IV期 | 31 | 30 | 0 | 100.0 | 3.2 | 0.2 | 14.1 | 73.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 79 | 37 | | | | | |
| % | 68.1 | 31.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 26 | 37 | 32 | | |
| % | | 14.7 | 22.4 | 31.9 | 27.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | 13 | 18 | 31 | (1-3) | 0 | |
| % | 45.7 | 11.2 | 15.5 | 26.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 94 | 78 | (7-9) | (7-9) | | |
| % | 19.0 | 81.0 | 67.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 18 | 80 | | | |
| % | | 12.1 | 15.5 | 69.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 135 | 55 | (1-3) | 99.3 | 59.1 | 50.3 | 66.8 | 70.3 |
| I期 | 22 | (4-6) | 0 | | | | | 70.0 |
| II期 | 43 | 10 | (1-3) | 97.7 | 76.3 | 60.4 | 86.5 | 72.4 |
| III期 | 44 | 19 | 0 | 100.0 | 56.8 | 41.0 | 69.9 | 72.7 |
| IV期 | 24 | 19 | 0 | | | | | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 83 | 52 | | | | | |
| % | 61.5 | 38.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 33 | 47 | 29 | | |
| % | | 14.8 | 24.4 | 34.8 | 21.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 43 | 44 | 24 | (1-3) | 0 | |
| % | 16.3 | 31.9 | 32.6 | 17.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 123 | 101 | (7-9) | 14 | | |
| % | 8.9 | 91.1 | 74.8 | | 10.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 11 | 34 | 83 | | | |
| % | | 8.1 | 25.2 | 61.5 | | | |

209 紀南病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 23 | 16 | 0 | | | | | 71.9 |
| I期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 68.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.7 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 69.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 14 | (7-9) | | | | | |
| % | 60.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 11 | (4-6) | | |
| % | | | | 47.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 13 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | 56.5 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 10 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | | 43.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 78.3 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 14 | (7-9) | | | |
| % | | | 60.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 41 | 37 | 0 | 100.0 | 9.8 | 3.1 | 21.0 | 72.5 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 89.0 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 24 | 24 | 0 | | | | | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 30 | 11 | 対象数 | | (4-6) | 35 |
| % | 73.2 | 26.8 | % | | | 85.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 13 | 15 | 10 | |
| % | | | 31.7 | 36.6 | 24.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 24 | (1-3) | (1-3) |
| % | | | | 58.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 17 | 22 | | |
| % | | | 41.5 | 53.7 | | |

209 紀南病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 39 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 84.3 | 68.3 | 92.6 | 62.6 |
| I期 | 17 | (1-3) | (1-3) | | | | | 61.4 |
| II期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 61.0 |
| III期 | (7-9) | 0 | 0 | | | | | 61.1 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 97.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 39 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 12 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | 30.8 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 17 | 11 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 43.6 | 28.2 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 37 | 36 | 0 | (1-3) | | |
| % | | 94.9 | 92.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 26 | | | |
| % | | | | 66.7 | | | |

210 日本赤十字社和歌山医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

当センターのがん患者は、年齢が60歳以上またはがんが進行した状態で発見されることが多く、がん治療前にすでに基礎疾患を合併している場合や治療中に他の疾患に罹患する場合がありますため、積極的な治療の実施や生存率にも影響しています。

210 日本赤十字社和歌山医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 411 | 173 | 10 | 97.6 | 57.8 | 52.8 | 62.4 | 70.0 |
| I期 | 225 | 34 | (7-9) | 96.0 | 84.8 | 79.3 | 88.9 | 70.1 |
| II期 | 33 | 14 | 0 | 100.0 | 57.6 | 39.1 | 72.3 | 69.6 |
| III期 | 42 | 21 | (1-3) | 97.6 | 49.8 | 34.0 | 63.7 | 73.4 |
| IV期 | 106 | 99 | 0 | 100.0 | 6.6 | 2.9 | 12.4 | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 273 | 138 | | | | | |
| % | 66.4 | 33.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 35 | 138 | 150 | 73 | | |
| % | 3.6 | 8.5 | 33.6 | 36.5 | 17.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 225 | 33 | 42 | 106 | (4-6) | 0 | |
| % | 54.7 | 8.0 | 10.2 | 25.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 77 | 334 | 288 | 32 | 14 | | |
| % | 18.7 | 81.3 | 70.1 | 7.8 | 3.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 65 | 142 | 188 | | | |
| % | 3.9 | 15.8 | 34.5 | 45.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 411 | 174 | (7-9) | 98.1 | 57.3 | 52.4 | 62.0 | 69.9 |
| I期 | 115 | 26 | (4-6) | 96.5 | 77.1 | 68.2 | 83.8 | 68.6 |
| II期 | 101 | 33 | (1-3) | 98.0 | 66.8 | 56.7 | 75.2 | 72.7 |
| III期 | 107 | 41 | (1-3) | 98.1 | 61.3 | 51.4 | 69.9 | 70.0 |
| IV期 | 82 | 69 | 0 | 100.0 | 15.9 | 8.9 | 24.5 | 68.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 217 | 194 | | | | | |
| % | 52.8 | 47.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 55 | 109 | 134 | 92 | | |
| % | 5.1 | 13.4 | 26.5 | 32.6 | 22.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 115 | 101 | 107 | 82 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 28.0 | 24.6 | 26.0 | 20.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 381 | 327 | 41 | 13 | | |
| % | 7.3 | 92.7 | 79.6 | 10.0 | 3.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 43 | 153 | 206 | | | |
| % | | 10.5 | 37.2 | 50.1 | | | |

210 日本赤十字社和歌山医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 140 | 98 | (1-3) | 98.6 | 29.5 | 22.1 | 37.2 | 70.5 |
| I期 | 49 | 27 | 0 | 100.0 | 44.9 | 30.7 | 58.1 | 70.1 |
| II期 | 37 | 18 | (1-3) | 97.3 | 51.4 | 34.4 | 66.0 | 71.3 |
| III期 | 25 | 24 | (1-3) | | | | | 70.4 |
| IV期 | 27 | 27 | 0 | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 95 | 45 | | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 43 | 61 | 19 | | | |
| % | | 8.6 | 30.7 | 43.6 | 13.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 49 | 37 | 25 | 27 | (1-3) | 0 | |
| | % | 35.0 | 26.4 | 17.9 | 19.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 31 | 43 | 25 | 39 | (1-3) | 0 | |
| | % | 22.1 | 30.7 | 17.9 | 27.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 123 | 17 | 15 | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 87.9 | 12.1 | 10.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 92 | 45 | | | | |
| % | | | 65.7 | 32.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 556 | 357 | (7-9) | 98.4 | 35.3 | 31.3 | 39.3 | 71.0 |
| I期 | 186 | 50 | (1-3) | 98.9 | 73.1 | 66.0 | 78.8 | 71.4 |
| II期 | 39 | 25 | 0 | 100.0 | 35.9 | 21.4 | 50.6 | 72.9 |
| III期 | 140 | 103 | (4-6) | 97.1 | 24.8 | 17.9 | 32.3 | 69.8 |
| IV期 | 184 | 172 | (1-3) | 98.4 | 5.5 | 2.8 | 9.6 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|--|
| 対象数 | 383 | 173 | 対象数 | | 55 | 501 | |
| % | 68.9 | 31.1 | % | | 9.9 | 90.1 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 54 | 163 | 207 | 117 | | |
| % | 2.7 | 9.7 | 29.3 | 37.2 | 21.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 186 | 39 | 140 | 184 | (7-9) | 0 | |
| % | 33.5 | 7.0 | 25.2 | 33.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 313 | 243 | 216 | 21 | (4-6) | | |
| % | 56.3 | 43.7 | 38.8 | 3.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 66 | 219 | 264 | | | |
| % | | 11.9 | 39.4 | 47.5 | | | |

210 日本赤十字社和歌山医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 155 | 18 | (1-3) | 98.7 | 88.3 | 82.1 | 92.5 | 58.9 |
| I期 | 59 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.3 | 88.6 | 99.8 | 59.2 |
| II期 | 54 | (4-6) | (1-3) | 96.3 | 90.6 | 78.9 | 96.0 | 59.3 |
| III期 | 26 | (4-6) | 0 | | | | | 69.4 |
| IV期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 58.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 155 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 47 | 36 | 36 | 22 | 14 | | |
| % | 30.3 | 23.2 | 23.2 | 14.2 | 9.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 54 | 26 | 14 | (1-3) | 0 | |
| % | 38.1 | 34.8 | 16.8 | 9.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 130 | 101 | (7-9) | 21 | | |
| % | 16.1 | 83.9 | 65.2 | | 13.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | (7-9) | 22 | 85 | | | |
| % | 25.2 | | 14.2 | 54.8 | | | |

211 和歌山県立医科大学附属病院
2011年のみ

コメント:

特になし

211 和歌山県立医科大学附属病院
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 304 | 85 | (7-9) | 97.7 | 71.7 | 66.2 | 76.5 | 69.8 |
| I期 | 222 | 28 | (4-6) | 97.3 | 87.2 | 82.0 | 91.0 | 70.6 |
| II期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 68.2 |
| III期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 66.5 |
| IV期 | 44 | 40 | (1-3) | 97.7 | 7.1 | 1.8 | 17.3 | 67.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 201 | 103 | | | | | |
| % | 66.1 | 33.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 28 | 89 | 121 | 52 | | |
| % | 4.6 | 9.2 | 29.3 | 39.8 | 17.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 222 | 17 | 17 | 44 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 73.0 | 5.6 | 5.6 | 14.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 264 | 255 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 13.2 | 86.8 | 83.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 37 | 27 | 105 | 135 | | | |
| % | 12.2 | 8.9 | 34.5 | 44.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 178 | 55 | (7-9) | 96.1 | 68.3 | 60.8 | 74.7 | 68.9 |
| I期 | 45 | 10 | (1-3) | 93.3 | 76.9 | 61.3 | 86.8 | 67.7 |
| II期 | 48 | (4-6) | (1-3) | 95.8 | 87.3 | 73.9 | 94.1 | 69.1 |
| III期 | 49 | 13 | (1-3) | 98.0 | 72.9 | 58.0 | 83.3 | 71.7 |
| IV期 | 29 | 25 | (1-3) | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 96 | 82 | | | | | |
| % | 53.9 | 46.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 55 | 69 | 23 | | |
| % | | 13.5 | 30.9 | 38.8 | 12.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 45 | 48 | 49 | 29 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 25.3 | 27.0 | 27.5 | 16.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 157 | 147 | 10 | 0 | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 82.6 | 5.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 10 | 52 | 102 | | | |
| % | 7.9 | 5.6 | 29.2 | 57.3 | | | |

211 和歌山県立医科大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 104 | 71 | (1-3) | 98.1 | 31.3 | 22.6 | 40.3 | 69.1 |
| I期 | 49 | 29 | (1-3) | 98.0 | 40.8 | 27.1 | 54.1 | 70.3 |
| II期 | 29 | 19 | (1-3) | | | | | 69.6 |
| III期 | 18 | 16 | 0 | | | | | 69.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 55.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 71 | 33 | | | | | |
| % | 68.3 | 31.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 33 | 45 | 13 | | |
| % | | | 31.7 | 43.3 | 12.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 49 | 29 | 18 | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 47.1 | 27.9 | 17.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 20 | 41 | 22 | 17 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 19.2 | 39.4 | 21.2 | 16.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 68 | 36 | 32 | (4-6) | 0 | | |
| % | 65.4 | 34.6 | 30.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 71 | 29 | | | |
| % | | | 68.3 | 27.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 113 | 75 | (4-6) | 96.5 | 31.9 | 23.4 | 40.7 | 71.0 |
| I期 | 48 | 20 | (1-3) | 95.8 | 56.7 | 41.3 | 69.5 | 74.4 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 68.4 |
| III期 | 24 | 19 | (1-3) | | | | | 71.2 |
| IV期 | 32 | 31 | (1-3) | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 84 | 29 | 対象数 | 12 | 101 | | |
| % | 74.3 | 25.7 | % | 10.6 | 89.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 32 | 47 | 21 | | |
| % | | 8.8 | 28.3 | 41.6 | 18.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | (7-9) | 24 | 32 | (1-3) | 0 | |
| % | 42.5 | | 21.2 | 28.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 60 | 58 | (1-3) | 0 | | |
| % | 46.9 | 53.1 | 51.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 53 | 48 | | | |
| % | | | 46.9 | 42.5 | | | |

211 和歌山県立医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 113 | 14 | (1-3) | 99.1 | 87.5 | 79.9 | 92.4 | 60.2 |
| I期 | 56 | (1-3) | (1-3) | 98.2 | 94.6 | 84.1 | 98.2 | 60.5 |
| II期 | 41 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.2 | 76.1 | 96.2 | 57.8 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 60.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 58.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 113 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 36 | 17 | 28 | 16 | 16 | | |
| % | 31.9 | 15.0 | 24.8 | 14.2 | 14.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 56 | 41 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 49.6 | 36.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 100 | 93 | (7-9) | 0 | | |
| % | 11.5 | 88.5 | 82.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 0 | 14 | 75 | | | |
| % | 21.2 | | 12.4 | 66.4 | | | |

212 鳥取県立厚生病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

212 鳥取県立厚生病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 179 | 75 | 13 | 92.7 | 57.4 | 49.7 | 64.3 | 71.5 |
| I期 | 104 | 21 | 10 | 90.4 | 79.1 | 69.7 | 85.9 | 74.1 |
| II期 | 18 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.0 |
| III期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 78.2 |
| IV期 | 43 | 42 | 0 | 100.0 | 2.3 | 0.2 | 10.6 | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 128 | 51 | | | | | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 23 | 49 | 52 | 51 | | |
| % | | 12.8 | 27.4 | 29.1 | 28.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 104 | 18 | 13 | 43 | (1-3) | 0 | |
| % | 58.1 | 10.1 | 7.3 | 24.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 140 | 128 | 10 | (1-3) | | |
| % | 21.8 | 78.2 | 71.5 | 5.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 15 | 25 | 118 | | | |
| % | 11.7 | 8.4 | 14.0 | 65.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 142 | 61 | 10 | 93.0 | 56.3 | 47.7 | 64.1 | 69.2 |
| I期 | 30 | (4-6) | (1-3) | 93.3 | 83.2 | 64.2 | 92.6 | 68.1 |
| II期 | 46 | 11 | (4-6) | 91.3 | 75.4 | 60.0 | 85.6 | 69.9 |
| III期 | 24 | (7-9) | (1-3) | | | | | 64.4 |
| IV期 | 40 | 34 | (1-3) | 97.5 | 12.9 | 4.7 | 25.2 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 87 | 55 | | | | | |
| % | 61.3 | 38.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 21 | 48 | 42 | 28 | | |
| % | | 14.8 | 33.8 | 29.6 | 19.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 30 | 46 | 24 | 40 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 21.1 | 32.4 | 16.9 | 28.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 118 | 111 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 16.9 | 83.1 | 78.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (7-9) | 26 | 95 | | | |
| % | 9.9 | | 18.3 | 66.9 | | | |

212 鳥取県立厚生病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 54 | 36 | 0 | 100.0 | 33.3 | 21.3 | 45.9 | 68.4 |
| I期 | 21 | 10 | 0 | | | | | 69.0 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 68.3 |
| III期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 70.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 39 | 15 | | | | | |
| % | 72.2 | 27.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 17 | 13 | 11 | | |
| % | | 22.2 | 31.5 | 24.1 | 20.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 21 | 13 | 12 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 38.9 | 24.1 | 22.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 20 | (7-9) | 11 | (1-3) | 0 |
| | % | 20.4 | 37.0 | | 20.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 49 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 90.7 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 18 | 36 | | | |
| % | | | 33.3 | 66.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 194 | 114 | (4-6) | 97.4 | 40.9 | 34.0 | 47.8 | 71.9 |
| I期 | 92 | 22 | (4-6) | 95.7 | 75.7 | 65.4 | 83.3 | 71.2 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 41 | 36 | (1-3) | 97.6 | 12.2 | 4.5 | 24.1 | 73.0 |
| IV期 | 49 | 48 | 0 | 100.0 | 2.0 | 0.2 | 9.4 | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 135 | 59 | 対象数 | | 24 | 170 |
| % | 69.6 | 30.4 | % | | 12.4 | 87.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 56 | 70 | 49 | |
| % | | 8.8 | 28.9 | 36.1 | 25.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 92 | 10 | 41 | 49 | (1-3) | (1-3) |
| % | 47.4 | 5.2 | 21.1 | 25.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 90 | 104 | 102 | (1-3) | 0 | |
| % | 46.4 | 53.6 | 52.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 36 | 15 | 50 | 93 | | |
| % | 18.6 | 7.7 | 25.8 | 47.9 | | |

212 鳥取県立厚生病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 62 | (7-9) | (1-3) | 95.2 | 88.7 | 77.8 | 94.5 | 62.6 |
| I期 | 28 | (1-3) | 0 | | | | | 66.2 |
| II期 | 25 | (1-3) | (1-3) | | | | | 55.1 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 59.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 62 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 13 | 15 | 12 | (7-9) | | |
| % | 21.0 | 21.0 | 24.2 | 19.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 28 | 25 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 45.2 | 40.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 59 | 59 | 0 | 0 | | |
| % | | 95.2 | 95.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 44 | | | |
| % | | | | 71.0 | | | |

213 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

213 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 97 | 44 | 0 | 100.0 | 54.6 | 44.2 | 63.9 | 70.0 |
| I期 | 55 | (7-9) | 0 | 100.0 | 85.5 | 73.0 | 92.5 | 67.3 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 78.3 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 68.0 |
| IV期 | 24 | 22 | 0 | | | | | 68.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 59 | 38 | | | | | |
| % | 60.8 | 39.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 30 | 31 | 21 | | |
| % | | | 30.9 | 32.0 | 21.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | (7-9) | (4-6) | 24 | (4-6) | 0 | |
| % | 56.7 | | | 24.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 70 | 67 | 0 | (1-3) | | |
| % | 27.8 | 72.2 | 69.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 12 | 23 | 49 | | | |
| % | 13.4 | 12.4 | 23.7 | 50.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 109 | 40 | 0 | 100.0 | 63.3 | 53.5 | 71.6 | 71.0 |
| I期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 68.1 |
| II期 | 34 | (7-9) | 0 | 100.0 | 79.4 | 61.6 | 89.6 | 72.5 |
| III期 | 28 | 11 | 0 | | | | | 67.8 |
| IV期 | 21 | 18 | 0 | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 53 | 56 | | | | | |
| % | 48.6 | 51.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 44 | 26 | 30 | | |
| % | | | 40.4 | 23.9 | 27.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 34 | 28 | 21 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.0 | 31.2 | 25.7 | 19.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 86 | 79 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 21.1 | 78.9 | 72.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (4-6) | 14 | 76 | | | |
| % | 13.8 | | 12.8 | 69.7 | | | |

213 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 26 | 23 | 0 | | | | | 73.7 |
| I期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 80.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.3 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 17 | (7-9) | | | | | |
| % | 65.4 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (7-9) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (7-9) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | 88.5 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 18 | (7-9) | | | |
| % | | | 69.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 141 | 101 | 0 | 100.0 | 28.4 | 21.2 | 36.0 | 74.4 |
| I期 | 46 | 14 | 0 | 100.0 | 69.6 | 54.1 | 80.7 | 71.2 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 78.0 |
| III期 | 40 | 35 | 0 | 100.0 | 12.5 | 4.6 | 24.6 | 75.5 |
| IV期 | 44 | 44 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 99 | 42 | 対象数 | | (4-6) | 135 |
| % | 70.2 | 29.8 | % | | | 95.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 40 | 51 | 46 | |
| % | | | 28.4 | 36.2 | 32.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 46 | (4-6) | 40 | 44 | (4-6) | 0 |
| % | 32.6 | | 28.4 | 31.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 88 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| % | 62.4 | 37.6 | 37.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 14 | (4-6) | 60 | 62 | | |
| % | 9.9 | | 42.6 | 44.0 | | |

213 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 76 | 13 | 0 | 100.0 | 82.9 | 72.4 | 89.7 | 63.9 |
| I期 | 27 | (1-3) | 0 | | | | | 61.2 |
| II期 | 34 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.2 | 71.6 | 95.4 | 60.9 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 76 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 20 | 20 | 13 | 12 | | |
| % | 14.5 | 26.3 | 26.3 | 17.1 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 27 | 34 | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 35.5 | 44.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 69 | 65 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 90.8 | 85.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (1-3) | (1-3) | 52 | | | |
| % | 26.3 | | | 68.4 | | | |

214 鳥取県立中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

214 鳥取県立中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 255 | 87 | 12 | 95.3 | 64.6 | 58.3 | 70.2 | 72.0 |
| I期 | 179 | 39 | (7-9) | 95.0 | 77.3 | 70.3 | 82.9 | 73.8 |
| II期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 70.9 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 79.0 |
| IV期 | 43 | 38 | (1-3) | 93.0 | 5.1 | 0.9 | 15.1 | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 168 | 87 | | | | | |
| % | 65.9 | 34.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 19 | 64 | 101 | 63 | | |
| % | | 7.5 | 25.1 | 39.6 | 24.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 179 | 19 | 10 | 43 | 0 | (4-6) | |
| % | 70.2 | 7.5 | 3.9 | 16.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | 213 | 185 | 10 | 18 | | |
| % | 16.5 | 83.5 | 72.5 | 3.9 | 7.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 51 | (7-9) | 44 | 151 | | | |
| % | 20.0 | | 17.3 | 59.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 159 | 53 | (1-3) | 98.1 | 66.2 | 58.2 | 73.0 | 69.1 |
| I期 | 42 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.0 | 65.5 | 90.0 | 69.1 |
| II期 | 33 | 10 | 0 | 100.0 | 69.7 | 51.0 | 82.4 | 70.3 |
| III期 | 45 | 10 | (1-3) | 97.8 | 77.4 | 62.1 | 87.2 | 73.4 |
| IV期 | 33 | 24 | (1-3) | 93.9 | 22.7 | 10.0 | 38.5 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 104 | 55 | | | | | |
| % | 65.4 | 34.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 26 | 40 | 44 | 39 | | |
| % | 6.3 | 16.4 | 25.2 | 27.7 | 24.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 33 | 45 | 33 | 0 | (4-6) | |
| % | 26.4 | 20.8 | 28.3 | 20.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 137 | 115 | 12 | 10 | | |
| % | 13.8 | 86.2 | 72.3 | 7.5 | 6.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | 19 | 100 | | | |
| % | 21.4 | | 11.9 | 62.9 | | | |

214 鳥取県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 62 | 41 | (1-3) | 98.4 | 33.0 | 21.6 | 44.8 | 69.7 |
| I期 | 15 | 10 | 0 | | | | | 72.3 |
| II期 | 19 | (7-9) | (1-3) | | | | | 73.4 |
| III期 | 16 | 14 | 0 | | | | | 73.2 |
| IV期 | 12 | 10 | 0 | | | | | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 40 | 22 | | | | | | |
| % | 64.5 | 35.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 14 | 26 | 11 | | | |
| % | | | 22.6 | 41.9 | 17.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 15 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | |
| | % | 24.2 | 30.6 | 25.8 | 19.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 14 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
| | % | | 22.6 | 19.4 | 27.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 53 | (7-9) | (7-9) | 0 | (1-3) | | | |
| % | 85.5 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 51 | | | | |
| % | | | | 82.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 202 | 142 | (1-3) | 99.5 | 29.6 | 23.4 | 36.0 | 70.3 |
| I期 | 65 | 20 | (1-3) | 98.5 | 69.0 | 56.2 | 78.8 | 73.2 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 75.0 |
| III期 | 55 | 44 | 0 | 100.0 | 20.0 | 10.7 | 31.4 | 71.2 |
| IV期 | 72 | 71 | 0 | 100.0 | 1.4 | 0.1 | 6.6 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|--|--|
| 対象数 | 134 | 68 | 対象数 | | 22 | 180 | | |
| % | 66.3 | 33.7 | % | | 10.9 | 89.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 11 | 15 | 63 | 66 | 47 | | | |
| % | 5.4 | 7.4 | 31.2 | 32.7 | 23.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 65 | 10 | 55 | 72 | 0 | 0 | | |
| % | 32.2 | 5.0 | 27.2 | 35.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 121 | 81 | 56 | (4-6) | 20 | | | |
| % | 59.9 | 40.1 | 27.7 | | 9.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 43 | 13 | 27 | 119 | | | | |
| % | 21.3 | 6.4 | 13.4 | 58.9 | | | | |

214 鳥取県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 49 | (4-6) | 0 | 100.0 | 87.8 | 74.8 | 94.3 | 64.6 |
| I期 | 22 | (1-3) | 0 | | | | | 65.9 |
| II期 | 18 | (1-3) | 0 | | | | | 58.7 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 56.7 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 49 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | (7-9) | 14 | (7-9) | | |
| % | | | | 28.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 18 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 44.9 | 36.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 45 | (4-6) | 0 | 40 | | |
| % | | 91.8 | | | 81.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (1-3) | (4-6) | 31 | | | |
| % | 22.4 | | | 63.3 | | | |

215 鳥取市立病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

215 鳥取市立病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 167 | 67 | (1-3) | 98.8 | 59.6 | 51.7 | 66.6 | 70.7 |
| I期 | 94 | 15 | (1-3) | 98.9 | 84.0 | 74.9 | 90.1 | 72.0 |
| II期 | 25 | 15 | 0 | | | | | 68.8 |
| III期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 73.5 |
| IV期 | 36 | 31 | 0 | 100.0 | 13.9 | 5.1 | 27.1 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 120 | 47 | | | | | |
| % | 71.9 | 28.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 21 | 46 | 63 | 34 | | |
| % | | 12.6 | 27.5 | 37.7 | 20.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 94 | 25 | 10 | 36 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.3 | 15.0 | 6.0 | 21.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 141 | 125 | 14 | (1-3) | | |
| % | 15.6 | 84.4 | 74.9 | 8.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 26 | 43 | 68 | | | |
| % | 18.0 | 15.6 | 25.7 | 40.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 140 | 40 | (1-3) | 98.6 | 71.2 | 62.9 | 78.0 | 69.2 |
| I期 | 33 | (4-6) | 0 | 100.0 | 87.9 | 70.9 | 95.3 | 66.5 |
| II期 | 42 | (4-6) | 0 | 100.0 | 85.7 | 70.9 | 93.3 | 70.6 |
| III期 | 26 | (7-9) | (1-3) | | | | | 75.1 |
| IV期 | 30 | 22 | (1-3) | 96.7 | 24.9 | 11.1 | 41.5 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 86 | 54 | | | | | |
| % | 61.4 | 38.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 32 | 33 | 37 | | |
| % | | 22.1 | 22.9 | 23.6 | 26.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 42 | 26 | 30 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 23.6 | 30.0 | 18.6 | 21.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 128 | 107 | 20 | (1-3) | | |
| % | 8.6 | 91.4 | 76.4 | 14.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 17 | 29 | 77 | | | |
| % | 12.1 | 12.1 | 20.7 | 55.0 | | | |

215 鳥取市立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 64 | 42 | (1-3) | 98.4 | 33.6 | 22.3 | 45.2 | 71.4 |
| I期 | 19 | 10 | 0 | | | | | 74.6 |
| II期 | 23 | 13 | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 14 | 11 | (1-3) | | | | | 70.2 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 76.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 43 | 21 | | | | | | |
| % | 67.2 | 32.8 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 14 | 21 | 17 | | | |
| % | | 15.6 | 21.9 | 32.8 | 26.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 19 | 23 | 14 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 29.7 | 35.9 | 21.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 16 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
| | % | 25.0 | 26.6 | 25.0 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 35 | 29 | 26 | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 54.7 | 45.3 | 40.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 42 | 21 | | | | |
| % | | | 65.6 | 32.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 82 | (1-3) | 98.5 | 36.6 | 28.3 | 44.8 | 72.0 |
| I期 | 45 | 10 | (1-3) | 95.6 | 76.8 | 61.2 | 86.8 | 70.8 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 63.4 |
| III期 | 29 | 23 | 0 | | | | | 75.0 |
| IV期 | 46 | 42 | 0 | 100.0 | 8.7 | 2.8 | 18.9 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 90 | 41 | 対象数 | | 11 | 120 |
| % | 68.7 | 31.3 | % | | 8.4 | 91.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 35 | 48 | 33 | |
| % | | 9.9 | 26.7 | 36.6 | 25.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 45 | 10 | 29 | 46 | (1-3) | 0 |
| % | 34.4 | 7.6 | 22.1 | 35.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 70 | 61 | 57 | (4-6) | 0 | |
| % | 53.4 | 46.6 | 43.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 22 | 44 | 56 | | |
| % | | 16.8 | 33.6 | 42.7 | | |

215 鳥取市立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 47 | (7-9) | (1-3) | 95.7 | 80.6 | 66.0 | 89.4 | 64.2 |
| I期 | 26 | (4-6) | (1-3) | | | | | 53.7 |
| II期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 67.7 |
| III期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 47 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | 10 | (7-9) | 11 | | |
| % | 21.3 | | 21.3 | | 23.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 10 | 10 | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 55.3 | 21.3 | 21.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 45 | 44 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 95.7 | 93.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (1-3) | (1-3) | 27 | | | |
| % | 29.8 | | | 57.4 | | | |

216

鳥取大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

2010-2011年の2年間の集計対象数は2,473件ありますが、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が少なからず散見され、すべてのステージが網羅されているのは肺のみであります。このような歯抜け状態では全国、都道府県、施設別比較はもとより、当院そのものの数値的な評価もできないのでコメントは差し控えさせていただきます。

コメント・公表には、鳥取県分と同様、今しばらくのデータ蓄積が必要と考えます。

30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて大学病院の数値を全国値と比較してみますと、数値を羅列するにとどまりますが、(1)胃の対象数は252件、実測生存率は全体で58.5%<61.5% (全国値)、I期は76.0%<81.3% (全国値)、IV期は4.4%<7.9% (全国値)とすべて全国値より低く、ステージ別割合はI期が66.7%>63.8% (全国値)と高く、発見経緯別にはがん検診が19.0%>10.2% (全国値)と高く、健康診断等は6.7%<11.9% (全国値)と低い。(2)大腸の対象数は185件、実測生存率は全体で65.7%>63.5% (全国値)、II期で83.1%>75.6% (全国値)と高く、I期とIII期が僅かに低い。(3)肝の対象数は118件、実測生存率は全体で45.8%>35.1% (全国値)、ステージ別にもI期~II期まで全国値より高い。ステージ別割合はUICC TNM分類、取り扱い規約ともにI期が全国値より低く、発見経緯別には他疾患観察中が54.2%<64.1% (全国値)と低い。(4)肺の対象数は331件と最も多く、実測生存率は全体で46.3%>36.3% (全国値)、I期は78.2%>71.2% (全国値)、II期は51.6%>40.8% (全国値)、III期は23.0%>20.1% (全国値)、IV期は6.5%>4.7% (全国値)とすべて全国値より高い。ステージ別割合は全国値よりI期とII期が高く、III期とIV期が低い割合を観察した。発見経緯別にはがん検診が14.5%>7.3% (全国値)と高い。(5)乳房の対象数は140件、実測生存率は全体で86.9%<87.9% (全国値)と低く、I期、II期とも全国値より低い。

全体的には部位およびステージによって多様で一定の傾向は認められなかった。

217 松江市立病院
2010-2011年2力年

コメント:

高齢者の登録の割合が高く、基礎疾患や合併症を有していることが生存率へ影響を与えていると考えられる。また、高齢者の場合に治療を希望しない症例も見受けられる。

217 松江市立病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 221 | 93 | (1-3) | 98.6 | 57.4 | 50.5 | 63.6 | 71.1 |
| I期 | 122 | 19 | (1-3) | 97.5 | 84.1 | 76.1 | 89.5 | 69.7 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 25 | 14 | 0 | | | | | 76.3 |
| IV期 | 61 | 52 | 0 | 100.0 | 14.8 | 7.3 | 24.8 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 155 | 66 | | | | | |
| % | 70.1 | 29.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 63 | 74 | 53 | | |
| % | | 11.8 | 28.5 | 33.5 | 24.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 122 | (7-9) | 25 | 61 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 55.2 | | 11.3 | 27.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 73 | 148 | 139 | (7-9) | 0 | | |
| % | 33.0 | 67.0 | 62.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | 36 | 57 | 112 | | | |
| % | 7.2 | 16.3 | 25.8 | 50.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 180 | 72 | (4-6) | 97.8 | 59.6 | 52.0 | 66.4 | 72.7 |
| I期 | 48 | 13 | (1-3) | 95.8 | 72.3 | 57.1 | 82.9 | 72.0 |
| II期 | 46 | 10 | (1-3) | 97.8 | 78.0 | 63.0 | 87.5 | 72.8 |
| III期 | 42 | 15 | (1-3) | 97.6 | 64.0 | 47.5 | 76.5 | 76.7 |
| IV期 | 39 | 32 | 0 | 100.0 | 18.0 | 7.9 | 31.3 | 74.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 105 | 75 | | | | | |
| % | 58.3 | 41.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 53 | 50 | 58 | | |
| % | | 7.2 | 29.4 | 27.8 | 32.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 46 | 42 | 39 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 26.7 | 25.6 | 23.3 | 21.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 149 | 138 | 11 | 0 | | |
| % | 17.2 | 82.8 | 76.7 | 6.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 10 | 35 | 109 | | | |
| % | 14.4 | 5.6 | 19.4 | 60.6 | | | |

217 松江市立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 45 | 34 | (1-3) | 97.8 | 22.8 | 11.8 | 36.0 | 72.0 |
| I期 | 17 | (7-9) | (1-3) | | | | | 73.9 |
| II期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 72.3 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 84.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 22 | 23 | | | | | | |
| % | 48.9 | 51.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 14 | 12 | 12 | | | |
| % | | | 31.1 | 26.7 | 26.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | 11 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 37.8 | 24.4 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 10 | (7-9) | 15 | 0 | 0 | |
| | % | 24.4 | 22.2 | | 33.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 43 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 95.6 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 24 | 19 | | | | |
| % | | | 53.3 | 42.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 76 | 53 | (1-3) | 98.7 | 29.4 | 19.6 | 39.9 | 74.0 |
| I期 | 21 | (4-6) | 0 | | | | | 76.3 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 78.0 |
| III期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 71.1 |
| IV期 | 34 | 30 | (1-3) | 97.1 | 9.2 | 2.4 | 22.0 | 73.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 52 | 24 | 対象数 | (4-6) | 71 | |
| % | 68.4 | 31.6 | % | | 93.4 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 13 | 27 | 27 | |
| % | | | 17.1 | 35.5 | 35.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 21 | (4-6) | 13 | 34 | (1-3) | 0 |
| % | 27.6 | | 17.1 | 44.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 55 | 21 | 18 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 72.4 | 27.6 | 23.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 30 | 40 | | |
| % | | | 39.5 | 52.6 | | |

217 松江市立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | (4-6) | (1-3) | 98.6 | 94.5 | 86.0 | 97.9 | 60.5 |
| I期 | 42 | (1-3) | (1-3) | 97.6 | 97.6 | 83.9 | 99.7 | 59.7 |
| II期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 54.4 |
| III期 | (7-9) | 0 | 0 | | | | | 58.2 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 59.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 73 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 20 | 23 | 13 | (4-6) | | |
| % | 16.4 | 27.4 | 31.5 | 17.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 19 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 57.5 | 26.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 66 | 63 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 90.4 | 86.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | 11 | 47 | | | |
| % | 16.4 | | 15.1 | 64.4 | | | |

218 松江赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

218 松江赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 267 | 99 | (1-3) | 98.9 | 62.8 | 56.7 | 68.3 | 72.2 |
| I期 | 187 | 38 | (1-3) | 98.4 | 79.6 | 73.0 | 84.7 | 73.5 |
| II期 | 24 | 11 | 0 | | | | | 76.4 |
| III期 | 19 | 16 | 0 | | | | | 76.8 |
| IV期 | 34 | 33 | 0 | 100.0 | 2.9 | 0.2 | 13.0 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 184 | 83 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 20 | 69 | 106 | 63 | | |
| % | | 7.5 | 25.8 | 39.7 | 23.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 187 | 24 | 19 | 34 | 0 | (1-3) | |
| % | 70.0 | 9.0 | 7.1 | 12.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | 212 | 206 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 20.6 | 79.4 | 77.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 54 | 151 | 47 | | | |
| % | 5.6 | 20.2 | 56.6 | 17.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 268 | 109 | (1-3) | 99.3 | 59.1 | 52.9 | 64.7 | 72.0 |
| I期 | 53 | (7-9) | 0 | 100.0 | 86.8 | 74.3 | 93.5 | 70.3 |
| II期 | 85 | 29 | 0 | 100.0 | 65.9 | 54.8 | 74.9 | 73.8 |
| III期 | 67 | 19 | (1-3) | 97.0 | 70.8 | 58.2 | 80.3 | 69.1 |
| IV期 | 61 | 53 | 0 | 100.0 | 13.1 | 6.1 | 22.8 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 144 | 124 | | | | | |
| % | 53.7 | 46.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 22 | 61 | 102 | 69 | | |
| % | 5.2 | 8.2 | 22.8 | 38.1 | 25.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | 85 | 67 | 61 | 0 | (1-3) | |
| % | 19.8 | 31.7 | 25.0 | 22.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 247 | 221 | 23 | (1-3) | | |
| % | 7.8 | 92.2 | 82.5 | 8.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | 21 | 139 | 69 | | | |
| % | 14.6 | 7.8 | 51.9 | 25.7 | | | |

218 松江赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 51 | (1-3) | 98.6 | 25.2 | 15.6 | 35.9 | 73.4 |
| I期 | 20 | 11 | 0 | | | | | 78.6 |
| II期 | 24 | 17 | 0 | | | | | 71.7 |
| III期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 73.1 |
| IV期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|---|--|
| 対象数 | 47 | 22 | | | | | | |
| % | 68.1 | 31.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 20 | 28 | 17 | | | |
| % | | | 29.0 | 40.6 | 24.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 20 | 24 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
| | % | 29.0 | 34.8 | 21.7 | 14.5 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 19 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
| | % | | 27.5 | 30.4 | 29.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 63 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 91.3 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 60 | (4-6) | | | | |
| % | | | 87.0 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 172 | 95 | (1-3) | 99.4 | 44.5 | 36.9 | 51.7 | 71.8 |
| I期 | 74 | 20 | 0 | 100.0 | 73.0 | 61.3 | 81.6 | 74.0 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 85.5 |
| III期 | 41 | 26 | 0 | 100.0 | 36.6 | 22.3 | 51.0 | 72.4 |
| IV期 | 48 | 43 | (1-3) | 97.9 | 8.6 | 2.7 | 18.6 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 116 | 56 | 対象数 | | 11 | 161 |
| % | 67.4 | 32.6 | % | | 6.4 | 93.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 46 | 54 | 49 | |
| % | | 11.0 | 26.7 | 31.4 | 28.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 74 | (4-6) | 41 | 48 | (1-3) | (1-3) |
| % | 43.0 | | 23.8 | 27.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 81 | 91 | 85 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 47.1 | 52.9 | 49.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 13 | 15 | 111 | 33 | | |
| % | 7.6 | 8.7 | 64.5 | 19.2 | | |

218 松江赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 182 | 21 | 0 | 100.0 | 88.5 | 82.9 | 92.3 | 61.1 |
| I期 | 87 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.7 | 91.1 | 99.4 | 61.1 |
| II期 | 63 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.1 | 82.0 | 96.6 | 59.4 |
| III期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 76.2 |
| IV期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 64.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 182 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 37 | 51 | 49 | 31 | 14 | | |
| % | 20.3 | 28.0 | 26.9 | 17.0 | 7.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 87 | 63 | 20 | 11 | 0 | (1-3) | |
| % | 47.8 | 34.6 | 11.0 | 6.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 166 | 162 | (4-6) | 0 | | |
| % | 8.8 | 91.2 | 89.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 36 | 12 | 59 | 75 | | | |
| % | 19.8 | 6.6 | 32.4 | 41.2 | | | |

219

島根大学医学部附属病院

2010-2011年2力年

コメント:

本院は都道府県がん診療連携拠点病院として、県内の地域がん診療連携拠点病院などと連携しながら、がん診療に当たっています。また、小児がん、眼腫瘍、四肢軟部腫瘍などの稀少がんの拠点としての役割も果たしています。

病院がある出雲医療圏の患者は半数以下で、他は県内の他医療圏から患者を受け入れています。患者の紹介目的は様々で、手術、放射線療法、化学療法などを組み合わせた集学的治療のため、治験のため、他の病院では対応困難な重篤な併存疾患を有するためなど、県内のがん医療の最後の砦としての役割を果たしています。

また、がんと診断されたときからの緩和ケアにも力をいれており、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟を有しています。

がんの生存率は、がん死亡を減らすということを考えると現状把握ができる大切なデータですが、生存率集計の対象になる患者は多様で、全身状態や併存疾患などによる影響を受けた生存率ですので、参考として取り扱っていただきたいと思います。

がん患者・家族サポートセンターでは、がん患者さんや家族からの様々な相談にがん相談員が対応しています。本資料を活用して、患者・家族へ科学的根拠に基づいた情報提供に努めたいと思います。

219 島根大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 227 | 89 | (1-3) | 99.6 | 60.7 | 54.0 | 66.7 | 71.8 |
| I期 | 142 | 33 | (1-3) | 99.3 | 76.7 | 68.8 | 82.8 | 72.6 |
| II期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 77.1 |
| III期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 76.4 |
| IV期 | 42 | 38 | 0 | 100.0 | 9.5 | 3.0 | 20.6 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 161 | 66 | | | | | |
| % | 70.9 | 29.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 27 | 56 | 90 | 51 | | |
| % | | 11.9 | 24.7 | 39.6 | 22.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 142 | 13 | 15 | 42 | (1-3) | 12 | |
| % | 62.6 | 5.7 | 6.6 | 18.5 | | 5.3 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 192 | 174 | 16 | (1-3) | | |
| % | 15.4 | 84.6 | 76.7 | 7.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 30 | 114 | 68 | | | |
| % | 6.6 | 13.2 | 50.2 | 30.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 161 | 64 | (1-3) | 99.4 | 60.2 | 52.2 | 67.3 | 70.1 |
| I期 | 39 | (7-9) | (1-3) | 97.4 | 79.4 | 63.0 | 89.1 | 65.3 |
| II期 | 40 | 10 | 0 | 100.0 | 75.0 | 58.5 | 85.7 | 69.8 |
| III期 | 45 | 18 | 0 | 100.0 | 60.0 | 44.3 | 72.6 | 74.4 |
| IV期 | 33 | 26 | 0 | 100.0 | 21.2 | 9.4 | 36.3 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 90 | 71 | | | | | |
| % | 55.9 | 44.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 19 | 49 | 48 | 38 | | |
| % | | 11.8 | 30.4 | 29.8 | 23.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 40 | 45 | 33 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 24.2 | 24.8 | 28.0 | 20.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 138 | 122 | 14 | (1-3) | | |
| % | 14.3 | 85.7 | 75.8 | 8.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (7-9) | 58 | 76 | | | |
| % | 11.2 | | 36.0 | 47.2 | | | |

219 島根大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 82 | 47 | 0 | 100.0 | 42.7 | 31.9 | 53.0 | 72.6 |
| I期 | 39 | 19 | 0 | 100.0 | 51.3 | 34.8 | 65.6 | 70.5 |
| II期 | 28 | 14 | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 76.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 53 | 29 | | | | | |
| % | 64.6 | 35.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 18 | 38 | 20 | | |
| % | | | 22.0 | 46.3 | 24.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 39 | 28 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 47.6 | 34.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 33 | 11 | 13 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 28.0 | 40.2 | 13.4 | 15.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 59 | 23 | 20 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 72.0 | 28.0 | 24.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 67 | 14 | | | |
| % | | | 81.7 | 17.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 262 | 167 | (1-3) | 99.2 | 36.0 | 30.2 | 41.8 | 73.8 |
| I期 | 132 | 55 | (1-3) | 99.2 | 58.1 | 49.2 | 66.0 | 73.5 |
| II期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 75.3 |
| III期 | 55 | 46 | 0 | 100.0 | 16.4 | 8.1 | 27.2 | 72.3 |
| IV期 | 57 | 51 | (1-3) | 98.2 | 10.2 | 4.0 | 19.8 | 73.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 170 | 92 | 対象数 | | 13 | 249 |
| % | 64.9 | 35.1 | % | | 5.0 | 95.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 65 | 96 | 82 | |
| % | | 5.7 | 24.8 | 36.6 | 31.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 132 | 15 | 55 | 57 | (1-3) | (1-3) |
| % | 50.4 | 5.7 | 21.0 | 21.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 113 | 149 | 138 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 43.1 | 56.9 | 52.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 20 | 44 | 129 | 69 | | |
| % | 7.6 | 16.8 | 49.2 | 26.3 | | |

219 島根大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 76 | (7-9) | 0 | 100.0 | 90.8 | 81.7 | 95.5 | 64.5 |
| I期 | 25 | (1-3) | 0 | | | | | 67.5 |
| II期 | 34 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.1 | 80.9 | 99.6 | 62.6 |
| III期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 70.8 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 76 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 20 | 15 | 15 | 13 | | |
| % | 17.1 | 26.3 | 19.7 | 19.7 | 17.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 34 | 12 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 32.9 | 44.7 | 15.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 69 | 64 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | 90.8 | 84.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (1-3) | 19 | 39 | | | |
| % | 19.7 | | 25.0 | 51.3 | | | |

220

島根県立中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

【胃】

発見経緯において他疾患観察中の割合も多く、高齢患者も多くみられる。

【大腸】

年齢層は80歳代が29.7%と1番高く、依存疾患が予後に影響していることが考えられる。早期癌の割合よりIII期（20.9%）、IV期（24.3%）の進行した症例の割合が多いことが示されている。

【肝】

当院では全国や島根県全体と比較して、I期の患者が多く、肝癌のサーベイランスが適切に行えていると考えられる一方でIV期の患者も多く、偶然発見され紹介となる進行例や症状が出現してから受診する進行例も多いと推察される。

生存率はI期の患者でもやや低くなっているが、高齢で治療拒否される例や、合併症が多く積極的治療ができない例が多い印象はある。

【肺】

80歳以上の患者さんが31%であり、手術や抗がん剤治療が全身状態から難しい。または十分に行えていない場合がありうる。さらに他疾患を合併されていることも多いと考えられる。手術適応とされるI期、II期の患者さんの生存率に影響している可能性がある。

【女性乳房】

比較的高齢者が多い県ではあるが、病期別の患者数の割合や生存率において全国の値と変わりなく、検診や精査機関など早期診断のできる体制が整っており全国レベルの標準的な治療も十分かつ適切に行われていると考えられる。

220 島根県立中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 348 | 138 | (1-3) | 99.4 | 60.3 | 55.0 | 65.2 | 70.3 |
| I期 | 205 | 33 | (1-3) | 99.5 | 83.9 | 78.1 | 88.3 | 69.8 |
| II期 | 29 | 11 | 0 | | | | | 67.8 |
| III期 | 31 | 16 | (1-3) | 96.8 | 48.4 | 30.2 | 64.4 | 63.8 |
| IV期 | 77 | 75 | 0 | 100.0 | 2.6 | 0.5 | 8.1 | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 249 | 99 | | | | | |
| % | 71.6 | 28.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 39 | 92 | 125 | 77 | | |
| % | 4.3 | 11.2 | 26.4 | 35.9 | 22.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 205 | 29 | 31 | 77 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 58.9 | 8.3 | 8.9 | 22.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 75 | 273 | 254 | 19 | 0 | | |
| % | 21.6 | 78.4 | 73.0 | 5.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 36 | 92 | 191 | | | |
| % | 8.3 | 10.3 | 26.4 | 54.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 263 | 113 | (1-3) | 99.2 | 56.8 | 50.5 | 62.5 | 71.6 |
| I期 | 48 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.3 | 67.1 | 89.8 | 70.5 |
| II期 | 82 | 21 | (1-3) | 97.6 | 73.9 | 62.8 | 82.1 | 74.5 |
| III期 | 55 | 18 | 0 | 100.0 | 67.3 | 53.2 | 78.0 | 70.4 |
| IV期 | 64 | 54 | 0 | 100.0 | 15.6 | 8.0 | 25.5 | 67.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 150 | 113 | | | | | |
| % | 57.0 | 43.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 37 | 62 | 77 | 78 | | |
| % | | 14.1 | 23.6 | 29.3 | 29.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 82 | 55 | 64 | 12 | (1-3) | |
| % | 18.3 | 31.2 | 20.9 | 24.3 | 4.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 215 | 204 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 18.3 | 81.7 | 77.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 13 | 66 | 166 | | | |
| % | 6.8 | 4.9 | 25.1 | 63.1 | | | |

220 島根県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 123 | 84 | 0 | 100.0 | 31.7 | 23.7 | 40.0 | 73.4 |
| I期 | 58 | 33 | 0 | 100.0 | 43.1 | 30.2 | 55.3 | 73.8 |
| II期 | 23 | 12 | 0 | | | | | 67.9 |
| III期 | 25 | 22 | 0 | | | | | 77.6 |
| IV期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 75.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|
| 対象数 | 91 | 32 | | | | | |
| % | 74.0 | 26.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 24 | 54 | 35 | | |
| % | | | 19.5 | 43.9 | 28.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 58 | 23 | 25 | 15 | 0 | (1-3) |
| | % | 47.2 | 18.7 | 20.3 | 12.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 27 | 39 | 24 | 17 | 14 | (1-3) |
| | % | 22.0 | 31.7 | 19.5 | 13.8 | 11.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 100 | 23 | 23 | 0 | 0 | | |
| % | 81.3 | 18.7 | 18.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 83 | 37 | | | |
| % | | | 67.5 | 30.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 174 | 120 | (1-3) | 98.9 | 30.7 | 24.0 | 37.7 | 73.1 |
| I期 | 55 | 18 | (1-3) | 98.2 | 67.0 | 52.9 | 77.8 | 73.2 |
| II期 | 16 | 14 | 0 | | | | | 79.8 |
| III期 | 47 | 37 | (1-3) | 97.9 | 20.2 | 10.1 | 32.8 | 71.1 |
| IV期 | 54 | 51 | 0 | 100.0 | 5.6 | 1.5 | 13.9 | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 126 | 48 | 対象数 | 11 | 163 | | |
| % | 72.4 | 27.6 | % | 6.3 | 93.7 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 49 | 54 | 54 | | |
| % | | 7.5 | 28.2 | 31.0 | 31.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | 16 | 47 | 54 | 0 | (1-3) | |
| % | 31.6 | 9.2 | 27.0 | 31.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 102 | 72 | 71 | (1-3) | 0 | | |
| % | 58.6 | 41.4 | 40.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 69 | 83 | | | |
| % | | 8.0 | 39.7 | 47.7 | | | |

220 島根県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 187 | 24 | (1-3) | 98.4 | 87.0 | 81.2 | 91.1 | 61.2 |
| I期 | 92 | (7-9) | (1-3) | 97.8 | 90.0 | 81.7 | 94.7 | 62.7 |
| II期 | 62 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.3 | 79.7 | 95.5 | 56.7 |
| III期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 58.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 187 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 50 | 41 | 36 | 41 | 19 | | |
| % | 26.7 | 21.9 | 19.3 | 21.9 | 10.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 92 | 62 | 24 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 49.2 | 33.2 | 12.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 174 | 157 | 10 | (7-9) | | |
| % | 7.0 | 93.0 | 84.0 | 5.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | (7-9) | 23 | 122 | | | |
| % | 18.7 | | 12.3 | 65.2 | | | |

221 国立病院機構 浜田医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

221 国立病院機構 浜田医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 204 | 91 | (1-3) | 99.5 | 55.2 | 48.1 | 61.7 | 73.9 |
| I期 | 124 | 33 | (1-3) | 99.2 | 73.2 | 64.4 | 80.1 | 75.1 |
| II期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 80.0 |
| III期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 72.7 |
| IV期 | 45 | 43 | 0 | 100.0 | 4.4 | 0.8 | 13.3 | 73.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 127 | 77 | | | | | |
| % | 62.3 | 37.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 18 | 41 | 77 | 66 | | |
| % | | 8.8 | 20.1 | 37.7 | 32.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 124 | 14 | 17 | 45 | 0 | (4-6) | |
| % | 60.8 | 6.9 | 8.3 | 22.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 156 | 144 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 23.5 | 76.5 | 70.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 23 | 60 | 112 | | | |
| % | | 11.3 | 29.4 | 54.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 149 | 71 | (1-3) | 98.0 | 51.9 | 43.5 | 59.6 | 75.3 |
| I期 | 37 | (1-3) | (1-3) | 97.3 | 91.7 | 76.4 | 97.2 | 70.8 |
| II期 | 41 | 18 | (1-3) | 97.6 | 55.8 | 39.3 | 69.4 | 77.3 |
| III期 | 35 | 21 | 0 | 100.0 | 40.0 | 24.0 | 55.5 | 75.7 |
| IV期 | 35 | 29 | (1-3) | 97.1 | 16.1 | 6.1 | 30.3 | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 81 | 68 | | | | | |
| % | 54.4 | 45.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 33 | 54 | 53 | | |
| % | | | 22.1 | 36.2 | 35.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 41 | 35 | 35 | 0 | (1-3) | |
| % | 24.8 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 130 | 115 | 11 | (4-6) | | |
| % | 12.8 | 87.2 | 77.2 | 7.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 11 | 38 | 88 | | | |
| % | 8.1 | 7.4 | 25.5 | 59.1 | | | |

221 国立病院機構 浜田医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 44 | 32 | (1-3) | 97.7 | 26.0 | 14.0 | 39.6 | 74.8 |
| I期 | 17 | 12 | 0 | | | | | 74.3 |
| II期 | 12 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.5 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 79.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 29 | 15 | | | | | | |
| % | 65.9 | 34.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 26 | 10 | | | |
| % | | | | 59.1 | 22.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | 12 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 38.6 | 27.3 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 12 | (7-9) | 15 | 0 | 0 | |
| | % | | 27.3 | | 34.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 42 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | | | |
| % | 95.5 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 28 | 15 | | | | |
| % | | | 63.6 | 34.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 170 | 127 | (1-3) | 99.4 | 24.9 | 18.6 | 31.6 | 73.6 |
| I期 | 46 | 13 | 0 | 100.0 | 71.7 | 56.4 | 82.5 | 73.3 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | 49 | 43 | (1-3) | 98.0 | 10.4 | 3.8 | 20.9 | 73.8 |
| IV期 | 64 | 62 | 0 | 100.0 | 3.1 | 0.6 | 9.7 | 75.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|
| 対象数 | 127 | 43 | 対象数 | | 29 | 141 | |
| % | 74.7 | 25.3 | % | | 17.1 | 82.9 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 35 | 57 | 59 | | |
| % | | 10.0 | 20.6 | 33.5 | 34.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | 10 | 49 | 64 | (1-3) | 0 | |
| % | 27.1 | 5.9 | 28.8 | 37.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 119 | 51 | 51 | 0 | 0 | | |
| % | 70.0 | 30.0 | 30.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | (7-9) | 64 | 73 | | | |
| % | 14.7 | | 37.6 | 42.9 | | | |

221 国立病院機構 浜田医療センター
 女性乳房
 5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 79 | 10 | (1-3) | 98.7 | 87.3 | 77.7 | 93.0 | 63.8 |
| I期 | 38 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.4 | 82.8 | 99.6 | 61.9 |
| II期 | 29 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.9 |
| III期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 72.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 79 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 21 | 15 | 14 | 15 | | |
| % | 17.7 | 26.6 | 19.0 | 17.7 | 19.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 29 | 11 | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 48.1 | 36.7 | 13.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 66 | 62 | 0 | (4-6) | | |
| % | 16.5 | 83.5 | 78.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | (4-6) | (7-9) | 43 | | | |
| % | 31.6 | | | 54.4 | | | |

222 岡山済生会総合病院
2010-2011年2力年

コメント:

観血的治療の実施割合は、その施設全体が治療を行っている重症な慢性疾患患者や合併症の多い高齢患者の割合を表現しています。観血的治療の実測生存率も同様の傾向があり、重症な慢性疾患患者や合併症の多い高齢患者の占める割合が高くなると、がん以外の原因で亡くなる患者が多くなり、生存率は低くなります。当院の観血的治療の実施割合や治療対象患者の平均年齢を全国平均や岡山県内他施設と比較すると、重症な慢性疾患患者や合併症の多い高齢患者の割合が高い結果でしたが、生存率は良好でした。全身状態不良ながん患者の治療を行う“がんのハイボリュームセンター”としての役割を認識して対応を検討し、今後もより適切な治療法を目指します。

222 岡山済生会総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 483 | 198 | 21 | 95.7 | 58.4 | 53.9 | 62.7 | 70.3 |
| I期 | 290 | 57 | 21 | 92.8 | 79.8 | 74.6 | 84.0 | 70.4 |
| II期 | 40 | 12 | 0 | 100.0 | 70.0 | 53.3 | 81.7 | 70.2 |
| III期 | 38 | 19 | 0 | 100.0 | 50.0 | 33.4 | 64.5 | 69.8 |
| IV期 | 105 | 101 | 0 | 100.0 | 3.8 | 1.3 | 8.8 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 325 | 158 | | | | | |
| % | 67.3 | 32.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 44 | 148 | 159 | 104 | | |
| % | 5.8 | 9.1 | 30.6 | 32.9 | 21.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 290 | 40 | 38 | 105 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 60.0 | 8.3 | 7.9 | 21.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 110 | 373 | 347 | 25 | (1-3) | | |
| % | 22.8 | 77.2 | 71.8 | 5.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 47 | 48 | 163 | 225 | | | |
| % | 9.7 | 9.9 | 33.7 | 46.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 373 | 155 | 11 | 97.1 | 58.0 | 52.8 | 62.8 | 69.4 |
| I期 | 82 | 14 | (4-6) | 95.1 | 82.7 | 72.5 | 89.4 | 70.6 |
| II期 | 108 | 32 | (4-6) | 96.3 | 69.9 | 60.2 | 77.7 | 71.3 |
| III期 | 90 | 29 | (1-3) | 97.8 | 67.5 | 56.8 | 76.2 | 68.7 |
| IV期 | 89 | 77 | (1-3) | 98.9 | 12.5 | 6.6 | 20.3 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 213 | 160 | | | | | |
| % | 57.1 | 42.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 48 | 107 | 113 | 81 | | |
| % | 6.4 | 12.9 | 28.7 | 30.3 | 21.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 108 | 90 | 89 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.0 | 29.0 | 24.1 | 23.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 44 | 329 | 270 | 58 | (1-3) | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 72.4 | 15.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | 27 | 101 | 207 | | | |
| % | 10.2 | 7.2 | 27.1 | 55.5 | | | |

222 岡山済生会総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 225 | 139 | (7-9) | 96.0 | 36.9 | 30.5 | 43.3 | 71.1 |
| I期 | 112 | 51 | (4-6) | 95.5 | 53.0 | 43.2 | 61.9 | 72.1 |
| II期 | 56 | 38 | (1-3) | 94.6 | 30.5 | 18.8 | 42.9 | 70.7 |
| III期 | 42 | 35 | (1-3) | 97.6 | 15.7 | 6.6 | 28.5 | 69.1 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 対象数 | 154 | 71 | | | | | | |
| % | 68.4 | 31.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 23 | 70 | 81 | 48 | | | |
| % | | 10.2 | 31.1 | 36.0 | 21.3 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 112 | 56 | 42 | 11 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 49.8 | 24.9 | 18.7 | 4.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 65 | 84 | 39 | 34 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 28.9 | 37.3 | 17.3 | 15.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 153 | 72 | 65 | (7-9) | 0 | | | |
| % | 68.0 | 32.0 | 28.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 164 | 51 | | | | |
| % | | 4.4 | 72.9 | 22.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 244 | 159 | (4-6) | 98.4 | 34.3 | 28.4 | 40.3 | 72.4 |
| I期 | 100 | 31 | (1-3) | 98.0 | 68.9 | 58.8 | 77.0 | 71.6 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 65.3 |
| III期 | 64 | 55 | (1-3) | 98.4 | 12.8 | 6.0 | 22.2 | 74.5 |
| IV期 | 65 | 64 | (1-3) | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 167 | 77 | 対象数 | | 24 | 220 | | |
| % | 68.4 | 31.6 | % | | 9.8 | 90.2 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 56 | 94 | 63 | | | |
| % | | 11.1 | 23.0 | 38.5 | 25.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 100 | 11 | 64 | 65 | (4-6) | 0 | | |
| % | 41.0 | 4.5 | 26.2 | 26.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 134 | 110 | 109 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 54.9 | 45.1 | 44.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 23 | 16 | 126 | 79 | | | | |
| % | 9.4 | 6.6 | 51.6 | 32.4 | | | | |

222 岡山済生会総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 119 | 21 | (1-3) | 98.3 | 82.2 | 74.1 | 88.0 | 63.9 |
| I期 | 61 | (4-6) | 0 | 100.0 | 93.4 | 83.5 | 97.5 | 64.4 |
| II期 | 37 | (4-6) | (1-3) | 94.6 | 86.2 | 69.8 | 94.0 | 61.0 |
| III期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 71.5 |
| IV期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 60.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 119 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 29 | 36 | 19 | 18 | | |
| % | 14.3 | 24.4 | 30.3 | 16.0 | 15.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | 37 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| % | 51.3 | 31.1 | 8.4 | 9.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 108 | 103 | (4-6) | 0 | | |
| % | 9.2 | 90.8 | 86.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | (1-3) | 19 | 68 | | | |
| % | 25.2 | | 16.0 | 57.1 | | | |

223 岡山赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

223 岡山赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 225 | 99 | (4-6) | 97.3 | 55.6 | 48.8 | 61.8 | 71.8 |
| I期 | 132 | 32 | (4-6) | 97.0 | 75.5 | 67.1 | 82.0 | 71.2 |
| II期 | 20 | (7-9) | (1-3) | | | | | 63.8 |
| III期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 73.9 |
| IV期 | 49 | 46 | (1-3) | 98.0 | 4.8 | 0.9 | 13.9 | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 155 | 70 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 26 | 62 | 81 | 53 | | |
| % | | 11.6 | 27.6 | 36.0 | 23.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 132 | 20 | 18 | 49 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 58.7 | 8.9 | 8.0 | 21.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 56 | 169 | 156 | 13 | 0 | | |
| % | 24.9 | 75.1 | 69.3 | 5.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 35 | 60 | 105 | | | |
| % | 11.1 | 15.6 | 26.7 | 46.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 180 | 55 | (7-9) | 96.1 | 69.1 | 61.7 | 75.3 | 69.7 |
| I期 | 33 | (1-3) | (4-6) | 87.9 | 90.9 | 74.4 | 97.0 | 73.4 |
| II期 | 60 | 11 | (1-3) | 98.3 | 81.4 | 69.0 | 89.3 | 70.9 |
| III期 | 52 | 17 | 0 | 100.0 | 67.3 | 52.8 | 78.2 | 69.0 |
| IV期 | 29 | 20 | 0 | | | | | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 94 | 86 | | | | | |
| % | 52.2 | 47.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 55 | 55 | 38 | | |
| % | | 14.4 | 30.6 | 30.6 | 21.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 60 | 52 | 29 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 18.3 | 33.3 | 28.9 | 16.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 160 | 143 | 17 | 0 | | |
| % | 11.1 | 88.9 | 79.4 | 9.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 15 | 47 | 105 | | | |
| % | 7.2 | 8.3 | 26.1 | 58.3 | | | |

223 岡山赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 34 | 0 | 100.0 | 35.9 | 23.3 | 48.6 | 73.1 |
| I期 | 22 | 10 | 0 | | | | | 73.8 |
| II期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 69.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 82.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 34 | 19 | | | | | |
| % | 64.2 | 35.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 12 | 20 | 15 | | |
| % | | | 22.6 | 37.7 | 28.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 15 | 11 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 41.5 | 28.3 | 20.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 23 | (7-9) | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | | 43.4 | | 24.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 18 | 17 | (1-3) | 0 | | |
| % | 66.0 | 34.0 | 32.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 35 | 17 | | | |
| % | | | 66.0 | 32.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 312 | 202 | (4-6) | 98.7 | 34.8 | 29.6 | 40.2 | 70.3 |
| I期 | 110 | 32 | (1-3) | 98.2 | 70.6 | 61.0 | 78.2 | 72.1 |
| II期 | 33 | 21 | 0 | 100.0 | 36.4 | 20.6 | 52.3 | 71.6 |
| III期 | 55 | 40 | (1-3) | 96.4 | 25.5 | 14.7 | 37.7 | 71.0 |
| IV期 | 104 | 100 | 0 | 100.0 | 3.9 | 1.3 | 8.8 | 67.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 229 | 83 | 対象数 | | 36 | 276 |
| % | 73.4 | 26.6 | % | | 11.5 | 88.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 104 | 106 | 62 | |
| % | | 9.9 | 33.3 | 34.0 | 19.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 110 | 33 | 55 | 104 | (4-6) | (4-6) |
| % | 35.3 | 10.6 | 17.6 | 33.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 169 | 143 | 129 | 14 | 0 | |
| % | 54.2 | 45.8 | 41.3 | 4.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 37 | 32 | 112 | 131 | | |
| % | 11.9 | 10.3 | 35.9 | 42.0 | | |

223 岡山赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 110 | 12 | (1-3) | 99.1 | 89.0 | 81.5 | 93.6 | 63.3 |
| I期 | 47 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.9 | 85.8 | 99.7 | 59.7 |
| II期 | 44 | (1-3) | 0 | 100.0 | 93.2 | 80.3 | 97.8 | 63.9 |
| III期 | 10 | (1-3) | (1-3) | | | | | 70.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 110 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 19 | 32 | 22 | 15 | | |
| % | 20.0 | 17.3 | 29.1 | 20.0 | 13.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 47 | 44 | 10 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 42.7 | 40.0 | 9.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 98 | 98 | 0 | 0 | | |
| % | 10.9 | 89.1 | 89.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (7-9) | 22 | 64 | | | |
| % | 13.6 | | 20.0 | 58.2 | | | |

224 岡山大学病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

224 岡山大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 419 | 123 | 28 | 93.3 | 69.6 | 64.8 | 73.8 | 69.0 |
| I期 | 324 | 59 | 25 | 92.3 | 80.9 | 76.1 | 84.9 | 69.5 |
| II期 | 23 | 10 | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | 12 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.8 |
| IV期 | 57 | 49 | (1-3) | 98.2 | 12.5 | 5.5 | 22.6 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 326 | 93 | | | | | |
| % | 77.8 | 22.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 51 | 137 | 152 | 63 | | |
| % | 3.8 | 12.2 | 32.7 | 36.3 | 15.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 324 | 23 | 12 | 57 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 77.3 | 5.5 | 2.9 | 13.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 57 | 362 | 343 | 18 | (1-3) | | |
| % | 13.6 | 86.4 | 81.9 | 4.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 40 | 208 | 154 | | | |
| % | 4.1 | 9.5 | 49.6 | 36.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 226 | 65 | 11 | 95.1 | 70.6 | 64.0 | 76.1 | 66.7 |
| I期 | 51 | (7-9) | (1-3) | 94.1 | 83.9 | 70.4 | 91.6 | 68.9 |
| II期 | 61 | 15 | (4-6) | 91.8 | 74.5 | 61.3 | 83.8 | 66.9 |
| III期 | 64 | 10 | (1-3) | 98.4 | 84.2 | 72.5 | 91.1 | 64.6 |
| IV期 | 43 | 32 | (1-3) | 97.7 | 24.1 | 12.5 | 37.7 | 67.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 135 | 91 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 39 | 82 | 65 | 25 | | |
| % | 6.6 | 17.3 | 36.3 | 28.8 | 11.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | 61 | 64 | 43 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 22.6 | 27.0 | 28.3 | 19.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 198 | 185 | 13 | 0 | | |
| % | 12.4 | 87.6 | 81.9 | 5.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 24 | 65 | 120 | | | |
| % | 7.5 | 10.6 | 28.8 | 53.1 | | | |

224 岡山大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 239 | 116 | 20 | 91.6 | 47.7 | 40.9 | 54.1 | 69.2 |
| I期 | 123 | 46 | (4-6) | 96.7 | 61.7 | 52.4 | 69.7 | 68.6 |
| II期 | 55 | 28 | (4-6) | 90.9 | 44.3 | 30.4 | 57.4 | 70.7 |
| III期 | 41 | 27 | (4-6) | 85.4 | 23.6 | 11.2 | 38.6 | 71.9 |
| IV期 | 17 | 12 | (4-6) | | | | | 65.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 171 | 68 | | | | | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 69 | 93 | 38 | | |
| % | | 12.6 | 28.9 | 38.9 | 15.9 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 123 | 55 | 41 | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 51.5 | 23.0 | 17.2 | 7.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 70 | 80 | 45 | 41 | (1-3) | 0 |
| | % | 29.3 | 33.5 | 18.8 | 17.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 148 | 91 | 83 | (7-9) | 0 | | |
| % | 61.9 | 38.1 | 34.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 192 | 40 | | | |
| % | | | 80.3 | 16.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 437 | 203 | 25 | 94.3 | 51.5 | 46.6 | 56.1 | 67.7 |
| I期 | 199 | 48 | (7-9) | 96.0 | 75.2 | 68.5 | 80.7 | 70.4 |
| II期 | 24 | 10 | (1-3) | | | | | 71.4 |
| III期 | 113 | 63 | (7-9) | 92.9 | 40.6 | 31.2 | 49.8 | 65.7 |
| IV期 | 98 | 81 | (7-9) | 92.9 | 11.9 | 6.2 | 19.6 | 65.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 295 | 142 | 対象数 | | 30 | 407 |
| % | 67.5 | 32.5 | % | | 6.9 | 93.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 23 | 60 | 152 | 155 | 47 | |
| % | 5.3 | 13.7 | 34.8 | 35.5 | 10.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 199 | 24 | 113 | 98 | 0 | (1-3) |
| % | 45.5 | 5.5 | 25.9 | 22.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 205 | 232 | 225 | (7-9) | 0 | |
| % | 46.9 | 53.1 | 51.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 19 | 64 | 216 | 138 | | |
| % | 4.3 | 14.6 | 49.4 | 31.6 | | |

224 岡山大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 223 | 19 | (7-9) | 96.4 | 91.3 | 86.6 | 94.3 | 56.8 |
| I期 | 113 | (4-6) | (4-6) | 95.6 | 95.4 | 89.4 | 98.1 | 58.3 |
| II期 | 69 | (1-3) | (1-3) | 97.1 | 95.5 | 86.8 | 98.5 | 55.1 |
| III期 | 32 | (7-9) | 0 | 100.0 | 78.1 | 59.5 | 88.9 | 55.4 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 48.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 223 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 75 | 48 | 58 | 31 | 11 | | |
| % | 33.6 | 21.5 | 26.0 | 13.9 | 4.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 113 | 69 | 32 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 50.7 | 30.9 | 14.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 208 | 194 | 14 | 0 | | |
| % | 6.7 | 93.3 | 87.0 | 6.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | 26 | 40 | 124 | | | |
| % | 14.8 | 11.7 | 17.9 | 55.6 | | | |

225 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
2011年のみ

コメント:

特になし

225 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 326 | 149 | (1-3) | 99.1 | 54.0 | 48.4 | 59.2 | 71.5 |
| I期 | 202 | 54 | (1-3) | 99.5 | 73.1 | 66.4 | 78.7 | 72.0 |
| II期 | 25 | 14 | 0 | | | | | 72.5 |
| III期 | 26 | 15 | (1-3) | | | | | 70.3 |
| IV期 | 70 | 63 | 0 | 100.0 | 10.0 | 4.4 | 18.3 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 220 | 106 | | | | | |
| % | 67.5 | 32.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 24 | 91 | 122 | 75 | | |
| % | 4.3 | 7.4 | 27.9 | 37.4 | 23.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 202 | 25 | 26 | 70 | (1-3) | 0 | |
| % | 62.0 | 7.7 | 8.0 | 21.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 275 | 250 | 25 | 0 | | |
| % | 15.6 | 84.4 | 76.7 | 7.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 52 | 12 | 110 | 152 | | | |
| % | 16.0 | 3.7 | 33.7 | 46.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 252 | 111 | (1-3) | 98.8 | 55.6 | 49.2 | 61.5 | 70.6 |
| I期 | 61 | 12 | (1-3) | 98.4 | 80.2 | 67.7 | 88.2 | 70.5 |
| II期 | 70 | 24 | (1-3) | 98.6 | 65.4 | 53.0 | 75.3 | 71.6 |
| III期 | 58 | 21 | 0 | 100.0 | 63.8 | 50.1 | 74.7 | 70.6 |
| IV期 | 54 | 48 | (1-3) | 98.1 | 9.5 | 3.5 | 19.1 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 161 | 91 | | | | | |
| % | 63.9 | 36.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 30 | 62 | 88 | 61 | | |
| % | 4.4 | 11.9 | 24.6 | 34.9 | 24.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | 70 | 58 | 54 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 24.2 | 27.8 | 23.0 | 21.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 218 | 209 | (7-9) | 0 | | |
| % | 13.5 | 86.5 | 82.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | 0 | 73 | 134 | | | |
| % | 17.9 | | 29.0 | 53.2 | | | |

225 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 115 | 63 | (1-3) | 98.3 | 44.5 | 35.2 | 53.3 | 71.1 |
| I期 | 53 | 28 | 0 | 100.0 | 47.2 | 33.4 | 59.8 | 73.1 |
| II期 | 41 | 15 | (1-3) | 95.1 | 61.8 | 44.8 | 74.9 | 69.8 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 67.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 68.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 72 | 43 | | | | | |
| % | 62.6 | 37.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 34 | 38 | 28 | | |
| % | | 11.3 | 29.6 | 33.0 | 24.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 53 | 41 | 12 | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | 46.1 | 35.7 | 10.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 39 | 39 | 22 | 12 | (1-3) | 0 |
| | % | 33.9 | 33.9 | 19.1 | 10.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 84 | 31 | 30 | (1-3) | 0 | | |
| % | 73.0 | 27.0 | 26.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 88 | 20 | | | |
| % | | | 76.5 | 17.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 433 | 249 | (7-9) | 98.4 | 42.2 | 37.5 | 46.8 | 70.2 |
| I期 | 187 | 52 | (4-6) | 97.9 | 72.1 | 65.0 | 78.0 | 70.1 |
| II期 | 24 | (7-9) | (1-3) | | | | | 68.4 |
| III期 | 90 | 63 | (1-3) | 97.8 | 28.8 | 19.7 | 38.4 | 69.7 |
| IV期 | 127 | 122 | 0 | 100.0 | 3.9 | 1.5 | 8.4 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 317 | 116 | 対象数 | | 25 | 408 |
| % | 73.2 | 26.8 | % | | 5.8 | 94.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 41 | 153 | 136 | 92 | |
| % | 2.5 | 9.5 | 35.3 | 31.4 | 21.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 187 | 24 | 90 | 127 | (1-3) | (1-3) |
| % | 43.2 | 5.5 | 20.8 | 29.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 202 | 231 | 219 | 12 | 0 | |
| % | 46.7 | 53.3 | 50.6 | 2.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 78 | 188 | 158 | | |
| % | | 18.0 | 43.4 | 36.5 | | |

225 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 123 | 17 | (1-3) | 99.2 | 86.1 | 78.6 | 91.1 | 63.5 |
| I期 | 74 | (7-9) | 0 | 100.0 | 89.2 | 79.5 | 94.4 | 62.7 |
| II期 | 32 | (1-3) | 0 | 100.0 | 90.6 | 73.7 | 96.9 | 62.7 |
| III期 | 14 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.2 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 123 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 28 | 29 | 23 | 21 | | |
| % | 17.9 | 22.8 | 23.6 | 18.7 | 17.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 74 | 32 | 14 | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 60.2 | 26.0 | 11.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 106 | 104 | 0 | (1-3) | | |
| % | 13.8 | 86.2 | 84.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 53 | 0 | 20 | 50 | | | |
| % | 43.1 | | 16.3 | 40.7 | | | |

226 岡山医療センター
2011年のみ

コメント:

岡山医療センターは、2011年の単年データのみでの参加で、2010年は参加していません。生存状況把握割合は、定期的に行っている予後調査を実施したので100%でした。しかし、今回も、5大がんの各がん種別に、単一施設ごとの生存率を算出することに関しては、単年データのみということもあり症例数が少なすぎて、肺がん以外の病期別の生存率のほとんどが公表対象外となったため比較自体が困難です。

226 岡山医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 115 | 45 | 0 | 100.0 | 60.9 | 51.3 | 69.1 | 70.5 |
| I期 | 77 | 15 | 0 | 100.0 | 80.5 | 69.8 | 87.8 | 70.2 |
| II期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 68.0 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.1 |
| IV期 | 17 | 17 | 0 | | | | | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 82 | 33 | | | | | |
| % | 71.3 | 28.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 34 | 38 | 25 | | |
| % | | 12.2 | 29.6 | 33.0 | 21.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 11 | (7-9) | 17 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 67.0 | 9.6 | | 14.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 104 | 96 | (7-9) | 0 | | |
| % | 9.6 | 90.4 | 83.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | (7-9) | 47 | 35 | | | |
| % | 21.7 | | 40.9 | 30.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 59 | 24 | 0 | 100.0 | 59.3 | 45.7 | 70.6 | 71.6 |
| I期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 73.1 |
| II期 | 13 | (1-3) | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 71.4 |
| IV期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 36 | 23 | | | | | |
| % | 61.0 | 39.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 14 | 22 | 16 | | |
| % | | | 23.7 | 37.3 | 27.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 18 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | |
| % | 30.5 | 22.0 | 27.1 | 20.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 54 | 47 | (7-9) | 0 | | |
| % | | 91.5 | 79.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 28 | 21 | | | |
| % | | | 47.5 | 35.6 | | | |

226 岡山医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 70.1 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.8 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 71.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.6 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 15 | (1-3) | | | | | | |
| % | 88.2 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | | |
| % | | 64.7 | 58.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 13 | (1-3) | | | | |
| % | | | 76.5 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 98 | 0 | 100.0 | 29.5 | 22.2 | 37.2 | 71.0 |
| I期 | 48 | 18 | 0 | 100.0 | 62.5 | 47.3 | 74.5 | 70.2 |
| II期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 80.7 |
| III期 | 37 | 30 | 0 | 100.0 | 18.9 | 8.3 | 32.8 | 73.2 |
| IV期 | 42 | 40 | 0 | 100.0 | 4.8 | 0.9 | 14.2 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 102 | 37 | 対象数 | | 18 | 121 | |
| % | 73.4 | 26.6 | % | | 12.9 | 87.1 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 39 | 44 | 40 | | |
| % | | 7.9 | 28.1 | 31.7 | 28.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 11 | 37 | 42 | 0 | (1-3) | |
| % | 34.5 | 7.9 | 26.6 | 30.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 85 | 54 | 52 | (1-3) | 0 | | |
| % | 61.2 | 38.8 | 37.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 26 | 60 | 40 | | | |
| % | 9.4 | 18.7 | 43.2 | 28.8 | | | |

226 岡山医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 32 | (4-6) | 0 | 100.0 | 87.5 | 70.0 | 95.1 | 66.0 |
| I期 | 16 | 0 | 0 | | | | | 68.6 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 66.4 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 63.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 51.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 32 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | (7-9) | (7-9) | (7-9) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 50.0 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 26 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 84.4 | 81.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (7-9) | 18 | | | |
| % | | | | 56.3 | | | |

227 川崎医科大学附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

227 川崎医科大学附属病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 290 | 105 | (4-6) | 98.3 | 63.4 | 57.6 | 68.7 | 70.0 |
| I期 | 190 | 36 | (4-6) | 97.4 | 80.8 | 74.3 | 85.7 | 72.4 |
| II期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 63.5 |
| IV期 | 55 | 49 | 0 | 100.0 | 10.9 | 4.4 | 20.7 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 213 | 77 | | | | | |
| % | 73.4 | 26.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 30 | 85 | 109 | 53 | | |
| % | 4.5 | 10.3 | 29.3 | 37.6 | 18.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 190 | 17 | 17 | 55 | (1-3) | 10 | |
| % | 65.5 | 5.9 | 5.9 | 19.0 | | 3.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 261 | 230 | 30 | (1-3) | | |
| % | 10.0 | 90.0 | 79.3 | 10.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | 32 | 129 | 97 | | | |
| % | 11.0 | 11.0 | 44.5 | 33.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 228 | 99 | (7-9) | 96.5 | 56.0 | 49.2 | 62.2 | 69.7 |
| I期 | 63 | 13 | (4-6) | 92.1 | 78.6 | 66.0 | 87.0 | 70.4 |
| II期 | 55 | 17 | (1-3) | 96.4 | 68.7 | 54.6 | 79.3 | 71.1 |
| III期 | 53 | 23 | 0 | 100.0 | 56.6 | 42.3 | 68.7 | 66.7 |
| IV期 | 53 | 45 | (1-3) | 98.1 | 13.5 | 5.9 | 24.2 | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 124 | 104 | | | | | |
| % | 54.4 | 45.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 29 | 66 | 71 | 50 | | |
| % | 5.3 | 12.7 | 28.9 | 31.1 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 63 | 55 | 53 | 53 | 0 | (4-6) | |
| % | 27.6 | 24.1 | 23.2 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 198 | 165 | 32 | (1-3) | | |
| % | 13.2 | 86.8 | 72.4 | 14.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | 10 | 78 | 119 | | | |
| % | 9.2 | 4.4 | 34.2 | 52.2 | | | |

227 川崎医科大学附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 86 | 55 | (1-3) | 97.7 | 34.6 | 24.7 | 44.8 | 71.3 |
| I期 | 35 | 15 | (1-3) | 97.1 | 55.9 | 37.8 | 70.6 | 71.2 |
| II期 | 25 | 16 | (1-3) | | | | | 73.0 |
| III期 | 16 | 14 | 0 | | | | | 67.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 65.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 55 | 31 | | | | | |
| % | 64.0 | 36.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 15 | 29 | 26 | | |
| % | | 14.0 | 17.4 | 33.7 | 30.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 35 | 25 | 16 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 40.7 | 29.1 | 18.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 14 | 30 | 23 | 17 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 16.3 | 34.9 | 26.7 | 19.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 57 | 29 | 24 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 66.3 | 33.7 | 27.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 63 | 19 | | | |
| % | | | 73.3 | 22.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 242 | 143 | (7-9) | 97.1 | 39.6 | 33.4 | 45.8 | 70.3 |
| I期 | 103 | 30 | (4-6) | 95.1 | 69.7 | 59.6 | 77.8 | 71.2 |
| II期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 61 | 49 | (1-3) | 98.4 | 18.4 | 9.8 | 29.0 | 70.1 |
| IV期 | 61 | 57 | (1-3) | 98.4 | 5.0 | 1.3 | 12.6 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 175 | 67 | 対象数 | | 17 | 225 |
| % | 72.3 | 27.7 | % | | 7.0 | 93.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 23 | 76 | 86 | 48 | |
| % | | 9.5 | 31.4 | 35.5 | 19.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 103 | 15 | 61 | 61 | (1-3) | (1-3) |
| % | 42.6 | 6.2 | 25.2 | 25.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 113 | 129 | 127 | (1-3) | 0 | |
| % | 46.7 | 53.3 | 52.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 24 | 16 | 123 | 79 | | |
| % | 9.9 | 6.6 | 50.8 | 32.6 | | |

227 川崎医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 405 | 42 | 12 | 97.0 | 89.5 | 86.0 | 92.1 | 57.2 |
| I期 | 202 | (4-6) | (7-9) | 95.5 | 98.0 | 94.6 | 99.2 | 57.9 |
| II期 | 115 | 11 | (1-3) | 98.3 | 90.4 | 83.3 | 94.6 | 55.1 |
| III期 | 65 | 16 | 0 | 100.0 | 75.4 | 63.0 | 84.1 | 58.4 |
| IV期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 58.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 405 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 135 | 80 | 117 | 51 | 22 | | |
| % | 33.3 | 19.8 | 28.9 | 12.6 | 5.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 202 | 115 | 65 | 17 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 49.9 | 28.4 | 16.0 | 4.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 365 | 333 | 11 | 21 | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 82.2 | 2.7 | 5.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 88 | 15 | 59 | 243 | | | |
| % | 21.7 | 3.7 | 14.6 | 60.0 | | | |

228

広島大学病院

2010-2011年2力年

コメント:

今後もこのような生存率の公表が、がん患者さんにとって有益な情報となる事を願っていますが、今回の施設別・病期別の生存率集計の死亡者数には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。そのため各施設のがん治療の成績をそのまま反映したものではないという事をご理解頂き、集計結果や治療法等についてお尋ねになりたい事がある場合はいつでもご相談ください。

228 広島大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 461 | 126 | 10 | 97.8 | 72.4 | 68.0 | 76.2 | 67.3 |
| I期 | 351 | 49 | (7-9) | 97.4 | 85.8 | 81.7 | 89.1 | 68.2 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 65.0 |
| III期 | 20 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.6 |
| IV期 | 61 | 56 | 0 | 100.0 | 8.2 | 3.0 | 16.7 | 67.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 345 | 116 | | | | | |
| % | 74.8 | 25.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 36 | 67 | 141 | 160 | 57 | | |
| % | 7.8 | 14.5 | 30.6 | 34.7 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 351 | 20 | 20 | 61 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 76.1 | 4.3 | 4.3 | 13.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 59 | 402 | 383 | 18 | (1-3) | | |
| % | 12.8 | 87.2 | 83.1 | 3.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 67 | 80 | 141 | 173 | | | |
| % | 14.5 | 17.4 | 30.6 | 37.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 312 | 78 | (4-6) | 98.1 | 74.7 | 69.5 | 79.2 | 66.4 |
| I期 | 109 | 11 | 0 | 100.0 | 89.9 | 82.5 | 94.3 | 67.4 |
| II期 | 65 | 11 | (1-3) | 98.5 | 83.1 | 71.5 | 90.3 | 66.9 |
| III期 | 70 | 16 | (1-3) | 95.7 | 76.7 | 64.8 | 85.0 | 66.6 |
| IV期 | 44 | 36 | (1-3) | 97.7 | 16.3 | 7.2 | 28.7 | 62.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 200 | 112 | | | | | |
| % | 64.1 | 35.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 53 | 115 | 75 | 45 | | |
| % | 7.7 | 17.0 | 36.9 | 24.0 | 14.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 109 | 65 | 70 | 44 | (4-6) | 20 | |
| % | 34.9 | 20.8 | 22.4 | 14.1 | | 6.4 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 294 | 257 | 33 | (4-6) | | |
| % | 5.8 | 94.2 | 82.4 | 10.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 46 | 25 | 83 | 158 | | | |
| % | 14.7 | 8.0 | 26.6 | 50.6 | | | |

228 広島大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 299 | 180 | (4-6) | 98.3 | 39.0 | 33.4 | 44.5 | 67.5 |
| I期 | 129 | 54 | (1-3) | 98.4 | 57.7 | 48.7 | 65.8 | 69.2 |
| II期 | 89 | 53 | (1-3) | 98.9 | 39.8 | 29.6 | 49.8 | 67.6 |
| III期 | 58 | 52 | (1-3) | 96.6 | 7.2 | 2.3 | 15.9 | 70.2 |
| IV期 | 18 | 18 | 0 | | | | | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 213 | 86 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 41 | 85 | 117 | 38 | | |
| % | 6.0 | 13.7 | 28.4 | 39.1 | 12.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 129 | 89 | 58 | 18 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 43.1 | 29.8 | 19.4 | 6.0 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 55 | 104 | 74 | 56 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 18.4 | 34.8 | 24.7 | 18.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 161 | 138 | 109 | 29 | 0 | | |
| % | 53.8 | 46.2 | 36.5 | 9.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 227 | 61 | | | |
| % | | 3.3 | 75.9 | 20.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 451 | 215 | (7-9) | 98.4 | 52.0 | 47.2 | 56.5 | 67.5 |
| I期 | 229 | 52 | (1-3) | 98.7 | 77.3 | 71.3 | 82.2 | 67.6 |
| II期 | 32 | 17 | 0 | 100.0 | 46.9 | 29.2 | 62.8 | 68.0 |
| III期 | 94 | 61 | (1-3) | 96.8 | 33.2 | 23.8 | 42.9 | 67.2 |
| IV期 | 92 | 84 | (1-3) | 98.9 | 7.7 | 3.4 | 14.3 | 63.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 281 | 170 | 対象数 | 39 | 412 | | |
| % | 62.3 | 37.7 | % | 8.6 | 91.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 31 | 57 | 158 | 149 | 56 | | |
| % | 6.9 | 12.6 | 35.0 | 33.0 | 12.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 229 | 32 | 94 | 92 | 0 | (4-6) | |
| % | 50.8 | 7.1 | 20.8 | 20.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 190 | 261 | 247 | 14 | 0 | | |
| % | 42.1 | 57.9 | 54.8 | 3.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | 54 | 226 | 132 | | | |
| % | 8.6 | 12.0 | 50.1 | 29.3 | | | |

228 広島大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 254 | 25 | (7-9) | 97.2 | 90.0 | 85.6 | 93.1 | 60.0 |
| I期 | 125 | (4-6) | (4-6) | 96.0 | 96.7 | 91.5 | 98.8 | 61.6 |
| II期 | 89 | (7-9) | (1-3) | 98.9 | 92.1 | 84.1 | 96.1 | 57.1 |
| III期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.0 |
| IV期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 60.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 254 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 55 | 57 | 89 | 34 | 19 | | |
| % | 21.7 | 22.4 | 35.0 | 13.4 | 7.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 125 | 89 | 22 | 15 | 0 | (1-3) | |
| % | 49.2 | 35.0 | 8.7 | 5.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 237 | 230 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 6.7 | 93.3 | 90.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | (4-6) | 50 | 141 | | | |
| % | 22.8 | | 19.7 | 55.5 | | | |

229 県立広島病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

229 県立広島病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 253 | 122 | (1-3) | 99.6 | 51.8 | 45.4 | 57.7 | 70.6 |
| I期 | 144 | 36 | (1-3) | 99.3 | 75.0 | 67.1 | 81.3 | 72.1 |
| II期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 68.1 |
| IV期 | 73 | 66 | 0 | 100.0 | 9.6 | 4.2 | 17.6 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 177 | 76 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 69 | 85 | 60 | | |
| % | | 11.9 | 27.3 | 33.6 | 23.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 144 | 17 | 14 | 73 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 56.9 | 6.7 | 5.5 | 28.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 60 | 193 | 171 | 22 | 0 | | |
| % | 23.7 | 76.3 | 67.6 | 8.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | 16 | 72 | 134 | | | |
| % | 12.3 | 6.3 | 28.5 | 53.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 250 | 88 | (4-6) | 97.6 | 64.3 | 58.0 | 69.9 | 67.8 |
| I期 | 59 | (7-9) | (1-3) | 96.6 | 84.5 | 72.3 | 91.6 | 70.4 |
| II期 | 65 | 17 | (1-3) | 98.5 | 73.5 | 60.8 | 82.6 | 66.4 |
| III期 | 59 | 17 | (1-3) | 96.6 | 70.8 | 57.2 | 80.7 | 68.0 |
| IV期 | 56 | 42 | 0 | 100.0 | 25.0 | 14.6 | 36.8 | 64.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 138 | 112 | | | | | |
| % | 55.2 | 44.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 20 | 36 | 77 | 72 | 45 | | |
| % | 8.0 | 14.4 | 30.8 | 28.8 | 18.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 59 | 65 | 59 | 56 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 23.6 | 26.0 | 23.6 | 22.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 212 | 195 | 17 | 0 | | |
| % | 15.2 | 84.8 | 78.0 | 6.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | (7-9) | 42 | 177 | | | |
| % | 9.6 | | 16.8 | 70.8 | | | |

229 県立広島病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 99 | 59 | (1-3) | 99.0 | 39.9 | 30.2 | 49.4 | 71.5 |
| I期 | 30 | 12 | 0 | 100.0 | 60.0 | 40.5 | 75.0 | 70.9 |
| II期 | 47 | 28 | 0 | 100.0 | 40.4 | 26.5 | 53.9 | 71.8 |
| III期 | 15 | 12 | (1-3) | | | | | 71.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 89.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 79 | 20 | | | | | | |
| % | 79.8 | 20.2 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 25 | 42 | 23 | | | |
| % | | | 25.3 | 42.4 | 23.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 30 | 47 | 15 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | 30.3 | 47.5 | 15.2 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 34 | 38 | 13 | (1-3) | 0 | |
| | % | 13.1 | 34.3 | 38.4 | 13.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 54 | 45 | 41 | (4-6) | 0 | | | |
| % | 54.5 | 45.5 | 41.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 69 | 25 | | | | |
| % | | | 69.7 | 25.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 264 | 168 | (4-6) | 98.5 | 35.9 | 30.1 | 41.7 | 69.7 |
| I期 | 116 | 43 | (1-3) | 97.4 | 62.5 | 53.0 | 70.6 | 71.7 |
| II期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 72.9 |
| III期 | 59 | 48 | 0 | 100.0 | 18.6 | 10.0 | 29.4 | 69.3 |
| IV期 | 68 | 64 | (1-3) | 98.5 | 4.5 | 1.2 | 11.4 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 182 | 82 | 対象数 | 21 | 243 | | |
| % | 68.9 | 31.1 | % | 8.0 | 92.0 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 30 | 94 | 92 | 44 | | |
| % | | 11.4 | 35.6 | 34.8 | 16.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 116 | 18 | 59 | 68 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 43.9 | 6.8 | 22.3 | 25.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 134 | 130 | 127 | (1-3) | 0 | | |
| % | 50.8 | 49.2 | 48.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (4-6) | 108 | 119 | | | |
| % | 11.7 | | 40.9 | 45.1 | | | |

229 県立広島病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 174 | 23 | (1-3) | 99.4 | 86.8 | 80.7 | 91.0 | 60.0 |
| I期 | 89 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.5 | 88.5 | 98.3 | 59.7 |
| II期 | 63 | (7-9) | (1-3) | 98.4 | 87.3 | 76.2 | 93.4 | 60.4 |
| III期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 66.7 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 50.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 174 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 51 | 26 | 52 | 25 | 20 | | |
| % | 29.3 | 14.9 | 29.9 | 14.4 | 11.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 89 | 63 | 15 | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| % | 51.1 | 36.2 | 8.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 166 | 157 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | 95.4 | 90.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | 28 | 107 | | | |
| % | 19.5 | | 16.1 | 61.5 | | | |

230 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
2011年のみ

コメント:

特にないです

230 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 381 | 98 | 21 | 94.5 | 73.8 | 69.0 | 78.0 | 69.4 |
| I期 | 289 | 41 | 16 | 94.5 | 85.5 | 80.8 | 89.1 | 69.5 |
| II期 | 23 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.3 |
| III期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 64.1 |
| IV期 | 48 | 40 | (1-3) | 95.8 | 14.7 | 6.3 | 26.5 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 254 | 127 | | | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 43 | 125 | 127 | 74 | | |
| % | 3.1 | 11.3 | 32.8 | 33.3 | 19.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 289 | 23 | 16 | 48 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 75.9 | 6.0 | 4.2 | 12.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 336 | 327 | (7-9) | 0 | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 85.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 53 | 67 | 101 | 160 | | | |
| % | 13.9 | 17.6 | 26.5 | 42.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 206 | 64 | 10 | 95.1 | 68.6 | 61.7 | 74.5 | 67.9 |
| I期 | 49 | (7-9) | (1-3) | 93.9 | 83.7 | 70.0 | 91.5 | 69.9 |
| II期 | 53 | (7-9) | (1-3) | 94.3 | 84.6 | 71.5 | 92.0 | 68.1 |
| III期 | 54 | 15 | 0 | 100.0 | 72.2 | 58.2 | 82.2 | 68.7 |
| IV期 | 40 | 32 | (1-3) | 95.0 | 18.0 | 7.8 | 31.6 | 67.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 107 | 99 | | | | | |
| % | 51.9 | 48.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 22 | 72 | 65 | 32 | | |
| % | 7.3 | 10.7 | 35.0 | 31.6 | 15.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 53 | 54 | 40 | 0 | 10 | |
| % | 23.8 | 25.7 | 26.2 | 19.4 | | 4.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 187 | 165 | 22 | 0 | | |
| % | 9.2 | 90.8 | 80.1 | 10.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (7-9) | 59 | 118 | | | |
| % | 9.7 | | 28.6 | 57.3 | | | |

230 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 111 | 59 | (1-3) | 97.3 | 45.9 | 36.4 | 55.0 | 69.6 |
| I期 | 50 | 20 | 0 | 100.0 | 60.0 | 45.1 | 72.0 | 70.1 |
| II期 | 30 | 15 | 0 | 100.0 | 50.0 | 31.3 | 66.1 | 72.4 |
| III期 | 17 | 10 | (1-3) | | | | | 69.4 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 66.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 対象数 | 78 | 33 | | | | | |
| % | 70.3 | 29.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 24 | 46 | 20 | | |
| % | | 12.6 | 21.6 | 41.4 | 18.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 50 | 30 | 17 | 13 | 0 | (1-3) |
| | % | 45.0 | 27.0 | 15.3 | 11.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 28 | 40 | 20 | 22 | 0 | (1-3) |
| | % | 25.2 | 36.0 | 18.0 | 19.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 33 | 33 | 0 | 0 | | |
| % | 70.3 | 29.7 | 29.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 85 | 20 | | | |
| % | | | 76.6 | 18.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 332 | 171 | 12 | 96.4 | 47.9 | 42.4 | 53.2 | 69.4 |
| I期 | 152 | 36 | (4-6) | 97.4 | 76.2 | 68.6 | 82.2 | 70.5 |
| II期 | 25 | 13 | (1-3) | | | | | 68.8 |
| III期 | 73 | 48 | (1-3) | 95.9 | 33.2 | 22.6 | 44.1 | 68.4 |
| IV期 | 79 | 74 | (1-3) | 96.2 | 4.0 | 1.1 | 10.1 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 217 | 115 | 対象数 | 24 | 308 | | |
| % | 65.4 | 34.6 | % | 7.2 | 92.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 23 | 122 | 121 | 51 | | |
| % | 4.5 | 6.9 | 36.7 | 36.4 | 15.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 152 | 25 | 73 | 79 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.8 | 7.5 | 22.0 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 132 | 200 | 197 | (1-3) | 0 | | |
| % | 39.8 | 60.2 | 59.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 51 | 130 | 127 | | | |
| % | 7.2 | 15.4 | 39.2 | 38.3 | | | |

230 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 358 | 29 | 12 | 96.6 | 91.8 | 88.4 | 94.2 | 56.5 |
| I期 | 156 | (4-6) | (4-6) | 96.8 | 97.4 | 93.2 | 99.0 | 55.8 |
| II期 | 142 | (4-6) | (4-6) | 95.8 | 95.8 | 90.8 | 98.1 | 57.0 |
| III期 | 45 | (7-9) | (1-3) | 97.8 | 84.1 | 69.6 | 92.1 | 57.5 |
| IV期 | 14 | 12 | 0 | | | | | 57.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 358 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 125 | 81 | 90 | 40 | 22 | | |
| % | 34.9 | 22.6 | 25.1 | 11.2 | 6.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 156 | 142 | 45 | 14 | 0 | (1-3) | |
| % | 43.6 | 39.7 | 12.6 | 3.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 341 | 339 | (1-3) | 0 | | |
| % | 4.7 | 95.3 | 94.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 97 | 18 | 23 | 220 | | | |
| % | 27.1 | 5.0 | 6.4 | 61.5 | | | |

231 広島赤十字・原爆病院
2010－2011年2力年

コメント:

症例数は他施設と比べて、やや伸び悩んでいる状況ですが、がん登録のデータとしては比較的安定してきたものと思われます。
一方、当院は赤十字・原爆病院、という性格上、白血病や他の悪性疾患が併存している患者さんが多く含まれており、「自施設診断自施設治療」症例の割合が多いというのも、その現れと思われる。そのぶん、生存率もやや頭打ちですが、それが現実であると認識しています。
引き続きこれらのデータを参考にして、診療の改善に役立ててゆきたいと考えています。

231 広島赤十字・原爆病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 193 | 87 | (1-3) | 98.4 | 54.7 | 47.4 | 61.5 | 71.9 |
| I期 | 111 | 25 | (1-3) | 99.1 | 77.5 | 68.5 | 84.2 | 72.3 |
| II期 | 12 | (1-3) | (1-3) | | | | | 67.0 |
| III期 | 15 | 11 | 0 | | | | | 79.2 |
| IV期 | 50 | 44 | 0 | 100.0 | 12.0 | 4.9 | 22.6 | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 133 | 60 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 23 | 43 | 73 | 49 | | |
| % | | 11.9 | 22.3 | 37.8 | 25.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 111 | 12 | 15 | 50 | (4-6) | 0 | |
| % | 57.5 | 6.2 | 7.8 | 25.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 150 | 137 | 11 | (1-3) | | |
| % | 22.3 | 77.7 | 71.0 | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 33 | 83 | 66 | | | |
| % | 5.7 | 17.1 | 43.0 | 34.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 171 | 64 | (1-3) | 99.4 | 62.4 | 54.7 | 69.2 | 68.7 |
| I期 | 39 | 11 | 0 | 100.0 | 71.8 | 54.9 | 83.3 | 68.9 |
| II期 | 45 | 13 | 0 | 100.0 | 71.1 | 55.5 | 82.1 | 70.6 |
| III期 | 42 | 12 | (1-3) | 97.6 | 70.8 | 54.3 | 82.2 | 68.6 |
| IV期 | 38 | 28 | 0 | 100.0 | 26.3 | 13.7 | 40.8 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 91 | 80 | | | | | |
| % | 53.2 | 46.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 60 | 52 | 30 | | |
| % | | 12.3 | 35.1 | 30.4 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 45 | 42 | 38 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 22.8 | 26.3 | 24.6 | 22.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 148 | 143 | (4-6) | 0 | | |
| % | 13.5 | 86.5 | 83.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | 67 | 83 | | | |
| % | | 7.6 | 39.2 | 48.5 | | | |

231 広島赤十字・原爆病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 67 | (1-3) | 99.3 | 49.9 | 41.2 | 58.1 | 70.4 |
| I期 | 47 | 21 | (1-3) | 97.9 | 55.2 | 39.9 | 68.0 | 70.4 |
| II期 | 41 | 14 | 0 | 100.0 | 65.9 | 49.3 | 78.2 | 71.3 |
| III期 | 20 | 12 | 0 | | | | | 78.2 |
| IV期 | 26 | 20 | 0 | | | | | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 88 | 46 | | | | | |
| % | 65.7 | 34.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 49 | 51 | 22 | | |
| % | | | 36.6 | 38.1 | 16.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 47 | 41 | 20 | 26 | 0 | 0 |
| | % | 35.1 | 30.6 | 14.9 | 19.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 39 | 49 | 23 | 19 | (4-6) | 0 |
| | % | 29.1 | 36.6 | 17.2 | 14.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 65 | 69 | 61 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 48.5 | 51.5 | 45.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 109 | 21 | | | |
| % | | | 81.3 | 15.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 231 | 158 | (1-3) | 99.6 | 31.5 | 25.7 | 37.6 | 69.3 |
| I期 | 70 | 14 | (1-3) | 98.6 | 79.9 | 68.4 | 87.6 | 71.4 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.5 |
| III期 | 68 | 56 | 0 | 100.0 | 17.7 | 9.7 | 27.5 | 70.0 |
| IV期 | 81 | 79 | 0 | 100.0 | 2.5 | 0.5 | 7.8 | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 160 | 71 | 対象数 | | 22 | 209 |
| % | 69.3 | 30.7 | % | | 9.5 | 90.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 32 | 81 | 74 | 39 | |
| % | | 13.9 | 35.1 | 32.0 | 16.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 70 | (7-9) | 68 | 81 | (4-6) | 0 |
| % | 30.3 | | 29.4 | 35.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 140 | 91 | 85 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 60.6 | 39.4 | 36.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 25 | 106 | 91 | | |
| % | | 10.8 | 45.9 | 39.4 | | |

231 広島赤十字・原爆病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | (7-9) | (1-3) | 98.7 | 88.4 | 79.0 | 93.8 | 62.8 |
| I期 | 42 | (1-3) | (1-3) | 97.6 | 97.6 | 84.3 | 99.7 | 60.2 |
| II期 | 19 | 0 | 0 | | | | | 61.9 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 49.0 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 56.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 78 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 16 | 23 | 15 | 11 | | |
| % | 16.7 | 20.5 | 29.5 | 19.2 | 14.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 19 | 10 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 53.8 | 24.4 | 12.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 69 | 68 | 0 | (1-3) | | |
| % | | 88.5 | 87.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (1-3) | 14 | 42 | | | |
| % | 24.4 | | 17.9 | 53.8 | | | |

232 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

2010-11年に登録されたがん患者の平均年齢は、胃がん-70.9歳、大腸がん-70.7歳、肝がん-71.2歳、肺がん-70.4歳、乳がん-64.0歳です。がん診療連携拠点病院の中において、これらの患者年齢は最も高い群に入ります。年齢が高いほど、がん以外の病気を合併している割合が高くなり、治療が困難となるため、生存率が低くなる傾向があります。当センターは、がんに対して高度な専門的治療を行うとともに、複雑な病気を抱える高齢の患者さんに対しても、総合的な治療が行える医療施設です。

232 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 309 | 130 | (1-3) | 99.0 | 57.7 | 52.0 | 63.0 | 70.9 |
| I期 | 179 | 35 | (1-3) | 98.3 | 80.3 | 73.6 | 85.4 | 72.1 |
| II期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 70.9 |
| IV期 | 86 | 79 | 0 | 100.0 | 8.1 | 3.6 | 15.1 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 225 | 84 | | | | | |
| % | 72.8 | 27.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 32 | 90 | 99 | 77 | | |
| % | 3.6 | 10.4 | 29.1 | 32.0 | 24.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 179 | 20 | 19 | 86 | 0 | (4-6) | |
| % | 57.9 | 6.5 | 6.1 | 27.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 257 | 235 | 22 | 0 | | |
| % | 16.8 | 83.2 | 76.1 | 7.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 40 | 91 | 158 | | | |
| % | 6.5 | 12.9 | 29.4 | 51.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 282 | 114 | (1-3) | 98.9 | 59.3 | 53.3 | 64.8 | 70.7 |
| I期 | 69 | (7-9) | (1-3) | 97.1 | 88.2 | 77.8 | 93.9 | 72.5 |
| II期 | 67 | 21 | (1-3) | 98.5 | 68.2 | 55.5 | 78.0 | 74.7 |
| III期 | 84 | 31 | 0 | 100.0 | 63.1 | 51.9 | 72.4 | 71.0 |
| IV期 | 57 | 52 | 0 | 100.0 | 8.8 | 3.2 | 17.8 | 71.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 156 | 126 | | | | | |
| % | 55.3 | 44.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 28 | 78 | 95 | 68 | | |
| % | 4.6 | 9.9 | 27.7 | 33.7 | 24.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 69 | 67 | 84 | 57 | 0 | (4-6) | |
| % | 24.5 | 23.8 | 29.8 | 20.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 249 | 228 | 21 | 0 | | |
| % | 11.7 | 88.3 | 80.9 | 7.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 19 | 75 | 171 | | | |
| % | 6.0 | 6.7 | 26.6 | 60.6 | | | |

232 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 85 | 0 | 100.0 | 36.6 | 28.5 | 44.7 | 71.2 |
| I期 | 66 | 32 | 0 | 100.0 | 51.5 | 38.9 | 62.8 | 72.4 |
| II期 | 28 | 16 | 0 | | | | | 68.3 |
| III期 | 25 | 22 | 0 | | | | | 71.4 |
| IV期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|--|
| 対象数 | 89 | 45 | | | | | | |
| % | 66.4 | 33.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 41 | 54 | 25 | | | |
| % | | 9.0 | 30.6 | 40.3 | 18.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 66 | 28 | 25 | 15 | 0 | 0 | |
| | % | 49.3 | 20.9 | 18.7 | 11.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 37 | 44 | 21 | 31 | (1-3) | 0 | |
| | % | 27.6 | 32.8 | 15.7 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 102 | 32 | 32 | 0 | 0 | | | |
| % | 76.1 | 23.9 | 23.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 99 | 33 | | | | |
| % | | | 73.9 | 24.6 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 262 | 162 | (1-3) | 99.6 | 38.1 | 32.3 | 44.0 | 70.4 |
| I期 | 111 | 27 | 0 | 100.0 | 75.7 | 66.6 | 82.6 | 70.1 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 57.5 |
| III期 | 50 | 42 | (1-3) | 98.0 | 15.4 | 7.0 | 26.9 | 66.5 |
| IV期 | 88 | 86 | 0 | 100.0 | 2.3 | 0.4 | 7.2 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|--|
| 対象数 | 166 | 96 | 対象数 | 18 | 244 | | | |
| % | 63.4 | 36.6 | % | 6.9 | 93.1 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 10 | 20 | 87 | 90 | 55 | | | |
| % | 3.8 | 7.6 | 33.2 | 34.4 | 21.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 111 | 10 | 50 | 88 | 0 | (1-3) | | |
| % | 42.4 | 3.8 | 19.1 | 33.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 130 | 132 | 129 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 49.6 | 50.4 | 49.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (4-6) | 29 | 98 | 129 | | | | |
| % | | 11.1 | 37.4 | 49.2 | | | | |

232 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 187 | 29 | (1-3) | 99.5 | 84.4 | 78.4 | 88.9 | 64.0 |
| I期 | 80 | (4-6) | (1-3) | 98.8 | 92.5 | 84.0 | 96.5 | 66.6 |
| II期 | 65 | (7-9) | 0 | 100.0 | 87.7 | 76.9 | 93.7 | 62.9 |
| III期 | 31 | (7-9) | 0 | 100.0 | 74.2 | 55.0 | 86.2 | 67.3 |
| IV期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 63.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 187 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 34 | 59 | 37 | 28 | | |
| % | 15.5 | 18.2 | 31.6 | 19.8 | 15.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 80 | 65 | 31 | 11 | 0 | 0 | |
| % | 42.8 | 34.8 | 16.6 | 5.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 168 | 162 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 10.2 | 89.8 | 86.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 13 | 34 | 111 | | | |
| % | 15.5 | 7.0 | 18.2 | 59.4 | | | |

233 東広島医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

国立がん研究センターによる説明にもございますとおり、生存率には様々な要因が影響を与えます。

この度の公表項目には、他施設にて治療開始後、当院で継続した初回治療の実施や、非観血的治療（化学療法や放射線療法など）の実施など、反映されていないデータも沢山あるため、病院の診療実態・治療成果を表しきれはけません。

その点にご注意・ご理解いただいた上で、ご参照願います。

233 東広島医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 72 | 0 | 100.0 | 50.7 | 42.3 | 58.5 | 70.8 |
| I期 | 77 | 16 | 0 | 100.0 | 79.2 | 68.3 | 86.7 | 69.2 |
| II期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 75.3 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | 43 | 42 | 0 | 100.0 | 2.3 | 0.2 | 10.6 | 72.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 100 | 46 | | | | | |
| % | 68.5 | 31.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 51 | 54 | 26 | | |
| % | | 7.5 | 34.9 | 37.0 | 17.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 16 | (7-9) | 43 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 52.7 | 11.0 | | 29.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 42 | 104 | 98 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 28.8 | 71.2 | 67.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 20 | 28 | 81 | | | |
| % | 11.6 | 13.7 | 19.2 | 55.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 150 | 58 | (1-3) | 99.3 | 61.3 | 53.0 | 68.6 | 68.7 |
| I期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 66.5 |
| II期 | 55 | 12 | 0 | 100.0 | 78.2 | 64.8 | 87.0 | 66.8 |
| III期 | 47 | 16 | (1-3) | 97.9 | 66.0 | 50.6 | 77.6 | 68.7 |
| IV期 | 28 | 26 | 0 | | | | | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 77 | 73 | | | | | |
| % | 51.3 | 48.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 14 | 47 | 46 | 29 | | |
| % | 9.3 | 9.3 | 31.3 | 30.7 | 19.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 19 | 55 | 47 | 28 | 0 | (1-3) | |
| % | 12.7 | 36.7 | 31.3 | 18.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 132 | 114 | 17 | (1-3) | | |
| % | 12.0 | 88.0 | 76.0 | 11.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | 16 | 111 | | | |
| % | 10.7 | | 10.7 | 74.0 | | | |

233 東広島医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 50 | 36 | (1-3) | 96.0 | 26.7 | 15.3 | 39.5 | 72.3 |
| I期 | 14 | (4-6) | (1-3) | | | | | 76.0 |
| II期 | 18 | 13 | (1-3) | | | | | 67.8 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 79.4 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 77.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 42 | (7-9) | | | | | | |
| % | 84.0 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 13 | 27 | (4-6) | | | |
| % | | | 26.0 | 54.0 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 14 | 18 | 10 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 28.0 | 36.0 | 20.0 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | |
| | % | | 36.0 | 26.0 | 28.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 42 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 84.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 33 | 14 | | | | |
| % | | | 66.0 | 28.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 158 | 99 | (1-3) | 99.4 | 37.2 | 29.7 | 44.7 | 70.7 |
| I期 | 54 | 12 | 0 | 100.0 | 77.8 | 64.2 | 86.7 | 67.5 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |
| III期 | 52 | 41 | (1-3) | 98.1 | 20.2 | 10.5 | 32.2 | 71.9 |
| IV期 | 44 | 42 | 0 | 100.0 | 4.6 | 0.8 | 13.6 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|------|
| 対象数 | 113 | 45 | 対象数 | | 17 | 141 |
| % | 71.5 | 28.5 | % | | 10.8 | 89.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 59 | 50 | 35 | |
| % | | | 37.3 | 31.6 | 22.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 54 | (7-9) | 52 | 44 | 0 | 0 |
| % | 34.2 | | 32.9 | 27.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 90 | 68 | 65 | (1-3) | 0 | |
| % | 57.0 | 43.0 | 41.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 11 | 12 | 44 | 91 | | |
| % | 7.0 | 7.6 | 27.8 | 57.6 | | |

233 東広島医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 133 | 12 | (1-3) | 98.5 | 90.9 | 84.6 | 94.7 | 59.2 |
| I期 | 44 | (1-3) | 0 | 100.0 | 97.7 | 84.9 | 99.7 | 61.1 |
| II期 | 61 | (1-3) | (1-3) | 98.4 | 95.0 | 85.3 | 98.4 | 55.5 |
| III期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 52.1 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 133 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 34 | 39 | 22 | (4-6) | | |
| % | 24.1 | 25.6 | 29.3 | 16.5 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | 61 | 19 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 33.1 | 45.9 | 14.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 122 | 115 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 8.3 | 91.7 | 86.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | (4-6) | (7-9) | 91 | | | |
| % | 22.6 | | | 68.4 | | | |

234 福山市民病院
2011年のみ

コメント:

2010年当院生存状況把握割合が49.5%となっていますが、これについて再度提出データを確認した結果、2010年予後情報データの一部が未入力であり、正しくは、2010年診断症例集計対象数1,061件、死亡数475件、打ち切り数79件、生存状況把握割合が92.5%となります。
2011年5年生存率集計に対するコメントは特にありません。

234 福山市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 180 | 76 | 0 | 100.0 | 57.8 | 50.2 | 64.6 | 68.8 |
| I期 | 107 | 25 | 0 | 100.0 | 76.6 | 67.4 | 83.6 | 69.4 |
| II期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 66.8 |
| III期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 67.9 |
| IV期 | 40 | 36 | 0 | 100.0 | 10.0 | 3.2 | 21.5 | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 139 | 41 | | | | | |
| % | 77.2 | 22.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 25 | 55 | 63 | 27 | | |
| % | 5.6 | 13.9 | 30.6 | 35.0 | 15.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 107 | 16 | 12 | 40 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 59.4 | 8.9 | 6.7 | 22.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 140 | 128 | 11 | (1-3) | | |
| % | 22.2 | 77.8 | 71.1 | 6.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | 21 | 53 | 87 | | | |
| % | 10.6 | 11.7 | 29.4 | 48.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 141 | 56 | 0 | 100.0 | 60.3 | 51.7 | 67.8 | 70.7 |
| I期 | 31 | (4-6) | 0 | 100.0 | 83.9 | 65.5 | 93.0 | 71.7 |
| II期 | 37 | (7-9) | 0 | 100.0 | 78.4 | 61.4 | 88.6 | 71.5 |
| III期 | 42 | 18 | 0 | 100.0 | 57.1 | 40.9 | 70.4 | 71.8 |
| IV期 | 29 | 24 | 0 | | | | | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 91 | 50 | | | | | |
| % | 64.5 | 35.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 40 | 47 | 32 | | |
| % | | 12.1 | 28.4 | 33.3 | 22.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 31 | 37 | 42 | 29 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.0 | 26.2 | 29.8 | 20.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 121 | 111 | 10 | 0 | | |
| % | 14.2 | 85.8 | 78.7 | 7.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 39 | 86 | | | |
| % | | 7.8 | 27.7 | 61.0 | | | |

234 福山市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 97 | 0 | 100.0 | 30.2 | 22.8 | 37.9 | 70.2 |
| I期 | 54 | 26 | 0 | 100.0 | 51.9 | 37.9 | 64.1 | 70.7 |
| II期 | 42 | 32 | 0 | 100.0 | 23.8 | 12.3 | 37.4 | 70.0 |
| III期 | 34 | 30 | 0 | 100.0 | 11.8 | 3.7 | 24.9 | 71.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 95 | 44 | | | | | |
| % | 68.3 | 31.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 38 | 49 | 32 | | |
| % | | 10.1 | 27.3 | 35.3 | 23.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 54 | 42 | 34 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 38.8 | 30.2 | 24.5 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 30 | 45 | 35 | 27 | (1-3) | 0 |
| | % | 21.6 | 32.4 | 25.2 | 19.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 111 | 28 | 26 | (1-3) | 0 | | |
| % | 79.9 | 20.1 | 18.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 98 | 38 | | | |
| % | | | 70.5 | 27.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 81 | 53 | (1-3) | 98.8 | 34.1 | 23.9 | 44.4 | 70.4 |
| I期 | 28 | (7-9) | 0 | | | | | 69.9 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | 16 | 11 | (1-3) | | | | | 67.3 |
| IV期 | 29 | 28 | 0 | | | | | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 58 | 23 | | (4-6) | 76 | | |
| % | 71.6 | 28.4 | | | 93.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | 12 | 23 | 30 | 16 | | |
| % | | 14.8 | 28.4 | 37.0 | 19.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 28 | (4-6) | 16 | 29 | (1-3) | 0 | |
| % | 34.6 | | 19.8 | 35.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 33 | 28 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 59.3 | 40.7 | 34.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 29 | 45 | | | |
| % | | | 35.8 | 55.6 | | | |

234 福山市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 141 | 19 | 0 | 100.0 | 86.5 | 79.7 | 91.2 | 57.2 |
| I期 | 57 | (1-3) | 0 | 100.0 | 98.3 | 88.2 | 99.8 | 57.7 |
| II期 | 42 | (1-3) | 0 | 100.0 | 92.9 | 79.5 | 97.6 | 54.7 |
| III期 | 28 | (7-9) | 0 | | | | | 59.2 |
| IV期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 58.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 141 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 48 | 25 | 40 | 19 | (7-9) | | |
| % | 34.0 | 17.7 | 28.4 | 13.5 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 57 | 42 | 28 | 13 | 0 | (1-3) | |
| % | 40.4 | 29.8 | 19.9 | 9.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 129 | 126 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 8.5 | 91.5 | 89.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (4-6) | 16 | 101 | | | |
| % | 12.8 | | 11.3 | 71.6 | | | |

235 山口県立総合医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

当院は、山口県の基幹病院としての役割から、一般の病院では対応が困難な進行がんの患者や高齢者等で合併症を有するがん患者についても、積極的に受け入れています。また、地域がん診療連携拠点病院として、患者の個々の病態に応じて手術療法、化学療法及び放射線療法などを適切に組み合わせた集学的治療や全人的ケアの提供に努めています。

なお、がん治療に当たっては、当院を含め地域のがん診療連携拠点病院等に「がん相談支援センター」が設置されており専門の相談員が配置されていますのでそちらへのご相談もお勧めします。

今回の実測生存率は、発見された時のがんの進行度や、合併症の有無、重症度など種々の因子が大きく影響を与えている可能性があります。このため、当院の数値をご覧になる場合は、山口県におけるそれぞれの地域の医療機関の役割等もご考慮ください。また、各医療機関の数値を比較する場合は、あくまでも参考としてご覧ください。

235 山口県立総合医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 138 | 68 | (4-6) | 97.1 | 49.6 | 40.9 | 57.7 | 69.9 |
| I期 | 70 | 23 | (1-3) | 98.6 | 66.7 | 54.3 | 76.5 | 73.1 |
| II期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 71.3 |
| III期 | 17 | 10 | (1-3) | | | | | 68.2 |
| IV期 | 37 | 30 | (1-3) | 94.6 | 14.8 | 5.4 | 28.5 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 89 | 49 | | | | | |
| % | 64.5 | 35.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 48 | 46 | 28 | | |
| % | | 8.0 | 34.8 | 33.3 | 20.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 70 | 11 | 17 | 37 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 50.7 | 8.0 | 12.3 | 26.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 110 | 91 | 14 | (4-6) | | |
| % | 20.3 | 79.7 | 65.9 | 10.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 37 | 84 | | | |
| % | | | 26.8 | 60.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 143 | 54 | (7-9) | 94.4 | 60.3 | 51.6 | 68.0 | 70.3 |
| I期 | 32 | (4-6) | (1-3) | 96.9 | 87.5 | 70.0 | 95.1 | 72.8 |
| II期 | 48 | 15 | (1-3) | 97.9 | 68.3 | 53.0 | 79.5 | 74.5 |
| III期 | 31 | 14 | (1-3) | 96.8 | 53.3 | 34.3 | 69.1 | 67.9 |
| IV期 | 30 | 19 | (4-6) | 83.3 | 24.6 | 10.1 | 42.5 | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 82 | 61 | | | | | |
| % | 57.3 | 42.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 33 | 47 | 35 | | |
| % | | 14.7 | 23.1 | 32.9 | 24.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | 48 | 31 | 30 | 0 | (1-3) | |
| % | 22.4 | 33.6 | 21.7 | 21.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 122 | 102 | 17 | (1-3) | | |
| % | 14.7 | 85.3 | 71.3 | 11.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 33 | 96 | | | |
| % | | | 23.1 | 67.1 | | | |

235 山口県立総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 44 | (1-3) | 98.4 | 26.8 | 16.3 | 38.3 | 71.2 |
| I期 | 17 | 10 | 0 | | | | | 69.6 |
| II期 | 17 | 12 | 0 | | | | | 66.0 |
| III期 | 22 | 18 | 0 | | | | | 73.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | | | | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 47 | 14 | | | | | | |
| % | 77.0 | 23.0 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 13 | 24 | 15 | | | |
| % | | | 21.3 | 39.3 | 24.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | 17 | 22 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 27.9 | 27.9 | 36.1 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 20 | 15 | 12 | 0 | 0 | |
| | % | 16.4 | 32.8 | 24.6 | 19.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 55 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 90.2 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 35 | 25 | | | | |
| % | | | 57.4 | 41.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 72 | 42 | (4-6) | 94.4 | 38.9 | 27.4 | 50.2 | 73.3 |
| I期 | 40 | 17 | 0 | 100.0 | 57.5 | 40.8 | 71.0 | 73.2 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 78.0 |
| III期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.0 |
| IV期 | 21 | 17 | (1-3) | | | | | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 45 | 27 | 対象数 | | (1-3) | 69 | | |
| % | 62.5 | 37.5 | % | | | 95.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 23 | 27 | 19 | | | |
| % | | | 31.9 | 37.5 | 26.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 40 | (1-3) | 10 | 21 | 0 | 0 | | |
| % | 55.6 | | 13.9 | 29.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 32 | 40 | 40 | 0 | 0 | | | |
| % | 44.4 | 55.6 | 55.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 35 | 29 | | | | |
| % | | | 48.6 | 40.3 | | | | |

235 山口県立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 113 | 15 | (1-3) | 99.1 | 86.6 | 78.8 | 91.7 | 60.2 |
| I期 | 44 | (1-3) | (1-3) | 97.7 | 95.4 | 82.7 | 98.8 | 61.8 |
| II期 | 39 | (4-6) | 0 | 100.0 | 87.2 | 71.9 | 94.5 | 55.6 |
| III期 | 22 | (1-3) | 0 | | | | | 59.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 52.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 113 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 22 | 39 | 16 | 10 | | |
| % | 23.0 | 19.5 | 34.5 | 14.2 | 8.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | 39 | 22 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 38.9 | 34.5 | 19.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 97 | 94 | 0 | (1-3) | | |
| % | 14.2 | 85.8 | 83.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | (1-3) | 11 | 75 | | | |
| % | 23.0 | | 9.7 | 66.4 | | | |

236 国立病院機構 岩国医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

236 国立病院機構 岩国医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 215 | 96 | (4-6) | 98.1 | 54.9 | 48.0 | 61.3 | 73.4 |
| I期 | 132 | 33 | (4-6) | 97.0 | 74.6 | 66.2 | 81.2 | 74.1 |
| II期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 78.2 |
| III期 | 16 | 11 | 0 | | | | | 74.6 |
| IV期 | 46 | 44 | 0 | 100.0 | 4.4 | 0.8 | 13.1 | 73.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 151 | 64 | | | | | |
| % | 70.2 | 29.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 55 | 78 | 63 | | |
| % | | 6.5 | 25.6 | 36.3 | 29.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 132 | 16 | 16 | 46 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 61.4 | 7.4 | 7.4 | 21.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 165 | 144 | 16 | (4-6) | | |
| % | 23.3 | 76.7 | 67.0 | 7.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 72 | 128 | | | |
| % | | 5.1 | 33.5 | 59.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 200 | 97 | (4-6) | 97.0 | 50.6 | 43.4 | 57.3 | 72.8 |
| I期 | 51 | 18 | 0 | 100.0 | 64.7 | 50.0 | 76.1 | 69.4 |
| II期 | 48 | 15 | (1-3) | 95.8 | 68.3 | 53.0 | 79.5 | 76.3 |
| III期 | 53 | 24 | (1-3) | 94.3 | 52.8 | 38.3 | 65.4 | 76.7 |
| IV期 | 43 | 36 | (1-3) | 97.7 | 14.3 | 5.8 | 26.5 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 118 | 82 | | | | | |
| % | 59.0 | 41.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 47 | 72 | 57 | | |
| % | | 9.5 | 23.5 | 36.0 | 28.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | 48 | 53 | 43 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.5 | 24.0 | 26.5 | 21.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 169 | 153 | 15 | (1-3) | | |
| % | 15.5 | 84.5 | 76.5 | 7.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (7-9) | 51 | 128 | | | |
| % | 6.0 | | 25.5 | 64.0 | | | |

236 国立病院機構 岩国医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 63 | 39 | (1-3) | 98.4 | 37.3 | 25.4 | 49.1 | 72.2 |
| I期 | 26 | 13 | (1-3) | | | | | 76.4 |
| II期 | 16 | 10 | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | 12 | 10 | 0 | | | | | 74.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 33 | 30 | | | | | |
| % | 52.4 | 47.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 19 | 25 | 14 | | |
| % | | | 30.2 | 39.7 | 22.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 26 | 16 | 12 | (7-9) | 0 | (1-3) |
| | % | 41.3 | 25.4 | 19.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 19 | 10 | 13 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 28.6 | 30.2 | 15.9 | 20.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 22 | 18 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 65.1 | 34.9 | 28.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 46 | 17 | | | |
| % | | | 73.0 | 27.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 210 | 162 | (1-3) | 98.6 | 22.1 | 16.7 | 28.0 | 72.5 |
| I期 | 47 | 18 | (1-3) | 97.9 | 61.1 | 45.6 | 73.5 | 72.8 |
| II期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | 55 | 47 | (1-3) | 98.2 | 14.1 | 6.5 | 24.8 | 75.1 |
| IV期 | 89 | 83 | (1-3) | 98.9 | 5.7 | 2.1 | 11.9 | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 155 | 55 | 対象数 | | 24 | 186 |
| % | 73.8 | 26.2 | % | | 11.4 | 88.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 61 | 89 | 46 | |
| % | | 6.2 | 29.0 | 42.4 | 21.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 47 | 15 | 55 | 89 | (1-3) | (1-3) |
| % | 22.4 | 7.1 | 26.2 | 42.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 135 | 75 | 54 | (4-6) | 17 | |
| % | 64.3 | 35.7 | 25.7 | | 8.1 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 74 | 118 | | |
| % | | | 35.2 | 56.2 | | |

236 国立病院機構 岩国医療センター
 女性乳房
 5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 97 | 14 | 0 | 100.0 | 85.6 | 76.9 | 91.2 | 62.3 |
| I期 | 50 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.0 | 77.6 | 95.7 | 63.7 |
| II期 | 20 | (1-3) | 0 | | | | | 54.9 |
| III期 | 22 | (1-3) | 0 | | | | | 58.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 48.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 97 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 23 | 23 | 19 | 13 | | |
| % | 19.6 | 23.7 | 23.7 | 19.6 | 13.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 50 | 20 | 22 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 51.5 | 20.6 | 22.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 90 | 45 | 15 | 30 | | |
| % | | 92.8 | 46.4 | 15.5 | 30.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | (1-3) | 19 | 51 | | | |
| % | 26.8 | | 19.6 | 52.6 | | | |

237 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

237 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 193 | 75 | (1-3) | 99.0 | 61.0 | 53.7 | 67.5 | 73.6 |
| I期 | 132 | 28 | (1-3) | 99.2 | 78.7 | 70.6 | 84.8 | 72.9 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |
| III期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 73.0 |
| IV期 | 40 | 37 | 0 | 100.0 | 7.5 | 1.9 | 18.2 | 76.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 146 | 47 | | | | | |
| % | 75.6 | 24.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 46 | 71 | 60 | | |
| % | | 7.3 | 23.8 | 36.8 | 31.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 132 | (7-9) | 10 | 40 | (1-3) | 0 | |
| % | 68.4 | | 5.2 | 20.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 157 | 140 | 17 | 0 | | |
| % | 18.7 | 81.3 | 72.5 | 8.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | 20 | 66 | 90 | | | |
| % | 8.8 | 10.4 | 34.2 | 46.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 54 | (1-3) | 97.8 | 60.2 | 51.5 | 67.9 | 72.2 |
| I期 | 24 | (1-3) | (1-3) | | | | | 69.7 |
| II期 | 49 | 15 | (1-3) | 98.0 | 69.4 | 54.5 | 80.3 | 75.5 |
| III期 | 33 | 13 | (1-3) | 97.0 | 60.6 | 42.0 | 74.9 | 70.7 |
| IV期 | 30 | 23 | 0 | 100.0 | 23.3 | 10.3 | 39.4 | 73.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 81 | 55 | | | | | |
| % | 59.6 | 40.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 33 | 51 | 37 | | |
| % | | 8.8 | 24.3 | 37.5 | 27.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 49 | 33 | 30 | 0 | 0 | |
| % | 17.6 | 36.0 | 24.3 | 22.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 120 | 96 | 24 | 0 | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 70.6 | 17.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 31 | 90 | | | |
| % | | | 22.8 | 66.2 | | | |

237 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 68 | 52 | (1-3) | 95.6 | 21.2 | 12.2 | 31.8 | 72.9 |
| I期 | 34 | 22 | (1-3) | 94.1 | 31.5 | 16.5 | 47.6 | 70.6 |
| II期 | 14 | 10 | (1-3) | | | | | 69.5 |
| III期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 79.2 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 63.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 41 | 27 | | | | | | |
| % | 60.3 | 39.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 17 | 25 | 19 | | | |
| % | | | 25.0 | 36.8 | 27.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 34 | 14 | 14 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 50.0 | 20.6 | 20.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 19 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
| | % | 26.5 | 27.9 | 23.5 | 22.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 65 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 95.6 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 47 | 19 | | | | |
| % | | | 69.1 | 27.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 59 | 42 | 0 | 100.0 | 28.8 | 18.0 | 40.6 | 75.1 |
| I期 | 22 | (7-9) | 0 | | | | | 75.2 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 14 | 13 | 0 | | | | | 72.7 |
| IV期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 75.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 44 | 15 | | (1-3) | 57 | | | |
| % | 74.6 | 25.4 | | | 96.6 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 11 | 31 | 16 | | | |
| % | | | 18.6 | 52.5 | 27.1 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 22 | (4-6) | 14 | 17 | (1-3) | 0 | | |
| % | 37.3 | | 23.7 | 28.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 31 | 28 | 26 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 52.5 | 47.5 | 44.1 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 36 | 16 | | | | |
| % | | | 61.0 | 27.1 | | | | |

237 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 80 | 12 | (1-3) | 97.5 | 84.8 | 74.7 | 91.0 | 67.8 |
| I期 | 38 | (1-3) | 0 | 100.0 | 94.7 | 80.6 | 98.7 | 65.2 |
| II期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.2 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 80 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 11 | 27 | 19 | 16 | | |
| % | | 13.8 | 33.8 | 23.8 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 24 | 13 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 47.5 | 30.0 | 16.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 70 | 56 | 14 | 0 | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 70.0 | 17.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 0 | 10 | 60 | | | |
| % | 12.5 | | 12.5 | 75.0 | | | |

238 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
2010-2011年2力年

コメント:

今回の報告は生存率に影響を与える患者背景、合併症などが考慮されたものではなく、必ずしも施設間の比較やがん治療の評価の参考とはならないことをご理解いただきたい。

238 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 332 | 146 | (7-9) | 97.6 | 55.3 | 49.7 | 60.5 | 70.1 |
| I期 | 186 | 35 | (4-6) | 97.8 | 81.0 | 74.5 | 86.0 | 70.7 |
| II期 | 37 | 18 | 0 | 100.0 | 51.4 | 34.4 | 66.0 | 73.2 |
| III期 | 21 | 19 | 0 | | | | | 69.1 |
| IV期 | 79 | 69 | (4-6) | 94.9 | 8.1 | 3.3 | 15.7 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 235 | 97 | | | | | |
| % | 70.8 | 29.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 40 | 105 | 110 | 68 | | |
| % | | 12.0 | 31.6 | 33.1 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 186 | 37 | 21 | 79 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 56.0 | 11.1 | 6.3 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 274 | 234 | 29 | 11 | | |
| % | 17.5 | 82.5 | 70.5 | 8.7 | 3.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 68 | 45 | 189 | | | |
| % | 9.0 | 20.5 | 13.6 | 56.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 280 | 116 | (4-6) | 98.2 | 58.0 | 51.9 | 63.5 | 70.4 |
| I期 | 60 | 14 | 0 | 100.0 | 76.7 | 63.8 | 85.5 | 70.7 |
| II期 | 90 | 25 | (1-3) | 97.8 | 71.7 | 61.1 | 79.9 | 73.3 |
| III期 | 65 | 24 | (1-3) | 98.5 | 62.7 | 49.7 | 73.2 | 68.5 |
| IV期 | 58 | 46 | (1-3) | 96.6 | 17.9 | 9.2 | 28.9 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 151 | 129 | | | | | |
| % | 53.9 | 46.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 23 | 86 | 86 | 70 | | |
| % | 5.4 | 8.2 | 30.7 | 30.7 | 25.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 90 | 65 | 58 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 21.4 | 32.1 | 23.2 | 20.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 254 | 212 | 37 | (4-6) | | |
| % | 9.3 | 90.7 | 75.7 | 13.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 34 | 38 | 190 | | | |
| % | 6.4 | 12.1 | 13.6 | 67.9 | | | |

238 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 125 | 85 | (4-6) | 96.8 | 30.4 | 22.5 | 38.7 | 72.0 |
| I期 | 63 | 35 | (1-3) | 96.8 | 43.4 | 30.9 | 55.2 | 71.2 |
| II期 | 26 | 18 | (1-3) | | | | | 68.3 |
| III期 | 26 | 23 | (1-3) | | | | | 74.1 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 89 | 36 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 36 | 61 | 20 | | |
| % | | | 28.8 | 48.8 | 16.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 63 | 26 | 26 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 50.4 | 20.8 | 20.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 48 | 21 | 27 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 20.0 | 38.4 | 16.8 | 21.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 102 | 23 | 22 | (1-3) | 0 | | |
| % | 81.6 | 18.4 | 17.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 66 | 51 | | | |
| % | | | 52.8 | 40.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 191 | 144 | (4-6) | 97.4 | 23.0 | 17.3 | 29.3 | 71.7 |
| I期 | 46 | 14 | (1-3) | 95.7 | 68.9 | 53.2 | 80.3 | 71.0 |
| II期 | 15 | 11 | 0 | | | | | 73.0 |
| III期 | 47 | 37 | (1-3) | 95.7 | 17.8 | 8.4 | 30.2 | 73.0 |
| IV期 | 80 | 79 | (1-3) | 98.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 132 | 59 | 対象数 | 22 | 169 | |
| % | 69.1 | 30.9 | % | 11.5 | 88.5 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 56 | 77 | 37 | |
| % | | 10.5 | 29.3 | 40.3 | 19.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 46 | 15 | 47 | 80 | (1-3) | 0 |
| % | 24.1 | 7.9 | 24.6 | 41.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 130 | 61 | 56 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 68.1 | 31.9 | 29.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | 20 | 52 | 110 | | |
| % | | 10.5 | 27.2 | 57.6 | | |

238 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 158 | 16 | (1-3) | 99.4 | 89.9 | 84.0 | 93.7 | 62.3 |
| I期 | 75 | (1-3) | (1-3) | 98.7 | 98.7 | 90.9 | 99.8 | 62.7 |
| II期 | 57 | (4-6) | 0 | 100.0 | 91.2 | 80.2 | 96.3 | 62.1 |
| III期 | 22 | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 158 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 33 | 26 | 55 | 29 | 15 | | |
| % | 20.9 | 16.5 | 34.8 | 18.4 | 9.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 75 | 57 | 22 | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 47.5 | 36.1 | 13.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 154 | 141 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | 97.5 | 89.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | (4-6) | 16 | 108 | | | |
| % | 18.4 | | 10.1 | 68.4 | | | |

239 徳島県立中央病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

239 徳島県立中央病院
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 265 | 101 | 13 | 95.1 | 60.6 | 54.3 | 66.3 | 72.1 |
| I期 | 170 | 28 | (7-9) | 95.9 | 83.1 | 76.4 | 88.0 | 72.0 |
| II期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 65.8 |
| III期 | 21 | 16 | (1-3) | | | | | 68.8 |
| IV期 | 48 | 42 | (1-3) | 93.8 | 6.9 | 1.8 | 16.8 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 197 | 68 | | | | | |
| % | 74.3 | 25.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 32 | 59 | 101 | 71 | | |
| % | | 12.1 | 22.3 | 38.1 | 26.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 170 | 17 | 21 | 48 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 64.2 | 6.4 | 7.9 | 18.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 212 | 199 | 13 | 0 | | |
| % | 20.0 | 80.0 | 75.1 | 4.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | 14 | 68 | 155 | | | |
| % | 10.6 | 5.3 | 25.7 | 58.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 208 | 89 | (4-6) | 97.1 | 56.5 | 49.4 | 62.9 | 71.8 |
| I期 | 56 | 11 | (1-3) | 98.2 | 80.3 | 67.2 | 88.6 | 70.5 |
| II期 | 60 | 21 | (1-3) | 95.0 | 63.9 | 50.1 | 74.8 | 73.6 |
| III期 | 39 | 18 | (1-3) | 97.4 | 52.8 | 35.9 | 67.1 | 71.2 |
| IV期 | 41 | 36 | (1-3) | 97.6 | 10.1 | 3.2 | 21.6 | 73.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 128 | 80 | | | | | |
| % | 61.5 | 38.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 23 | 49 | 76 | 55 | | |
| % | | 11.1 | 23.6 | 36.5 | 26.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 56 | 60 | 39 | 41 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 26.9 | 28.8 | 18.8 | 19.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 184 | 159 | 24 | (1-3) | | |
| % | 11.5 | 88.5 | 76.4 | 11.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 32 | (7-9) | 30 | 137 | | | |
| % | 15.4 | | 14.4 | 65.9 | | | |

239 徳島県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 127 | 73 | (4-6) | 95.3 | 40.0 | 31.3 | 48.6 | 71.3 |
| I期 | 71 | 27 | (4-6) | 94.4 | 59.9 | 47.2 | 70.5 | 72.5 |
| II期 | 28 | 21 | 0 | | | | | 72.9 |
| III期 | 17 | 14 | (1-3) | | | | | 68.5 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 74.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 89 | 38 | | | | | |
| % | 70.1 | 29.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 31 | 54 | 25 | | |
| % | | 10.2 | 24.4 | 42.5 | 19.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 71 | 28 | 17 | 10 | (1-3) | 0 |
| | % | 55.9 | 22.0 | 13.4 | 7.9 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 30 | 57 | 16 | 23 | (1-3) | 0 |
| | % | 23.6 | 44.9 | 12.6 | 18.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 116 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | |
| % | 91.3 | 8.7 | 7.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 85 | 39 | | | |
| % | | | 66.9 | 30.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 288 | 191 | (7-9) | 97.6 | 32.3 | 26.9 | 37.8 | 72.4 |
| I期 | 111 | 43 | 0 | 100.0 | 61.3 | 51.6 | 69.6 | 74.6 |
| II期 | 16 | 11 | 0 | | | | | 71.2 |
| III期 | 86 | 66 | (4-6) | 95.3 | 20.1 | 12.2 | 29.5 | 71.2 |
| IV期 | 73 | 70 | (1-3) | 95.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 203 | 85 | 対象数 | | 35 | 253 |
| % | 70.5 | 29.5 | % | | 12.2 | 87.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 26 | 73 | 113 | 73 | |
| % | | 9.0 | 25.3 | 39.2 | 25.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 111 | 16 | 86 | 73 | (1-3) | (1-3) |
| % | 38.5 | 5.6 | 29.9 | 25.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 138 | 150 | 142 | (7-9) | 0 | |
| % | 47.9 | 52.1 | 49.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 21 | 25 | 75 | 167 | | |
| % | 7.3 | 8.7 | 26.0 | 58.0 | | |

239 徳島県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 31 | 15 | (1-3) | 96.8 | 51.4 | 32.8 | 67.2 | 66.2 |
| I期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.2 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 63.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 54.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 31 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | 11 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 32.3 | | 35.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 23 | 21 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 74.2 | 67.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (7-9) | 22 | | | |
| % | | | | 71.0 | | | |

240

徳島大学病院

2010-2011年2力年

コメント:

肝の実測生存率（全ステージの合計）は、全国平均と比較して高く95%信頼区間は全国の値を含んでいないため、統計的有意差があると判断できます。胃については、全国平均を下回っており統計的有意差があります。しかし、厳密にはステージ別の比較が必要です。大腸、肺、乳については全国と有意差はありません。

今回の施設別の生存率集計には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。また、患者さんの背景要因に様々な違いがあることが予想されますので、当該施設の医療の質を生存率のみで判断されることはお勧めできません。他施設と比較される際にはご留意いただき、ご供覧ください。

240 徳島大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 285 | 125 | (7-9) | 97.2 | 55.3 | 49.3 | 60.9 | 68.4 |
| I期 | 162 | 33 | (7-9) | 95.7 | 79.0 | 71.8 | 84.6 | 69.9 |
| II期 | 21 | (7-9) | 0 | | | | | 69.8 |
| III期 | 23 | 13 | (1-3) | | | | | 72.5 |
| IV期 | 77 | 69 | 0 | 100.0 | 10.4 | 4.9 | 18.4 | 65.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 200 | 85 | | | | | |
| % | 70.2 | 29.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 48 | 77 | 103 | 43 | | |
| % | 4.9 | 16.8 | 27.0 | 36.1 | 15.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 162 | 21 | 23 | 77 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.8 | 7.4 | 8.1 | 27.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 58 | 227 | 212 | 15 | 0 | | |
| % | 20.4 | 79.6 | 74.4 | 5.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 27 | 45 | 191 | | | |
| % | 7.7 | 9.5 | 15.8 | 67.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 217 | 70 | (4-6) | 97.7 | 67.5 | 60.8 | 73.3 | 68.9 |
| I期 | 62 | (7-9) | (1-3) | 96.8 | 85.2 | 73.5 | 92.0 | 70.8 |
| II期 | 62 | 14 | (1-3) | 96.8 | 77.2 | 64.6 | 85.8 | 73.0 |
| III期 | 47 | 11 | (1-3) | 97.9 | 76.6 | 61.7 | 86.3 | 65.7 |
| IV期 | 45 | 35 | 0 | 100.0 | 22.2 | 11.5 | 35.1 | 62.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 125 | 92 | | | | | |
| % | 57.6 | 42.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 65 | 78 | 34 | | |
| % | | 14.3 | 30.0 | 35.9 | 15.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 62 | 62 | 47 | 45 | 0 | (1-3) | |
| % | 28.6 | 28.6 | 21.7 | 20.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 22 | 195 | 192 | (1-3) | 0 | | |
| % | 10.1 | 89.9 | 88.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 41 | 18 | 44 | 114 | | | |
| % | 18.9 | 8.3 | 20.3 | 52.5 | | | |

240 徳島大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 184 | 102 | (1-3) | 98.4 | 43.9 | 36.6 | 51.0 | 69.2 |
| I期 | 78 | 34 | (1-3) | 98.7 | 56.0 | 44.2 | 66.2 | 69.4 |
| II期 | 43 | 16 | (1-3) | 97.7 | 62.1 | 45.8 | 74.8 | 70.8 |
| III期 | 44 | 36 | (1-3) | 97.7 | 16.3 | 7.2 | 28.7 | 65.8 |
| IV期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 74.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 130 | 54 | | | | | |
| % | 70.7 | 29.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 54 | 66 | 31 | | |
| % | | 13.0 | 29.3 | 35.9 | 16.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 78 | 43 | 44 | 16 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 42.4 | 23.4 | 23.9 | 8.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 30 | 71 | 37 | 40 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 16.3 | 38.6 | 20.1 | 21.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 102 | 82 | 82 | 0 | 0 | | |
| % | 55.4 | 44.6 | 44.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 60 | 112 | | | |
| % | | | 32.6 | 60.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 365 | 225 | (1-3) | 99.2 | 38.2 | 33.2 | 43.2 | 69.9 |
| I期 | 146 | 39 | (1-3) | 99.3 | 73.2 | 65.2 | 79.6 | 70.4 |
| II期 | 16 | 13 | 0 | | | | | 71.6 |
| III期 | 71 | 56 | (1-3) | 98.6 | 20.8 | 12.2 | 31.0 | 70.5 |
| IV期 | 129 | 116 | (1-3) | 99.2 | 10.0 | 5.6 | 15.9 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 249 | 116 | 対象数 | 49 | 316 | | |
| % | 68.2 | 31.8 | % | 13.4 | 86.6 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 36 | 122 | 148 | 51 | | |
| % | | 9.9 | 33.4 | 40.5 | 14.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 146 | 16 | 71 | 129 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 40.0 | 4.4 | 19.5 | 35.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 215 | 150 | 148 | (1-3) | 0 | | |
| % | 58.9 | 41.1 | 40.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | 42 | 110 | 174 | | | |
| % | 10.7 | 11.5 | 30.1 | 47.7 | | | |

240 徳島大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 185 | 21 | (4-6) | 97.8 | 88.4 | 82.8 | 92.3 | 61.7 |
| I期 | 77 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 93.4 | 84.9 | 97.2 | 63.7 |
| II期 | 71 | (4-6) | (1-3) | 98.6 | 91.4 | 81.9 | 96.1 | 63.7 |
| III期 | 27 | (4-6) | 0 | | | | | 63.9 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 58.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 185 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 39 | 29 | 60 | 36 | 21 | | |
| % | 21.1 | 15.7 | 32.4 | 19.5 | 11.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 77 | 71 | 27 | (4-6) | (4-6) | 0 | |
| % | 41.6 | 38.4 | 14.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 155 | 149 | (4-6) | 0 | | |
| % | 16.2 | 83.8 | 80.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | 12 | 134 | | | |
| % | 18.4 | | 6.5 | 72.4 | | | |

241 香川県立中央病院
2010-2011年2力年

コメント:

- ・胃がんに関しては、I、II期の生存率の高さが有り、全体的に高い生存率を示している。
- ・大腸がんは、香川県全体では全国平均を下回っている。当院も下回っているが、III、IV期はやや平均を上回っている。
- ・肝がんに関しては、高齢者が多い傾向があるが、全国平均及び香川県平均を上回っている。
- ・肺がんは、県内の他施設と比較して平均年齢が高く、生存率はやや低い傾向にあった。
- ・乳がんに関しては、III、IV期の比率が高いことが全体としての生存率を低下させていると考えられる。

241 香川県立中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 491 | 161 | (7-9) | 98.6 | 67.1 | 62.7 | 71.0 | 69.8 |
| I期 | 328 | 46 | (4-6) | 98.8 | 86.0 | 81.7 | 89.3 | 70.4 |
| II期 | 35 | 13 | 0 | 100.0 | 62.9 | 44.8 | 76.5 | 68.2 |
| III期 | 35 | 19 | (1-3) | 97.1 | 45.7 | 28.9 | 61.1 | 70.9 |
| IV期 | 91 | 83 | (1-3) | 98.9 | 7.8 | 3.4 | 14.5 | 69.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 330 | 161 | | | | | |
| % | 67.2 | 32.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 57 | 126 | 192 | 91 | | |
| % | 5.1 | 11.6 | 25.7 | 39.1 | 18.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 328 | 35 | 35 | 91 | 0 | (1-3) | |
| % | 66.8 | 7.1 | 7.1 | 18.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 72 | 419 | 409 | 10 | 0 | | |
| % | 14.7 | 85.3 | 83.3 | 2.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 58 | 68 | 144 | 221 | | | |
| % | 11.8 | 13.8 | 29.3 | 45.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 269 | 101 | (4-6) | 98.1 | 62.1 | 56.0 | 67.7 | 69.7 |
| I期 | 78 | 14 | (1-3) | 97.4 | 81.8 | 71.2 | 88.8 | 68.7 |
| II期 | 88 | 29 | (1-3) | 97.7 | 66.7 | 55.7 | 75.5 | 71.5 |
| III期 | 53 | 17 | (1-3) | 98.1 | 67.7 | 53.3 | 78.5 | 70.6 |
| IV期 | 45 | 37 | 0 | 100.0 | 17.8 | 8.3 | 30.1 | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 146 | 123 | | | | | |
| % | 54.3 | 45.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 32 | 78 | 80 | 65 | | |
| % | 5.2 | 11.9 | 29.0 | 29.7 | 24.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 78 | 88 | 53 | 45 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 29.0 | 32.7 | 19.7 | 16.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 251 | 234 | 17 | 0 | | |
| % | 6.7 | 93.3 | 87.0 | 6.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 59 | 15 | 64 | 131 | | | |
| % | 21.9 | 5.6 | 23.8 | 48.7 | | | |

241 香川県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 150 | 94 | (1-3) | 99.3 | 36.9 | 29.3 | 44.6 | 72.1 |
| I期 | 66 | 32 | (1-3) | 98.5 | 50.8 | 38.1 | 62.1 | 72.5 |
| II期 | 47 | 31 | 0 | 100.0 | 34.0 | 21.0 | 47.5 | 73.1 |
| III期 | 28 | 24 | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 105 | 45 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 27 | 65 | 38 | | |
| % | | 10.0 | 18.0 | 43.3 | 25.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 66 | 47 | 28 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 44.0 | 31.3 | 18.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 30 | 59 | 34 | 25 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 20.0 | 39.3 | 22.7 | 16.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 113 | 37 | 35 | (1-3) | 0 | | |
| % | 75.3 | 24.7 | 23.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 106 | 39 | | | |
| % | | | 70.7 | 26.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 333 | 206 | (4-6) | 98.5 | 37.7 | 32.4 | 42.9 | 70.7 |
| I期 | 149 | 52 | (1-3) | 98.7 | 64.7 | 56.4 | 71.8 | 72.2 |
| II期 | 26 | 20 | (1-3) | | | | | 71.7 |
| III期 | 75 | 58 | (1-3) | 98.7 | 22.0 | 13.3 | 32.0 | 69.5 |
| IV期 | 77 | 71 | 0 | 100.0 | 7.8 | 3.2 | 15.1 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 223 | 110 | 対象数 | 27 | 306 | | |
| % | 67.0 | 33.0 | % | 8.1 | 91.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 24 | 119 | 106 | 73 | | |
| % | 3.3 | 7.2 | 35.7 | 31.8 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 149 | 26 | 75 | 77 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 44.7 | 7.8 | 22.5 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 160 | 173 | 168 | (4-6) | 0 | | |
| % | 48.0 | 52.0 | 50.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | 38 | 151 | 110 | | | |
| % | 10.2 | 11.4 | 45.3 | 33.0 | | | |

241 香川県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 114 | 17 | (1-3) | 97.4 | 84.9 | 76.9 | 90.4 | 62.4 |
| I期 | 51 | (1-3) | (1-3) | 96.1 | 98.0 | 86.6 | 99.7 | 64.5 |
| II期 | 37 | (1-3) | (1-3) | 97.3 | 91.8 | 76.7 | 97.3 | 58.9 |
| III期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 58.6 |
| IV期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 61.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 114 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 25 | 44 | 19 | 10 | | |
| % | 14.0 | 21.9 | 38.6 | 16.7 | 8.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 51 | 37 | 15 | 11 | 0 | 0 | |
| % | 44.7 | 32.5 | 13.2 | 9.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| % | 12.3 | 87.7 | 87.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | (1-3) | 19 | 58 | | | |
| % | 29.8 | | 16.7 | 50.9 | | | |

242 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

242 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 352 | 144 | (7-9) | 97.4 | 58.4 | 53.0 | 63.4 | 71.5 |
| I期 | 213 | 44 | (7-9) | 96.7 | 78.9 | 72.7 | 83.8 | 70.8 |
| II期 | 35 | 13 | 0 | 100.0 | 62.9 | 44.8 | 76.5 | 70.9 |
| III期 | 27 | 19 | (1-3) | | | | | 72.9 |
| IV期 | 60 | 53 | (1-3) | 98.3 | 10.2 | 4.2 | 19.5 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 245 | 107 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 36 | 101 | 131 | 78 | | |
| % | | 10.2 | 28.7 | 37.2 | 22.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 213 | 35 | 27 | 60 | 16 | (1-3) | |
| % | 60.5 | 9.9 | 7.7 | 17.0 | 4.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 73 | 279 | 257 | 20 | (1-3) | | |
| % | 20.7 | 79.3 | 73.0 | 5.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 39 | 38 | 75 | 200 | | | |
| % | 11.1 | 10.8 | 21.3 | 56.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 226 | 90 | (7-9) | 96.9 | 59.7 | 53.0 | 65.8 | 70.8 |
| I期 | 37 | (4-6) | 0 | 100.0 | 86.5 | 70.5 | 94.1 | 70.2 |
| II期 | 59 | (7-9) | (1-3) | 96.6 | 86.4 | 74.7 | 93.0 | 72.1 |
| III期 | 66 | 24 | (1-3) | 95.5 | 63.0 | 50.0 | 73.5 | 68.7 |
| IV期 | 49 | 40 | (1-3) | 98.0 | 16.9 | 7.9 | 28.7 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 119 | 107 | | | | | |
| % | 52.7 | 47.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 28 | 68 | 64 | 59 | | |
| % | | 12.4 | 30.1 | 28.3 | 26.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 59 | 66 | 49 | 15 | 0 | |
| % | 16.4 | 26.1 | 29.2 | 21.7 | 6.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 176 | 149 | 23 | (4-6) | | |
| % | 22.1 | 77.9 | 65.9 | 10.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 17 | 32 | 147 | | | |
| % | 13.3 | 7.5 | 14.2 | 65.0 | | | |

242 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 39 | 26 | (1-3) | 97.4 | 33.1 | 19.1 | 47.9 | 71.3 |
| I期 | 19 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.0 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 73.7 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 32 | (7-9) | | | | | | |
| % | 82.1 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | 13 | 10 | | | |
| % | | | | 33.3 | 25.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 19 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | |
| | % | 48.7 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 18 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | 0 | |
| | % | | 46.2 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 28 | 11 | (4-6) | (1-3) | (4-6) | | | |
| % | 71.8 | 28.2 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 26 | 11 | | | | |
| % | | | 66.7 | 28.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 240 | 139 | (1-3) | 98.8 | 41.5 | 35.2 | 47.7 | 69.3 |
| I期 | 102 | 20 | (1-3) | 99.0 | 80.2 | 71.0 | 86.8 | 67.8 |
| II期 | 18 | 11 | 0 | | | | | 68.1 |
| III期 | 52 | 41 | (1-3) | 96.2 | 18.2 | 9.0 | 30.0 | 70.7 |
| IV期 | 57 | 57 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 154 | 86 | | 20 | 220 | | |
| % | 64.2 | 35.8 | | 8.3 | 91.7 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 77 | 85 | 39 | | |
| % | | 12.9 | 32.1 | 35.4 | 16.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 102 | 18 | 52 | 57 | 10 | (1-3) | |
| % | 42.5 | 7.5 | 21.7 | 23.8 | 4.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 120 | 120 | 115 | (4-6) | 0 | | |
| % | 50.0 | 50.0 | 47.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 40 | 95 | 80 | | | |
| % | 10.4 | 16.7 | 39.6 | 33.3 | | | |

242 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 172 | 14 | (1-3) | 98.3 | 91.8 | 86.6 | 95.1 | 62.9 |
| I期 | 83 | (4-6) | (1-3) | 96.4 | 93.9 | 86.0 | 97.4 | 62.5 |
| II期 | 70 | (1-3) | 0 | 100.0 | 95.7 | 87.3 | 98.6 | 62.7 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 56.5 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 172 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 30 | 57 | 37 | 16 | | |
| % | 18.6 | 17.4 | 33.1 | 21.5 | 9.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 83 | 70 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 48.3 | 40.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 157 | 143 | (1-3) | 11 | | |
| % | 8.7 | 91.3 | 83.1 | | 6.4 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | (7-9) | 20 | 110 | | | |
| % | 20.3 | | 11.6 | 64.0 | | | |

243 三豊総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

243 三豊総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 323 | 124 | (1-3) | 99.1 | 61.5 | 55.9 | 66.5 | 71.9 |
| I期 | 208 | 29 | (1-3) | 99.0 | 86.0 | 80.5 | 90.1 | 70.8 |
| II期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 69.9 |
| III期 | 23 | 19 | 0 | | | | | 73.8 |
| IV期 | 60 | 58 | 0 | 100.0 | 3.3 | 0.6 | 10.2 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 228 | 95 | | | | | |
| % | 70.6 | 29.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 31 | 86 | 105 | 90 | | |
| % | 3.4 | 9.6 | 26.6 | 32.5 | 27.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 208 | 15 | 23 | 60 | 13 | (4-6) | |
| % | 64.4 | 4.6 | 7.1 | 18.6 | 4.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 79 | 244 | 231 | 10 | (1-3) | | |
| % | 24.5 | 75.5 | 71.5 | 3.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | 25 | 93 | 174 | | | |
| % | 9.6 | 7.7 | 28.8 | 53.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 203 | 92 | (1-3) | 98.5 | 54.1 | 47.0 | 60.7 | 73.3 |
| I期 | 38 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 83.8 | 67.4 | 92.4 | 73.7 |
| II期 | 65 | 22 | 0 | 100.0 | 66.2 | 53.3 | 76.2 | 72.8 |
| III期 | 47 | 15 | 0 | 100.0 | 68.1 | 52.8 | 79.4 | 72.4 |
| IV期 | 37 | 34 | (1-3) | 94.6 | 2.9 | 0.2 | 12.8 | 78.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 107 | 96 | | | | | |
| % | 52.7 | 47.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 27 | 44 | 64 | 65 | | |
| % | | 13.3 | 21.7 | 31.5 | 32.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 65 | 47 | 37 | 15 | (1-3) | |
| % | 18.7 | 32.0 | 23.2 | 18.2 | 7.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 163 | 154 | (7-9) | 0 | | |
| % | 19.7 | 80.3 | 75.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 37 | 141 | | | |
| % | | 9.9 | 18.2 | 69.5 | | | |

243 三豊総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 74 | 45 | 0 | 100.0 | 39.2 | 28.1 | 50.1 | 70.1 |
| I期 | 34 | 15 | 0 | 100.0 | 55.9 | 37.8 | 70.6 | 71.5 |
| II期 | 17 | 12 | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 17 | 12 | 0 | | | | | 65.1 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 56 | 18 | | | | | |
| % | 75.7 | 24.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 23 | 22 | 17 | | |
| % | | | 31.1 | 29.7 | 23.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 34 | 17 | 17 | (1-3) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 45.9 | 23.0 | 23.0 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 24 | 17 | 12 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 24.3 | 32.4 | 23.0 | 16.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 94.6 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 34 | 37 | | | |
| % | | | 45.9 | 50.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 232 | 179 | (1-3) | 98.7 | 22.0 | 16.9 | 27.6 | 73.7 |
| I期 | 60 | 26 | (1-3) | 98.3 | 56.1 | 42.5 | 67.6 | 70.4 |
| II期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 81.8 |
| III期 | 77 | 66 | (1-3) | 98.7 | 13.2 | 6.8 | 21.8 | 71.5 |
| IV期 | 76 | 71 | (1-3) | 98.7 | 5.5 | 1.8 | 12.3 | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 184 | 48 | 対象数 | 28 | 204 | | |
| % | 79.3 | 20.7 | % | 12.1 | 87.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 53 | 78 | 77 | | |
| % | | 8.2 | 22.8 | 33.6 | 33.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 15 | 77 | 76 | (4-6) | 0 | |
| % | 25.9 | 6.5 | 33.2 | 32.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 168 | 64 | 63 | 0 | (1-3) | | |
| % | 72.4 | 27.6 | 27.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 51 | 165 | | | |
| % | | 4.3 | 22.0 | 71.1 | | | |

243 三豊総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 89 | 11 | 0 | 100.0 | 87.6 | 78.8 | 93.0 | 65.9 |
| I期 | 44 | (4-6) | 0 | 100.0 | 90.9 | 77.6 | 96.5 | 68.5 |
| II期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 64.5 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 68.9 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 56.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 89 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 17 | 29 | 19 | 15 | | |
| % | | 19.1 | 32.6 | 21.3 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | 24 | 15 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 49.4 | 27.0 | 16.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 77 | 76 | (1-3) | 0 | | |
| % | 13.5 | 86.5 | 85.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 12 | (4-6) | 57 | | | |
| % | 15.7 | 13.5 | | 64.0 | | | |

244

高松赤十字病院

2010-2011年2カ年

コメント:

胃は実測生存率が、全体、香川県と比較して低い。若干ではあるが80歳代の患者割合が高く、もともとの合併症を抱えている患者が多かった可能性が考えられる。

大腸の実測生存率はI期では、全体、香川県と比較して高いが、III期、IV期で低い傾向を認める。70歳代の患者割合が高く、もともとの合併症を抱えている患者が多かった可能性が考えられる。

肝は実測生存率が、全体、香川県と比較して低い。70歳代の患者割合が高く、もともとの合併症を抱えている患者が多かった可能性が考えられる。対象者数が少なく、計算値が大きく変動しやすい可能性がある。

肺は高齢者、合併症を有する症例が多く、他病で亡くなることもみられた。近年の自施設算出のI期5年生存率は75パーセントとなっている。

244 高松赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 257 | 115 | (1-3) | 99.6 | 55.1 | 48.8 | 60.9 | 71.5 |
| I期 | 150 | 34 | (1-3) | 99.3 | 77.2 | 69.6 | 83.1 | 70.6 |
| II期 | 33 | 19 | 0 | 100.0 | 42.4 | 25.6 | 58.3 | 72.4 |
| III期 | 20 | 11 | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 51 | 49 | 0 | 100.0 | 3.9 | 0.7 | 11.9 | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 170 | 87 | | | | | |
| % | 66.1 | 33.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 60 | 93 | 66 | | |
| % | | 12.1 | 23.3 | 36.2 | 25.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 150 | 33 | 20 | 51 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 58.4 | 12.8 | 7.8 | 19.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 204 | 186 | 18 | 0 | | |
| % | 20.6 | 79.4 | 72.4 | 7.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 17 | 79 | 137 | | | |
| % | 9.3 | 6.6 | 30.7 | 53.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 166 | 63 | (4-6) | 97.0 | 61.6 | 53.7 | 68.6 | 70.6 |
| I期 | 37 | (1-3) | (1-3) | 91.9 | 91.8 | 76.7 | 97.3 | 72.4 |
| II期 | 52 | 12 | (1-3) | 98.1 | 76.7 | 62.7 | 86.1 | 73.1 |
| III期 | 45 | 18 | (1-3) | 97.8 | 59.4 | 43.5 | 72.2 | 71.1 |
| IV期 | 30 | 28 | 0 | 100.0 | 6.7 | 1.2 | 19.2 | 63.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 91 | 75 | | | | | |
| % | 54.8 | 45.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 48 | 60 | 37 | | |
| % | | 8.4 | 28.9 | 36.1 | 22.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | 52 | 45 | 30 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.3 | 31.3 | 27.1 | 18.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 150 | 135 | 15 | 0 | | |
| % | 9.6 | 90.4 | 81.3 | 9.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (7-9) | 42 | 89 | | | |
| % | 16.9 | | 25.3 | 53.6 | | | |

244 高松赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 45 | 0 | 100.0 | 26.2 | 16.0 | 37.6 | 70.7 |
| I期 | 28 | 15 | 0 | | | | | 71.0 |
| II期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 76.5 |
| III期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 75.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 44 | 17 | | | | | | |
| % | 72.1 | 27.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 15 | 26 | 13 | | | |
| % | | | 24.6 | 42.6 | 21.3 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 15 | 11 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 45.9 | 24.6 | 18.0 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 19 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
| | % | 29.5 | 31.1 | 18.0 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 44 | 17 | 14 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 72.1 | 27.9 | 23.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 48 | 11 | | | | |
| % | | | 78.7 | 18.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 210 | 159 | 0 | 100.0 | 24.3 | 18.7 | 30.3 | 73.1 |
| I期 | 64 | 25 | 0 | 100.0 | 60.9 | 47.9 | 71.7 | 72.4 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 70.3 |
| III期 | 58 | 51 | 0 | 100.0 | 12.1 | 5.3 | 21.8 | 72.0 |
| IV期 | 76 | 74 | 0 | 100.0 | 2.6 | 0.5 | 8.2 | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 147 | 63 | 対象数 | 15 | 195 | | |
| % | 70.0 | 30.0 | % | 7.1 | 92.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 54 | 88 | 53 | | |
| % | | 5.2 | 25.7 | 41.9 | 25.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 64 | 10 | 58 | 76 | 0 | (1-3) | |
| % | 30.5 | 4.8 | 27.6 | 36.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 138 | 72 | 68 | (4-6) | 0 | | |
| % | 65.7 | 34.3 | 32.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 12 | 68 | 110 | | | |
| % | 9.5 | 5.7 | 32.4 | 52.4 | | | |

244 高松赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 68 | 12 | (1-3) | 98.5 | 82.3 | 70.9 | 89.5 | 62.5 |
| I期 | 30 | (1-3) | 0 | 100.0 | 90.0 | 72.1 | 96.7 | 61.8 |
| II期 | 27 | (1-3) | (1-3) | | | | | 58.7 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 63.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 68 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | 23 | 14 | (7-9) | | |
| % | 23.5 | | 33.8 | 20.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 30 | 27 | (7-9) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 44.1 | 39.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 58 | 49 | (7-9) | 0 | | |
| % | 14.7 | 85.3 | 72.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (1-3) | (7-9) | 41 | | | |
| % | 25.0 | | | 60.3 | | | |

245 国立大学法人 香川大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院のがん患者さんは、他院で治療開始後の患者さん、再発患者さん及び合併症等を持った他院での治療の困難なハイリスク患者さんの割合が高い。本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療例以外）も数多く治療しているため、本集計結果が当院のがん治療症例の全てではないことに留意して参照していただきたい。

245 国立大学法人 香川大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 235 | 80 | (7-9) | 97.0 | 65.8 | 59.4 | 71.5 | 70.6 |
| I期 | 167 | 28 | (7-9) | 95.8 | 83.1 | 76.5 | 88.0 | 71.5 |
| II期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 15 | (7-9) | 0 | | | | | 74.8 |
| IV期 | 35 | 32 | 0 | 100.0 | 8.6 | 2.2 | 20.6 | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 174 | 61 | | | | | |
| % | 74.0 | 26.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 21 | 82 | 83 | 47 | | |
| % | | 8.9 | 34.9 | 35.3 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 167 | 14 | 15 | 35 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 71.1 | 6.0 | 6.4 | 14.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 201 | 195 | (4-6) | 0 | | |
| % | 14.5 | 85.5 | 83.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 27 | 15 | 78 | 115 | | | |
| % | 11.5 | 6.4 | 33.2 | 48.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 151 | 64 | (1-3) | 98.0 | 57.3 | 49.0 | 64.8 | 69.2 |
| I期 | 42 | 10 | 0 | 100.0 | 76.2 | 60.3 | 86.4 | 67.6 |
| II期 | 45 | 15 | (1-3) | 95.6 | 65.9 | 50.0 | 77.9 | 69.5 |
| III期 | 29 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.6 |
| IV期 | 33 | 29 | 0 | 100.0 | 12.1 | 3.8 | 25.5 | 68.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 88 | 63 | | | | | |
| % | 58.3 | 41.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 45 | 39 | 35 | | |
| % | | 15.9 | 29.8 | 25.8 | 23.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 45 | 29 | 33 | 0 | (1-3) | |
| % | 27.8 | 29.8 | 19.2 | 21.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 135 | 128 | (7-9) | 0 | | |
| % | 10.6 | 89.4 | 84.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (4-6) | 43 | 86 | | | |
| % | 10.6 | | 28.5 | 57.0 | | | |

245 国立大学法人 香川大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 116 | 68 | (4-6) | 95.7 | 40.6 | 31.6 | 49.5 | 69.9 |
| I期 | 37 | 11 | (4-6) | 89.2 | 69.7 | 52.0 | 81.9 | 70.3 |
| II期 | 41 | 25 | 0 | 100.0 | 39.0 | 24.3 | 53.4 | 69.3 |
| III期 | 24 | 19 | 0 | | | | | 72.1 |
| IV期 | 13 | 12 | (1-3) | | | | | 60.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 75 | 41 | | | | | |
| % | 64.7 | 35.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 42 | 32 | 25 | | |
| % | | 12.9 | 36.2 | 27.6 | 21.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 37 | 41 | 24 | 13 | (1-3) | 0 |
| | % | 31.9 | 35.3 | 20.7 | 11.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 36 | 28 | 27 | (4-6) | 0 |
| | % | 18.1 | 31.0 | 24.1 | 23.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 89 | 27 | 26 | (1-3) | 0 | | |
| % | 76.7 | 23.3 | 22.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 71 | 40 | | | |
| % | | | 61.2 | 34.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 348 | 162 | (7-9) | 97.7 | 53.3 | 47.9 | 58.4 | 68.6 |
| I期 | 192 | 47 | (7-9) | 96.4 | 75.4 | 68.7 | 80.9 | 68.7 |
| II期 | 19 | 14 | 0 | | | | | 65.9 |
| III期 | 56 | 31 | 0 | 100.0 | 44.6 | 31.4 | 57.0 | 64.9 |
| IV期 | 77 | 68 | (1-3) | 98.7 | 11.1 | 5.3 | 19.4 | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 245 | 103 | 対象数 | | 12 | 336 |
| % | 70.4 | 29.6 | % | | 3.4 | 96.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 11 | 45 | 128 | 113 | 51 | |
| % | 3.2 | 12.9 | 36.8 | 32.5 | 14.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 192 | 19 | 56 | 77 | (1-3) | (1-3) |
| % | 55.2 | 5.5 | 16.1 | 22.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 117 | 231 | 230 | (1-3) | 0 | |
| % | 33.6 | 66.4 | 66.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 42 | 27 | 147 | 132 | | |
| % | 12.1 | 7.8 | 42.2 | 37.9 | | |

245 国立大学法人 香川大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 104 | 12 | (1-3) | 97.1 | 88.3 | 80.3 | 93.2 | 63.0 |
| I期 | 53 | (1-3) | (1-3) | 98.1 | 98.1 | 87.4 | 99.7 | 65.6 |
| II期 | 33 | (4-6) | (1-3) | 93.9 | 87.5 | 70.0 | 95.1 | 62.9 |
| III期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 57.3 |
| IV期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 104 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 25 | 24 | 29 | (7-9) | | |
| % | 16.3 | 24.0 | 23.1 | 27.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 53 | 33 | 11 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 51.0 | 31.7 | 10.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 97 | 95 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 93.3 | 91.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | (4-6) | 12 | 66 | | | |
| % | 20.2 | | 11.5 | 63.5 | | | |

246

市立宇和島病院

2010-2011年2力年

コメント:

当院の2010-2011年実測生存率は、胃、大腸、肝、女性乳房に於いて全国の実測生存率と比べ低くなっており、肝、女性乳房に於いては10%以上低い。年代別では、当院の70歳以上の割合は、胃、大腸、肝、肺、女性乳房のいずれに於いても全国平均より高くなっており、当院のがん診療は高齢者の割合が高いという特徴がみられる。高齢化により循環器疾患や呼吸器疾患、糖尿病などの合併症の罹患率が高くなり、実測生存率の低下に影響を与えたと推測される。

246 市立宇和島病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 340 | 139 | 0 | 100.0 | 59.1 | 53.7 | 64.1 | 72.4 |
| I期 | 209 | 41 | 0 | 100.0 | 80.4 | 74.3 | 85.2 | 72.3 |
| II期 | 29 | 11 | 0 | | | | | 75.4 |
| III期 | 22 | 15 | 0 | | | | | 71.5 |
| IV期 | 69 | 64 | 0 | 100.0 | 7.3 | 2.7 | 14.9 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 223 | 117 | | | | | |
| % | 65.6 | 34.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 78 | 139 | 86 | | |
| % | | 8.8 | 22.9 | 40.9 | 25.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 209 | 29 | 22 | 69 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 61.5 | 8.5 | 6.5 | 20.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 287 | 258 | 23 | (4-6) | | |
| % | 15.6 | 84.4 | 75.9 | 6.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | 17 | 137 | 155 | | | |
| % | 9.1 | 5.0 | 40.3 | 45.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 252 | 99 | (1-3) | 99.6 | 60.6 | 54.2 | 66.3 | 71.6 |
| I期 | 48 | (4-6) | 0 | 100.0 | 89.6 | 76.8 | 95.5 | 68.1 |
| II期 | 81 | 30 | (1-3) | 98.8 | 62.5 | 50.9 | 72.1 | 75.8 |
| III期 | 63 | 24 | 0 | 100.0 | 61.9 | 48.8 | 72.6 | 67.0 |
| IV期 | 54 | 39 | 0 | 100.0 | 27.8 | 16.7 | 40.0 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 147 | 105 | | | | | |
| % | 58.3 | 41.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 24 | 67 | 94 | 61 | | |
| % | | 9.5 | 26.6 | 37.3 | 24.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 48 | 81 | 63 | 54 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 19.0 | 32.1 | 25.0 | 21.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 224 | 189 | 32 | (1-3) | | |
| % | 11.1 | 88.9 | 75.0 | 12.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | (4-6) | 77 | 147 | | | |
| % | 9.5 | | 30.6 | 58.3 | | | |

246 市立宇和島病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 89 | 70 | 0 | 100.0 | 21.4 | 13.5 | 30.3 | 71.7 |
| I期 | 34 | 26 | 0 | 100.0 | 23.5 | 11.1 | 38.6 | 76.3 |
| II期 | 17 | 11 | 0 | | | | | 68.4 |
| III期 | 24 | 19 | 0 | | | | | 70.9 |
| IV期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 66 | 23 | | | | | |
| % | 74.2 | 25.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 26 | 30 | 24 | | |
| % | | | 29.2 | 33.7 | 27.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 34 | 17 | 24 | 12 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 38.2 | 19.1 | 27.0 | 13.5 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 31 | 22 | 24 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 11.2 | 34.8 | 24.7 | 27.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 74 | 15 | 12 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 83.1 | 16.9 | 13.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 64 | 24 | | | |
| % | | | 71.9 | 27.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 104 | 60 | 0 | 100.0 | 42.3 | 32.7 | 51.6 | 73.3 |
| I期 | 54 | 18 | 0 | 100.0 | 66.7 | 52.4 | 77.5 | 72.5 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |
| III期 | 17 | 10 | 0 | | | | | 76.0 |
| IV期 | 24 | 24 | 0 | | | | | 72.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 73 | 31 | 対象数 | (4-6) | 100 | | |
| % | 70.2 | 29.8 | % | | 96.2 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 28 | 36 | 33 | | |
| % | | | 26.9 | 34.6 | 31.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 54 | (4-6) | 17 | 24 | (1-3) | 0 | |
| % | 51.9 | | 16.3 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 52 | 52 | 50 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 50.0 | 50.0 | 48.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (1-3) | 55 | 29 | | | |
| % | 17.3 | | 52.9 | 27.9 | | | |

246 市立宇和島病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 114 | 25 | (4-6) | 96.5 | 77.5 | 68.6 | 84.2 | 65.5 |
| I期 | 55 | (4-6) | (4-6) | 92.7 | 90.3 | 78.3 | 95.9 | 66.9 |
| II期 | 37 | (7-9) | 0 | 100.0 | 81.1 | 64.4 | 90.5 | 63.5 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.0 |
| IV期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 114 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 12 | 42 | 24 | 17 | | |
| % | 16.7 | 10.5 | 36.8 | 21.1 | 14.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 55 | 37 | (7-9) | 12 | (1-3) | 0 | |
| % | 48.2 | 32.5 | | 10.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 100 | 88 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | 12.3 | 87.7 | 77.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | (1-3) | 16 | 71 | | | |
| % | 21.9 | | 14.0 | 62.3 | | | |

247 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
2010-2011年2力年

コメント:

当院は、2010-11年頃は多くの病院で行えていなかった外来がん登録を当時から行い、積極治療を施さずベストサポーターティブケアや経過観察のみを行った患者も含めた院内がん登録情報を高い精度で行ってきた。

予後補足率も高く、肝臓と胃癌のIII期を除く5大がんでステージ別生存率を出せたことは素直に喜ぶたい。生存率は病院の実力と直結するわけではないが、がん情報をきちんと管理把握するという実力を示すことが出来たと考えている。施設の生存率が妥当な範囲より高すぎたり低すぎたりすると、がん診療上あるいはがん登録上の問題点があることが示唆される。公表された当院の『全がん』および臓器別実測生存率が妥当な範囲でおおむね全国および県全体より高かったことは喜ばしい結果であった。

当院は外来がん登録を含めた精度が高い院内がん登録を行って来たため、公表される生存率は、積極的治療を行ったものに限った生存率よりやや低く出てしまうという点で注意が必要である。また、近年のがん治療の著しい進歩により、今新たにがんにかかった方は2010-11年頃の方より、良い予後が得られる可能性が高いことも申し添えておく。しかし、がん専門病院で行う標準治療の治療成績として参考にしていただけるものになっていると思われる。

今後も、四国唯一の全国がんセンター協議会所属のがん専門病院として、愛媛県がん診療連携拠点病院としてがん診療に尽力していくつもりである。

247 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 554 | 188 | (7-9) | 98.4 | 65.9 | 61.8 | 69.7 | 66.6 |
| I期 | 339 | 36 | (7-9) | 97.9 | 89.3 | 85.4 | 92.1 | 67.2 |
| II期 | 45 | (7-9) | (1-3) | 97.8 | 80.0 | 65.1 | 89.1 | 68.5 |
| III期 | 29 | 19 | (1-3) | | | | | 66.6 |
| IV期 | 132 | 117 | 0 | 100.0 | 11.4 | 6.7 | 17.4 | 66.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 382 | 172 | | | | | |
| % | 69.0 | 31.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 33 | 94 | 201 | 162 | 64 | | |
| % | 6.0 | 17.0 | 36.3 | 29.2 | 11.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 339 | 45 | 29 | 132 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 61.2 | 8.1 | 5.2 | 23.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 123 | 431 | 410 | 21 | 0 | | |
| % | 22.2 | 77.8 | 74.0 | 3.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 53 | 66 | 125 | 310 | | | |
| % | 9.6 | 11.9 | 22.6 | 56.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 382 | 119 | 10 | 97.4 | 68.5 | 63.6 | 73.0 | 64.3 |
| I期 | 91 | 10 | (1-3) | 96.7 | 88.9 | 80.3 | 93.8 | 65.1 |
| II期 | 88 | 12 | (1-3) | 96.6 | 86.2 | 77.0 | 91.9 | 65.2 |
| III期 | 110 | 22 | (1-3) | 97.3 | 79.8 | 70.9 | 86.2 | 64.9 |
| IV期 | 82 | 71 | 0 | 100.0 | 13.4 | 7.1 | 21.7 | 63.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 226 | 156 | | | | | |
| % | 59.2 | 40.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 39 | 79 | 133 | 101 | 30 | | |
| % | 10.2 | 20.7 | 34.8 | 26.4 | 7.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 91 | 88 | 110 | 82 | (1-3) | 10 | |
| % | 23.8 | 23.0 | 28.8 | 21.5 | | 2.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 339 | 307 | 32 | 0 | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 80.4 | 8.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | 41 | 70 | 229 | | | |
| % | 11.0 | 10.7 | 18.3 | 59.9 | | | |

247 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 120 | 76 | (4-6) | 95.0 | 34.7 | 26.2 | 43.4 | 68.2 |
| I期 | 46 | 22 | (4-6) | 89.1 | 48.5 | 32.9 | 62.4 | 70.9 |
| II期 | 28 | 10 | (1-3) | | | | | 67.3 |
| III期 | 25 | 23 | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | 20 | 20 | 0 | | | | | 66.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 94 | 26 | | | | | |
| % | 78.3 | 21.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 17 | 38 | 33 | 24 | | |
| % | | 14.2 | 31.7 | 27.5 | 20.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 46 | 28 | 25 | 20 | (1-3) | 0 |
| | % | 38.3 | 23.3 | 20.8 | 16.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 15 | 47 | 25 | 32 | (1-3) | 0 |
| | % | 12.5 | 39.2 | 20.8 | 26.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 89 | 31 | 31 | 0 | 0 | | |
| % | 74.2 | 25.8 | 25.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 77 | 36 | | | |
| % | | | 64.2 | 30.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 753 | 388 | 14 | 98.1 | 48.0 | 44.4 | 51.5 | 68.8 |
| I期 | 383 | 93 | (7-9) | 97.7 | 75.4 | 70.7 | 79.4 | 68.6 |
| II期 | 44 | 20 | 0 | 100.0 | 54.6 | 38.8 | 67.8 | 69.1 |
| III期 | 147 | 106 | (1-3) | 98.0 | 27.0 | 20.0 | 34.4 | 68.8 |
| IV期 | 175 | 167 | (1-3) | 98.9 | 3.5 | 1.5 | 7.1 | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 493 | 260 | 対象数 | 59 | 694 | |
| % | 65.5 | 34.5 | % | 7.8 | 92.2 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 22 | 108 | 251 | 260 | 112 | |
| % | 2.9 | 14.3 | 33.3 | 34.5 | 14.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 383 | 44 | 147 | 175 | 0 | (4-6) |
| % | 50.9 | 5.8 | 19.5 | 23.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 370 | 383 | 379 | (4-6) | 0 | |
| % | 49.1 | 50.9 | 50.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 60 | 60 | 361 | 272 | | |
| % | 8.0 | 8.0 | 47.9 | 36.1 | | |

247 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 737 | 63 | 16 | 97.8 | 91.4 | 89.1 | 93.2 | 57.1 |
| I期 | 310 | (1-3) | (7-9) | 97.7 | 99.0 | 97.0 | 99.7 | 58.7 |
| II期 | 284 | 17 | (4-6) | 97.9 | 94.0 | 90.5 | 96.2 | 56.9 |
| III期 | 100 | 13 | (1-3) | 98.0 | 87.0 | 78.6 | 92.2 | 53.9 |
| IV期 | 40 | 29 | (1-3) | 97.5 | 25.9 | 13.5 | 40.2 | 60.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 737 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 239 | 170 | 187 | 110 | 31 | | |
| % | 32.4 | 23.1 | 25.4 | 14.9 | 4.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 310 | 284 | 100 | 40 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 42.1 | 38.5 | 13.6 | 5.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 690 | 665 | 23 | (1-3) | | |
| % | 6.4 | 93.6 | 90.2 | 3.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 171 | 32 | 92 | 442 | | | |
| % | 23.2 | 4.3 | 12.5 | 60.0 | | | |

248 住友別子病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

248 住友別子病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 60 | (4-6) | 97.0 | 54.8 | 45.9 | 62.8 | 72.6 |
| I期 | 67 | 11 | (4-6) | 94.0 | 83.3 | 71.8 | 90.4 | 72.0 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 74.6 |
| III期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 76.2 |
| IV期 | 38 | 36 | 0 | 100.0 | 5.3 | 1.0 | 15.5 | 73.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 93 | 41 | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 36 | 55 | 32 | | |
| % | | | 26.9 | 41.0 | 23.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | (7-9) | 18 | 38 | (1-3) | 0 | |
| % | 50.0 | | 13.4 | 28.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 99 | 75 | 12 | 12 | | |
| % | 26.1 | 73.9 | 56.0 | 9.0 | 9.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 44 | 72 | | | |
| % | | 9.0 | 32.8 | 53.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 109 | 48 | (4-6) | 96.3 | 55.5 | 45.6 | 64.3 | 71.6 |
| I期 | 25 | (4-6) | (1-3) | | | | | 75.0 |
| II期 | 34 | 11 | (1-3) | 97.1 | 66.9 | 48.2 | 80.1 | 73.1 |
| III期 | 23 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.6 |
| IV期 | 23 | 21 | 0 | | | | | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 62 | 47 | | | | | |
| % | 56.9 | 43.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 27 | 43 | 27 | | |
| % | | 9.2 | 24.8 | 39.4 | 24.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 34 | 23 | 23 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.9 | 31.2 | 21.1 | 21.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 103 | 80 | 11 | 12 | | |
| % | | 94.5 | 73.4 | 10.1 | 11.0 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 44 | 50 | | | |
| % | | 9.2 | 40.4 | 45.9 | | | |

248 住友別子病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 60 | 38 | (1-3) | 96.7 | 35.1 | 23.2 | 47.3 | 72.5 |
| I期 | 29 | 12 | (1-3) | | | | | 67.1 |
| II期 | 17 | 12 | 0 | | | | | 74.0 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 78.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 77.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 41 | 19 | | | | | | |
| % | 68.3 | 31.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (7-9) | 28 | 15 | | | |
| % | | | | 46.7 | 25.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 29 | 17 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 48.3 | 28.3 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 19 | 17 | 11 | 12 | (1-3) | 0 | |
| | % | 31.7 | 28.3 | 18.3 | 20.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 52 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | |
| % | 86.7 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 47 | 11 | | | | |
| % | | | 78.3 | 18.3 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 128 | 98 | (7-9) | 93.8 | 22.4 | 15.5 | 30.1 | 74.5 |
| I期 | 41 | 18 | (7-9) | 82.9 | 54.4 | 37.6 | 68.4 | 73.6 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 76.4 |
| III期 | 43 | 39 | 0 | 100.0 | 9.3 | 3.0 | 20.1 | 71.2 |
| IV期 | 34 | 34 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 93 | 35 | 対象数 | | 12 | 116 |
| % | 72.7 | 27.3 | % | | 9.4 | 90.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 28 | 50 | 43 | |
| % | | | 21.9 | 39.1 | 33.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 41 | (7-9) | 43 | 34 | (1-3) | 0 |
| % | 32.0 | | 33.6 | 26.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 87 | 41 | 31 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 68.0 | 32.0 | 24.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 67 | 52 | | |
| % | | | 52.3 | 40.6 | | |

248 住友別子病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 57 | 13 | (4-6) | 93.0 | 76.2 | 62.5 | 85.4 | 65.4 |
| I期 | 30 | (1-3) | (1-3) | 93.3 | 89.6 | 71.2 | 96.5 | 66.7 |
| II期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 64.5 |
| III期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.2 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 57 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 18 | 16 | (7-9) | | |
| % | | | 31.6 | 28.1 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 30 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 52.6 | 29.8 | 17.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | 57 | 47 | 0 | 10 | | |
| % | | 100.0 | 82.5 | | 17.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | (4-6) | 39 | | | |
| % | 17.5 | | | 68.4 | | | |

249

愛媛大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

5年生存率とは、がんと診断された患者さんの中で診断から5年後に生存が確認できた割合を示し、病気や治療を考える上で重要な指標の一つです。今年のがん登録の集計でも、病気の進行度（ステージ）別の5年生存率が、より詳細な情報として公表されました。早期発見、早期治療が重要であることが、こういった新たなデータからも読み取れます。一方、病気に対する治療は、患者さんの背景（合併症、全身状態、家族や社会背景等）や患者さんやご家族の要望を熟慮し、診療チーム全体で方向性を決めることから、患者さん個々でその方針が異なります。愛媛県では、7つの拠点病院を中心に互いに連携し、地域の特色や役割を果たしながら、県内のがん患者さんの加療を行っています。中でも当院は、県内唯一の大学病院であることから、希少がんや種々の医療者の協力が必要な難治がん患者さんが多く受診され、一人の医師、一つの診療科の判断や実績による対応ではなく、様々な状況の患者さんにも対応できるように、病院をあげてチーム医療を推進しています。

249 愛媛大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 207 | 89 | (1-3) | 99.0 | 56.7 | 49.6 | 63.2 | 71.5 |
| I期 | 139 | 42 | (1-3) | 99.3 | 69.7 | 61.3 | 76.6 | 72.6 |
| II期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 73.9 |
| III期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 49.3 |
| IV期 | 37 | 32 | (1-3) | 97.3 | 11.1 | 3.5 | 23.6 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 145 | 62 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 16 | 44 | 80 | 55 | | |
| % | 5.8 | 7.7 | 21.3 | 38.6 | 26.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 139 | 16 | 12 | 37 | 0 | (1-3) | |
| % | 67.1 | 7.7 | 5.8 | 17.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 173 | 167 | (4-6) | 0 | | |
| % | 16.4 | 83.6 | 80.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 10 | 78 | 94 | | | |
| % | 12.1 | 4.8 | 37.7 | 45.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 135 | 56 | (7-9) | 94.1 | 57.3 | 48.3 | 65.3 | 68.7 |
| I期 | 34 | 10 | (1-3) | 91.2 | 69.9 | 51.3 | 82.6 | 71.4 |
| II期 | 27 | (7-9) | (1-3) | | | | | 68.4 |
| III期 | 37 | 12 | (1-3) | 94.6 | 66.4 | 48.5 | 79.4 | 69.5 |
| IV期 | 33 | 24 | (1-3) | 93.9 | 23.0 | 10.2 | 38.8 | 64.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 81 | 54 | | | | | |
| % | 60.0 | 40.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 44 | 43 | 23 | | |
| % | | 14.1 | 32.6 | 31.9 | 17.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | 27 | 37 | 33 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.2 | 20.0 | 27.4 | 24.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 103 | 100 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 23.7 | 76.3 | 74.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 0 | 44 | 87 | | | |
| % | | | 32.6 | 64.4 | | | |

249 愛媛大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 69 | (4-6) | 95.0 | 41.1 | 32.1 | 49.9 | 68.1 |
| I期 | 64 | 27 | (1-3) | 96.9 | 57.1 | 44.0 | 68.3 | 72.3 |
| II期 | 32 | 19 | (1-3) | 90.6 | 36.1 | 19.4 | 53.1 | 73.4 |
| III期 | 16 | 15 | (1-3) | | | | | 65.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 59.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 79 | 42 | | | | | |
| % | 65.3 | 34.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | 34 | 40 | 22 | | |
| % | | 13.2 | 28.1 | 33.1 | 18.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 64 | 32 | 16 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 52.9 | 26.4 | 13.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 37 | 43 | 23 | 16 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 30.6 | 35.5 | 19.0 | 13.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 83 | 38 | 36 | (1-3) | 0 | | |
| % | 68.6 | 31.4 | 29.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 79 | 41 | | | |
| % | | | 65.3 | 33.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 165 | 107 | (1-3) | 98.2 | 34.4 | 27.2 | 41.7 | 70.7 |
| I期 | 77 | 30 | (1-3) | 98.7 | 61.0 | 49.2 | 70.9 | 71.8 |
| II期 | 11 | (4-6) | (1-3) | | | | | 78.5 |
| III期 | 33 | 29 | 0 | 100.0 | 12.1 | 3.8 | 25.5 | 72.6 |
| IV期 | 44 | 42 | 0 | 100.0 | 4.6 | 0.8 | 13.6 | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 118 | 47 | | (7-9) | 157 | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | 95.2 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 48 | 64 | 34 | |
| % | | 7.9 | 29.1 | 38.8 | 20.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 77 | 11 | 33 | 44 | 0 | 0 |
| % | 46.7 | 6.7 | 20.0 | 26.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 85 | 80 | 78 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 51.5 | 48.5 | 47.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 67 | 85 | | |
| % | | | 40.6 | 51.5 | | |

249 愛媛大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 60 | 18 | (4-6) | 93.3 | 69.6 | 56.1 | 79.6 | 63.8 |
| I期 | 22 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.5 |
| II期 | 23 | (4-6) | (1-3) | | | | | 61.6 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 73.5 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 59.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 60 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 12 | 11 | 16 | (7-9) | | |
| % | 20.0 | 20.0 | 18.3 | 26.7 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 23 | (7-9) | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 36.7 | 38.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 52 | 49 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 86.7 | 81.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 0 | 15 | 34 | | | |
| % | 18.3 | | 25.0 | 56.7 | | | |

コメント:

当院は救命救急センターを持つ病院として、様々な急性期重症症例を受け入れ、高度な医療を提供しております。がん医療におきましても、地域の医療機関と連携しながら、各診療科が協働して、重篤な併存疾患を持つなど他の施設では対応困難なリスクの高い症例を多く受け入れています。

地域における各施設の役割、患者構成（年齢・性別・併存疾患の有無等）は様々であり、また、同一部位・同一ステージにおいても予後に影響する患者背景は複雑です。特に、実測生存率は、年齢や併存疾患等の影響を強く受けるため、高齢者を多く診療している医療機関では低くなる傾向があります。そのような理由で、当院としては従前から生存率の公表や比較・考察については慎重に行うべきであると考えております。

一方、各施設のがん登録データの精度は向上してきており、国全体や地域単位での部位別のがん登録件数やステージ別の生存率等については、これからのがん医療において大変貴重なデータと考えているところです。

では、今回報告した部位別5年生存率について、全国と当院を比較して説明いたします。

【胃】

胃は、全国と比較してII期の生存率は高くなっています。しかし、全体の生存率は若干低くなっています。これは80歳以上の割合が全国19.1%に対して当院24.4%と高くなっていることが要因の1つと考えられます。

| | | | |
|---------|-------|------|-------|
| 全体（全国） | 61.5% | （当院） | 59.8% |
| II期（全国） | 58.6% | （当院） | 69.4% |

【大腸】

大腸は、全国と比較してII期の生存率は低くなっていますが、I期とIII期は高くなっています。全体の生存率は若干低くなっており、80歳以上の割合が全国19.1%に対して当院26.4%と高くなっていることが要因の1つと考えられます。

| | | | |
|----------|-------|------|-------|
| 全体（全国） | 63.5% | （当院） | 61.0% |
| I期（全国） | 83.4% | （当院） | 88.0% |
| II期（全国） | 75.6% | （当院） | 69.5% |
| III期（全国） | 67.5% | （当院） | 71.6% |

【肝】

肝は、全国と比較して全体、I期、II期、III期の生存率は高くなっています。50歳代の割合が全国10.3%に対して当院15.0%と高く、70歳代の割合が全国40.5%に対して当院34.3%と低くなっていることが要因の1つと考えられます。

| | | | |
|----------|-------|------|-------|
| 全体（全国） | 35.1% | （当院） | 38.9% |
| I期（全国） | 52.8% | （当院） | 54.4% |
| II期（全国） | 38.3% | （当院） | 41.4% |
| III期（全国） | 12.4% | （当院） | 20.1% |

【肺】

肺は、生存率・年齢の割合共に、全国と比較し大きな差異はありませんでした。

| | | | |
|--------|-------|------|-------|
| 全体（全国） | 36.3% | （当院） | 35.8% |
|--------|-------|------|-------|

【女性乳房】

女性乳房は、全国と比較してII期の生存率が低く、III期は高くなっています。全体の生存率は若干低くなっており、80歳以上の割合が全国7.8%に対して当院12.5%と高くなっていることが要因の1つと考えられます。

| | | | |
|----------|-------|------|-------|
| 全体（全国） | 87.9% | （当院） | 83.3% |
| II期（全国） | 91.4% | （当院） | 85.1% |
| III期（全国） | 76.4% | （当院） | 85.1% |

250 愛媛県立中央病院
2010-2011年2力年

コメント:

今後、更に多くの症例データが収集されてくると、ステージ亜分類別の生存率や、ステージごとの男女別・年齢別等の生存率の公表が可能になると考えられます。

今回の公表結果をご覧になられ、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご質問や不安に思われることがございましたら、是非、主治医までご相談ください。

250 愛媛県立中央病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 513 | 202 | 31 | 94.0 | 59.8 | 55.3 | 63.9 | 71.8 |
| I期 | 330 | 66 | 28 | 91.5 | 79.3 | 74.4 | 83.3 | 72.9 |
| II期 | 36 | 11 | 0 | 100.0 | 69.4 | 51.7 | 81.8 | 69.5 |
| III期 | 26 | 20 | (1-3) | | | | | 64.0 |
| IV期 | 107 | 99 | 0 | 100.0 | 7.5 | 3.5 | 13.5 | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 341 | 172 | | | | | |
| % | 66.5 | 33.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 40 | 145 | 187 | 125 | | |
| % | 3.1 | 7.8 | 28.3 | 36.5 | 24.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 330 | 36 | 26 | 107 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 64.3 | 7.0 | 5.1 | 20.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 100 | 413 | 378 | 33 | (1-3) | | |
| % | 19.5 | 80.5 | 73.7 | 6.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 52 | 199 | 242 | | | |
| % | 3.9 | 10.1 | 38.8 | 47.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 360 | 137 | 24 | 93.3 | 61.0 | 55.6 | 65.9 | 71.8 |
| I期 | 94 | 11 | (7-9) | 92.6 | 88.0 | 79.3 | 93.2 | 70.5 |
| II期 | 105 | 31 | (7-9) | 93.3 | 69.5 | 59.5 | 77.5 | 73.3 |
| III期 | 69 | 19 | (7-9) | 89.9 | 71.6 | 59.2 | 80.9 | 70.7 |
| IV期 | 85 | 72 | (1-3) | 97.6 | 14.1 | 7.6 | 22.5 | 72.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 196 | 164 | | | | | |
| % | 54.4 | 45.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 40 | 94 | 123 | 95 | | |
| % | | 11.1 | 26.1 | 34.2 | 26.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 94 | 105 | 69 | 85 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 26.1 | 29.2 | 19.2 | 23.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 322 | 260 | 60 | (1-3) | | |
| % | 10.6 | 89.4 | 72.2 | 16.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 25 | 113 | 211 | | | |
| % | 3.1 | 6.9 | 31.4 | 58.6 | | | |

250 愛媛県立中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 207 | 125 | (4-6) | 97.6 | 38.9 | 32.2 | 45.5 | 70.1 |
| I期 | 73 | 33 | (1-3) | 98.6 | 54.4 | 42.3 | 65.0 | 69.9 |
| II期 | 76 | 44 | (1-3) | 97.4 | 41.4 | 30.1 | 52.2 | 71.3 |
| III期 | 42 | 33 | (1-3) | 95.2 | 20.1 | 9.4 | 33.6 | 70.1 |
| IV期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 144 | 63 | | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 31 | 62 | 71 | 39 | | | |
| % | | 15.0 | 30.0 | 34.3 | 18.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 73 | 76 | 42 | 14 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 35.3 | 36.7 | 20.3 | 6.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 46 | 73 | 44 | 42 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 22.2 | 35.3 | 21.3 | 20.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 127 | 80 | 68 | (7-9) | (4-6) | | | |
| % | 61.4 | 38.6 | 32.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 147 | 49 | | | | |
| % | | | 71.0 | 23.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 378 | 241 | (7-9) | 98.1 | 35.8 | 30.9 | 40.6 | 70.5 |
| I期 | 132 | 37 | (1-3) | 99.2 | 71.9 | 63.4 | 78.8 | 71.8 |
| II期 | 27 | 15 | (1-3) | | | | | 67.2 |
| III期 | 86 | 64 | (1-3) | 96.5 | 24.1 | 15.6 | 33.7 | 69.8 |
| IV期 | 128 | 122 | (1-3) | 98.4 | 4.2 | 1.5 | 8.9 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 270 | 108 | 対象数 | | 23 | 355 | |
| % | 71.4 | 28.6 | % | | 6.1 | 93.9 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 38 | 124 | 135 | 74 | | |
| % | | 10.1 | 32.8 | 35.7 | 19.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 132 | 27 | 86 | 128 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 34.9 | 7.1 | 22.8 | 33.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 259 | 119 | 115 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 68.5 | 31.5 | 30.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 31 | 181 | 141 | | | |
| % | 6.6 | 8.2 | 47.9 | 37.3 | | | |

250 愛媛県立中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 216 | 34 | 20 | 90.7 | 83.3 | 77.4 | 87.8 | 60.7 |
| I期 | 85 | (7-9) | (4-6) | 92.9 | 91.4 | 82.9 | 95.8 | 62.4 |
| II期 | 79 | 11 | (7-9) | 89.9 | 85.1 | 74.7 | 91.5 | 60.8 |
| III期 | 30 | (4-6) | (4-6) | 86.7 | 85.1 | 65.1 | 94.2 | 61.7 |
| IV期 | 20 | 11 | (1-3) | | | | | 57.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 216 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 61 | 39 | 54 | 35 | 27 | | |
| % | 28.2 | 18.1 | 25.0 | 16.2 | 12.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 85 | 79 | 30 | 20 | (1-3) | 0 | |
| % | 39.4 | 36.6 | 13.9 | 9.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 181 | 171 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 16.2 | 83.8 | 79.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 49 | 11 | 35 | 121 | | | |
| % | 22.7 | 5.1 | 16.2 | 56.0 | | | |

251 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院は、集計対象数が少数なため、すべての生存率を公開することはできませんが、条件を満たした部位では公開しました。今治医療圏のがん診療拠点病院として、がん登録情報を把握し、地域が求めているがん医療を提供できるように努力していきます。

251 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 161 | 63 | (1-3) | 99.4 | 60.7 | 52.7 | 67.8 | 71.8 |
| I期 | 98 | 19 | (1-3) | 99.0 | 80.4 | 71.1 | 87.1 | 73.7 |
| II期 | 13 | (1-3) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.0 |
| IV期 | 43 | 37 | 0 | 100.0 | 14.0 | 5.7 | 25.9 | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 102 | 59 | | | | | |
| % | 63.4 | 36.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 45 | 52 | 41 | | |
| % | | 11.8 | 28.0 | 32.3 | 25.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 98 | 13 | (4-6) | 43 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 60.9 | 8.1 | | 26.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 26 | 135 | 119 | 14 | (1-3) | | |
| % | 16.1 | 83.9 | 73.9 | 8.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 50 | 92 | | | |
| % | | 8.1 | 31.1 | 57.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 59 | (1-3) | 99.3 | 56.5 | 47.8 | 64.4 | 71.8 |
| I期 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 70.3 |
| II期 | 39 | (7-9) | (1-3) | 97.4 | 81.9 | 65.7 | 90.9 | 73.1 |
| III期 | 40 | 18 | 0 | 100.0 | 55.0 | 38.5 | 68.8 | 72.4 |
| IV期 | 33 | 29 | 0 | 100.0 | 12.1 | 3.8 | 25.5 | 72.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 82 | 54 | | | | | |
| % | 60.3 | 39.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 28 | 50 | 35 | | |
| % | | 13.2 | 20.6 | 36.8 | 25.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 19 | 39 | 40 | 33 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 14.0 | 28.7 | 29.4 | 24.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 120 | 100 | 19 | (1-3) | | |
| % | 11.8 | 88.2 | 73.5 | 14.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 25 | 97 | | | |
| % | | | 18.4 | 71.3 | | | |

251 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 64 | 41 | (1-3) | 98.4 | 35.0 | 23.5 | 46.7 | 71.9 |
| I期 | 38 | 18 | (1-3) | 97.4 | 51.4 | 34.4 | 66.0 | 70.3 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 68.8 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 42 | 22 | | | | | |
| % | 65.6 | 34.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 22 | 23 | 15 | | |
| % | | | 34.4 | 35.9 | 23.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 38 | 10 | 12 | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | 59.4 | 15.6 | 18.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 23 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 32.8 | 35.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 55 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | 85.9 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 40 | 23 | | | |
| % | | | 62.5 | 35.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 28 | 26 | (1-3) | | | | | 75.3 |
| I期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 62.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |
| III期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 82.6 |
| IV期 | 13 | 12 | (1-3) | | | | | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 23 | (4-6) | | | (1-3) | 26 |
| % | 82.1 | | | | % | 92.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | 13 | |
| % | | | | | 46.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 11 | 13 | (1-3) | 0 |
| % | | | 39.3 | 46.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 27 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 96.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 21 | | |
| % | | | | 75.0 | | |

251 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 51 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 82.1 | 68.4 | 90.2 | 65.8 |
| I期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 64.4 |
| II期 | 15 | (1-3) | (1-3) | | | | | 66.3 |
| III期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 62.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 51 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | 14 | 10 | 12 | | |
| % | 19.6 | | 27.5 | 19.6 | 23.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 19 | 15 | 11 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 37.3 | 29.4 | 21.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 47 | 43 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 92.2 | 84.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 33 | | | |
| % | | | | 64.7 | | | |

252 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

当院は、2008年に高知県で初めて「地域がん診療連携病院」の認定を受け、都道府県や地域内でのがん診療の中心的・指導的役割を担っています。

2010年当時の院内がん登録は入院症例のみを対象としており、症例件数やデータ精度においても課題があることは否めませんが、当院実測生存率と全国平均に大きな差異がみられない為公表いたします。乳がんに関しては対象症例が非常に少なく、各ステージでは30症例未満の為ステージ別生存率が公表されていません。その為III期IV期の生存率が低い事が予想され、全体の实測生存率に影響が出ていると考えられます。

当院では、2011年より全体の95%以上の生存状況割合を維持するように取り組んでいます。また、2016年より主要5部位に食道、胆のう（肝外胆管を含む）、膵臓、前立腺、膀胱、子宮頸部を加えた11部位についてKaplan-Meier法を用い実測5年生存率を算出し、ホームページでの情報公開を実施しています。ホームページで公開しているデータにつきましては、本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療以外や0期など）も含めた生存率となっています。

「実測生存率」は死因に関係なくすべての死亡を計算に含めた生存率の為、生存率がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

今後も院内がん登録データのあらたな活用法を検討し、引き続きがんに関する情報公開を進めていきたいと思っています。

252 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 461 | 152 | (1-3) | 99.6 | 66.9 | 62.4 | 71.0 | 70.0 |
| I期 | 319 | 51 | (1-3) | 99.7 | 84.0 | 79.5 | 87.6 | 70.4 |
| II期 | 34 | 13 | (1-3) | 97.1 | 60.8 | 42.2 | 75.0 | 69.6 |
| III期 | 37 | 23 | 0 | 100.0 | 37.8 | 22.6 | 53.0 | 75.1 |
| IV期 | 69 | 64 | 0 | 100.0 | 7.3 | 2.7 | 14.9 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 321 | 140 | | | | | |
| % | 69.6 | 30.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 18 | 53 | 137 | 157 | 96 | | |
| % | 3.9 | 11.5 | 29.7 | 34.1 | 20.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 319 | 34 | 37 | 69 | 0 | (1-3) | |
| % | 69.2 | 7.4 | 8.0 | 15.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 414 | 411 | (1-3) | 0 | | |
| % | 10.2 | 89.8 | 89.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 71 | 20 | 364 | | | |
| % | | 15.4 | 4.3 | 79.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 451 | 153 | (1-3) | 99.3 | 65.9 | 61.3 | 70.1 | 69.1 |
| I期 | 121 | 12 | (1-3) | 99.2 | 90.0 | 83.1 | 94.2 | 66.7 |
| II期 | 158 | 43 | (1-3) | 98.7 | 72.5 | 64.8 | 78.8 | 70.2 |
| III期 | 95 | 37 | 0 | 100.0 | 61.1 | 50.5 | 70.0 | 68.7 |
| IV期 | 74 | 61 | 0 | 100.0 | 17.6 | 9.9 | 27.0 | 67.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 269 | 182 | | | | | |
| % | 59.6 | 40.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 51 | 147 | 136 | 91 | | |
| % | 5.8 | 11.3 | 32.6 | 30.2 | 20.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | 158 | 95 | 74 | 0 | (1-3) | |
| % | 26.8 | 35.0 | 21.1 | 16.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 417 | 411 | (4-6) | 0 | | |
| % | 7.5 | 92.5 | 91.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 23 | 20 | 396 | | | |
| % | 2.7 | 5.1 | 4.4 | 87.8 | | | |

252 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 113 | 74 | (1-3) | 99.1 | 33.9 | 25.3 | 42.7 | 71.9 |
| I期 | 28 | 12 | (1-3) | | | | | 70.8 |
| II期 | 31 | 16 | 0 | 100.0 | 48.4 | 30.2 | 64.4 | 77.1 |
| III期 | 47 | 39 | 0 | 100.0 | 17.0 | 8.0 | 29.0 | 73.4 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 91 | 22 | | | | | | |
| % | 80.5 | 19.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 30 | 43 | 29 | | | |
| % | | | 26.5 | 38.1 | 25.7 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 28 | 31 | 47 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 24.8 | 27.4 | 41.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 22 | 43 | 25 | 23 | 0 | 0 | |
| | % | 19.5 | 38.1 | 22.1 | 20.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 57 | 56 | 56 | 0 | 0 | | | |
| % | 50.4 | 49.6 | 49.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | 97 | | | | |
| % | | | 9.7 | 85.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 276 | 177 | (1-3) | 99.6 | 35.8 | 30.1 | 41.4 | 69.3 |
| I期 | 98 | 23 | 0 | 100.0 | 76.5 | 66.8 | 83.7 | 70.7 |
| II期 | 21 | 13 | 0 | | | | | 69.1 |
| III期 | 55 | 43 | (1-3) | 98.2 | 21.3 | 11.5 | 32.9 | 66.0 |
| IV期 | 102 | 98 | 0 | 100.0 | 3.9 | 1.3 | 9.0 | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|------|--|--|
| 対象数 | 193 | 83 | 対象数 | | 20 | 256 | | |
| % | 69.9 | 30.1 | % | | 7.2 | 92.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 13 | 33 | 85 | 97 | 48 | | | |
| % | 4.7 | 12.0 | 30.8 | 35.1 | 17.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 98 | 21 | 55 | 102 | 0 | 0 | | |
| % | 35.5 | 7.6 | 19.9 | 37.0 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 177 | 99 | 98 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 64.1 | 35.9 | 35.5 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (4-6) | 49 | 17 | 206 | | | | |
| % | | 17.8 | 6.2 | 74.6 | | | | |

252 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 50 | 12 | 0 | 100.0 | 76.0 | 61.6 | 85.6 | 69.0 |
| I期 | 22 | (1-3) | 0 | | | | | 68.6 |
| II期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 73.9 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 61.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 50 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 13 | 13 | 13 | | |
| % | | | 26.0 | 26.0 | 26.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 17 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 44.0 | 34.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | | |
| % | 20.0 | 80.0 | 80.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (4-6) | 37 | | | |
| % | | | | 74.0 | | | |

253 高知県立幡多けんみん病院
2011年のみ

コメント:

当院のデータは、2011年4月～12月（9ヶ月間）の登録データである。
全部位の罹患平均年齢は67.9歳、主要5部位（53.0%）とその他の部位（47.0%）
男女比（5.4：4.6）

部位別の5年生存率について

<胃>
平均年齢は72.9歳と高くなっている。ステージはⅠ期が6割以上と多く生存率も高い、Ⅳ期に関しては全件が亡くなっている。男性の罹患率が高い

<大腸>
平均年齢は69.3歳と当院の平均並み、Ⅱ期が多くあとは、ほぼ同数となっている。大腸の生存率は6割弱、Ⅱ期以降のステージが多かった事が影響していると思われる。

<肝臓>
約8割が男性である。罹患年齢も74.2歳と高い、進行してからの発見が多く観血的な治療は少ない。生存率は低くなっている。

<肺>
4分の3が男性、罹患年齢も75.4歳と5部位の中で一番高い、治療に関しては専門医不在もあり観血的治療は行っていない。生存率も低い。

<乳房>
罹患年齢は63.9歳と若い、ステージではⅡ期が多く、また治療も観血的治療が多く施行されている。生存率は5部位の中で最も高い

253 高知県立幡多けんみん病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 59 | 25 | (1-3) | 94.9 | 56.4 | 42.6 | 68.1 | 72.9 |
| I期 | 37 | (7-9) | (1-3) | 97.3 | 80.8 | 63.9 | 90.4 | 72.8 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 79.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 75.8 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 42 | 17 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 14 | 16 | 20 | | |
| % | | | 23.7 | 27.1 | 33.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 37 | (1-3) | (4-6) | 13 | (1-3) | 0 | |
| % | 62.7 | | | 22.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 45 | 45 | 0 | 0 | | |
| % | 23.7 | 76.3 | 76.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 11 | 41 | | | |
| % | | | 18.6 | 69.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 56 | 23 | (1-3) | 96.4 | 58.2 | 44.1 | 69.9 | 69.3 |
| I期 | 10 | (1-3) | (1-3) | | | | | 67.6 |
| II期 | 23 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.6 |
| III期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 65.4 |
| IV期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 34 | 22 | | | | | |
| % | 60.7 | 39.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 15 | 16 | 12 | | |
| % | | 19.6 | 26.8 | 28.6 | 21.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | 23 | 11 | 11 | (1-3) | 0 | |
| % | 17.9 | 41.1 | 19.6 | 19.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 47 | 47 | 0 | 0 | | |
| % | | 83.9 | 83.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 18 | 30 | | | |
| % | | | 32.1 | 53.6 | | | |

253 高知県立幡多けんみん病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 19 | 12 | (1-3) | | | | | 74.2 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 75.6 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.3 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 75.3 |
| IV期 | (1-3) | 0 | (1-3) | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 15 | (4-6) | | | | | | |
| % | 78.9 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (7-9) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (4-6) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 14 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | 73.7 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | 12 | | | | |
| % | | | | 63.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 16 | 15 | (1-3) | | | | | 75.4 |
| I期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 81.5 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 81.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | | | | 73.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-----------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 12 | (4-6) | | 対象数 (1-3) | 15 | | | |
| % | 75.0 | | | % | 93.8 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (7-9) | | | |
| % | | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| % | 100.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | (7-9) | | | | |
| % | | | | | | | | |

253 高知県立幡多けんみん病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 32 | 10 | (1-3) | 96.9 | 67.7 | 48.4 | 81.2 | 63.9 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 63.5 |
| II期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 63.8 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 66.2 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 50.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 32 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | (7-9) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | | 56.3 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 26 | 25 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 81.3 | 78.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | 24 | | | |
| % | | | | 75.0 | | | |

254

久留米大学病院

2010-2011年2力年

コメント:

施設別・病期別の生存率を推定する場合、症例数が限られるので必然的にバラツキが大きくなる。加えて、様々な予後に影響する要因、例えば部位別登録数、年齢別登録数、観血的治療（手術）実施別登録数、発見経緯、肺については小細胞癌・非小細胞癌別登録数など、要素・割合が異なる場合には生存率に影響を及ぼす。実際、病期別生存率の逆転現象がみられる場合もあり、その解釈には注意を要する。

また、今回は実測生存率のみを算出しており、がん死・他病死の判別ができない本調査では対象疾患（胃がんや肺がんなど）以外による死亡の補正が出来ていない。がん診療体制の違いによる対象者の違いや併存症等も生存率には影響を与えることに留意する必要がある。

254 久留米大学病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 433 | 139 | (4-6) | 98.8 | 67.7 | 63.0 | 71.9 | 68.8 |
| I期 | 304 | 48 | (4-6) | 98.4 | 84.0 | 79.4 | 87.7 | 68.1 |
| II期 | 27 | 11 | 0 | | | | | 73.5 |
| III期 | 32 | 21 | 0 | 100.0 | 34.4 | 18.8 | 50.6 | 67.5 |
| IV期 | 59 | 53 | 0 | 100.0 | 10.2 | 4.1 | 19.4 | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 318 | 115 | | | | | |
| % | 73.4 | 26.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 59 | 126 | 152 | 73 | | |
| % | 5.3 | 13.6 | 29.1 | 35.1 | 16.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 304 | 27 | 32 | 59 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 70.2 | 6.2 | 7.4 | 13.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 387 | 358 | 28 | (1-3) | | |
| % | 10.6 | 89.4 | 82.7 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 54 | 29 | 153 | 197 | | | |
| % | 12.5 | 6.7 | 35.3 | 45.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 299 | 91 | 0 | 100.0 | 69.6 | 64.0 | 74.4 | 66.6 |
| I期 | 107 | 14 | 0 | 100.0 | 86.9 | 78.9 | 92.0 | 66.6 |
| II期 | 62 | 16 | 0 | 100.0 | 74.2 | 61.4 | 83.3 | 71.7 |
| III期 | 62 | 15 | 0 | 100.0 | 75.8 | 63.1 | 84.6 | 63.6 |
| IV期 | 54 | 39 | 0 | 100.0 | 27.8 | 16.7 | 40.0 | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 172 | 127 | | | | | |
| % | 57.5 | 42.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 52 | 89 | 86 | 46 | | |
| % | 8.7 | 17.4 | 29.8 | 28.8 | 15.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 107 | 62 | 62 | 54 | 10 | (4-6) | |
| % | 35.8 | 20.7 | 20.7 | 18.1 | 3.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 256 | 227 | 22 | (7-9) | | |
| % | 14.4 | 85.6 | 75.9 | 7.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 40 | (4-6) | 95 | 158 | | | |
| % | 13.4 | | 31.8 | 52.8 | | | |

254 久留米大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 313 | 152 | (1-3) | 99.7 | 51.3 | 45.6 | 56.7 | 68.4 |
| I期 | 138 | 48 | 0 | 100.0 | 65.2 | 56.6 | 72.5 | 68.9 |
| II期 | 119 | 55 | (1-3) | 99.2 | 53.4 | 44.0 | 61.9 | 69.8 |
| III期 | 35 | 30 | 0 | 100.0 | 14.3 | 5.2 | 27.7 | 66.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 209 | 104 | | | | | |
| % | 66.8 | 33.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 46 | 95 | 135 | 29 | | |
| % | | 14.7 | 30.4 | 43.1 | 9.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 138 | 119 | 35 | (7-9) | (7-9) | (1-3) |
| | % | 44.1 | 38.0 | 11.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 69 | 147 | 58 | 38 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 22.0 | 47.0 | 18.5 | 12.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 179 | 134 | 134 | 0 | 0 | | |
| % | 57.2 | 42.8 | 42.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 254 | 52 | | | |
| % | | | 81.2 | 16.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 346 | 227 | 0 | 100.0 | 34.4 | 29.4 | 39.4 | 68.9 |
| I期 | 115 | 36 | 0 | 100.0 | 68.7 | 59.4 | 76.3 | 69.3 |
| II期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 64.0 |
| III期 | 107 | 91 | 0 | 100.0 | 15.0 | 9.0 | 22.4 | 70.8 |
| IV期 | 96 | 85 | 0 | 100.0 | 11.5 | 6.1 | 18.7 | 67.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 235 | 111 | 対象数 | | 37 | 309 |
| % | 67.9 | 32.1 | % | | 10.7 | 89.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 13 | 40 | 108 | 143 | 42 | |
| % | 3.8 | 11.6 | 31.2 | 41.3 | 12.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 115 | 14 | 107 | 96 | 13 | (1-3) |
| % | 33.2 | 4.0 | 30.9 | 27.7 | 3.8 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 212 | 134 | 132 | (1-3) | 0 | |
| % | 61.3 | 38.7 | 38.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 30 | 31 | 157 | 128 | | |
| % | 8.7 | 9.0 | 45.4 | 37.0 | | |

254 久留米大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 29 | 0 | 100.0 | 77.9 | 69.7 | 84.1 | 61.1 |
| I期 | 60 | (7-9) | 0 | 100.0 | 85.0 | 73.2 | 91.9 | 60.6 |
| II期 | 37 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 |
| III期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 63.5 |
| IV期 | 17 | 13 | 0 | | | | | 60.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 131 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 31 | 35 | 22 | 14 | | |
| % | 22.1 | 23.7 | 26.7 | 16.8 | 10.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 60 | 37 | 13 | 17 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 45.8 | 28.2 | 9.9 | 13.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 85 | 81 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 35.1 | 64.9 | 61.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 21 | (4-6) | 30 | 76 | | | |
| % | 16.0 | | 22.9 | 58.0 | | | |

255 公立八女総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

255 公立八女総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 147 | 71 | (1-3) | 99.3 | 51.4 | 43.0 | 59.2 | 72.5 |
| I期 | 85 | 27 | (1-3) | 98.8 | 67.9 | 56.8 | 76.7 | 72.7 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 62.0 |
| III期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | 29 | 26 | 0 | | | | | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 96 | 51 | | | | | |
| % | 65.3 | 34.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 23 | 57 | 44 | | |
| % | | 9.5 | 15.6 | 38.8 | 29.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 85 | 11 | 18 | 29 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 57.8 | 7.5 | 12.2 | 19.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 104 | 99 | (4-6) | 0 | | |
| % | 29.3 | 70.7 | 67.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 32 | 102 | | | |
| % | | | 21.8 | 69.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 164 | 71 | (1-3) | 99.4 | 56.6 | 48.7 | 63.8 | 74.6 |
| I期 | 35 | (7-9) | 0 | 100.0 | 77.1 | 59.5 | 87.9 | 75.3 |
| II期 | 46 | 12 | 0 | 100.0 | 73.9 | 58.7 | 84.3 | 75.6 |
| III期 | 42 | 12 | (1-3) | 97.6 | 71.3 | 55.0 | 82.6 | 76.6 |
| IV期 | 38 | 36 | 0 | 100.0 | 5.3 | 1.0 | 15.5 | 74.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 87 | 77 | | | | | |
| % | 53.0 | 47.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 33 | 55 | 59 | | |
| % | | 7.9 | 20.1 | 33.5 | 36.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 35 | 46 | 42 | 38 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 21.3 | 28.0 | 25.6 | 23.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 131 | 115 | 15 | (1-3) | | |
| % | 20.1 | 79.9 | 70.1 | 9.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 36 | 121 | | | |
| % | | | 22.0 | 73.8 | | | |

255 公立八女総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 94 | 60 | 0 | 100.0 | 36.2 | 26.6 | 45.8 | 73.1 |
| I期 | 32 | 14 | 0 | 100.0 | 56.3 | 37.6 | 71.3 | 76.1 |
| II期 | 31 | 17 | 0 | 100.0 | 45.2 | 27.4 | 61.4 | 72.4 |
| III期 | 26 | 24 | 0 | | | | | 72.9 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 83.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 60 | 34 | | | | | |
| % | 63.8 | 36.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 22 | 43 | 24 | | |
| % | | | 23.4 | 45.7 | 25.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 32 | 31 | 26 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 34.0 | 33.0 | 27.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 19 | 31 | 23 | 20 | (1-3) | 0 |
| | % | 20.2 | 33.0 | 24.5 | 21.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 16 | 16 | 0 | 0 | | |
| % | 83.0 | 17.0 | 17.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 58 | 36 | | | |
| % | | | 61.7 | 38.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 150 | 115 | (1-3) | 99.3 | 22.9 | 16.6 | 30.0 | 75.1 |
| I期 | 47 | 22 | (1-3) | 97.9 | 52.3 | 37.1 | 65.5 | 76.7 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 69.7 |
| III期 | 51 | 47 | 0 | 100.0 | 7.8 | 2.5 | 17.2 | 74.9 |
| IV期 | 39 | 37 | 0 | 100.0 | 5.1 | 0.9 | 15.2 | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 122 | 28 | 対象数 | 20 | 130 | | |
| % | 81.3 | 18.7 | % | 13.3 | 86.7 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 31 | 62 | 51 | | |
| % | | | 20.7 | 41.3 | 34.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 47 | 13 | 51 | 39 | 0 | 0 | |
| % | 31.3 | 8.7 | 34.0 | 26.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 97 | 53 | 47 | (4-6) | 0 | | |
| % | 64.7 | 35.3 | 31.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 52 | 91 | | | |
| % | | | 34.7 | 60.7 | | | |

255 公立八女総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 39 | 10 | 0 | 100.0 | 74.4 | 57.6 | 85.3 | 64.6 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |
| II期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | 64.4 |
| III期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 72.9 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 55.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 39 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | (7-9) | (4-6) | (7-9) | | |
| % | | 28.2 | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 12 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | | 35.9 | 30.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治療切除 | 非治療切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 29 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 82.1 | 74.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (1-3) | 29 | | | |
| % | | | | 74.4 | | | |

256 地方独立行政法人大牟田市立病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

256 地方独立行政法人大牟田市立病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 64 | (4-6) | 96.6 | 55.3 | 46.8 | 63.0 | 71.2 |
| I期 | 89 | 19 | (1-3) | 96.6 | 78.2 | 67.9 | 85.5 | 71.6 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 78.4 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 71.8 |
| IV期 | 32 | 31 | 0 | 100.0 | 3.1 | 0.2 | 13.7 | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 106 | 40 | | | | | |
| % | 72.6 | 27.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 37 | 60 | 30 | | |
| % | | 9.6 | 25.3 | 41.1 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 89 | (7-9) | (7-9) | 32 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 61.0 | | | 21.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 110 | 96 | 12 | (1-3) | | |
| % | 24.7 | 75.3 | 65.8 | 8.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 73 | 65 | | | |
| % | | | 50.0 | 44.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 158 | 69 | (4-6) | 96.2 | 55.6 | 47.4 | 63.0 | 72.9 |
| I期 | 36 | (4-6) | (1-3) | 97.2 | 85.8 | 69.2 | 93.8 | 73.4 |
| II期 | 49 | 18 | (4-6) | 91.8 | 61.8 | 46.3 | 74.0 | 74.5 |
| III期 | 36 | 13 | (1-3) | 97.2 | 63.3 | 45.3 | 76.8 | 72.3 |
| IV期 | 29 | 26 | 0 | | | | | 73.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 88 | 70 | | | | | |
| % | 55.7 | 44.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 31 | 58 | 49 | | |
| % | | 10.8 | 19.6 | 36.7 | 31.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 49 | 36 | 29 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 22.8 | 31.0 | 22.8 | 18.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 130 | 112 | 15 | (1-3) | | |
| % | 17.7 | 82.3 | 70.9 | 9.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 76 | 68 | | | |
| % | | 6.3 | 48.1 | 43.0 | | | |

256 地方独立行政法人大牟田市立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 128 | 86 | (4-6) | 96.9 | 31.5 | 23.6 | 39.8 | 71.3 |
| I期 | 38 | 21 | 0 | 100.0 | 44.7 | 28.7 | 59.6 | 72.6 |
| II期 | 55 | 36 | (4-6) | 92.7 | 31.3 | 19.3 | 44.2 | 71.1 |
| III期 | 24 | 19 | 0 | | | | | 73.6 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 75 | 53 | | | | | |
| % | 58.6 | 41.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | 12 | 41 | 50 | 25 | | |
| % | | 9.4 | 32.0 | 39.1 | 19.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 38 | 55 | 24 | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | 29.7 | 43.0 | 18.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 70 | 0 | 38 | 15 | (4-6) | 0 |
| | % | 54.7 | | 29.7 | 11.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 103 | 25 | 20 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 80.5 | 19.5 | 15.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 115 | 12 | | | |
| % | | | 89.8 | 9.4 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 26 | 22 | 0 | | | | | 72.7 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.0 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.0 |
| IV期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 19 | (7-9) | 対象数 | 0 | 26 | | |
| % | 73.1 | | % | | 100.0 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (7-9) | (4-6) | 10 | | |
| % | | | | | 38.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | 0 | (1-3) | 15 | (1-3) | 0 | |
| % | | | | 57.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | 92.3 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 15 | 10 | | | |
| % | | | 57.7 | 38.5 | | | |

256 地方独立行政法人大牟田市立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 68 | 11 | (1-3) | 97.1 | 83.5 | 72.2 | 90.5 | 67.2 |
| I期 | 27 | (1-3) | 0 | | | | | 62.7 |
| II期 | 29 | (1-3) | (1-3) | | | | | 62.8 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.6 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 68 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 10 | 22 | 16 | 13 | | |
| % | | 14.7 | 32.4 | 23.5 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 27 | 29 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 39.7 | 42.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 57 | 47 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 16.2 | 83.8 | 69.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (1-3) | 42 | 13 | | | |
| % | 16.2 | | 61.8 | 19.1 | | | |

257 社会保険田川病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

257 社会保険田川病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 178 | 92 | 0 | 100.0 | 48.3 | 40.8 | 55.4 | 72.7 |
| I期 | 100 | 32 | 0 | 100.0 | 68.0 | 57.9 | 76.2 | 73.4 |
| II期 | 21 | 14 | 0 | | | | | 74.6 |
| III期 | 17 | 10 | 0 | | | | | 78.9 |
| IV期 | 37 | 34 | 0 | 100.0 | 8.1 | 2.1 | 19.6 | 63.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 125 | 53 | | | | | |
| % | 70.2 | 29.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 34 | 70 | 53 | | |
| % | | 9.6 | 19.1 | 39.3 | 29.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 100 | 21 | 17 | 37 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.2 | 11.8 | 9.6 | 20.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 141 | 126 | 12 | (1-3) | | |
| % | 20.8 | 79.2 | 70.8 | 6.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 10 | 92 | 63 | | | |
| % | 7.3 | 5.6 | 51.7 | 35.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 196 | 85 | 0 | 100.0 | 56.6 | 49.4 | 63.2 | 71.6 |
| I期 | 47 | 14 | 0 | 100.0 | 70.2 | 55.0 | 81.2 | 74.4 |
| II期 | 69 | 25 | 0 | 100.0 | 63.8 | 51.3 | 73.9 | 71.9 |
| III期 | 48 | 20 | 0 | 100.0 | 58.3 | 43.2 | 70.8 | 75.6 |
| IV期 | 27 | 24 | 0 | | | | | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 112 | 84 | | | | | |
| % | 57.1 | 42.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 43 | 59 | 60 | | |
| % | | 13.8 | 21.9 | 30.1 | 30.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 47 | 69 | 48 | 27 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 24.0 | 35.2 | 24.5 | 13.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 182 | 159 | 22 | (1-3) | | |
| % | 7.1 | 92.9 | 81.1 | 11.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | (7-9) | 93 | 82 | | | |
| % | 6.6 | | 47.4 | 41.8 | | | |

257 社会保険田川病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 43 | 34 | 0 | 100.0 | 20.9 | 10.4 | 34.0 | 72.1 |
| I期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 72.6 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | 15 | 14 | 0 | | | | | 74.0 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 37 | (4-6) | | | | | | |
| % | 86.0 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 11 | 17 | 11 | | | |
| % | | | 25.6 | 39.5 | 25.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 10 | 10 | 15 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| | % | 23.3 | 23.3 | 34.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 10 | (7-9) | 18 | (1-3) | 0 | |
| | % | | 23.3 | | 41.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| % | 100.0 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 39 | (4-6) | | | | |
| % | | | 90.7 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 101 | 88 | 0 | 100.0 | 12.9 | 7.2 | 20.2 | 74.6 |
| I期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 79.2 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 76.8 |
| III期 | 14 | 12 | 0 | | | | | 75.9 |
| IV期 | 62 | 61 | 0 | 100.0 | 1.6 | 0.1 | 7.6 | 70.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 63 | 38 | 対象数 | | 16 | 85 |
| % | 62.4 | 37.6 | % | | 15.8 | 84.2 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 23 | 41 | 31 | |
| % | | | 22.8 | 40.6 | 30.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 12 | (4-6) | 14 | 62 | (7-9) | 0 |
| % | 11.9 | | 13.9 | 61.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 90 | 11 | (7-9) | 0 | (1-3) | |
| % | 89.1 | 10.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 78 | 20 | | |
| % | | | 77.2 | 19.8 | | |

257 社会保険田川病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 77 | 17 | 0 | 100.0 | 77.9 | 66.9 | 85.7 | 67.8 |
| I期 | 26 | (4-6) | 0 | | | | | 70.3 |
| II期 | 35 | (4-6) | 0 | 100.0 | 85.7 | 69.0 | 93.8 | 68.3 |
| III期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 61.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 77 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 19 | 19 | 16 | | |
| % | | 23.4 | 24.7 | 24.7 | 20.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 35 | 11 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 33.8 | 45.5 | 14.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 70 | 67 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 90.9 | 87.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 16 | (1-3) | 14 | 44 | | | |
| % | 20.8 | | 18.2 | 57.1 | | | |

258

飯塚病院

2010－2011年2力年

コメント:

生存率を比較すると、全てのがん腫で施設毎に大きな差が見られる。施設毎の治療対象が異なる場合、5年生存率に差が出るのは当然であり、今回のデータは病院の実力を示すものではない。今後、生存率に影響を与えるような背景因子の蓄積を経ての生存率公表が必要である。

258 飯塚病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 424 | 190 | (4-6) | 99.1 | 55.1 | 50.2 | 59.7 | 71.8 |
| I期 | 245 | 65 | (1-3) | 98.8 | 73.3 | 67.3 | 78.4 | 72.2 |
| II期 | 44 | 27 | (1-3) | 97.7 | 37.9 | 23.8 | 52.0 | 70.8 |
| III期 | 28 | 20 | 0 | | | | | 70.4 |
| IV期 | 72 | 68 | 0 | 100.0 | 5.6 | 1.8 | 12.5 | 70.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 282 | 142 | | | | | |
| % | 66.5 | 33.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 47 | 115 | 138 | 113 | | |
| % | 2.6 | 11.1 | 27.1 | 32.5 | 26.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 245 | 44 | 28 | 72 | (7-9) | 28 | |
| % | 57.8 | 10.4 | 6.6 | 17.0 | | 6.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 108 | 316 | 287 | 14 | 15 | | |
| % | 25.5 | 74.5 | 67.7 | 3.3 | 3.5 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 33 | 177 | 194 | | | |
| % | 4.7 | 7.8 | 41.7 | 45.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 342 | 166 | (4-6) | 98.8 | 51.2 | 45.8 | 56.4 | 71.2 |
| I期 | 71 | 20 | 0 | 100.0 | 71.8 | 59.8 | 80.8 | 69.9 |
| II期 | 103 | 39 | (1-3) | 99.0 | 62.1 | 52.0 | 70.7 | 71.3 |
| III期 | 73 | 34 | 0 | 100.0 | 53.4 | 41.4 | 64.1 | 70.1 |
| IV期 | 64 | 53 | (1-3) | 98.4 | 16.0 | 8.3 | 26.1 | 69.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|--|
| 対象数 | 192 | 150 | | | | | |
| % | 56.1 | 43.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 34 | 95 | 119 | 83 | | |
| % | 3.2 | 9.9 | 27.8 | 34.8 | 24.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 71 | 103 | 73 | 64 | 20 | 11 | |
| % | 20.8 | 30.1 | 21.3 | 18.7 | 5.8 | 3.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 75 | 267 | 235 | (4-6) | 28 | | |
| % | 21.9 | 78.1 | 68.7 | | 8.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 20 | 108 | 204 | | | |
| % | 2.9 | 5.8 | 31.6 | 59.6 | | | |

258 飯塚病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 272 | 162 | (1-3) | 99.3 | 40.2 | 34.3 | 46.0 | 70.3 |
| I期 | 113 | 52 | (1-3) | 99.1 | 53.9 | 44.3 | 62.6 | 70.4 |
| II期 | 85 | 41 | 0 | 100.0 | 51.8 | 40.7 | 61.8 | 70.8 |
| III期 | 43 | 38 | (1-3) | 97.7 | 9.6 | 3.1 | 20.7 | 73.1 |
| IV期 | 13 | 13 | 0 | | | | | 66.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|---|
| 対象数 | 188 | 84 | | | | | |
| % | 69.1 | 30.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 34 | 76 | 113 | 44 | | |
| % | | 12.5 | 27.9 | 41.5 | 16.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 113 | 85 | 43 | 13 | 18 | 0 |
| | % | 41.5 | 31.3 | 15.8 | 4.8 | 6.6 | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 45 | 107 | 72 | 28 | 16 | 0 |
| | % | 16.5 | 39.3 | 26.5 | 10.3 | 5.9 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 169 | 103 | 96 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 62.1 | 37.9 | 35.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 131 | 133 | | | |
| % | | | 48.2 | 48.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 478 | 328 | (1-3) | 99.6 | 31.2 | 27.1 | 35.4 | 71.4 |
| I期 | 182 | 77 | 0 | 100.0 | 57.7 | 50.2 | 64.5 | 72.0 |
| II期 | 35 | 24 | 0 | 100.0 | 31.4 | 17.1 | 46.8 | 71.6 |
| III期 | 108 | 83 | (1-3) | 98.1 | 22.4 | 15.1 | 30.7 | 70.9 |
| IV期 | 136 | 127 | 0 | 100.0 | 6.6 | 3.3 | 11.6 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 323 | 155 | 対象数 | | 51 | 427 |
| % | 67.6 | 32.4 | % | | 10.7 | 89.3 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 10 | 44 | 144 | 169 | 111 | |
| % | 2.1 | 9.2 | 30.1 | 35.4 | 23.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 182 | 35 | 108 | 136 | 17 | 0 |
| % | 38.1 | 7.3 | 22.6 | 28.5 | 3.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 268 | 210 | 198 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 56.1 | 43.9 | 41.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 14 | 41 | 172 | 251 | | |
| % | 2.9 | 8.6 | 36.0 | 52.5 | | |

258 飯塚病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 164 | 26 | (1-3) | 99.4 | 84.1 | 77.5 | 88.9 | 64.6 |
| I期 | 82 | (4-6) | 0 | 100.0 | 92.7 | 84.4 | 96.6 | 64.7 |
| II期 | 51 | 10 | 0 | 100.0 | 80.4 | 66.6 | 88.9 | 66.3 |
| III期 | 18 | (1-3) | 0 | | | | | 63.8 |
| IV期 | 12 | (7-9) | (1-3) | | | | | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 164 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 41 | 50 | 29 | 27 | | |
| % | 10.4 | 25.0 | 30.5 | 17.7 | 16.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 51 | 18 | 12 | 0 | (1-3) | |
| % | 50.0 | 31.1 | 11.0 | 7.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 149 | 128 | 11 | 10 | | |
| % | 9.1 | 90.9 | 78.0 | 6.7 | 6.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | 15 | 26 | 90 | | | |
| % | 20.1 | 9.1 | 15.9 | 54.9 | | | |

259 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
2011年のみ

コメント:

当院では各科でエビデンスに基づいた癌治療を行っており、症例数は年々増加しています。
5年生存率の数値は他病死の患者さんが多く含まれているため必ずしも癌死の患者さんの実数を反映するものではありません。
年齢や併存症などの背景因子が異なることから生存率の単純な比較には注意を要します。

259 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 63 | 26 | (1-3) | 98.4 | 58.1 | 44.8 | 69.2 | 71.7 |
| I期 | 43 | 11 | 0 | 100.0 | 74.4 | 58.6 | 84.9 | 72.0 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 72.8 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 73.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 68.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 47 | 16 | | | | | |
| % | 74.6 | 25.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 15 | 22 | 18 | | |
| % | | | 23.8 | 34.9 | 28.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 43 | (4-6) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 68.3 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 56 | 51 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 88.9 | 81.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 25 | 30 | | | |
| % | | | 39.7 | 47.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 48 | 25 | (1-3) | 97.9 | 47.6 | 33.0 | 60.9 | 72.7 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |
| II期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 76.7 |
| III期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 69.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 31 | 17 | | | | | |
| % | 64.6 | 35.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | 19 | 13 | | |
| % | | | 22.9 | 39.6 | 27.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 14 | 11 | (1-3) | 0 | |
| % | | 31.3 | 29.2 | 22.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 41 | 40 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 85.4 | 83.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 15 | 29 | | | |
| % | | | 31.3 | 60.4 | | | |

259 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 32 | 20 | (1-3) | 96.9 | 35.5 | 19.5 | 52.0 | 73.4 |
| I期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 74.2 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.6 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 78.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 21 | 11 | | | | | |
| % | 65.6 | 34.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 10 | 11 | | |
| % | | | | 31.3 | 34.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 13 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 40.6 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 12 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | | 37.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 11 | 10 | (1-3) | 0 | | |
| % | 65.6 | 34.4 | 31.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 19 | 12 | | | |
| % | | | 59.4 | 37.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 163 | 100 | 0 | 100.0 | 38.7 | 31.2 | 46.0 | 70.6 |
| I期 | 63 | 18 | 0 | 100.0 | 71.4 | 58.6 | 80.9 | 70.3 |
| II期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 70.5 |
| III期 | 35 | 27 | 0 | 100.0 | 22.9 | 10.8 | 37.6 | 67.8 |
| IV期 | 51 | 49 | 0 | 100.0 | 3.9 | 0.7 | 11.9 | 72.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 110 | 53 | 対象数 | | 20 | 143 |
| % | 67.5 | 32.5 | % | | 12.3 | 87.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 51 | 58 | 34 | |
| % | | 9.8 | 31.3 | 35.6 | 20.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 63 | 11 | 35 | 51 | (1-3) | 0 |
| % | 38.7 | 6.7 | 21.5 | 31.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 90 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
| % | 55.2 | 44.8 | 44.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 50 | 87 | | |
| % | | 13.5 | 30.7 | 53.4 | | |

259 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 29 | (4-6) | 0 | | | | | 66.3 |
| I期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 68.6 |
| II期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 59.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 58.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 29 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (7-9) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 19 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 65.5 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 26 | 26 | 0 | 0 | | |
| % | | 89.7 | 89.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 0 | (4-6) | 19 | | | |
| % | | | | 65.5 | | | |

260 北九州市立医療センター
2010－2011年2カ年

コメント:

施設別生存率の差は治療した対象者の進行度や年齢、併存症の有無及び重症度等の背景因子が異なることも影響していると考えられる。
したがって、生存率の数値のみで施設ごとの治療成績を比較することには注意を要する。

260 北九州市立医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 530 | 173 | (1-3) | 99.6 | 67.3 | 63.1 | 71.1 | 68.1 |
| I期 | 347 | 50 | 0 | 100.0 | 85.6 | 81.4 | 88.9 | 66.9 |
| II期 | 45 | 19 | (1-3) | 97.8 | 56.9 | 41.1 | 70.0 | 67.0 |
| III期 | 27 | 18 | 0 | | | | | 70.2 |
| IV期 | 85 | 79 | (1-3) | 98.8 | 6.0 | 2.2 | 12.5 | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 355 | 175 | | | | | |
| % | 67.0 | 33.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 26 | 74 | 177 | 181 | 72 | | |
| % | 4.9 | 14.0 | 33.4 | 34.2 | 13.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 347 | 45 | 27 | 85 | (7-9) | 19 | |
| % | 65.5 | 8.5 | 5.1 | 16.0 | | 3.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 78 | 452 | 427 | 22 | (1-3) | | |
| % | 14.7 | 85.3 | 80.6 | 4.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 33 | 66 | 138 | 293 | | | |
| % | 6.2 | 12.5 | 26.0 | 55.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 370 | 108 | (1-3) | 99.7 | 70.8 | 65.8 | 75.1 | 67.6 |
| I期 | 97 | 11 | 0 | 100.0 | 88.7 | 80.5 | 93.6 | 70.3 |
| II期 | 89 | 14 | 0 | 100.0 | 84.3 | 74.9 | 90.4 | 71.4 |
| III期 | 106 | 27 | 0 | 100.0 | 74.5 | 65.1 | 81.8 | 67.9 |
| IV期 | 68 | 54 | (1-3) | 98.5 | 19.5 | 11.1 | 29.7 | 61.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 197 | 173 | | | | | |
| % | 53.2 | 46.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 51 | 117 | 129 | 50 | | |
| % | 6.2 | 13.8 | 31.6 | 34.9 | 13.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 97 | 89 | 106 | 68 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 26.2 | 24.1 | 28.6 | 18.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 339 | 315 | 23 | (1-3) | | |
| % | 8.4 | 91.6 | 85.1 | 6.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 40 | 90 | 220 | | | |
| % | 5.4 | 10.8 | 24.3 | 59.5 | | | |

260 北九州市立医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 148 | 92 | (1-3) | 99.3 | 37.8 | 30.0 | 45.5 | 68.6 |
| I期 | 54 | 17 | 0 | 100.0 | 68.5 | 54.3 | 79.1 | 70.5 |
| II期 | 39 | 23 | 0 | 100.0 | 41.0 | 25.7 | 55.8 | 71.5 |
| III期 | 35 | 33 | (1-3) | 97.1 | 5.7 | 1.0 | 16.7 | 66.7 |
| IV期 | 19 | 19 | 0 | | | | | 64.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 101 | 47 | | | | | |
| % | 68.2 | 31.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 53 | 58 | 16 | | |
| % | | 9.5 | 35.8 | 39.2 | 10.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 54 | 39 | 35 | 19 | (1-3) | 0 |
| | % | 36.5 | 26.4 | 23.6 | 12.8 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 20 | 53 | 32 | 40 | (1-3) | 0 |
| | % | 13.5 | 35.8 | 21.6 | 27.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 100 | 48 | 42 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 67.6 | 32.4 | 28.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 101 | 41 | | | |
| % | | | 68.2 | 27.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 471 | 273 | 0 | 100.0 | 42.0 | 37.6 | 46.5 | 69.5 |
| I期 | 224 | 55 | 0 | 100.0 | 75.5 | 69.3 | 80.6 | 71.2 |
| II期 | 26 | 15 | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 89 | 74 | 0 | 100.0 | 16.9 | 10.0 | 25.3 | 67.8 |
| IV期 | 125 | 123 | 0 | 100.0 | 1.6 | 0.3 | 5.2 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 288 | 183 | 対象数 | | 35 | 436 |
| % | 61.1 | 38.9 | % | | 7.4 | 92.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 17 | 52 | 146 | 189 | 67 | |
| % | 3.6 | 11.0 | 31.0 | 40.1 | 14.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 224 | 26 | 89 | 125 | (4-6) | (1-3) |
| % | 47.6 | 5.5 | 18.9 | 26.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 218 | 253 | 240 | 10 | (1-3) | |
| % | 46.3 | 53.7 | 51.0 | 2.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 49 | 230 | 187 | | |
| % | | 10.4 | 48.8 | 39.7 | | |

260 北九州市立医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 610 | 55 | 0 | 100.0 | 91.0 | 88.4 | 93.0 | 58.3 |
| I期 | 313 | (4-6) | 0 | 100.0 | 98.7 | 96.6 | 99.5 | 58.8 |
| II期 | 194 | 16 | 0 | 100.0 | 91.8 | 86.9 | 94.9 | 57.9 |
| III期 | 65 | 12 | 0 | 100.0 | 81.5 | 69.8 | 89.1 | 56.1 |
| IV期 | 30 | 17 | 0 | 100.0 | 43.3 | 25.6 | 59.9 | 60.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 610 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 171 | 137 | 173 | 96 | 33 | | |
| % | 28.0 | 22.5 | 28.4 | 15.7 | 5.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 313 | 194 | 65 | 30 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 51.3 | 31.8 | 10.7 | 4.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 43 | 567 | 560 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 7.0 | 93.0 | 91.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 162 | 24 | 75 | 349 | | | |
| % | 26.6 | 3.9 | 12.3 | 57.2 | | | |

261 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

261 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 317 | 126 | (7-9) | 97.5 | 59.8 | 54.1 | 65.0 | 65.8 |
| I期 | 180 | 22 | (4-6) | 97.8 | 87.7 | 81.9 | 91.7 | 68.5 |
| II期 | 26 | 10 | (1-3) | | | | | 62.5 |
| III期 | 18 | 11 | (1-3) | | | | | 69.2 |
| IV期 | 92 | 83 | (1-3) | 97.8 | 7.8 | 3.4 | 14.5 | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 206 | 111 | | | | | |
| % | 65.0 | 35.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 49 | 115 | 91 | 33 | | |
| % | 9.1 | 15.5 | 36.3 | 28.7 | 10.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 180 | 26 | 18 | 92 | 0 | (1-3) | |
| % | 56.8 | 8.2 | 5.7 | 29.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 105 | 212 | 210 | (1-3) | 0 | | |
| % | 33.1 | 66.9 | 66.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 53 | 24 | 69 | 171 | | | |
| % | 16.7 | 7.6 | 21.8 | 53.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 271 | 86 | (1-3) | 98.9 | 68.0 | 62.1 | 73.2 | 65.1 |
| I期 | 76 | 13 | 0 | 100.0 | 82.9 | 72.4 | 89.7 | 64.8 |
| II期 | 56 | (1-3) | 0 | 100.0 | 94.6 | 84.3 | 98.2 | 66.8 |
| III期 | 60 | 11 | 0 | 100.0 | 81.7 | 69.4 | 89.4 | 60.8 |
| IV期 | 75 | 59 | (1-3) | 96.0 | 18.5 | 10.5 | 28.2 | 63.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 139 | 132 | | | | | |
| % | 51.3 | 48.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 54 | 102 | 68 | 26 | | |
| % | 7.7 | 19.9 | 37.6 | 25.1 | 9.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 76 | 56 | 60 | 75 | 0 | (4-6) | |
| % | 28.0 | 20.7 | 22.1 | 27.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 75 | 196 | 194 | (1-3) | 0 | | |
| % | 27.7 | 72.3 | 71.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 35 | 14 | 52 | 170 | | | |
| % | 12.9 | 5.2 | 19.2 | 62.7 | | | |

261 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 74 | 47 | (1-3) | 97.3 | 35.6 | 24.8 | 46.5 | 69.7 |
| I期 | 38 | 20 | (1-3) | 97.4 | 46.0 | 29.6 | 60.9 | 73.8 |
| II期 | 23 | 14 | (1-3) | | | | | 65.4 |
| III期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 68.8 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 55.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 48 | 26 | | | | | |
| % | 64.9 | 35.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 16 | 34 | 12 | | |
| % | | | 21.6 | 45.9 | 16.2 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 38 | 23 | 11 | (1-3) | 0 | 0 |
| | % | 51.4 | 31.1 | 14.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 23 | 27 | 14 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 31.1 | 36.5 | 18.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 48 | 26 | 26 | 0 | 0 | | |
| % | 64.9 | 35.1 | 35.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 51 | 17 | | | |
| % | | | 68.9 | 23.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 627 | 353 | (4-6) | 99.4 | 43.5 | 39.6 | 47.4 | 66.4 |
| I期 | 244 | 39 | (4-6) | 98.4 | 83.9 | 78.6 | 88.0 | 67.2 |
| II期 | 36 | 19 | 0 | 100.0 | 47.2 | 30.5 | 62.3 | 66.5 |
| III期 | 140 | 104 | 0 | 100.0 | 25.7 | 18.8 | 33.2 | 65.6 |
| IV期 | 203 | 190 | 0 | 100.0 | 6.4 | 3.6 | 10.3 | 64.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 395 | 232 | 対象数 | 59 | 568 | | |
| % | 63.0 | 37.0 | % | 9.4 | 90.6 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 44 | 105 | 220 | 196 | 62 | | |
| % | 7.0 | 16.7 | 35.1 | 31.3 | 9.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 244 | 36 | 140 | 203 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 38.9 | 5.7 | 22.3 | 32.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 361 | 266 | 265 | (1-3) | 0 | | |
| % | 57.6 | 42.4 | 42.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 76 | 52 | 200 | 299 | | | |
| % | 12.1 | 8.3 | 31.9 | 47.7 | | | |

261 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 541 | 40 | (7-9) | 98.5 | 92.6 | 90.0 | 94.5 | 56.8 |
| I期 | 243 | (4-6) | (1-3) | 99.2 | 97.5 | 94.6 | 98.9 | 58.1 |
| II期 | 218 | 14 | (4-6) | 97.2 | 93.5 | 89.3 | 96.1 | 55.3 |
| III期 | 54 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.9 | 76.9 | 94.9 | 59.0 |
| IV期 | 25 | 14 | 0 | | | | | 52.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 541 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 173 | 130 | 148 | 71 | 19 | | |
| % | 32.0 | 24.0 | 27.4 | 13.1 | 3.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 243 | 218 | 54 | 25 | (1-3) | 0 | |
| % | 44.9 | 40.3 | 10.0 | 4.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 123 | 418 | 418 | 0 | 0 | | |
| % | 22.7 | 77.3 | 77.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 126 | 16 | 57 | 342 | | | |
| % | 23.3 | 3.0 | 10.5 | 63.2 | | | |

262 九州大学病院
2010-2011年2カ年

コメント:

当院の5年生存率集計では、ほとんどのステージ別生存率が全国平均と同等であり、がん診療の実態がより正確に反映されていると思われる。

262 九州大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 498 | 151 | 15 | 97.0 | 69.6 | 65.3 | 73.4 | 68.0 |
| I期 | 365 | 63 | 13 | 96.4 | 82.7 | 78.4 | 86.2 | 67.8 |
| II期 | 37 | 13 | (1-3) | 97.3 | 64.8 | 47.1 | 77.8 | 68.6 |
| III期 | 16 | 11 | 0 | | | | | 68.9 |
| IV期 | 70 | 59 | (1-3) | 98.6 | 15.5 | 8.1 | 25.0 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 356 | 142 | | | | | |
| % | 71.5 | 28.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 29 | 60 | 171 | 163 | 75 | | |
| % | 5.8 | 12.0 | 34.3 | 32.7 | 15.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 365 | 37 | 16 | 70 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 73.3 | 7.4 | 3.2 | 14.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | 428 | 407 | 20 | (1-3) | | |
| % | 14.1 | 85.9 | 81.7 | 4.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 48 | 79 | 171 | 200 | | | |
| % | 9.6 | 15.9 | 34.3 | 40.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 388 | 111 | (7-9) | 97.7 | 71.3 | 66.5 | 75.5 | 65.4 |
| I期 | 93 | 11 | (1-3) | 97.8 | 88.2 | 79.7 | 93.3 | 68.0 |
| II期 | 93 | 10 | (1-3) | 96.8 | 89.2 | 80.8 | 94.0 | 66.6 |
| III期 | 118 | 31 | (1-3) | 97.5 | 73.4 | 64.4 | 80.5 | 65.1 |
| IV期 | 71 | 55 | (1-3) | 98.6 | 22.2 | 13.4 | 32.5 | 62.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 224 | 164 | | | | | |
| % | 57.7 | 42.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 41 | 65 | 133 | 109 | 40 | | |
| % | 10.6 | 16.8 | 34.3 | 28.1 | 10.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 93 | 93 | 118 | 71 | (1-3) | 10 | |
| % | 24.0 | 24.0 | 30.4 | 18.3 | | 2.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 342 | 316 | 25 | (1-3) | | |
| % | 11.9 | 88.1 | 81.4 | 6.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | 39 | 92 | 244 | | | |
| % | 3.4 | 10.1 | 23.7 | 62.9 | | | |

262 九州大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 178 | 93 | (4-6) | 97.2 | 47.2 | 39.7 | 54.4 | 67.8 |
| I期 | 80 | 26 | (1-3) | 97.5 | 67.1 | 55.6 | 76.3 | 68.2 |
| II期 | 56 | 31 | (1-3) | 96.4 | 44.1 | 30.8 | 56.6 | 67.6 |
| III期 | 27 | 22 | (1-3) | | | | | 69.8 |
| IV期 | 14 | 13 | 0 | | | | | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 109 | 69 | | | | | |
| % | 61.2 | 38.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 30 | 48 | 72 | 18 | | |
| % | 5.6 | 16.9 | 27.0 | 40.4 | 10.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 80 | 56 | 27 | 14 | (1-3) | 0 |
| | % | 44.9 | 31.5 | 15.2 | 7.9 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 42 | 62 | 40 | 32 | (1-3) | 0 |
| | % | 23.6 | 34.8 | 22.5 | 18.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 96 | 82 | 75 | (7-9) | 0 | | |
| % | 53.9 | 46.1 | 42.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 135 | 35 | | | |
| % | | | 75.8 | 19.7 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 447 | 242 | 14 | 96.9 | 45.0 | 40.2 | 49.5 | 69.7 |
| I期 | 252 | 87 | (7-9) | 96.8 | 64.9 | 58.6 | 70.5 | 72.3 |
| II期 | 28 | 16 | 0 | | | | | 67.6 |
| III期 | 55 | 40 | (1-3) | 98.2 | 25.9 | 15.2 | 38.1 | 68.8 |
| IV期 | 108 | 98 | (4-6) | 96.3 | 6.1 | 2.5 | 11.9 | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 285 | 162 | 対象数 | 22 | 425 | | |
| % | 63.8 | 36.2 | % | 4.9 | 95.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 59 | 132 | 142 | 95 | | |
| % | 4.3 | 13.2 | 29.5 | 31.8 | 21.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 252 | 28 | 55 | 108 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.4 | 6.3 | 12.3 | 24.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 289 | 158 | 146 | 12 | 0 | | |
| % | 64.7 | 35.3 | 32.7 | 2.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 36 | 252 | 151 | | | |
| % | | 8.1 | 56.4 | 33.8 | | | |

262 九州大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 311 | 39 | (4-6) | 98.1 | 87.4 | 83.1 | 90.6 | 57.8 |
| I期 | 140 | (7-9) | 0 | 100.0 | 94.3 | 88.9 | 97.1 | 58.2 |
| II期 | 120 | 12 | (4-6) | 95.0 | 89.7 | 82.6 | 94.0 | 57.1 |
| III期 | 34 | 11 | 0 | 100.0 | 67.7 | 49.2 | 80.6 | 59.9 |
| IV期 | 16 | (7-9) | 0 | | | | | 56.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 311 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 98 | 73 | 66 | 53 | 21 | | |
| % | 31.5 | 23.5 | 21.2 | 17.0 | 6.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 140 | 120 | 34 | 16 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.0 | 38.6 | 10.9 | 5.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 281 | 273 | (7-9) | 0 | | |
| % | 9.6 | 90.4 | 87.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 63 | 14 | 55 | 179 | | | |
| % | 20.3 | 4.5 | 17.7 | 57.6 | | | |

263 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

263 胃
胃
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 361 | 136 | (1-3) | 99.4 | 62.3 | 57.0 | 67.0 | 69.6 |
| I期 | 228 | 47 | (1-3) | 99.6 | 79.3 | 73.5 | 84.0 | 70.0 |
| II期 | 27 | 10 | (1-3) | | | | | 69.9 |
| III期 | 28 | 14 | 0 | | | | | 70.0 |
| IV期 | 68 | 62 | 0 | 100.0 | 8.8 | 3.6 | 17.0 | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 236 | 125 | | | | | |
| % | 65.4 | 34.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 47 | 102 | 124 | 72 | | |
| % | 4.4 | 13.0 | 28.3 | 34.3 | 19.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 228 | 27 | 28 | 68 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 63.2 | 7.5 | 7.8 | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 80 | 281 | 272 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 22.2 | 77.8 | 75.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 32 | 74 | 237 | | | |
| % | 5.0 | 8.9 | 20.5 | 65.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 338 | 124 | (1-3) | 99.4 | 63.2 | 57.8 | 68.1 | 69.2 |
| I期 | 82 | 15 | (1-3) | 98.8 | 81.7 | 71.5 | 88.5 | 69.1 |
| II期 | 78 | 23 | (1-3) | 98.7 | 70.1 | 58.6 | 79.0 | 72.8 |
| III期 | 96 | 22 | 0 | 100.0 | 77.1 | 67.3 | 84.3 | 68.5 |
| IV期 | 69 | 61 | 0 | 100.0 | 11.6 | 5.4 | 20.3 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 186 | 152 | | | | | |
| % | 55.0 | 45.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 38 | 91 | 118 | 67 | | |
| % | 7.1 | 11.2 | 26.9 | 34.9 | 19.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 78 | 96 | 69 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 24.3 | 23.1 | 28.4 | 20.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 53 | 285 | 279 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 15.7 | 84.3 | 82.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | 14 | 77 | 232 | | | |
| % | 4.4 | 4.1 | 22.8 | 68.6 | | | |

263 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 286 | 160 | (1-3) | 99.3 | 43.9 | 38.1 | 49.6 | 70.3 |
| I期 | 80 | 37 | 0 | 100.0 | 53.8 | 42.3 | 63.9 | 71.7 |
| II期 | 126 | 61 | 0 | 100.0 | 51.6 | 42.5 | 59.9 | 70.4 |
| III期 | 57 | 41 | (1-3) | 96.5 | 27.2 | 16.4 | 39.2 | 70.6 |
| IV期 | 18 | 18 | 0 | | | | | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 対象数 | 176 | 110 | | | | | | |
| % | 61.5 | 38.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 33 | 86 | 102 | 57 | | | |
| % | | 11.5 | 30.1 | 35.7 | 19.9 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 80 | 126 | 57 | 18 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 28.0 | 44.1 | 19.9 | 6.3 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 39 | 124 | 68 | 52 | (1-3) | (1-3) | |
| | % | 13.6 | 43.4 | 23.8 | 18.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 244 | 42 | 42 | 0 | 0 | | | |
| % | 85.3 | 14.7 | 14.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 114 | 169 | | | | |
| % | | | 39.9 | 59.1 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 514 | 295 | (1-3) | 99.8 | 42.6 | 38.3 | 46.8 | 68.7 |
| I期 | 232 | 63 | 0 | 100.0 | 72.8 | 66.6 | 78.1 | 68.9 |
| II期 | 24 | 12 | 0 | | | | | 65.4 |
| III期 | 103 | 75 | (1-3) | 99.0 | 26.9 | 18.7 | 35.7 | 67.7 |
| IV期 | 151 | 141 | 0 | 100.0 | 6.6 | 3.4 | 11.3 | 68.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 331 | 183 | 対象数 | | 34 | 480 |
| % | 64.4 | 35.6 | % | | 6.6 | 93.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 15 | 71 | 178 | 175 | 75 | |
| % | 2.9 | 13.8 | 34.6 | 34.0 | 14.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 232 | 24 | 103 | 151 | (1-3) | (1-3) |
| % | 45.1 | 4.7 | 20.0 | 29.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 200 | 314 | 313 | (1-3) | 0 | |
| % | 38.9 | 61.1 | 60.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 24 | 57 | 112 | 321 | | |
| % | 4.7 | 11.1 | 21.8 | 62.5 | | |

263 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 259 | 47 | (1-3) | 99.6 | 81.9 | 76.6 | 86.0 | 59.9 |
| I期 | 112 | 11 | (1-3) | 99.1 | 90.2 | 83.0 | 94.4 | 59.3 |
| II期 | 120 | 22 | 0 | 100.0 | 81.7 | 73.5 | 87.5 | 61.0 |
| III期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 56.4 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 63.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 259 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 72 | 45 | 74 | 43 | 25 | | |
| % | 27.8 | 17.4 | 28.6 | 16.6 | 9.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 112 | 120 | 16 | 10 | (1-3) | 0 | |
| % | 43.2 | 46.3 | 6.2 | 3.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 38 | 221 | 219 | (1-3) | 0 | | |
| % | 14.7 | 85.3 | 84.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 30 | 15 | 31 | 183 | | | |
| % | 11.6 | 5.8 | 12.0 | 70.7 | | | |

264 福岡県済生会福岡総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

264 福岡県済生会福岡総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 293 | 100 | 13 | 95.6 | 65.0 | 59.2 | 70.3 | 69.0 |
| I期 | 200 | 35 | 11 | 94.5 | 82.0 | 75.8 | 86.7 | 68.1 |
| II期 | 24 | 12 | 0 | | | | | 76.0 |
| III期 | 12 | (4-6) | (1-3) | | | | | 72.5 |
| IV期 | 55 | 47 | (1-3) | 98.2 | 13.1 | 5.7 | 23.4 | 68.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 188 | 105 | | | | | |
| % | 64.2 | 35.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 41 | 78 | 104 | 55 | | |
| % | 5.1 | 14.0 | 26.6 | 35.5 | 18.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 200 | 24 | 12 | 55 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 68.3 | 8.2 | 4.1 | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 61 | 232 | 205 | 23 | (4-6) | | |
| % | 20.8 | 79.2 | 70.0 | 7.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 53 | 61 | 154 | | | |
| % | 8.5 | 18.1 | 20.8 | 52.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 303 | 103 | (4-6) | 98.7 | 65.8 | 60.1 | 70.8 | 69.4 |
| I期 | 82 | 11 | (1-3) | 97.6 | 86.6 | 77.1 | 92.3 | 67.9 |
| II期 | 76 | 13 | 0 | 100.0 | 82.9 | 72.4 | 89.7 | 70.9 |
| III期 | 88 | 36 | 0 | 100.0 | 59.1 | 48.1 | 68.5 | 68.3 |
| IV期 | 54 | 42 | (1-3) | 98.1 | 20.8 | 11.1 | 32.5 | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 154 | 149 | | | | | |
| % | 50.8 | 49.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 38 | 89 | 76 | 78 | | |
| % | 7.3 | 12.5 | 29.4 | 25.1 | 25.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 82 | 76 | 88 | 54 | 0 | (1-3) | |
| % | 27.1 | 25.1 | 29.0 | 17.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 45 | 258 | 227 | 29 | (1-3) | | |
| % | 14.9 | 85.1 | 74.9 | 9.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 27 | 47 | 217 | | | |
| % | 4.0 | 8.9 | 15.5 | 71.6 | | | |

264 福岡県済生会福岡総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 94 | 60 | 0 | 100.0 | 36.2 | 26.6 | 45.8 | 71.8 |
| I期 | 36 | 12 | 0 | 100.0 | 66.7 | 48.8 | 79.5 | 69.3 |
| II期 | 26 | 18 | 0 | | | | | 76.4 |
| III期 | 22 | 21 | 0 | | | | | 73.1 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 81.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|---|--|
| 対象数 | 61 | 33 | | | | | | |
| % | 64.9 | 35.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 26 | 36 | 21 | | | |
| % | | | 27.7 | 38.3 | 22.3 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 36 | 26 | 22 | 10 | 0 | 0 | |
| | % | 38.3 | 27.7 | 23.4 | 10.6 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 34 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
| | % | 26.6 | 36.2 | 16.0 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 74 | 20 | 16 | (4-6) | 0 | | | |
| % | 78.7 | 21.3 | 17.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 61 | 32 | | | | |
| % | | | 64.9 | 34.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 241 | 151 | (4-6) | 98.3 | 36.6 | 30.6 | 42.7 | 69.5 |
| I期 | 90 | 25 | (1-3) | 97.8 | 71.9 | 61.4 | 80.1 | 68.7 |
| II期 | 21 | 15 | 0 | | | | | 69.4 |
| III期 | 47 | 37 | 0 | 100.0 | 21.3 | 11.0 | 33.8 | 72.2 |
| IV期 | 82 | 74 | (1-3) | 97.6 | 7.6 | 3.1 | 14.7 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 168 | 73 | 対象数 | | 19 | 222 | |
| % | 69.7 | 30.3 | % | | 7.9 | 92.1 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 17 | 83 | 92 | 38 | | |
| % | 4.6 | 7.1 | 34.4 | 38.2 | 15.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 21 | 47 | 82 | 0 | (1-3) | |
| % | 37.3 | 8.7 | 19.5 | 34.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 129 | 112 | 102 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | 53.5 | 46.5 | 42.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 78 | 141 | | | |
| % | | 7.5 | 32.4 | 58.5 | | | |

264 福岡県済生会福岡総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 139 | 24 | 10 | 92.8 | 82.5 | 75.0 | 87.9 | 59.6 |
| I期 | 68 | (4-6) | (4-6) | 92.6 | 92.6 | 83.1 | 96.8 | 56.4 |
| II期 | 50 | (7-9) | (1-3) | 96.0 | 85.6 | 72.2 | 92.9 | 60.7 |
| III期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 63.0 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 61.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 139 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 35 | 32 | 39 | 29 | (4-6) | | |
| % | 25.2 | 23.0 | 28.1 | 20.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 68 | 50 | 13 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 48.9 | 36.0 | 9.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 114 | 109 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 18.0 | 82.0 | 78.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | 12 | 89 | | | |
| % | 24.5 | | 8.6 | 64.0 | | | |

265 福岡大学病院
2010-2011年2力年

コメント:

各施設が取り扱う症例に偏りが考えられるため、施設間の比較は難しいと考える。当院としては、更に精度の高い情報を提供できるよう努めていきたい。

265 福岡大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 400 | 144 | 17 | 95.8 | 63.4 | 58.4 | 68.0 | 69.3 |
| I期 | 291 | 58 | 15 | 94.8 | 79.6 | 74.4 | 83.8 | 70.0 |
| II期 | 25 | 13 | 0 | | | | | 65.0 |
| III期 | 26 | 19 | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | 50 | 48 | (1-3) | 98.0 | 3.0 | 0.3 | 12.0 | 63.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 284 | 116 | | | | | |
| % | 71.0 | 29.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 47 | 123 | 124 | 87 | | |
| % | 4.8 | 11.8 | 30.8 | 31.0 | 21.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 291 | 25 | 26 | 50 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 72.8 | 6.3 | 6.5 | 12.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 77 | 323 | 318 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 19.3 | 80.8 | 79.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 50 | 34 | 113 | 203 | | | |
| % | 12.5 | 8.5 | 28.3 | 50.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 334 | 130 | (7-9) | 97.3 | 60.6 | 55.1 | 65.7 | 68.6 |
| I期 | 89 | 17 | (1-3) | 96.6 | 80.6 | 70.7 | 87.5 | 68.2 |
| II期 | 94 | 28 | (1-3) | 96.8 | 69.8 | 59.4 | 78.1 | 69.4 |
| III期 | 80 | 31 | (1-3) | 96.3 | 60.4 | 48.6 | 70.2 | 66.9 |
| IV期 | 57 | 47 | 0 | 100.0 | 17.5 | 9.0 | 28.4 | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 196 | 138 | | | | | |
| % | 58.7 | 41.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 22 | 46 | 100 | 107 | 59 | | |
| % | 6.6 | 13.8 | 29.9 | 32.0 | 17.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 89 | 94 | 80 | 57 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 26.6 | 28.1 | 24.0 | 17.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 299 | 290 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 10.5 | 89.5 | 86.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | 23 | 87 | 200 | | | |
| % | 7.2 | 6.9 | 26.0 | 59.9 | | | |

265 福岡大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 167 | 101 | (1-3) | 98.2 | 39.1 | 31.6 | 46.4 | 68.4 |
| I期 | 60 | 25 | (1-3) | 98.3 | 58.2 | 44.8 | 69.5 | 66.0 |
| II期 | 58 | 33 | (1-3) | 98.3 | 43.0 | 30.2 | 55.3 | 68.0 |
| III期 | 29 | 24 | (1-3) | | | | | 71.3 |
| IV期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 61.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 123 | 44 | | | | | |
| % | 73.7 | 26.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 51 | 52 | 28 | | |
| % | | 16.2 | 30.5 | 31.1 | 16.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 60 | 58 | 29 | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 35.9 | 34.7 | 17.4 | 10.2 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 35 | 67 | 29 | 33 | (1-3) | 0 |
| | % | 21.0 | 40.1 | 17.4 | 19.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 133 | 34 | 33 | (1-3) | 0 | | |
| % | 79.6 | 20.4 | 19.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 130 | 31 | | | |
| % | | | 77.8 | 18.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 424 | 255 | 10 | 97.6 | 39.2 | 34.6 | 43.9 | 69.1 |
| I期 | 198 | 72 | (4-6) | 97.0 | 63.3 | 56.1 | 69.6 | 70.0 |
| II期 | 40 | 28 | (1-3) | 97.5 | 28.4 | 15.4 | 42.9 | 72.5 |
| III期 | 79 | 64 | (1-3) | 97.5 | 18.0 | 10.4 | 27.2 | 69.5 |
| IV期 | 99 | 90 | (1-3) | 99.0 | 8.2 | 3.8 | 14.6 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 296 | 128 | 対象数 | | 39 | 385 |
| % | 69.8 | 30.2 | % | | 9.2 | 90.8 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 19 | 47 | 137 | 145 | 76 | |
| % | 4.5 | 11.1 | 32.3 | 34.2 | 17.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 198 | 40 | 79 | 99 | (1-3) | (4-6) |
| % | 46.7 | 9.4 | 18.6 | 23.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 175 | 249 | 233 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 41.3 | 58.7 | 55.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 18 | 41 | 214 | 151 | | |
| % | 4.2 | 9.7 | 50.5 | 35.6 | | |

265 福岡大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 16 | (1-3) | 98.5 | 87.6 | 80.6 | 92.2 | 60.6 |
| I期 | 66 | (1-3) | (1-3) | 98.5 | 95.4 | 86.4 | 98.5 | 60.2 |
| II期 | 39 | (1-3) | 0 | 100.0 | 92.3 | 78.0 | 97.5 | 55.8 |
| III期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 65.9 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 57.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 131 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 28 | 28 | 42 | 23 | 10 | | |
| % | 21.4 | 21.4 | 32.1 | 17.6 | 7.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 66 | 39 | 15 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 50.4 | 29.8 | 11.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 106 | 101 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 19.1 | 80.9 | 77.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 31 | (1-3) | 17 | 80 | | | |
| % | 23.7 | | 13.0 | 61.1 | | | |

266

聖マリア病院

2010-2011年2カ年

コメント:

当院は地域中核病院として、救急医療が柱となっております
同時に地域の特性として、患者の高齢化が進んでいる中、がんが進行して症状が明らかとなった状態「閉塞、出血など」での比率が高いという現状があります
以上のように患者背景が統一されていない現状でのがん治療生存率は、どうしてもがん専門病院などと比較した場合「生存率低下」が否めません
他方、その結果を一般市民は当然、各病院の治療成績として比較するわけですから、当院のがん治療成績は低いという誤解を招きます
以上から、今回の2010-2011年2年間の「生存率公開」はすべきではないと愚考します

267 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

267 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 413 | 161 | (1-3) | 99.3 | 60.9 | 56.0 | 65.5 | 70.5 |
| I期 | 253 | 49 | (1-3) | 99.2 | 80.6 | 75.1 | 85.0 | 71.3 |
| II期 | 32 | 13 | (1-3) | 96.9 | 58.3 | 39.2 | 73.3 | 68.8 |
| III期 | 38 | 18 | 0 | 100.0 | 52.6 | 35.8 | 67.0 | 71.6 |
| IV期 | 82 | 78 | 0 | 100.0 | 4.9 | 1.6 | 11.1 | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 278 | 135 | | | | | |
| % | 67.3 | 32.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 51 | 107 | 162 | 80 | | |
| % | 3.1 | 12.3 | 25.9 | 39.2 | 19.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 253 | 32 | 38 | 82 | 0 | (7-9) | |
| % | 61.3 | 7.7 | 9.2 | 19.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 68 | 345 | 320 | 25 | 0 | | |
| % | 16.5 | 83.5 | 77.5 | 6.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 25 | 29 | 105 | 254 | | | |
| % | 6.1 | 7.0 | 25.4 | 61.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 384 | 132 | (4-6) | 98.7 | 65.4 | 60.4 | 69.9 | 69.4 |
| I期 | 96 | 15 | (1-3) | 96.9 | 84.0 | 74.9 | 90.1 | 70.2 |
| II期 | 122 | 29 | (1-3) | 99.2 | 76.1 | 67.5 | 82.8 | 71.2 |
| III期 | 95 | 32 | 0 | 100.0 | 66.3 | 55.9 | 74.8 | 70.2 |
| IV期 | 60 | 53 | (1-3) | 98.3 | 10.7 | 4.4 | 20.2 | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 238 | 146 | | | | | |
| % | 62.0 | 38.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 42 | 110 | 144 | 67 | | |
| % | 5.5 | 10.9 | 28.6 | 37.5 | 17.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 96 | 122 | 95 | 60 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 25.0 | 31.8 | 24.7 | 15.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 40 | 344 | 312 | 32 | 0 | | |
| % | 10.4 | 89.6 | 81.3 | 8.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 32 | 71 | 272 | | | |
| % | | 8.3 | 18.5 | 70.8 | | | |

267 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 134 | 81 | 0 | 100.0 | 39.6 | 31.3 | 47.7 | 71.6 |
| I期 | 63 | 24 | 0 | 100.0 | 61.9 | 48.8 | 72.6 | 71.3 |
| II期 | 33 | 22 | 0 | 100.0 | 33.3 | 18.2 | 49.3 | 70.6 |
| III期 | 29 | 26 | 0 | | | | | 73.9 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 75.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 91 | 43 | | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 40 | 62 | 22 | | | |
| % | | 7.5 | 29.9 | 46.3 | 16.4 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 63 | 33 | 29 | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 47.0 | 24.6 | 21.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 29 | 45 | 35 | 23 | (1-3) | 0 | |
| | % | 21.6 | 33.6 | 26.1 | 17.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 109 | 25 | 25 | 0 | 0 | | | |
| % | 81.3 | 18.7 | 18.7 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 67 | 64 | | | | |
| % | | | 50.0 | 47.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 287 | 189 | (1-3) | 99.0 | 33.6 | 28.2 | 39.2 | 71.7 |
| I期 | 112 | 39 | (1-3) | 99.1 | 64.9 | 55.3 | 73.0 | 71.1 |
| II期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.7 |
| III期 | 71 | 59 | 0 | 100.0 | 16.9 | 9.3 | 26.5 | 73.0 |
| IV期 | 84 | 83 | 0 | 100.0 | 1.2 | 0.1 | 5.8 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 192 | 95 | 対象数 | | 30 | 257 | |
| % | 66.9 | 33.1 | % | | 10.5 | 89.5 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 85 | 111 | 65 | | |
| % | | 7.3 | 29.6 | 38.7 | 22.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 112 | 17 | 71 | 84 | 0 | (1-3) | |
| % | 39.0 | 5.9 | 24.7 | 29.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 163 | 124 | 116 | (7-9) | 0 | | |
| % | 56.8 | 43.2 | 40.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 26 | 111 | 148 | | | |
| % | | 9.1 | 38.7 | 51.6 | | | |

267 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 279 | 32 | (1-3) | 98.9 | 88.5 | 84.1 | 91.7 | 62.1 |
| I期 | 131 | (7-9) | (1-3) | 97.7 | 94.6 | 88.9 | 97.4 | 62.2 |
| II期 | 92 | (4-6) | 0 | 100.0 | 94.6 | 87.4 | 97.7 | 63.1 |
| III期 | 46 | 13 | 0 | 100.0 | 71.7 | 56.4 | 82.5 | 64.8 |
| IV期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 66.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 279 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 49 | 62 | 101 | 40 | 27 | | |
| % | 17.6 | 22.2 | 36.2 | 14.3 | 9.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 131 | 92 | 46 | 10 | 0 | 0 | |
| % | 47.0 | 33.0 | 16.5 | 3.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 264 | 257 | (7-9) | 0 | | |
| % | 5.4 | 94.6 | 92.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 62 | (4-6) | 30 | 182 | | | |
| % | 22.2 | | 10.8 | 65.2 | | | |

268 産業医科大学病院
2010-2011年2力年

コメント:

この集計結果における死亡数および生存率は、がんによるものだけでなく、他の病気や不慮の事故等による死亡も含めた値である。さらに、各施設の患者の状況（平均年齢や併存疾患の有無の割合等）が異なることから、この値だけで施設間の治療成績の比較は困難であると考えます。

268 産業医科大学病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 212 | 89 | 10 | 95.3 | 57.1 | 50.0 | 63.5 | 70.5 |
| I期 | 121 | 26 | (4-6) | 96.7 | 78.3 | 69.7 | 84.6 | 71.8 |
| II期 | 25 | 11 | (1-3) | | | | | 68.4 |
| III期 | 15 | 10 | (1-3) | | | | | 72.7 |
| IV期 | 50 | 42 | (1-3) | 96.0 | 12.8 | 5.2 | 23.9 | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 132 | 80 | | | | | |
| % | 62.3 | 37.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 19 | 53 | 86 | 43 | | |
| % | 5.2 | 9.0 | 25.0 | 40.6 | 20.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | 25 | 15 | 50 | 0 | (1-3) | |
| % | 57.1 | 11.8 | 7.1 | 23.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 51 | 161 | 151 | 10 | 0 | | |
| % | 24.1 | 75.9 | 71.2 | 4.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 82 | 104 | | | |
| % | | 9.9 | 38.7 | 49.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 186 | 72 | (4-6) | 97.3 | 60.8 | 53.4 | 67.5 | 69.7 |
| I期 | 41 | 13 | (1-3) | 92.7 | 67.2 | 50.3 | 79.5 | 66.2 |
| II期 | 53 | 12 | (1-3) | 96.2 | 76.8 | 62.8 | 86.1 | 69.8 |
| III期 | 49 | 16 | 0 | 100.0 | 67.4 | 52.3 | 78.6 | 66.8 |
| IV期 | 40 | 30 | 0 | 100.0 | 25.0 | 13.0 | 39.0 | 68.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 106 | 80 | | | | | |
| % | 57.0 | 43.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 24 | 53 | 66 | 34 | | |
| % | | 12.9 | 28.5 | 35.5 | 18.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 53 | 49 | 40 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 22.0 | 28.5 | 26.3 | 21.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 168 | 165 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 9.7 | 90.3 | 88.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 79 | 92 | | | |
| % | | 7.5 | 42.5 | 49.5 | | | |

268 産業医科大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 148 | 90 | (4-6) | 97.3 | 37.9 | 30.0 | 45.7 | 72.0 |
| I期 | 77 | 36 | (1-3) | 96.1 | 51.7 | 39.9 | 62.4 | 73.9 |
| II期 | 33 | 18 | 0 | 100.0 | 45.5 | 28.2 | 61.2 | 73.5 |
| III期 | 22 | 20 | (1-3) | | | | | 75.9 |
| IV期 | 15 | 15 | 0 | | | | | 74.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 102 | 46 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 16 | 38 | 59 | 34 | | |
| % | | 10.8 | 25.7 | 39.9 | 23.0 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 77 | 33 | 22 | 15 | (1-3) | 0 |
| | % | 52.0 | 22.3 | 14.9 | 10.1 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 36 | 52 | 32 | 27 | (1-3) | 0 |
| | % | 24.3 | 35.1 | 21.6 | 18.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 114 | 34 | 32 | (1-3) | 0 | | |
| % | 77.0 | 23.0 | 21.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 117 | 25 | | | |
| % | | | 79.1 | 16.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 421 | 228 | 21 | 95.0 | 43.8 | 39.0 | 48.6 | 69.9 |
| I期 | 210 | 70 | (7-9) | 96.2 | 65.8 | 58.9 | 71.9 | 70.4 |
| II期 | 31 | 15 | (1-3) | 96.8 | 51.6 | 33.0 | 67.4 | 71.0 |
| III期 | 83 | 61 | (7-9) | 91.6 | 20.6 | 12.3 | 30.3 | 68.4 |
| IV期 | 94 | 80 | (4-6) | 94.7 | 10.4 | 5.1 | 17.8 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 277 | 144 | 対象数 | | 30 | 391 |
| % | 65.8 | 34.2 | % | | 7.1 | 92.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 13 | 41 | 133 | 161 | 73 | |
| % | 3.1 | 9.7 | 31.6 | 38.2 | 17.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 210 | 31 | 83 | 94 | (1-3) | (1-3) |
| % | 49.9 | 7.4 | 19.7 | 22.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 182 | 239 | 227 | 11 | (1-3) | |
| % | 43.2 | 56.8 | 53.9 | 2.6 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 40 | 256 | 119 | | |
| % | | 9.5 | 60.8 | 28.3 | | |

268 産業医科大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 131 | 23 | (4-6) | 96.2 | 82.1 | 74.3 | 87.7 | 61.8 |
| I期 | 66 | (4-6) | (1-3) | 95.5 | 90.8 | 80.6 | 95.7 | 61.1 |
| II期 | 37 | (4-6) | (1-3) | 97.3 | 89.0 | 73.2 | 95.7 | 60.8 |
| III期 | 19 | (7-9) | (1-3) | | | | | 64.2 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 59.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 131 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 30 | 24 | 39 | 26 | 12 | | |
| % | 22.9 | 18.3 | 29.8 | 19.8 | 9.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 66 | 37 | 19 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 50.4 | 28.2 | 14.5 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 111 | 108 | (1-3) | 0 | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 82.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | 0 | 29 | 76 | | | |
| % | 19.8 | | 22.1 | 58.0 | | | |

269 戸畑共立病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

269 戸畑共立病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 80 | 28 | (4-6) | 95.0 | 64.7 | 53.1 | 74.1 | 73.4 |
| I期 | 56 | (7-9) | (4-6) | 92.9 | 83.6 | 70.8 | 91.1 | 73.4 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 67.7 |
| IV期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 58 | 22 | | | | | |
| % | 72.5 | 27.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 14 | 40 | 19 | | |
| % | | | 17.5 | 50.0 | 23.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 56 | (4-6) | (7-9) | 13 | 0 | 0 | |
| % | 70.0 | | | 16.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 71 | 69 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 88.8 | 86.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 12 | 55 | | | |
| % | | 15.0 | 15.0 | 68.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 66 | 21 | (1-3) | 97.0 | 67.7 | 54.9 | 77.6 | 72.2 |
| I期 | 22 | (4-6) | 0 | | | | | 70.7 |
| II期 | 20 | (4-6) | (1-3) | | | | | 76.8 |
| III期 | 11 | (1-3) | (1-3) | | | | | 69.3 |
| IV期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 36 | 30 | | | | | |
| % | 54.5 | 45.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 17 | 22 | 19 | | |
| % | | | 25.8 | 33.3 | 28.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 20 | 11 | 10 | 0 | (1-3) | |
| % | 33.3 | 30.3 | 16.7 | 15.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 63 | 59 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 95.5 | 89.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 13 | 40 | | | |
| % | | | 19.7 | 60.6 | | | |

269 戸畑共立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 25 | 15 | 0 | | | | | 74.8 |
| I期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 71.6 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.8 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 81.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|
| 対象数 | 17 | (7-9) | | | | | |
| % | 68.0 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 10 | (7-9) | | |
| % | | | | 40.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 14 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 |
| | % | 56.0 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 76.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 16 | (7-9) | | | |
| % | | | 64.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 68 | 47 | (7-9) | 88.2 | 23.1 | 13.5 | 34.3 | 76.3 |
| I期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 78.4 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 13 | 12 | (1-3) | | | | | 76.7 |
| IV期 | 30 | 24 | (4-6) | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 50 | 18 | 対象数 | | (4-6) | 63 |
| % | 73.5 | 26.5 | % | | | 92.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 11 | 20 | 32 | |
| % | | | 16.2 | 29.4 | 47.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 22 | (1-3) | 13 | 30 | (1-3) | 0 |
| % | 32.4 | | 19.1 | 44.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 65 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 95.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 21 | 45 | | |
| % | | | 30.9 | 66.2 | | |

269 戸畑共立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 34 | (7-9) | (1-3) | 94.1 | 76.4 | 58.2 | 87.4 | 64.8 |
| I期 | 19 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.0 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 58.2 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 63.4 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 51.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 34 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 10 | | |
| % | | | | | 29.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 19 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 55.9 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 32 | 31 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 94.1 | 91.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (1-3) | 24 | | | |
| % | | | | 70.6 | | | |

270 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
2010-2011年2力年

コメント:

全国平均と比較してのコメントします。
胃がん：80歳以上の高齢者が多い割には全国平均とほぼ同様の生存率である。
大腸がん：明らかに高齢者、特に80歳以上が多く、進行例も多いのが生存率を低くしている。
肝臓がん：著明に高齢者が多く、進行例も多い割に生存率は全国平均と同等となっている。
肺がん：著明に高齢者が多く、進行例も多いことが生存率の低下につながっている。
全体として高齢者が多い割には、胃がん・肝がんは全国平均を保っている。
大腸がん・肺がんに関しては、高齢者の割合が顕著に高いことと進行例が多いことが、生存率を悪くしている。

270 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 308 | 120 | 0 | 100.0 | 61.0 | 55.4 | 66.2 | 70.3 |
| I期 | 204 | 48 | 0 | 100.0 | 76.5 | 70.0 | 81.7 | 70.7 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 76.0 |
| III期 | 25 | 11 | 0 | | | | | 69.7 |
| IV期 | 54 | 51 | 0 | 100.0 | 5.6 | 1.5 | 13.9 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 215 | 93 | | | | | |
| % | 69.8 | 30.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 30 | 81 | 131 | 54 | | |
| % | 3.9 | 9.7 | 26.3 | 42.5 | 17.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 204 | 19 | 25 | 54 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 66.2 | 6.2 | 8.1 | 17.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 261 | 244 | 15 | (1-3) | | |
| % | 15.3 | 84.7 | 79.2 | 4.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | 20 | 118 | 141 | | | |
| % | 9.4 | 6.5 | 38.3 | 45.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 253 | 111 | (1-3) | 99.6 | 56.1 | 49.7 | 61.9 | 71.6 |
| I期 | 46 | 11 | 0 | 100.0 | 76.1 | 61.0 | 86.0 | 77.0 |
| II期 | 77 | 23 | 0 | 100.0 | 70.1 | 58.6 | 79.0 | 73.9 |
| III期 | 75 | 28 | (1-3) | 98.7 | 62.5 | 50.4 | 72.3 | 73.2 |
| IV期 | 46 | 43 | 0 | 100.0 | 6.5 | 1.7 | 16.1 | 71.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 139 | 114 | | | | | |
| % | 54.9 | 45.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 59 | 88 | 67 | | |
| % | | 11.9 | 23.3 | 34.8 | 26.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 46 | 77 | 75 | 46 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 18.2 | 30.4 | 29.6 | 18.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 206 | 183 | 20 | (1-3) | | |
| % | 18.6 | 81.4 | 72.3 | 7.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 22 | 10 | 66 | 155 | | | |
| % | 8.7 | 4.0 | 26.1 | 61.3 | | | |

270 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 115 | 74 | (1-3) | 99.1 | 35.1 | 26.5 | 43.8 | 72.8 |
| I期 | 54 | 26 | 0 | 100.0 | 51.9 | 37.9 | 64.1 | 75.3 |
| II期 | 30 | 19 | 0 | 100.0 | 36.7 | 20.1 | 53.4 | 69.6 |
| III期 | 24 | 22 | (1-3) | | | | | 71.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 78 | 37 | | | | | |
| % | 67.8 | 32.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 18 | 57 | 26 | | |
| % | | 10.4 | 15.7 | 49.6 | 22.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 54 | 30 | 24 | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | 47.0 | 26.1 | 20.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 46 | 19 | 24 | (1-3) | 0 |
| | % | 21.7 | 40.0 | 16.5 | 20.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 107 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | 93.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 84 | 30 | | | |
| % | | | 73.0 | 26.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 221 | 160 | 0 | 100.0 | 27.6 | 21.9 | 33.6 | 72.1 |
| I期 | 68 | 22 | 0 | 100.0 | 67.7 | 55.2 | 77.4 | 68.3 |
| II期 | 13 | 10 | 0 | | | | | 76.5 |
| III期 | 57 | 46 | 0 | 100.0 | 19.3 | 10.3 | 30.4 | 70.4 |
| IV期 | 80 | 79 | 0 | 100.0 | 1.3 | 0.1 | 6.0 | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 168 | 53 | 対象数 | | 24 | 197 |
| % | 76.0 | 24.0 | % | | 10.9 | 89.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 18 | 63 | 89 | 50 | |
| % | | 8.1 | 28.5 | 40.3 | 22.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 68 | 13 | 57 | 80 | (1-3) | (1-3) |
| % | 30.8 | 5.9 | 25.8 | 36.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 149 | 72 | 66 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 67.4 | 32.6 | 29.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 16 | 25 | 99 | 81 | | |
| % | 7.2 | 11.3 | 44.8 | 36.7 | | |

270 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 62.3 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 61.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 75.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 44.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | (7-9) | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

271 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

271 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 374 | 107 | (1-3) | 99.7 | 71.4 | 66.5 | 75.7 | 70.1 |
| I期 | 267 | 43 | (1-3) | 99.6 | 83.9 | 78.9 | 87.8 | 70.4 |
| II期 | 28 | 10 | 0 | | | | | 70.8 |
| III期 | 30 | 14 | 0 | 100.0 | 53.3 | 34.3 | 69.1 | 68.0 |
| IV期 | 48 | 40 | 0 | 100.0 | 16.7 | 7.8 | 28.4 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 259 | 115 | | | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 49 | 91 | 137 | 81 | | |
| % | 4.3 | 13.1 | 24.3 | 36.6 | 21.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 267 | 28 | 30 | 48 | 0 | (1-3) | |
| % | 71.4 | 7.5 | 8.0 | 12.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 338 | 331 | (7-9) | 0 | | |
| % | 9.6 | 90.4 | 88.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 87 | 17 | 127 | 143 | | | |
| % | 23.3 | 4.5 | 34.0 | 38.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 269 | 81 | (4-6) | 98.5 | 69.7 | 63.8 | 74.8 | 70.0 |
| I期 | 68 | (7-9) | (1-3) | 97.1 | 86.6 | 75.8 | 92.8 | 66.5 |
| II期 | 84 | 17 | (1-3) | 98.8 | 79.7 | 69.4 | 86.9 | 73.7 |
| III期 | 70 | 18 | (1-3) | 98.6 | 74.0 | 62.0 | 82.8 | 71.0 |
| IV期 | 45 | 37 | 0 | 100.0 | 17.8 | 8.3 | 30.1 | 66.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 155 | 114 | | | | | |
| % | 57.6 | 42.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 37 | 69 | 91 | 59 | | |
| % | 4.8 | 13.8 | 25.7 | 33.8 | 21.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 68 | 84 | 70 | 45 | 0 | (1-3) | |
| % | 25.3 | 31.2 | 26.0 | 16.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 245 | 240 | (4-6) | 0 | | |
| % | 8.9 | 91.1 | 89.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 45 | (7-9) | 57 | 159 | | | |
| % | 16.7 | | 21.2 | 59.1 | | | |

271 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 148 | 86 | 0 | 100.0 | 41.9 | 33.9 | 49.7 | 68.7 |
| I期 | 53 | 22 | 0 | 100.0 | 58.5 | 44.1 | 70.4 | 70.1 |
| II期 | 58 | 33 | 0 | 100.0 | 43.1 | 30.2 | 55.3 | 69.9 |
| III期 | 27 | 21 | 0 | | | | | 67.6 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 56.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 104 | 44 | | | | | |
| % | 70.3 | 29.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 23 | 43 | 57 | 20 | | |
| % | | 15.5 | 29.1 | 38.5 | 13.5 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 53 | 58 | 27 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 35.8 | 39.2 | 18.2 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 26 | 52 | 38 | 30 | 0 | 0 |
| | % | 17.6 | 35.1 | 25.7 | 20.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 90 | 58 | 55 | (1-3) | 0 | | |
| % | 60.8 | 39.2 | 37.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 125 | 21 | | | |
| % | | | 84.5 | 14.2 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 282 | 164 | (1-3) | 99.6 | 41.8 | 36.0 | 47.5 | 70.2 |
| I期 | 121 | 28 | (1-3) | 99.2 | 76.8 | 68.2 | 83.4 | 71.5 |
| II期 | 26 | 18 | 0 | | | | | 71.4 |
| III期 | 62 | 46 | 0 | 100.0 | 25.8 | 15.7 | 37.1 | 69.3 |
| IV期 | 68 | 67 | 0 | 100.0 | 1.5 | 0.1 | 7.0 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 193 | 89 | 対象数 | 27 | 255 | | |
| % | 68.4 | 31.6 | % | 9.6 | 90.4 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 32 | 79 | 124 | 41 | | |
| % | | 11.3 | 28.0 | 44.0 | 14.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | 26 | 62 | 68 | 0 | (4-6) | |
| % | 42.9 | 9.2 | 22.0 | 24.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 143 | 139 | 135 | (4-6) | 0 | | |
| % | 50.7 | 49.3 | 47.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 46 | 125 | 104 | | | |
| % | | 16.3 | 44.3 | 36.9 | | | |

271 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 109 | 20 | (1-3) | 99.1 | 81.6 | 73.0 | 87.7 | 65.9 |
| I期 | 49 | (4-6) | 0 | 100.0 | 91.8 | 79.7 | 96.9 | 67.4 |
| II期 | 37 | (7-9) | 0 | 100.0 | 75.7 | 58.5 | 86.5 | 66.8 |
| III期 | 14 | (1-3) | (1-3) | | | | | 59.7 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 62.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 109 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 18 | 29 | 29 | 17 | | |
| % | 14.7 | 16.5 | 26.6 | 26.6 | 15.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 37 | 14 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 45.0 | 33.9 | 12.8 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 95 | 90 | (4-6) | 0 | | |
| % | 12.8 | 87.2 | 82.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | (1-3) | 20 | 65 | | | |
| % | 21.1 | | 18.3 | 59.6 | | | |

272 唐津赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

なし

272 唐津赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 187 | 69 | 0 | 100.0 | 63.1 | 55.8 | 69.6 | 72.0 |
| I期 | 129 | 29 | 0 | 100.0 | 77.5 | 69.3 | 83.8 | 73.3 |
| II期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 80.5 |
| III期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 73.1 |
| IV期 | 30 | 28 | 0 | 100.0 | 6.7 | 1.2 | 19.2 | 67.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 133 | 54 | | | | | |
| % | 71.1 | 28.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 40 | 65 | 55 | | |
| % | | 11.2 | 21.4 | 34.8 | 29.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 129 | 11 | 14 | 30 | 0 | (1-3) | |
| % | 69.0 | 5.9 | 7.5 | 16.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 148 | 145 | (1-3) | 0 | | |
| % | 20.9 | 79.1 | 77.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (4-6) | 67 | 103 | | | |
| % | 5.9 | | 35.8 | 55.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 148 | 65 | 0 | 100.0 | 56.1 | 47.7 | 63.6 | 72.4 |
| I期 | 44 | 14 | 0 | 100.0 | 68.2 | 52.3 | 79.8 | 69.5 |
| II期 | 40 | 11 | 0 | 100.0 | 72.5 | 55.9 | 83.7 | 73.9 |
| III期 | 45 | 24 | 0 | 100.0 | 46.7 | 31.7 | 60.3 | 77.1 |
| IV期 | 18 | 16 | 0 | | | | | 75.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 81 | 67 | | | | | |
| % | 54.7 | 45.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 32 | 52 | 43 | | |
| % | | 10.8 | 21.6 | 35.1 | 29.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | 40 | 45 | 18 | 0 | (1-3) | |
| % | 29.7 | 27.0 | 30.4 | 12.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 125 | 120 | (4-6) | 0 | | |
| % | 15.5 | 84.5 | 81.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (4-6) | 35 | 96 | | | |
| % | 7.4 | | 23.6 | 64.9 | | | |

272 唐津赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 36 | 28 | 0 | 100.0 | 22.2 | 10.5 | 36.7 | 71.1 |
| I期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 73.7 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.7 |
| III期 | 14 | 14 | 0 | | | | | 76.6 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 30 | (4-6) | | | | | | |
| % | 83.3 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 12 | (7-9) | | | |
| % | | | | 33.3 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 13 | (4-6) | 14 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 36.1 | | 38.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | (7-9) | (7-9) | 10 | 0 | 0 | |
| | % | | | | 27.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 25 | 11 | 10 | 0 | (1-3) | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | 27.8 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 18 | 18 | | | | |
| % | | | 50.0 | 50.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 110 | 97 | 0 | 100.0 | 11.8 | 6.6 | 18.6 | 74.6 |
| I期 | 23 | 12 | 0 | | | | | 72.8 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 80.8 |
| III期 | 27 | 25 | 0 | | | | | 72.1 |
| IV期 | 53 | 53 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 77 | 33 | 対象数 | | 12 | 98 |
| % | 70.0 | 30.0 | % | | 10.9 | 89.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 21 | 45 | 37 | |
| % | | | 19.1 | 40.9 | 33.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 23 | (4-6) | 27 | 53 | (1-3) | 0 |
| % | 20.9 | | 24.5 | 48.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| % | 81.8 | 18.2 | 18.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 32 | 69 | | |
| % | | | 29.1 | 62.7 | | |

272 唐津赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 71 | 14 | 0 | 100.0 | 80.3 | 69.0 | 87.8 | 64.5 |
| I期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 62.4 |
| II期 | 28 | (4-6) | 0 | | | | | 63.9 |
| III期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 71.4 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 66.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 71 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 10 | 19 | 20 | (7-9) | | |
| % | 18.3 | 14.1 | 26.8 | 28.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 28 | 10 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 33.8 | 39.4 | 14.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 67 | 67 | 0 | 0 | | |
| % | | 94.4 | 94.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 55 | | | |
| % | | | | 77.5 | | | |

273 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

273 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 163 | 74 | (1-3) | 99.4 | 54.6 | 46.6 | 61.8 | 72.4 |
| I期 | 103 | 24 | (1-3) | 99.0 | 76.7 | 67.3 | 83.7 | 72.9 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 77.2 |
| III期 | 16 | 12 | 0 | | | | | 68.9 |
| IV期 | 33 | 31 | 0 | 100.0 | 6.1 | 1.1 | 17.6 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 116 | 47 | | | | | |
| % | 71.2 | 28.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 35 | 57 | 51 | | |
| % | | 9.8 | 21.5 | 35.0 | 31.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 103 | (7-9) | 16 | 33 | 0 | (1-3) | |
| % | 63.2 | | 9.8 | 20.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 134 | 124 | 10 | 0 | | |
| % | 17.8 | 82.2 | 76.1 | 6.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 30 | 119 | | | |
| % | | | 18.4 | 73.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 163 | 49 | 0 | 100.0 | 69.9 | 62.3 | 76.4 | 70.1 |
| I期 | 38 | (4-6) | 0 | 100.0 | 84.2 | 68.2 | 92.6 | 67.9 |
| II期 | 46 | (7-9) | 0 | 100.0 | 80.4 | 65.8 | 89.3 | 75.8 |
| III期 | 42 | (7-9) | 0 | 100.0 | 83.3 | 68.2 | 91.7 | 69.0 |
| IV期 | 31 | 27 | 0 | 100.0 | 12.9 | 4.1 | 27.0 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 104 | 59 | | | | | |
| % | 63.8 | 36.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 47 | 52 | 37 | | |
| % | | 12.9 | 28.8 | 31.9 | 22.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 46 | 42 | 31 | 0 | (4-6) | |
| % | 23.3 | 28.2 | 25.8 | 19.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 155 | 133 | 22 | 0 | | |
| % | | 95.1 | 81.6 | 13.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (4-6) | 25 | 118 | | | |
| % | 8.6 | | 15.3 | 72.4 | | | |

273 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 80 | 49 | 0 | 100.0 | 38.8 | 28.2 | 49.2 | 71.5 |
| I期 | 40 | 18 | 0 | 100.0 | 55.0 | 38.5 | 68.8 | 71.5 |
| II期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 71.0 |
| III期 | 14 | 11 | 0 | | | | | 72.4 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 55 | 25 | | | | | |
| % | 68.8 | 31.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 19 | 42 | 11 | | |
| % | | | 23.8 | 52.5 | 13.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 40 | 18 | 14 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 50.0 | 22.5 | 17.5 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 18 | 30 | 17 | 14 | (1-3) | 0 |
| | % | 22.5 | 37.5 | 21.3 | 17.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | | |
| % | 75.0 | 25.0 | 25.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 54 | 20 | | | |
| % | | | 67.5 | 25.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 202 | 144 | 0 | 100.0 | 28.7 | 22.7 | 35.1 | 72.1 |
| I期 | 73 | 29 | 0 | 100.0 | 60.3 | 48.1 | 70.4 | 71.1 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.6 |
| III期 | 58 | 50 | 0 | 100.0 | 13.8 | 6.5 | 23.9 | 72.1 |
| IV期 | 60 | 58 | 0 | 100.0 | 3.3 | 0.6 | 10.2 | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 147 | 55 | 対象数 | | 16 | 186 |
| % | 72.8 | 27.2 | % | | 7.9 | 92.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 52 | 93 | 40 | |
| % | | 6.9 | 25.7 | 46.0 | 19.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 73 | (7-9) | 58 | 60 | (1-3) | (1-3) |
| % | 36.1 | | 28.7 | 29.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 140 | 62 | 61 | (1-3) | 0 | |
| % | 69.3 | 30.7 | 30.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 19 | (7-9) | 76 | 99 | | |
| % | 9.4 | | 37.6 | 49.0 | | |

273 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | (7-9) | (1-3) | 97.4 | 90.9 | 81.9 | 95.6 | 62.1 |
| I期 | 34 | (1-3) | (1-3) | 97.1 | 97.1 | 80.9 | 99.6 | 62.4 |
| II期 | 32 | (1-3) | (1-3) | 96.9 | 96.8 | 79.2 | 99.5 | 60.9 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 69.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 55.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 78 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 17 | 27 | 12 | 10 | | |
| % | 15.4 | 21.8 | 34.6 | 15.4 | 12.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 34 | 32 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 43.6 | 41.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 70 | 69 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 89.7 | 88.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | 0 | (7-9) | 53 | | | |
| % | 23.1 | | | 67.9 | | | |

274 日本赤十字社 長崎原爆病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

274 日本赤十字社 長崎原爆病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 146 | 69 | (4-6) | 97.3 | 51.8 | 43.3 | 59.6 | 71.1 |
| I期 | 88 | 22 | (1-3) | 97.7 | 74.6 | 64.1 | 82.5 | 72.7 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 83.0 |
| III期 | 12 | (7-9) | (1-3) | | | | | 75.3 |
| IV期 | 36 | 35 | (1-3) | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 101 | 45 | | | | | |
| % | 69.2 | 30.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 38 | 58 | 28 | | |
| % | | 11.0 | 26.0 | 39.7 | 19.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 88 | (7-9) | 12 | 36 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 60.3 | | 8.2 | 24.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 118 | 107 | 11 | 0 | | |
| % | 19.2 | 80.8 | 73.3 | 7.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | (4-6) | 48 | 79 | | | |
| % | 9.6 | | 32.9 | 54.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 179 | 83 | (4-6) | 97.2 | 53.0 | 45.4 | 60.1 | 70.3 |
| I期 | 35 | (7-9) | 0 | 100.0 | 77.1 | 59.5 | 87.9 | 72.8 |
| II期 | 59 | 15 | (1-3) | 94.9 | 73.7 | 60.2 | 83.2 | 70.2 |
| III期 | 42 | 22 | (1-3) | 95.2 | 47.1 | 31.4 | 61.2 | 69.0 |
| IV期 | 32 | 28 | 0 | 100.0 | 12.5 | 4.0 | 26.2 | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 86 | 93 | | | | | |
| % | 48.0 | 52.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 29 | 37 | 63 | 42 | | |
| % | | 16.2 | 20.7 | 35.2 | 23.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 35 | 59 | 42 | 32 | (7-9) | (4-6) | |
| % | 19.6 | 33.0 | 23.5 | 17.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 164 | 139 | 24 | (1-3) | | |
| % | 8.4 | 91.6 | 77.7 | 13.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | 60 | 102 | | | |
| % | 5.6 | | 33.5 | 57.0 | | | |

274 日本赤十字社 長崎原爆病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 46 | 25 | (1-3) | 93.5 | 42.9 | 28.1 | 56.9 | 71.5 |
| I期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.2 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 71.5 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 81.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 34 | 12 | | | | | |
| % | 73.9 | 26.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 10 | 19 | 10 | | |
| % | | | 21.7 | 41.3 | 21.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 22 | 10 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | 47.8 | 21.7 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 0 | 25 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | 23.9 | | 54.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| % | 69.6 | 30.4 | 30.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 29 | 12 | | | |
| % | | | 63.0 | 26.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 286 | 154 | (7-9) | 97.6 | 45.7 | 39.8 | 51.4 | 71.0 |
| I期 | 149 | 40 | (4-6) | 96.0 | 72.7 | 64.7 | 79.2 | 70.6 |
| II期 | 13 | 10 | 0 | | | | | 68.7 |
| III期 | 51 | 35 | (1-3) | 98.0 | 30.7 | 18.6 | 43.6 | 71.9 |
| IV期 | 67 | 64 | 0 | 100.0 | 4.5 | 1.2 | 11.4 | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 183 | 103 | 対象数 | 24 | 262 | | |
| % | 64.0 | 36.0 | % | 8.4 | 91.6 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 33 | 87 | 89 | 71 | | |
| % | | 11.5 | 30.4 | 31.1 | 24.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 149 | 13 | 51 | 67 | (4-6) | 0 | |
| % | 52.1 | 4.5 | 17.8 | 23.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 122 | 164 | 159 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 42.7 | 57.3 | 55.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 37 | 16 | 126 | 107 | | | |
| % | 12.9 | 5.6 | 44.1 | 37.4 | | | |

274 日本赤十字社 長崎原爆病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 209 | 25 | (4-6) | 97.6 | 87.9 | 82.7 | 91.7 | 61.3 |
| I期 | 95 | (4-6) | (1-3) | 97.9 | 95.8 | 89.1 | 98.4 | 60.9 |
| II期 | 71 | (4-6) | (1-3) | 97.2 | 94.3 | 85.5 | 97.8 | 59.5 |
| III期 | 28 | (7-9) | (1-3) | | | | | 58.3 |
| IV期 | 14 | (7-9) | 0 | | | | | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 209 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 48 | 54 | 45 | 38 | 24 | | |
| % | 23.0 | 25.8 | 21.5 | 18.2 | 11.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 95 | 71 | 28 | 14 | 0 | (1-3) | |
| % | 45.5 | 34.0 | 13.4 | 6.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 196 | 174 | 18 | (4-6) | | |
| % | 6.2 | 93.8 | 83.3 | 8.6 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | (4-6) | 39 | 123 | | | |
| % | 20.1 | | 18.7 | 58.9 | | | |

275 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
2011年のみ

コメント:

当院の集計結果は、2011年にがんと診断された症例1か年分のデータを表しているため、他施設の2010年及び2011年の2か年分のデータと比較すると、症例数が少なくなっています。

また、当院は医療圏の範囲が広く、進行がんの方や、高齢者、併存疾患の合併率が高いのが特徴です。生存率は、そういった背景や、対象となる症例数に大きく影響されます。なお、本集計結果はがん以外の死因も含まれているため、単純に他施設との比較はできませんのでご注意ください。

【胃】

当院の胃癌患者さんは、検診での発見率が16.7%であり、長崎（11.9%）、全国（10.2%）と比較しても高いことから、早期癌であるⅠ期が全体の6割を占めていることが特徴です。（156件中94件）

なお、Ⅰ期の生存率は、82.5%と、全国値（Ⅰ期：81.3%）と比較しても遜色ない結果といえます。

【大腸】

大腸癌のⅠ期は当院89.2%であり、90%近い結果となっています。これは、全国値（Ⅰ期：83.4%）、長崎県（Ⅰ期：83.2%）と比較しても高い数値といえます。

【肝】

当院の肝癌患者さんは、平均年齢が72.5歳であり、全国値（70.2歳）と比べても高齢者の方が多いことや、併存疾患の合併率が高いことなどが生存率に大きく影響されています。今後は、2018年に立ち上げた肝臓センターを中心に、IVR専門医など、各専門医による集学的治療にあたっていることから、治療成績も向上されると思われます。

【肺】

当医療圏の特徴として、高齢化率が高いこと、肺癌検診受診率が低いことがあります。したがって、当院で取り扱う肺癌患者さんは、進行度が高く、高齢であり、併存疾患が多いことが特徴となっています。本対象年度の肺癌切除率は約34%と全国平均より低いことにも現れており、全ステージで5年生存率が低めになっています。これらの生存率のデータには、手術できない症例、外科的治療も内科的治療もできない症例、他病死などが全て含まれており、一律に比較できるデータではないことにご留意ください。

なお、現在は、分子標的薬や免疫療法など治療法は進歩しているため成績は向上されると思われます。

【乳腺】

対象となった症例数が少なく、Ⅰ期のみの集計結果となっていますが、当院は、Ⅰ期が89.2%であり、長崎県（Ⅰ期：92.4%）と比較しても遜色ない結果といえます。

275 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 156 | 67 | 12 | 92.3 | 55.9 | 47.6 | 63.4 | 71.4 |
| I期 | 94 | 16 | (7-9) | 90.4 | 82.5 | 73.1 | 88.9 | 70.3 |
| II期 | 13 | 12 | (1-3) | | | | | 75.5 |
| III期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 75.5 |
| IV期 | 31 | 28 | (1-3) | 96.8 | 7.2 | 1.3 | 20.3 | 70.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 106 | 50 | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 40 | 63 | 34 | | |
| % | | 9.6 | 25.6 | 40.4 | 21.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 94 | 13 | 11 | 31 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 60.3 | 8.3 | 7.1 | 19.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 125 | 121 | (4-6) | 0 | | |
| % | 19.9 | 80.1 | 77.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 26 | (4-6) | 13 | 113 | | | |
| % | 16.7 | | 8.3 | 72.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 185 | 72 | (7-9) | 96.2 | 60.3 | 52.7 | 67.0 | 70.3 |
| I期 | 38 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 89.2 | 73.7 | 95.8 | 71.2 |
| II期 | 59 | 15 | (1-3) | 94.9 | 73.6 | 60.1 | 83.2 | 71.4 |
| III期 | 46 | 17 | (1-3) | 95.7 | 62.5 | 46.8 | 74.8 | 70.8 |
| IV期 | 34 | 30 | 0 | 100.0 | 11.8 | 3.7 | 24.9 | 67.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 100 | 85 | | | | | |
| % | 54.1 | 45.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 44 | 70 | 38 | | |
| % | | 14.6 | 23.8 | 37.8 | 20.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 59 | 46 | 34 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 20.5 | 31.9 | 24.9 | 18.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 161 | 153 | (7-9) | 0 | | |
| % | 13.0 | 87.0 | 82.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | (4-6) | 24 | 137 | | | |
| % | 10.8 | | 13.0 | 74.1 | | | |

275 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 47 | 32 | (4-6) | 91.5 | 28.9 | 16.4 | 42.6 | 72.5 |
| I期 | 19 | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.6 |
| II期 | 16 | 13 | 0 | | | | | 74.0 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | (1-3) | | | | | 72.1 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 64.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 33 | 14 | | | | | | |
| % | 70.2 | 29.8 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 10 | 23 | 11 | | | |
| % | | | 21.3 | 48.9 | 23.4 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 19 | 16 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 40.4 | 34.0 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 10 | 22 | (4-6) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | 21.3 | 46.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 31 | 16 | 16 | 0 | 0 | | | |
| % | 66.0 | 34.0 | 34.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 10 | 37 | | | | |
| % | | | 21.3 | 78.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 149 | 104 | 10 | 93.3 | 25.8 | 18.8 | 33.3 | 71.0 |
| I期 | 47 | 19 | 0 | 100.0 | 59.6 | 44.2 | 72.0 | 71.4 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 74.7 |
| III期 | 33 | 28 | (1-3) | 90.9 | 7.0 | 1.2 | 19.9 | 69.5 |
| IV期 | 57 | 47 | (7-9) | 87.7 | 6.6 | 1.7 | 16.2 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 101 | 48 | 対象数 | 16 | 133 | | | |
| % | 67.8 | 32.2 | % | 10.7 | 89.3 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 44 | 67 | 23 | | | |
| % | | 7.4 | 29.5 | 45.0 | 15.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 47 | (7-9) | 33 | 57 | (4-6) | 0 | | |
| % | 31.5 | | 22.1 | 38.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 99 | 50 | 50 | 0 | 0 | | | |
| % | 66.4 | 33.6 | 33.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 13 | (4-6) | 17 | 113 | | | | |
| % | 8.7 | | 11.4 | 75.8 | | | | |

275 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | 13 | (1-3) | 97.3 | 81.8 | 70.8 | 89.0 | 62.8 |
| I期 | 38 | (4-6) | (1-3) | 97.4 | 89.2 | 73.7 | 95.8 | 65.6 |
| II期 | 24 | (1-3) | (1-3) | | | | | 58.7 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 63.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 52.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 73 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 12 | 25 | 14 | (7-9) | | |
| % | 19.2 | 16.4 | 34.2 | 19.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 24 | 10 | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 52.1 | 32.9 | 13.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 65 | 65 | 0 | 0 | | |
| % | | 89.0 | 89.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (1-3) | (4-6) | 49 | | | |
| % | 26.0 | | | 67.1 | | | |

276 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

276 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 334 | 107 | 16 | 95.2 | 67.3 | 62.0 | 72.1 | 68.9 |
| I期 | 241 | 44 | 11 | 95.4 | 81.4 | 75.8 | 85.8 | 68.7 |
| II期 | 24 | (7-9) | 0 | | | | | 67.3 |
| III期 | 15 | 13 | 0 | | | | | 68.4 |
| IV期 | 48 | 42 | (4-6) | 91.7 | 6.9 | 1.8 | 16.9 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 221 | 113 | | | | | |
| % | 66.2 | 33.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 25 | 46 | 90 | 105 | 68 | | |
| % | 7.5 | 13.8 | 26.9 | 31.4 | 20.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 241 | 24 | 15 | 48 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 72.2 | 7.2 | 4.5 | 14.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 301 | 265 | 13 | 23 | | |
| % | 9.9 | 90.1 | 79.3 | 3.9 | 6.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 55 | 28 | 84 | 167 | | | |
| % | 16.5 | 8.4 | 25.1 | 50.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 239 | 69 | 10 | 95.8 | 70.4 | 64.1 | 75.8 | 69.5 |
| I期 | 74 | 10 | (1-3) | 95.9 | 86.2 | 75.9 | 92.4 | 70.5 |
| II期 | 67 | (7-9) | (4-6) | 94.0 | 87.5 | 76.6 | 93.5 | 70.1 |
| III期 | 57 | 22 | (1-3) | 94.7 | 60.2 | 46.0 | 71.7 | 69.6 |
| IV期 | 32 | 27 | 0 | 100.0 | 15.6 | 5.7 | 30.0 | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 130 | 109 | | | | | |
| % | 54.4 | 45.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 19 | 33 | 53 | 74 | 60 | | |
| % | 7.9 | 13.8 | 22.2 | 31.0 | 25.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 74 | 67 | 57 | 32 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 31.0 | 28.0 | 23.8 | 13.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 226 | 193 | 11 | 22 | | |
| % | 5.4 | 94.6 | 80.8 | 4.6 | 9.2 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | 12 | 43 | 142 | | | |
| % | 17.6 | 5.0 | 18.0 | 59.4 | | | |

276 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 175 | 92 | (4-6) | 96.6 | 46.7 | 39.0 | 53.9 | 69.2 |
| I期 | 82 | 25 | (1-3) | 97.6 | 69.1 | 57.8 | 78.0 | 67.3 |
| II期 | 55 | 32 | (4-6) | 92.7 | 39.6 | 26.5 | 52.4 | 70.6 |
| III期 | 27 | 24 | 0 | | | | | 66.2 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 65.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|-------|
| 対象数 | 119 | 56 | | | | | |
| % | 68.0 | 32.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 31 | 49 | 61 | 31 | | |
| % | | 17.7 | 28.0 | 34.9 | 17.7 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 82 | 55 | 27 | 10 | 0 | (1-3) |
| | % | 46.9 | 31.4 | 15.4 | 5.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 48 | 66 | 32 | 28 | 0 | (1-3) |
| | % | 27.4 | 37.7 | 18.3 | 16.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 104 | 71 | 41 | (4-6) | 24 | | |
| % | 59.4 | 40.6 | 23.4 | | 13.7 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 127 | 40 | | | |
| % | | | 72.6 | 22.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 241 | 154 | (4-6) | 97.9 | 35.3 | 29.3 | 41.4 | 70.8 |
| I期 | 88 | 26 | (4-6) | 95.5 | 69.7 | 58.8 | 78.3 | 69.8 |
| II期 | 18 | 12 | 0 | | | | | 70.1 |
| III期 | 68 | 51 | (1-3) | 98.5 | 23.9 | 14.5 | 34.6 | 71.9 |
| IV期 | 64 | 63 | 0 | 100.0 | 1.6 | 0.1 | 7.4 | 71.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 171 | 70 | 対象数 | 22 | 219 | | |
| % | 71.0 | 29.0 | % | 9.1 | 90.9 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 72 | 97 | 47 | | |
| % | | 7.9 | 29.9 | 40.2 | 19.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 88 | 18 | 68 | 64 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 36.5 | 7.5 | 28.2 | 26.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 120 | 121 | 69 | (4-6) | 48 | | |
| % | 49.8 | 50.2 | 28.6 | | 19.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 36 | 98 | 100 | | | |
| % | | 14.9 | 40.7 | 41.5 | | | |

276 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 208 | 32 | (1-3) | 99.0 | 84.5 | 78.8 | 88.8 | 56.9 |
| I期 | 90 | (7-9) | (1-3) | 98.9 | 92.2 | 84.2 | 96.2 | 58.1 |
| II期 | 91 | 10 | (1-3) | 98.9 | 88.9 | 80.4 | 93.9 | 57.5 |
| III期 | 18 | (7-9) | 0 | | | | | 60.9 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 53.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 208 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 57 | 59 | 64 | 22 | (4-6) | | |
| % | 27.4 | 28.4 | 30.8 | 10.6 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 90 | 91 | 18 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 43.3 | 43.8 | 8.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 191 | 14 | (1-3) | 175 | | |
| % | 8.2 | 91.8 | 6.7 | | 84.1 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 60 | (1-3) | 15 | 131 | | | |
| % | 28.8 | | 7.2 | 63.0 | | | |

277 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター
2011年のみ

コメント:

特になし

277 胃
 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 112 | 54 | (7-9) | 93.8 | 50.0 | 40.2 | 59.0 | 72.4 |
| I期 | 67 | 25 | (1-3) | 95.5 | 61.7 | 48.8 | 72.3 | 73.2 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 68.1 |
| III期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.1 |
| IV期 | 19 | 19 | 0 | | | | | 73.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 80 | 32 | | | | | |
| % | 71.4 | 28.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 22 | 45 | 31 | | |
| % | | 8.9 | 19.6 | 40.2 | 27.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 67 | 10 | 10 | 19 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 59.8 | 8.9 | 8.9 | 17.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 98 | 93 | (4-6) | 0 | | |
| % | 12.5 | 87.5 | 83.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 42 | 60 | | | |
| % | | | 37.5 | 53.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 103 | 38 | (4-6) | 94.2 | 62.6 | 52.4 | 71.2 | 71.2 |
| I期 | 18 | (1-3) | (1-3) | | | | | 70.1 |
| II期 | 34 | (7-9) | (1-3) | 97.1 | 73.5 | 55.3 | 85.3 | 72.3 |
| III期 | 36 | 15 | (1-3) | 94.4 | 57.4 | 39.5 | 71.8 | 70.1 |
| IV期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 55 | 48 | | | | | |
| % | 53.4 | 46.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 25 | 44 | 20 | | |
| % | | 10.7 | 24.3 | 42.7 | 19.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 18 | 34 | 36 | 12 | (1-3) | 0 | |
| % | 17.5 | 33.0 | 35.0 | 11.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 97 | 89 | (7-9) | 0 | | |
| % | | 94.2 | 86.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 22 | 73 | | | |
| % | | | 21.4 | 70.9 | | | |

277 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 37 | 21 | (1-3) | 94.6 | 42.7 | 26.6 | 57.9 | 71.4 |
| I期 | 25 | 13 | (1-3) | | | | | 73.4 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 67.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 67.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 51.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|--|
| 対象数 | 20 | 17 | | | | | | |
| % | 54.1 | 45.9 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 14 | 11 | (7-9) | | | |
| % | | | 37.8 | 29.7 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 25 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | 67.6 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 15 | 15 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | 40.5 | 40.5 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 29 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 78.4 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 24 | 11 | | | | |
| % | | | 64.9 | 29.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 100 | 66 | 0 | 100.0 | 34.0 | 24.9 | 43.3 | 74.2 |
| I期 | 49 | 19 | 0 | 100.0 | 61.2 | 46.2 | 73.2 | 73.2 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 77.3 |
| III期 | 14 | 13 | 0 | | | | | 74.9 |
| IV期 | 28 | 28 | 0 | | | | | 74.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 71 | 29 | 対象数 | | 11 | 89 |
| % | 71.0 | 29.0 | % | | 11.0 | 89.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 24 | 47 | 26 | |
| % | | | 24.0 | 47.0 | 26.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 49 | (7-9) | 14 | 28 | (1-3) | 0 |
| % | 49.0 | | 14.0 | 28.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 48 | 52 | 51 | (1-3) | 0 | |
| % | 48.0 | 52.0 | 51.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 60 | 36 | | |
| % | | | 60.0 | 36.0 | | |

277 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 43 | (7-9) | (1-3) | 95.3 | 81.0 | 65.5 | 90.0 | 63.4 |
| I期 | 24 | (1-3) | (1-3) | | | | | 60.7 |
| II期 | 12 | (1-3) | (1-3) | | | | | 65.8 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 69.3 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 43 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 12 | (4-6) | (7-9) | | |
| % | | 30.2 | 27.9 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 12 | (1-3) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 55.8 | 27.9 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 39 | 35 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 90.7 | 81.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 32 | | | |
| % | | | | 74.4 | | | |

278

長崎大学病院

2010-2011年2力年

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う「都道府県がん診療連携拠点病院」であり、高度先進医療を担う「特定機能病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行なっています。従って、がん以外の疾患を患っている方などが多い現状があります。生存率には、そういった併存症や合併症などの要因も大きく影響しますので、単純に他施設との成績を比較することはできませんのでご注意ください。

ご覧いただいた方におかれましては、生存率の数値に限らず、がんについて何か不安なことなどありましたらまずはかかりつけ医やがん診療連携拠点病院にご相談ください。

278 長崎大学病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 453 | 135 | (7-9) | 98.5 | 69.9 | 65.4 | 73.9 | 70.0 |
| I期 | 359 | 70 | (7-9) | 98.1 | 80.2 | 75.7 | 84.0 | 72.0 |
| II期 | 25 | 11 | 0 | | | | | 70.4 |
| III期 | 19 | 13 | 0 | | | | | 69.9 |
| IV期 | 43 | 37 | 0 | 100.0 | 14.0 | 5.7 | 25.9 | 65.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 317 | 136 | | | | | |
| % | 70.0 | 30.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 24 | 55 | 124 | 142 | 108 | | |
| % | 5.3 | 12.1 | 27.4 | 31.3 | 23.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 359 | 25 | 19 | 43 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 79.2 | 5.5 | 4.2 | 9.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 403 | 373 | 17 | 13 | | |
| % | 11.0 | 89.0 | 82.3 | 3.8 | 2.9 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 42 | 67 | 161 | 183 | | | |
| % | 9.3 | 14.8 | 35.5 | 40.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 346 | 108 | (7-9) | 98.0 | 68.4 | 63.2 | 73.0 | 67.7 |
| I期 | 107 | 13 | (4-6) | 96.3 | 87.5 | 79.4 | 92.5 | 69.7 |
| II期 | 78 | 19 | (1-3) | 97.4 | 75.3 | 64.1 | 83.5 | 70.6 |
| III期 | 87 | 24 | (1-3) | 98.9 | 72.3 | 61.5 | 80.5 | 68.8 |
| IV期 | 61 | 47 | 0 | 100.0 | 23.0 | 13.4 | 34.1 | 65.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 192 | 154 | | | | | |
| % | 55.5 | 44.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 67 | 82 | 109 | 61 | | |
| % | 7.8 | 19.4 | 23.7 | 31.5 | 17.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 107 | 78 | 87 | 61 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 30.9 | 22.5 | 25.1 | 17.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 307 | 282 | 20 | (4-6) | | |
| % | 11.3 | 88.7 | 81.5 | 5.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 38 | 114 | 187 | | | |
| % | | 11.0 | 32.9 | 54.0 | | | |

278 長崎大学病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 175 | 103 | (1-3) | 99.4 | 41.1 | 33.8 | 48.3 | 70.4 |
| I期 | 64 | 23 | (1-3) | 98.4 | 64.0 | 51.0 | 74.4 | 69.7 |
| II期 | 53 | 31 | 0 | 100.0 | 41.5 | 28.2 | 54.3 | 72.7 |
| III期 | 45 | 37 | 0 | 100.0 | 17.8 | 8.3 | 30.1 | 71.7 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 118 | 57 | | | | | |
| % | 67.4 | 32.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 47 | 70 | 36 | | |
| % | | 8.0 | 26.9 | 40.0 | 20.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 64 | 53 | 45 | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
| | % | 36.6 | 30.3 | 25.7 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 25 | 64 | 46 | 31 | (4-6) | (1-3) |
| | % | 14.3 | 36.6 | 26.3 | 17.7 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 90 | 85 | 77 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 51.4 | 48.6 | 44.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 129 | 39 | | | |
| % | | | 73.7 | 22.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 418 | 224 | (4-6) | 98.8 | 46.0 | 41.1 | 50.7 | 68.9 |
| I期 | 227 | 72 | (4-6) | 98.2 | 67.8 | 61.3 | 73.5 | 70.8 |
| II期 | 17 | 10 | 0 | | | | | 71.4 |
| III期 | 86 | 59 | (1-3) | 98.8 | 31.2 | 21.7 | 41.1 | 67.3 |
| IV期 | 86 | 81 | 0 | 100.0 | 5.8 | 2.2 | 12.1 | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 283 | 135 | 対象数 | | 22 | 396 |
| % | 67.7 | 32.3 | % | | 5.3 | 94.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 14 | 52 | 145 | 152 | 55 | |
| % | 3.3 | 12.4 | 34.7 | 36.4 | 13.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 227 | 17 | 86 | 86 | (1-3) | (1-3) |
| % | 54.3 | 4.1 | 20.6 | 20.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 185 | 233 | 221 | (4-6) | (7-9) | |
| % | 44.3 | 55.7 | 52.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 10 | 55 | 216 | 137 | | |
| % | 2.4 | 13.2 | 51.7 | 32.8 | | |

278 長崎大学病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 171 | 23 | (1-3) | 98.2 | 86.4 | 80.2 | 90.7 | 59.4 |
| I期 | 65 | (4-6) | (1-3) | 98.5 | 90.6 | 80.3 | 95.7 | 61.2 |
| II期 | 57 | (1-3) | (1-3) | 98.2 | 94.6 | 84.3 | 98.2 | 62.7 |
| III期 | 29 | (4-6) | (1-3) | | | | | 61.5 |
| IV期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 57.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 171 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 44 | 48 | 41 | 22 | 16 | | |
| % | 25.7 | 28.1 | 24.0 | 12.9 | 9.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 65 | 57 | 29 | 19 | 0 | (1-3) | |
| % | 38.0 | 33.3 | 17.0 | 11.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 146 | 132 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 77.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | 10 | 29 | 104 | | | |
| % | 16.4 | 5.8 | 17.0 | 60.8 | | | |

279

長崎県島原病院

2010-2011年2力年

コメント:

当院は長崎県南部のうち島原半島を中心として、がん診療を担う「地域がん診療連携拠点病院」です。本院の検査等ではがんが確認された患者のほか、地域の診療所からがんの疑いがある患者等を紹介していただき、診療を行っています。高齢者やがん以外の疾患を持つ患者も多く、がんの進行度や症例数が少ないがん種等の要因もあることから、生存率を他院と比較することは困難です。

279 長崎県島原病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 122 | 60 | (1-3) | 99.2 | 50.7 | 41.5 | 59.2 | 74.0 |
| I期 | 65 | 20 | (1-3) | 98.5 | 69.0 | 56.2 | 78.8 | 73.2 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 76.0 |
| IV期 | 30 | 25 | 0 | 100.0 | 16.7 | 6.1 | 31.8 | 74.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 72 | 50 | | | | | |
| % | 59.0 | 41.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 24 | 48 | 38 | | |
| % | | | 19.7 | 39.3 | 31.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 65 | (7-9) | 11 | 30 | (7-9) | 0 | |
| % | 53.3 | | 9.0 | 24.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 86 | 76 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | 29.5 | 70.5 | 62.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | (7-9) | 66 | 36 | | | |
| % | 10.7 | | 54.1 | 29.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 161 | 70 | (1-3) | 98.8 | 56.1 | 48.0 | 63.4 | 72.2 |
| I期 | 42 | 13 | (1-3) | 97.6 | 68.4 | 51.8 | 80.3 | 70.4 |
| II期 | 41 | (4-6) | 0 | 100.0 | 85.4 | 70.3 | 93.1 | 71.7 |
| III期 | 36 | 15 | 0 | 100.0 | 58.3 | 40.7 | 72.4 | 71.6 |
| IV期 | 28 | 27 | 0 | | | | | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 88 | 73 | | | | | |
| % | 54.7 | 45.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 38 | 63 | 40 | | |
| % | | 9.3 | 23.6 | 39.1 | 24.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | 41 | 36 | 28 | 13 | (1-3) | |
| % | 26.1 | 25.5 | 22.4 | 17.4 | 8.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 132 | 104 | (7-9) | 19 | | |
| % | 18.0 | 82.0 | 64.6 | | 11.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 17 | (4-6) | 59 | 81 | | | |
| % | 10.6 | | 36.6 | 50.3 | | | |

279 長崎県島原病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 21 | 20 | 0 | | | | | 76.1 |
| I期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 62.7 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 83.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 14 | (7-9) | | | | | |
| % | 66.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | 10 | (7-9) | | |
| % | | | | 47.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | 81.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 15 | (4-6) | | | |
| % | | | 71.4 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 104 | 73 | (1-3) | 98.1 | 28.9 | 20.5 | 37.9 | 75.6 |
| I期 | 42 | 22 | (1-3) | 95.2 | 45.7 | 30.0 | 60.1 | 80.3 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 77.4 |
| III期 | 17 | 14 | 0 | | | | | 77.3 |
| IV期 | 31 | 28 | 0 | 100.0 | 9.7 | 2.5 | 22.9 | 72.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 67 | 37 | 対象数 | | (1-3) | 101 |
| % | 64.4 | 35.6 | % | | | 97.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 18 | 30 | 47 | |
| % | | | 17.3 | 28.8 | 45.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 42 | (4-6) | 17 | 31 | (7-9) | 0 |
| % | 40.4 | | 16.3 | 29.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 103 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 99.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 54 | 39 | | |
| % | | | 51.9 | 37.5 | | |

279 長崎県島原病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | 17 | (1-3) | 98.7 | 78.2 | 67.3 | 85.8 | 66.1 |
| I期 | 36 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.9 | 73.1 | 95.7 | 66.0 |
| II期 | 23 | (1-3) | (1-3) | | | | | 65.8 |
| III期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 65.2 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 78 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | 21 | 19 | 13 | | |
| % | | 20.5 | 26.9 | 24.4 | 16.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 23 | 11 | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 46.2 | 29.5 | 14.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 69 | 57 | (1-3) | 10 | | |
| % | | 88.5 | 73.1 | | 12.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | 0 | 10 | 49 | | | |
| % | 24.4 | | 12.8 | 62.8 | | | |

280 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

当院で診療を行った胃、大腸、肺、乳房のがん患者さんの平均年齢は、全国平均と比べやや高い傾向にありました。

当院での胃、大腸、肺、乳房のがん患者さんの生存率が全国平均と比べやや低い傾向にありましたが上記の様な背景がその要因になっているものと考えられます。

280 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 81 | 34 | (1-3) | 98.8 | 58.0 | 46.5 | 67.9 | 71.1 |
| I期 | 49 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 81.6 | 67.6 | 90.0 | 71.4 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 70.1 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.6 |
| IV期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 50 | 31 | | | | | |
| % | 61.7 | 38.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 16 | 33 | 20 | | |
| % | | | 19.8 | 40.7 | 24.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | (7-9) | (7-9) | 17 | 0 | 0 | |
| % | 60.5 | | | 21.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 62 | 59 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 23.5 | 76.5 | 72.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | 24 | 43 | | | |
| % | 14.8 | | 29.6 | 53.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 93 | 37 | (4-6) | 94.6 | 59.0 | 48.1 | 68.4 | 71.9 |
| I期 | 20 | (4-6) | (1-3) | | | | | 73.2 |
| II期 | 24 | (7-9) | (1-3) | | | | | 77.1 |
| III期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.4 |
| IV期 | 17 | 14 | 0 | | | | | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 58 | 35 | | | | | |
| % | 62.4 | 37.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 15 | 19 | 27 | 30 | | |
| % | | 16.1 | 20.4 | 29.0 | 32.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 20 | 24 | 27 | 17 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 21.5 | 25.8 | 29.0 | 18.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 17 | 76 | 76 | 0 | 0 | | |
| % | 18.3 | 81.7 | 81.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (4-6) | 23 | 54 | | | |
| % | 12.9 | | 24.7 | 58.1 | | | |

280 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 19 | 16 | (1-3) | | | | | 71.6 |
| I期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 71.5 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 13 | (4-6) | | | | | | |
| % | 68.4 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 10 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 52.6 | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | 10 | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | | 52.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 17 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 89.5 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 13 | (4-6) | | | | |
| % | | | 68.4 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 73 | 52 | 0 | 100.0 | 28.8 | 18.9 | 39.4 | 73.7 |
| I期 | 34 | 16 | 0 | 100.0 | 52.9 | 35.1 | 68.0 | 73.1 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.2 |
| III期 | 17 | 16 | 0 | | | | | 72.9 |
| IV期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 74.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 対象数 | 53 | 20 | 対象数 | | (4-6) | 67 | | |
| % | 72.6 | 27.4 | % | | | 91.8 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 13 | 31 | 21 | | | |
| % | | | 17.8 | 42.5 | 28.8 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 34 | (4-6) | 17 | 16 | 0 | 0 | | |
| % | 46.6 | | 23.3 | 21.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 48 | 25 | 25 | 0 | 0 | | | |
| % | 65.8 | 34.2 | 34.2 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 38 | 23 | | | | |
| % | | | 52.1 | 31.5 | | | | |

280 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 49 | 10 | (1-3) | 93.9 | 78.6 | 63.8 | 87.9 | 65.6 |
| I期 | 24 | (1-3) | (1-3) | | | | | 63.7 |
| II期 | 14 | (1-3) | (1-3) | | | | | 65.1 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.1 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 54.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 49 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | (7-9) | (7-9) | 10 | | |
| % | | 32.7 | | | 20.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 14 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 49.0 | 28.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 42 | 40 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 85.7 | 81.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | (1-3) | (7-9) | 27 | | | |
| % | 24.5 | | | 55.1 | | | |

熊本大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

| | | | |
|--|------|--------------------|--------------------------|
| 2010-2011年5年実測生存率集計 | | | |
| 【全部位】 | | | |
| 対象数 | 3924 | 熊本県に占める本院の対象数 | 32.0% |
| 死亡数 | 1385 | 熊本県に占める本院の死亡数 | 27.3% |
| 【5大部位】 | | | |
| 対象数 | 1491 | 全部位に占める本院の5大部位の対象数 | 38.0% (全国52.2%・熊本県47.4%) |
| 死亡数 | 566 | 全部位に占める本院の5大部位の死亡数 | 40.9% (全国53.2%・熊本県50.9%) |
| 【5大部位以外】 | | | |
| 対象数 | 2433 | 死亡数 | 819 |
| <p>本院は熊本県の中心部に位置し、県内唯一の特定機能病院の承認を得た医療機関である。特徴として県内全域及び隣県の患者や、種々のがん腫の診療を行っている。</p> <p>熊本県の2010-2011年5年生存率集計対象9施設における、本院の対象者割合は5大部位で25.7% (本院の5大部位の割合としては胃が18.4%、大腸が12.9%、肝が43.8%、肺が29.8%、乳房が42.3%)、5大部位以外では37.7%であった。この集計から、本院は5大部位以外の腫瘍を多く診療しており、希少がんや他施設での標準治療が困難な方の受け入れなど、特定機能病院としての役割を果たしていることが分かる。</p> <p>実測生存率は、年齢や併存症・合併症等の影響を強く受けるため罹患時にすでに慢性疾患などを有する併存症がある患者や、標準治療が難しい病期の患者を受け入れるほど低くなりやすい傾向がある。また、死亡数は「がん死」とは限らず、併存症等が原因で亡くなった場合も死亡数に含まれていることを留意していただきたい。以下、部位別について述べる。</p> | | | |
| <p>【胃がん】対象数は277件 (男性206件 女性71件) であった。年代別で見ると60歳代が一番多く、性別では男性が74.4%を占めており、この割合は県内 (69.5%) や全国 (70.6%) よりも高くなっている。病期別について県内と比べると、I期の割合が2.4ポイント低く、IV期の割合が1ポイント高くなっている。胃がんの全体的な5年実測生存率が61.1% (県内61.8%・全国61.5%) と低いのは、他施設での標準治療が困難な患者を受け入れていることが要因と思われる。</p> | | | |
| <p>【大腸がん】対象数は186件 (男性118件 女性68件) であった。年代は60歳代が一番多く、性別で見ると男性63.4%の割合が高く (全国58.3%)、女性は36.6%と低かった (全国41.7%)。病期別に見るとI期32.8% (全国25.2%) とIV期30.6% (全国19.6%) が高い。5年実測生存率はI期80.5% (全国83.4%) が全国より低く、II期は79.4% (全国75.6%) と高かった。観血的治療の実施数は約8割で、そのうち原発巣・治癒切除は全国より12.1ポイント少なかった。I期の5年実測生存率が低いが、I期の97%が観血的治療を受け、原発巣・治癒非治癒不明切除数はI期1例であった。よって大腸がんI期の5年実測生存率が低いのは、併存疾患による死亡が要因と考えられる。</p> | | | |
| <p>【肝がん】対象数は331件 (男性220件 女性111件) であった。病期割合でみるとI・II期が74.0%で全国よりやや多く、III・IV期は少なかった。5年生存率はI・II・III期において全国より高く、その差はI期8.9ポイント、II期4.6ポイント、III期1.5ポイントであった。観血的治療の実施数は36.9%で全国より9.1ポイント多く、そのうち原発巣・治癒切除は8.3ポイント多かった。本院は肝疾患診療連携拠点病院の指定を受けており、肝炎等の他疾患経過観察中に肝がんを発見することも多い (72.5%が自施設で経過観察中に発見)。他施設より早期に発見し治療を行えることが5年実測生存率の高い要因と考えられる。</p> | | | |
| <p>【肺がん】対象数は459件 (男性286件 女性173件) であった。性別の割合でみると男性が62.3%で全国より6.7ポイント低く、女性は37.7%で6.7ポイント高かった。年代別で見ると50歳未満が4.8%で全国より1.4ポイント多かった。病期の割合別にみるとI期が67.1% (全国37.7%) と多く観血的治療の実施数が68.6%と全国より25.3ポイント高かった。発見経緯をみると他疾患経過観察が48.6%と全国より12.8ポイント高いことより、早期発見・早期治療が他施設より多いことが5年実測生存率の高い要因と考えられる。</p> | | | |
| <p>【乳がん (女性)】対象者数は238件であった。病期割合ではI・II期が81.6%を占めている。年代</p> | | | |

281 熊本大学医学部附属病院
2010-2011年2カ年

コメント:

別でみると50歳未満が22.7%（全国27.7）と5ポイント低いのに比べて、50歳以上においては全国より高く、その差は50歳代0.1ポイント、60歳代2.2ポイント、70歳代0.5ポイント、80歳代2.3ポイントであった。発見経緯は、他疾患の経過観察中が21.8%と全国より9.8も高いが、本院では疾患の治療前に全身精査を施行できることが要因ではないかと考えられる。

281 熊本大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 277 | 107 | (1-3) | 99.3 | 61.1 | 55.1 | 66.6 | 67.0 |
| I期 | 180 | 34 | (1-3) | 98.9 | 80.9 | 74.3 | 86.0 | 65.8 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 67.7 |
| III期 | 18 | 10 | 0 | | | | | 67.8 |
| IV期 | 52 | 50 | 0 | 100.0 | 3.9 | 0.7 | 11.7 | 61.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 206 | 71 | | | | | |
| % | 74.4 | 25.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 23 | 42 | 87 | 81 | 44 | | |
| % | 8.3 | 15.2 | 31.4 | 29.2 | 15.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 180 | 19 | 18 | 52 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 65.0 | 6.9 | 6.5 | 18.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 46 | 231 | 207 | 20 | (4-6) | | |
| % | 16.6 | 83.4 | 74.7 | 7.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 20 | 44 | 80 | 133 | | | |
| % | 7.2 | 15.9 | 28.9 | 48.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 186 | 72 | (1-3) | 98.4 | 60.7 | 53.3 | 67.4 | 66.3 |
| I期 | 61 | (7-9) | (1-3) | 98.4 | 85.0 | 73.2 | 91.9 | 70.0 |
| II期 | 31 | (4-6) | (1-3) | 93.5 | 79.4 | 59.8 | 90.2 | 67.5 |
| III期 | 29 | (7-9) | 0 | | | | | 68.0 |
| IV期 | 57 | 49 | 0 | 100.0 | 14.0 | 6.6 | 24.3 | 64.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 118 | 68 | | | | | |
| % | 63.4 | 36.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 15 | 29 | 61 | 59 | 22 | | |
| % | 8.1 | 15.6 | 32.8 | 31.7 | 11.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | 31 | 29 | 57 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 32.8 | 16.7 | 15.6 | 30.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 147 | 123 | 23 | (1-3) | | |
| % | 21.0 | 79.0 | 66.1 | 12.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 13 | 59 | 100 | | | |
| % | 7.5 | 7.0 | 31.7 | 53.8 | | | |

281 熊本大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 331 | 185 | (1-3) | 99.4 | 44.0 | 38.6 | 49.3 | 68.4 |
| I期 | 152 | 58 | (1-3) | 99.3 | 61.7 | 53.5 | 68.9 | 68.9 |
| II期 | 93 | 53 | (1-3) | 98.9 | 42.9 | 32.8 | 52.7 | 70.5 |
| III期 | 65 | 56 | 0 | 100.0 | 13.9 | 6.8 | 23.3 | 65.2 |
| IV期 | 18 | 16 | 0 | | | | | 69.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 220 | 111 | | | | | |
| % | 66.5 | 33.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 14 | 46 | 111 | 111 | 49 | | |
| % | 4.2 | 13.9 | 33.5 | 33.5 | 14.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 152 | 93 | 65 | 18 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 45.9 | 28.1 | 19.6 | 5.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 68 | 128 | 74 | 58 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 20.5 | 38.7 | 22.4 | 17.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 209 | 122 | 110 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | 63.1 | 36.9 | 33.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 240 | 65 | | | |
| % | | 6.3 | 72.5 | 19.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 459 | 166 | (4-6) | 99.1 | 63.6 | 59.0 | 67.9 | 67.8 |
| I期 | 308 | 58 | (1-3) | 99.0 | 81.0 | 76.2 | 85.0 | 68.4 |
| II期 | 19 | (7-9) | 0 | | | | | 66.5 |
| III期 | 59 | 37 | (1-3) | 98.3 | 36.5 | 24.3 | 48.7 | 69.3 |
| IV期 | 67 | 60 | 0 | 100.0 | 10.5 | 4.6 | 19.1 | 64.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 286 | 173 | 対象数 | | 27 | 432 |
| % | 62.3 | 37.7 | % | | 5.9 | 94.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 22 | 63 | 164 | 149 | 61 | |
| % | 4.8 | 13.7 | 35.7 | 32.5 | 13.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 308 | 19 | 59 | 67 | (1-3) | (4-6) |
| % | 67.1 | 4.1 | 12.9 | 14.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 144 | 315 | 299 | (7-9) | (7-9) | |
| % | 31.4 | 68.6 | 65.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 57 | 75 | 223 | 104 | | |
| % | 12.4 | 16.3 | 48.6 | 22.7 | | |

281 熊本大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 238 | 36 | (1-3) | 99.2 | 84.8 | 79.6 | 88.8 | 61.1 |
| I期 | 107 | (1-3) | (1-3) | 99.1 | 98.1 | 92.7 | 99.5 | 60.3 |
| II期 | 87 | 12 | (1-3) | 98.9 | 86.1 | 76.8 | 91.9 | 65.4 |
| III期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 62.2 |
| IV期 | 24 | 18 | 0 | | | | | 59.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 238 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 54 | 53 | 68 | 39 | 24 | | |
| % | 22.7 | 22.3 | 28.6 | 16.4 | 10.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 107 | 87 | 19 | 24 | (1-3) | 0 | |
| % | 45.0 | 36.6 | 8.0 | 10.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 213 | 191 | 14 | (7-9) | | |
| % | 10.5 | 89.5 | 80.3 | 5.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 55 | (4-6) | 52 | 125 | | | |
| % | 23.1 | | 21.8 | 52.5 | | | |

コメント:

【胃】

胃癌全体の実測生存率は、全国（61.5%）および熊本県（61.8%）に比し当院は（54.0%）という結果であった。生存率が低い結果となった要因について検討してみたところ、当院は70歳代以上が70%近く占め、生存率の高い他施設の割合（約50%）と比較すると高齢者の母集団であることが影響していることは否めない。またI期の実測生存率は、全国（81.3%）、熊本県（80.4%）に比し、当院は69.2%であった。死亡者数の死因について検討すると原病死の割合が17%で、他病死例が34%、不明が49%であった。I期症例でも、高齢、他疾患の併存等があり、観血的治療の介入ができずに経過観察となっている症例が散見され、これらの因子により平均以下の実測生存率となっている可能性が考えられた。

【大腸】

大腸癌全体の実測生存率は、全国（63.5%）および熊本県（60.5%）に比し当院は（48.5%）という非常に低い数値であった。対象数の年代別割合をみると、70歳以上が70%以上であり全国の51%という数値と比較し高齢者の多い集団であることも生存率低下につながっていることが予想された。また当院の大腸癌発見の経緯をみても、閉塞性イレウスなど、いわゆる病状が進行した状況が多く、診断時点で局所進行、遠隔転移などの予後不良因子の多い症例が多かったことも生存率低下の一因となっていることが考えられた。

【肝】

肝臓癌全体の実測生存率は、全国（35.1%）および熊本県（35.8%）に比し当院は（26.9%）という平均を下回る数値であった。対象数の年代別割合をみると、70歳以上が72.8%であり全国の57.7%という数値と比較し高齢者の多い集団であることも生存率低下につながっていることが予想された。地域の特長としてアルコールに起因した肝硬変、病状の進行した時点での発見などで観血的な根治術に至る割合が低いことも生存率低下の要因となっていることが予想された。

【肺】

当院の肺がん5年実測生存率は全体で27.4%と全国平均36.3%よりも低い数値であった。しかしI期での当院生存率は76.6%と全国平均71.2%と比較しても良好であった。全体として生存率を下けているのは、地域特性として、圧倒的に高齢患者が多く（80歳以上は全国18.2%、当院33.8%）、早期での受診例が少なく（I期全国37.7%、当院29.9%）、進行がんでの受診が多い（IV期全国30.5%、当院42.0%）ため、手術が行えた症例が少ない（全国43.3%、当院31.2%）ことが大きな原因と考えられた。当院の受診動機は検診10.8%でその他の症状等での受診が58.6%と高い特徴があるが、これは就労世代の検診受診者は熊本市内の病院を受診する傾向にあり、交通手段のない高齢者は検診を受けず、症状が出現した進行がんの状態でも地域の基幹病院を受診する傾向にあることが原因と考えられた。

【女性乳房】

5年生存率・年齢分布・ステージ分類・発見の経緯の全項目において概ね全国や熊本県の成績と同程度と考えられた。しかし、対象数にかなりの違いがあるため単純に比較するのは難しいと思われるが、強いて違いを挙げるなら、当院では60歳以上の患者数が多いことである。推測ではあるが原因は2つ考えられた。1つ目は若年層の都市部への流出による地域全体の高齢化という地方都市全体が抱える問題であり、2つ目はインターネットなどで情報を集め移動も容易である若年層は都市部の病院を受診する傾向が強いことである。乳癌は他部位の固形癌と比較してもともと予後が良く、治療ガイドラインも全国的に浸透しており生存率に極端な差は生じにくいと考えられた。

282 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 135 | 62 | (1-3) | 99.3 | 54.0 | 45.2 | 62.0 | 73.5 |
| I期 | 91 | 28 | (1-3) | 98.9 | 69.2 | 58.6 | 77.6 | 74.2 |
| II期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 71.9 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 78.4 |
| IV期 | 20 | 19 | 0 | | | | | 72.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 93 | 42 | | | | | |
| % | 68.9 | 31.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 14 | 29 | 51 | 40 | | |
| % | | 10.4 | 21.5 | 37.8 | 29.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 91 | 12 | 10 | 20 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 67.4 | 8.9 | 7.4 | 14.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 106 | 101 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 21.5 | 78.5 | 74.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 18 | 39 | 72 | | | |
| % | | 13.3 | 28.9 | 53.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 132 | 68 | 0 | 100.0 | 48.5 | 39.7 | 56.7 | 73.7 |
| I期 | 29 | (7-9) | 0 | | | | | 76.5 |
| II期 | 32 | 10 | 0 | 100.0 | 68.8 | 49.7 | 81.8 | 77.4 |
| III期 | 28 | 13 | 0 | | | | | 73.8 |
| IV期 | 37 | 33 | 0 | 100.0 | 10.8 | 3.4 | 23.1 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 73 | 59 | | | | | |
| % | 55.3 | 44.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 24 | 53 | 41 | | |
| % | | 8.3 | 18.2 | 40.2 | 31.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 32 | 28 | 37 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 22.0 | 24.2 | 21.2 | 28.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 37 | 95 | 80 | 11 | (4-6) | | |
| % | 28.0 | 72.0 | 60.6 | 8.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 12 | 36 | 84 | | | |
| % | | 9.1 | 27.3 | 63.6 | | | |

282 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 52 | 38 | 0 | 100.0 | 26.9 | 15.8 | 39.3 | 73.0 |
| I期 | 11 | (4-6) | 0 | | | | | 68.5 |
| II期 | 20 | 13 | 0 | | | | | 72.1 |
| III期 | 18 | 17 | 0 | | | | | 79.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 33 | 19 | | | | | | |
| % | 63.5 | 36.5 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 23 | 15 | | | |
| % | | | | 44.2 | 28.8 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 11 | 20 | 18 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 21.2 | 38.5 | 34.6 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| | % | | 36.5 | 23.1 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 43 | (7-9) | (7-9) | 0 | (1-3) | | | |
| % | 82.7 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 35 | 14 | | | | |
| % | | | 67.3 | 26.9 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 157 | 114 | 0 | 100.0 | 27.4 | 20.7 | 34.5 | 73.6 |
| I期 | 47 | 11 | 0 | 100.0 | 76.6 | 61.7 | 86.3 | 73.6 |
| II期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 86.0 |
| III期 | 32 | 27 | 0 | 100.0 | 15.6 | 5.7 | 30.0 | 73.9 |
| IV期 | 66 | 65 | 0 | 100.0 | 1.5 | 0.1 | 7.2 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 106 | 51 | 対象数 | | 10 | 147 | |
| % | 67.5 | 32.5 | % | | 6.4 | 93.6 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 37 | 50 | 53 | | |
| % | | 8.3 | 23.6 | 31.8 | 33.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 47 | 10 | 32 | 66 | 0 | (1-3) | |
| % | 29.9 | 6.4 | 20.4 | 42.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 108 | 49 | 46 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 68.8 | 31.2 | 29.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 46 | 92 | | | |
| % | | 10.8 | 29.3 | 58.6 | | | |

282 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 45 | (4-6) | 0 | 100.0 | 86.7 | 72.7 | 93.8 | 68.1 |
| I期 | 17 | 0 | 0 | | | | | 75.5 |
| II期 | 17 | (1-3) | 0 | | | | | 69.9 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 58.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 59.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 45 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | (7-9) | 12 | 10 | | |
| % | | 24.4 | | 26.7 | 22.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 17 | 17 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 37.8 | 37.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 33 | 25 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | 26.7 | 73.3 | 55.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 27 | | | |
| % | | | | 60.0 | | | |

283

人吉医療センター
2010－2011年2カ年

コメント:

当院の担当医療圏は熊本県の球磨地域で高齢化の進んだ地域である。今回の集計対象症例をみても80歳以上の割合が約25%であり、5部位全てにおいて全国より10%程度上回っている。これが全国と比較して生存率が低くなったことの要因のひとつとなっていると思われる。その中でも肺が最も差があったのは年齢に加え、IV期の割合が多かったことが考えられる。しかし、胃と乳房の生存率においては全国平均より高い結果となった。これは胃においてはI期の割合が73.8%、乳房ではI・II期が89.7%と早期の症例が多かったことが影響していると考えられる。

283 人吉医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 149 | 49 | (1-3) | 99.3 | 67.1 | 58.9 | 74.0 | 72.5 |
| I期 | 110 | 20 | (1-3) | 99.1 | 81.8 | 73.2 | 87.8 | 73.2 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 77.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.0 |
| IV期 | 24 | 22 | 0 | | | | | 75.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 100 | 49 | | | | | |
| % | 67.1 | 32.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 31 | 56 | 43 | | |
| % | | 9.4 | 20.8 | 37.6 | 28.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 110 | 10 | (4-6) | 24 | 0 | 0 | |
| % | 73.8 | 6.7 | | 16.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 128 | 126 | (1-3) | 0 | | |
| % | 14.1 | 85.9 | 84.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 28 | 44 | 67 | | | |
| % | 6.7 | 18.8 | 29.5 | 45.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 53 | 0 | 100.0 | 56.2 | 46.9 | 64.5 | 71.3 |
| I期 | 31 | 10 | 0 | 100.0 | 67.7 | 48.4 | 81.2 | 74.5 |
| II期 | 38 | (7-9) | 0 | 100.0 | 79.0 | 62.3 | 88.9 | 74.0 |
| III期 | 25 | 11 | 0 | | | | | 70.2 |
| IV期 | 25 | 23 | 0 | | | | | 67.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 73 | 48 | | | | | |
| % | 60.3 | 39.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 34 | 44 | 27 | | |
| % | | 10.7 | 28.1 | 36.4 | 22.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 31 | 38 | 25 | 25 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 25.6 | 31.4 | 20.7 | 20.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 100 | 93 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 17.4 | 82.6 | 76.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 20 | 16 | 82 | | | |
| % | | 16.5 | 13.2 | 67.8 | | | |

283 人吉医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 67 | 47 | (1-3) | 98.5 | 29.4 | 19.0 | 40.6 | 72.3 |
| I期 | 35 | 18 | (1-3) | 97.1 | 48.0 | 30.8 | 63.3 | 72.8 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.4 |
| III期 | 12 | 11 | 0 | | | | | 72.1 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 44.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 41 | 26 | | | | | |
| % | 61.2 | 38.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 22 | 23 | 17 | | |
| % | | | 32.8 | 34.3 | 25.4 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 35 | (7-9) | 12 | (4-6) | (4-6) | 0 |
| | % | 52.2 | | 17.9 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 12 | 28 | 11 | 10 | (4-6) | 0 |
| | % | 17.9 | 41.8 | 16.4 | 14.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 20 | 18 | (1-3) | 0 | | |
| % | 70.1 | 29.9 | 26.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 34 | 28 | | | |
| % | | | 50.7 | 41.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 98 | 74 | (1-3) | 99.0 | 24.0 | 16.0 | 32.8 | 71.6 |
| I期 | 32 | 13 | 0 | 100.0 | 59.4 | 40.5 | 74.0 | 72.4 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 48.0 |
| III期 | 24 | 21 | 0 | | | | | 69.5 |
| IV期 | 37 | 37 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|
| 対象数 | 63 | 35 | | (7-9) | 90 | |
| % | 64.3 | 35.7 | | | 91.8 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 20 | 34 | 29 | |
| % | | 11.2 | 20.4 | 34.7 | 29.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 32 | (4-6) | 24 | 37 | 0 | 0 |
| % | 32.7 | | 24.5 | 37.8 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 55 | 43 | 41 | (1-3) | 0 | |
| % | 56.1 | 43.9 | 41.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 24 | 19 | 55 | | |
| % | | 24.5 | 19.4 | 56.1 | | |

283 人吉医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 68 | (4-6) | (1-3) | 98.5 | 91.1 | 81.2 | 95.9 | 66.2 |
| I期 | 38 | (1-3) | (1-3) | 97.4 | 97.3 | 82.3 | 99.6 | 61.4 |
| II期 | 23 | (1-3) | 0 | | | | | 64.9 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 68 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 10 | 22 | 15 | 13 | | |
| % | | 14.7 | 32.4 | 22.1 | 19.1 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 23 | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 55.9 | 33.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 66 | 65 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 97.1 | 95.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | (7-9) | 45 | | | |
| % | | 16.2 | | 66.2 | | | |

284 国立病院機構 熊本医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

当院の特徴として70歳代、80歳代以上と年齢層が高いがん患者を治療しており、患者は必然的に多くの併存症を抱え、体力低下や行動能力低下を伴った者が多い。また、当院は精神科救急に取り組んでおり、県内の治療を要する精神疾患を抱えたがん患者が当院に集中する。以上の状況により、当院ではがんの標準的治療の完遂が難しいことが多い。

284 国立病院機構 熊本医療センター
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 178 | 100 | (1-3) | 98.9 | 43.5 | 36.1 | 50.7 | 73.2 |
| I期 | 100 | 32 | (1-3) | 98.0 | 67.6 | 57.4 | 75.9 | 71.5 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 82.1 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 81.5 |
| IV期 | 50 | 49 | 0 | 100.0 | 2.0 | 0.2 | 9.2 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 120 | 58 | | | | | |
| % | 67.4 | 32.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 14 | 30 | 74 | 53 | | |
| % | | 7.9 | 16.9 | 41.6 | 29.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 100 | 12 | 10 | 50 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.2 | 6.7 | 5.6 | 28.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 137 | 116 | 21 | 0 | | |
| % | 23.0 | 77.0 | 65.2 | 11.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 11 | 45 | 114 | | | |
| % | | 6.2 | 25.3 | 64.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 296 | 136 | (1-3) | 99.0 | 53.9 | 48.0 | 59.4 | 73.2 |
| I期 | 52 | 12 | 0 | 100.0 | 76.9 | 63.0 | 86.2 | 73.5 |
| II期 | 107 | 35 | (1-3) | 99.1 | 67.2 | 57.4 | 75.2 | 73.1 |
| III期 | 73 | 33 | 0 | 100.0 | 54.8 | 42.7 | 65.4 | 72.8 |
| IV期 | 60 | 54 | (1-3) | 96.7 | 8.5 | 3.1 | 17.3 | 73.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 142 | 154 | | | | | |
| % | 48.0 | 52.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 23 | 71 | 102 | 93 | | |
| % | | 7.8 | 24.0 | 34.5 | 31.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 52 | 107 | 73 | 60 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 17.6 | 36.1 | 24.7 | 20.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 267 | 232 | 32 | (1-3) | | |
| % | 9.8 | 90.2 | 78.4 | 10.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 49 | 229 | | | |
| % | | | 16.6 | 77.4 | | | |

284 国立病院機構 熊本医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 88 | 63 | (1-3) | 98.9 | 28.1 | 19.1 | 37.8 | 70.7 |
| I期 | 33 | 18 | (1-3) | 97.0 | 44.6 | 27.2 | 60.5 | 67.9 |
| II期 | 24 | 15 | 0 | | | | | 73.3 |
| III期 | 19 | 18 | 0 | | | | | 75.7 |
| IV期 | 10 | 10 | 0 | | | | | 82.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 対象数 | 66 | 22 | | | | | |
| % | 75.0 | 25.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 27 | 32 | 19 | | |
| % | | | 30.7 | 36.4 | 21.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 33 | 24 | 19 | 10 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 37.5 | 27.3 | 21.6 | 11.4 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 13 | 34 | 21 | 18 | (1-3) | (1-3) |
| | % | 14.8 | 38.6 | 23.9 | 20.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 70 | 18 | 17 | (1-3) | 0 | | |
| % | 79.5 | 20.5 | 19.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 46 | 40 | | | |
| % | | | 52.3 | 45.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 122 | 114 | (1-3) | 99.2 | 5.8 | 2.6 | 11.0 | 72.5 |
| I期 | 12 | 10 | 0 | | | | | 74.6 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 79.3 |
| III期 | 34 | 31 | 0 | 100.0 | 8.8 | 2.3 | 21.1 | 71.0 |
| IV期 | 70 | 67 | (1-3) | 98.6 | 2.9 | 0.6 | 9.1 | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 対象数 | 87 | 35 | 対象数 | 15 | 107 | |
| % | 71.3 | 28.7 | % | 12.3 | 87.7 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | (7-9) | 23 | 52 | 33 | |
| % | | | 18.9 | 42.6 | 27.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 12 | (4-6) | 34 | 70 | (1-3) | 0 |
| % | 9.8 | | 27.9 | 57.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 115 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 94.3 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 31 | 87 | | |
| % | | | 25.4 | 71.3 | | |

284 国立病院機構 熊本医療センター
 女性乳房
 5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 54 | 20 | 0 | 100.0 | 63.0 | 48.7 | 74.3 | 66.7 |
| I期 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 68.1 |
| II期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 61.0 |
| III期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 86.5 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 67.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 54 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 15 | 14 | (7-9) | | |
| % | | 24.1 | 27.8 | 25.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 20 | 15 | 13 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 37.0 | 27.8 | 24.1 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 41 | 40 | (1-3) | 0 | | |
| % | 24.1 | 75.9 | 74.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 46 | | | |
| % | | | | 85.2 | | | |

285

済生会熊本病院

2010-2011年2力年

コメント:

5部位それぞれの死因を調査したところ、すべての部位において他病死・死因不明が半数以上を占めていたため、原病死が要因となる生存率とは一概にはいえないと考える。

また、自施設の対象数に対する罹患率を年代別にみると、胃・大腸・肝・肺では60-70歳代が最も多く、それぞれ61.6%・59.6%・65.9%・65.4%であった。女性乳房では60歳代がやや多いが、年代別(50歳代-80歳以上)で大差なく、全国と比較すると60歳代以上の割合が多い。

以下、部位別に全国と自施設の比較結果である。

【胃】

自施設の実測生存率(71.5%)は、全国(61.5%)より高いといえる。I期の割合が73.9%と多数を占め、約半数は内視鏡的治療で治癒切除となっている。残りの半数に関しては、年齢的・体力的な部分を考慮し治療しなかったものを除いて、外科的・体腔鏡的治療が施行され、治癒切除であった。

【大腸】

自施設の実測生存率(64.3%)は、全国(63.5%)と比較し大差ない状況といえる。発見経緯(その他)の割合が68.3%を占め、全国と比較しても多い。内訳を確認すると、9割以上が自覚症状(血便・下痢・便秘・腹痛など)によるものであった。

【肝】

自施設の実測生存率(31.4%)は、全国(35.1%)よりやや低いといえる。生存率が低い要因として、全国と比べIV期の割合が多く、また、80歳以上の割合も多い事が影響していると考えられる。治療の選択として非観血的治療(TACE:肝動脈化学塞栓療法など)を選ぶ症例が多い。

【肺】

自施設実測生存率(43.7%)は、全国(36.3%)よりやや高いといえる。全国に比べI期の割合が多く、観血的治療により治癒切除となっている症例が多いため、生存率が高くなったと考えられる。

【女性乳房】

自施設の実測生存率(85.7%)は、全国(87.9%)と比較し大差ない状況といえる。対象症例91件中83件に対して観血的治療を行っており、すべて治癒切除となっている。

285 済生会熊本病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 545 | 150 | 39 | 92.8 | 71.5 | 67.4 | 75.2 | 68.7 |
| I期 | 403 | 46 | 31 | 92.3 | 88.0 | 84.4 | 90.9 | 68.3 |
| II期 | 30 | 17 | (1-3) | 90.0 | 41.3 | 23.4 | 58.2 | 69.8 |
| III期 | 29 | 15 | (1-3) | | | | | 62.0 |
| IV期 | 76 | 68 | (1-3) | 97.4 | 10.1 | 4.5 | 18.2 | 72.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 370 | 175 | | | | | |
| % | 67.9 | 32.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 32 | 77 | 167 | 169 | 100 | | |
| % | 5.9 | 14.1 | 30.6 | 31.0 | 18.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 403 | 30 | 29 | 76 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 73.9 | 5.5 | 5.3 | 13.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 88 | 457 | 449 | (7-9) | 0 | | |
| % | 16.1 | 83.9 | 82.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 154 | 109 | 272 | | | |
| % | 1.8 | 28.3 | 20.0 | 49.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 369 | 128 | 26 | 93.0 | 64.3 | 59.1 | 69.1 | 69.4 |
| I期 | 98 | 17 | 11 | 88.8 | 81.8 | 72.3 | 88.3 | 68.1 |
| II期 | 115 | 32 | (7-9) | 92.2 | 71.1 | 61.7 | 78.7 | 71.8 |
| III期 | 67 | 15 | (4-6) | 94.0 | 77.1 | 64.9 | 85.5 | 70.1 |
| IV期 | 68 | 60 | (1-3) | 98.5 | 10.5 | 4.6 | 19.2 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 216 | 153 | | | | | |
| % | 58.5 | 41.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 27 | 46 | 101 | 119 | 76 | | |
| % | 7.3 | 12.5 | 27.4 | 32.2 | 20.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 98 | 115 | 67 | 68 | (4-6) | 17 | |
| % | 26.6 | 31.2 | 18.2 | 18.4 | | 4.6 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 50 | 319 | 317 | (1-3) | 0 | | |
| % | 13.6 | 86.4 | 85.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 57 | 54 | 252 | | | |
| % | | 15.4 | 14.6 | 68.3 | | | |

285 済生会熊本病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 164 | 110 | 10 | 93.9 | 31.4 | 24.2 | 38.7 | 71.5 |
| I期 | 74 | 37 | (4-6) | 93.2 | 48.3 | 36.3 | 59.3 | 70.9 |
| II期 | 35 | 23 | (4-6) | 88.6 | 31.3 | 16.2 | 47.6 | 72.4 |
| III期 | 24 | 22 | 0 | | | | | 73.2 |
| IV期 | 30 | 27 | (1-3) | 96.7 | 8.9 | 1.8 | 23.1 | 68.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 121 | 43 | | | | | |
| % | 73.8 | 26.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 13 | 47 | 61 | 39 | | |
| % | | 7.9 | 28.7 | 37.2 | 23.8 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 74 | 35 | 24 | 30 | (1-3) | 0 |
| | % | 45.1 | 21.3 | 14.6 | 18.3 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 30 | 64 | 36 | 33 | (1-3) | 0 |
| | % | 18.3 | 39.0 | 22.0 | 20.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 138 | 26 | 26 | 0 | 0 | | |
| % | 84.1 | 15.9 | 15.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 95 | 59 | | | |
| % | | 6.1 | 57.9 | 36.0 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 372 | 207 | 10 | 97.3 | 43.7 | 38.6 | 48.7 | 69.6 |
| I期 | 168 | 32 | (4-6) | 96.4 | 80.6 | 73.7 | 85.9 | 69.0 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 65.0 |
| III期 | 79 | 65 | (1-3) | 98.7 | 16.7 | 9.4 | 25.7 | 71.3 |
| IV期 | 108 | 101 | (1-3) | 98.1 | 5.7 | 2.2 | 11.5 | 67.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 254 | 118 | 対象数 | 24 | 348 | | |
| % | 68.3 | 31.7 | % | 6.5 | 93.5 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 47 | 120 | 123 | 70 | | |
| % | 3.2 | 12.6 | 32.3 | 33.1 | 18.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 168 | 10 | 79 | 108 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 45.2 | 2.7 | 21.2 | 29.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 179 | 193 | 192 | (1-3) | 0 | | |
| % | 48.1 | 51.9 | 51.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 93 | 119 | 158 | | | |
| % | | 25.0 | 32.0 | 42.5 | | | |

285 済生会熊本病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 91 | 13 | (1-3) | 98.9 | 85.7 | 76.6 | 91.4 | 64.7 |
| I期 | 49 | (4-6) | 0 | 100.0 | 89.8 | 77.2 | 95.6 | 67.2 |
| II期 | 26 | (1-3) | (1-3) | | | | | 60.8 |
| III期 | 14 | (4-6) | 0 | | | | | 63.6 |
| IV期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 66.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 91 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 17 | 31 | 19 | 12 | | |
| % | 13.2 | 18.7 | 34.1 | 20.9 | 13.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 49 | 26 | 14 | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 53.8 | 28.6 | 15.4 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 83 | 83 | 0 | 0 | | |
| % | | 91.2 | 91.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 21 | 18 | 42 | | | |
| % | 11.0 | 23.1 | 19.8 | 46.2 | | | |

286 荒尾市民病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

286 荒尾市民病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 103 | 54 | (1-3) | 98.1 | 46.7 | 36.8 | 56.1 | 74.5 |
| I期 | 58 | 18 | (1-3) | 98.3 | 68.5 | 54.8 | 78.9 | 74.2 |
| II期 | 12 | (7-9) | 0 | | | | | 79.5 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 81.0 |
| IV期 | 23 | 20 | (1-3) | | | | | 72.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 74 | 29 | | | | | |
| % | 71.8 | 28.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 25 | 32 | 39 | | |
| % | | | 24.3 | 31.1 | 37.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 58 | 12 | (7-9) | 23 | (1-3) | 0 | |
| % | 56.3 | 11.7 | | 22.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 32 | 71 | 65 | (4-6) | 0 | | |
| % | 31.1 | 68.9 | 63.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 26 | 65 | | | |
| % | | | 25.2 | 63.1 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 105 | 49 | (1-3) | 99.0 | 53.2 | 43.2 | 62.2 | 73.2 |
| I期 | 23 | (7-9) | (1-3) | | | | | 74.2 |
| II期 | 36 | 13 | 0 | 100.0 | 63.9 | 46.1 | 77.2 | 73.5 |
| III期 | 31 | 15 | 0 | 100.0 | 51.6 | 33.0 | 67.4 | 73.7 |
| IV期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 58 | 47 | | | | | |
| % | 55.2 | 44.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 26 | 28 | 38 | | |
| % | | | 24.8 | 26.7 | 36.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 23 | 36 | 31 | 13 | 0 | (1-3) | |
| % | 21.9 | 34.3 | 29.5 | 12.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 93 | 91 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 11.4 | 88.6 | 86.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | 25 | 72 | | | |
| % | | | 23.8 | 68.6 | | | |

286 荒尾市民病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 17 | 13 | 0 | | | | | 72.8 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 66.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 77.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 65.5 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 77.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 13 | (4-6) | | | | | | |
| % | 76.5 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (4-6) | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 58.8 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (7-9) | (7-9) | | | | |
| % | | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 39 | 35 | 0 | 100.0 | 10.3 | 3.3 | 22.0 | 75.3 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 78.3 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | |
| IV期 | 18 | 18 | 0 | | | | | 77.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 31 | (7-9) | 対象数 | | (1-3) | 38 |
| % | 79.5 | | % | | | 97.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 17 | 12 | |
| % | | | | 43.6 | 30.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (7-9) | 18 | (1-3) | 0 |
| % | | | | 46.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 37 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 94.9 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 33 | | |
| % | | | | 84.6 | | |

286 荒尾市民病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 47 | 11 | (1-3) | 97.9 | 76.5 | 61.6 | 86.2 | 66.0 |
| I期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | 69.4 |
| II期 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 63.8 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 67.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 47 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 12 | 13 | (4-6) | | |
| % | | 25.5 | 25.5 | 27.7 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 14 | 20 | (7-9) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 29.8 | 42.6 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 32 | 27 | (4-6) | 0 | | |
| % | 31.9 | 68.1 | 57.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 35 | | | |
| % | | | | 74.5 | | | |

287 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

当院の生存率集計は2011年登録症例の単年集計の結果であり、すべての部位で生存率計算対象外の30例未満となるステージがあったため、今回は分析は控える。

287 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 58 | 20 | (1-3) | 96.6 | 65.2 | 51.5 | 76.0 | 72.9 |
| I期 | 33 | (4-6) | (1-3) | 93.9 | 81.4 | 63.2 | 91.2 | 72.6 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 67.8 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 76.5 |
| IV期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 76.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 39 | 19 | | | | | |
| % | 67.2 | 32.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 10 | 22 | 19 | | |
| % | | | 17.2 | 37.9 | 32.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | (7-9) | (1-3) | 11 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 56.9 | | | 19.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 48 | 45 | (1-3) | 0 | | |
| % | 17.2 | 82.8 | 77.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | (7-9) | 46 | | | |
| % | | | | 79.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 60 | 16 | (1-3) | 96.7 | 73.2 | 60.1 | 82.7 | 70.4 |
| I期 | 16 | (1-3) | 0 | | | | | 67.3 |
| II期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 71.9 |
| III期 | 19 | (4-6) | (1-3) | | | | | 71.8 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 68.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 36 | 24 | | | | | |
| % | 60.0 | 40.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 14 | 24 | 12 | | |
| % | | | 23.3 | 40.0 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | 15 | 19 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 26.7 | 25.0 | 31.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 51 | 49 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 85.0 | 81.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 11 | 46 | | | |
| % | | | 18.3 | 76.7 | | | |

287 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 18 | 13 | (1-3) | | | | | 72.2 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 69.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 72.8 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 78.8 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 67.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 15 | (1-3) | | | | | |
| % | 83.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | 77.8 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 11 | | | |
| % | | | | 61.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 279 | 156 | (1-3) | 99.3 | 44.0 | 38.1 | 49.7 | 70.4 |
| I期 | 128 | 29 | (1-3) | 99.2 | 77.3 | 69.1 | 83.7 | 69.8 |
| II期 | 19 | 10 | (1-3) | | | | | 72.4 |
| III期 | 72 | 60 | 0 | 100.0 | 16.7 | 9.2 | 26.1 | 72.1 |
| IV期 | 56 | 55 | 0 | 100.0 | 1.8 | 0.2 | 8.3 | 69.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 182 | 97 | 対象数 | | 23 | 256 | |
| % | 65.2 | 34.8 | % | | 8.2 | 91.8 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 10 | 31 | 77 | 106 | 55 | | |
| % | 3.6 | 11.1 | 27.6 | 38.0 | 19.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 128 | 19 | 72 | 56 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 45.9 | 6.8 | 25.8 | 20.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 144 | 135 | 134 | (1-3) | 0 | | |
| % | 51.6 | 48.4 | 48.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 43 | 36 | 197 | | | |
| % | | 15.4 | 12.9 | 70.6 | | | |

287 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

288 大腸肛門病センター高野病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

当院は熊本県指定のがん診療連携拠点病院であり、2010年より院内がん登録を開始している。当院は大腸肛門の専門病院であるため、発生部位は大腸が圧倒的に多く、大腸の特徴を述べる。対象数は117件（男性69件：59.0%、女性48件：41.0%）で、男女の分布は全国平均とほぼ変わらない。年齢は50歳未満から80代まで広く分布し、60歳代が最も多く、平均年齢は62.7歳と全国平均（69.0歳）より若い。

病期別で見ると、StageI期が41件（35.0%）、StageII期が29件（24.8%）、StageIII期が27件（23.1%）、StageIV期が17件（14.5%）となっており、早期がんが高い割合を占めている。観血的治療が116件（99.1%）、そのうち治癒切除が105件（89.7%）と全国より高い（全国観血的治療87.6%、治癒切除78.2%）。

発見経緯を見ると、自主受診を含むその他が71件（60.7%）と最も多く、次いでがん検診が38件（32.5%）であった。がん検診の割合が全国の9.9%より高いのは、当院が自施設で大腸がん検診を行っており、その事業が県外に及ぶことが理由の一つと考えられる。

5年実測生存率は、81.7%（全国63.5%）と全国よりも高いのは、がん検診および大腸内視鏡検査による早期発見・早期治療が他施設より多いことが考えられる。

288 大腸肛門病センター高野病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 63.3 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 64.6 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 58.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 117 | 21 | (1-3) | 97.4 | 81.7 | 73.3 | 87.7 | 62.7 |
| I期 | 41 | (1-3) | (1-3) | 95.1 | 97.4 | 83.2 | 99.6 | 59.7 |
| II期 | 29 | (1-3) | (1-3) | | | | | 69.6 |
| III期 | 27 | (4-6) | 0 | | | | | 59.9 |
| IV期 | 17 | 13 | 0 | | | | | 64.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 69 | 48 | | | | | |
| % | 59.0 | 41.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 17 | 24 | 43 | 19 | 14 | | |
| % | 14.5 | 20.5 | 36.8 | 16.2 | 12.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 41 | 29 | 27 | 17 | 0 | (1-3) | |
| % | 35.0 | 24.8 | 23.1 | 14.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 116 | 105 | 11 | 0 | | |
| % | | 99.1 | 89.7 | 9.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 38 | (1-3) | (4-6) | 71 | | | |
| % | 32.5 | | | 60.7 | | | |

288 大腸肛門病センター高野病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | . | . | . | . | . | . |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | . | . | . | . | . | . |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|
| 対象数 | . | . | 対象数 | . | . | |
| % | | | % | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | |

288 大腸肛門病センター高野病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

289 天草地域医療センター
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

289 天草地域医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 50 | 21 | 0 | 100.0 | 58.0 | 43.2 | 70.2 | 72.3 |
| I期 | 32 | (7-9) | 0 | 100.0 | 71.9 | 52.9 | 84.3 | 71.9 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 72.7 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |
| IV期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 71.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 37 | 13 | | | | | |
| % | 74.0 | 26.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | 20 | 13 | | |
| % | | | 22.0 | 40.0 | 26.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | (1-3) | (1-3) | 11 | (1-3) | 0 | |
| % | 64.0 | | | 22.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 44 | 43 | 0 | (1-3) | | |
| % | | 88.0 | 86.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 11 | 14 | 23 | | | |
| % | | 22.0 | 28.0 | 46.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 59 | 21 | 0 | 100.0 | 64.4 | 50.8 | 75.1 | 72.7 |
| I期 | 16 | 0 | 0 | | | | | 66.9 |
| II期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 72.0 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 80.5 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 36 | 23 | | | | | |
| % | 61.0 | 39.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 16 | 12 | 21 | | |
| % | | | 27.1 | 20.3 | 35.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | 18 | 12 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | |
| % | 27.1 | 30.5 | 20.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 50 | 49 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 84.7 | 83.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | 42 | | | |
| % | | | | 71.2 | | | |

289 天草地域医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 18 | 12 | (1-3) | | | | | 71.4 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 78.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 70.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 62.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 65.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|---|--|
| 対象数 | 15 | (1-3) | | | | | | |
| % | 83.3 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 10 | 0 | |
| | % | | | | | 55.6 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 10 | 0 | |
| | % | | | | | 55.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 15 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 83.3 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | 10 | | | | |
| % | | | | 55.6 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 13 | 10 | 0 | | | | | 71.4 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.3 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 83.0 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 対象数 | | (1-3) | 11 |
| % | | | % | | | 84.6 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (4-6) | 0 | (1-3) | (7-9) | (1-3) | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | | | | | | |

289 天草地域医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 20 | (4-6) | 0 | | | | | 66.1 |
| I期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 64.5 |
| II期 | (7-9) | 0 | 0 | | | | | 65.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 78.5 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 20 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | |
| % | 50.0 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 19 | 19 | 0 | 0 | | |
| % | | 95.0 | 95.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | (7-9) | | | |
| % | | | | | | | |

290 大分県立病院
2010－2011年2力年

コメント:

【施設全体】 5大がんにおいて、当院の5年生存率は全国平均と同じレベルであると思われる。

【胃がん】 ほぼ全国平均レベルの成績と考えられる。

【大腸がん】 特にIII期・IV期が全国平均より良好であるが、観血的治療の割合が高いことが理由として考えられる。

【肝がん】 観血的治療の割合が低い割に、良好な成績と考えられる。

290 大分県立病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 179 | 78 | (1-3) | 98.9 | 56.0 | 48.4 | 62.9 | 69.6 |
| I期 | 111 | 28 | (1-3) | 99.1 | 74.6 | 65.3 | 81.7 | 69.7 |
| II期 | 17 | (4-6) | (1-3) | | | | | 67.1 |
| III期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 68.6 |
| IV期 | 33 | 31 | 0 | 100.0 | 6.1 | 1.1 | 17.6 | 66.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 124 | 55 | | | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 26 | 42 | 59 | 40 | | |
| % | 6.7 | 14.5 | 23.5 | 33.0 | 22.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 111 | 17 | 11 | 33 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 62.0 | 9.5 | 6.1 | 18.4 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 148 | 134 | 13 | (1-3) | | |
| % | 17.3 | 82.7 | 74.9 | 7.3 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 29 | (7-9) | 45 | 97 | | | |
| % | 16.2 | | 25.1 | 54.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 158 | 56 | (4-6) | 96.8 | 63.9 | 55.8 | 70.9 | 66.3 |
| I期 | 29 | (7-9) | (1-3) | | | | | 67.6 |
| II期 | 39 | 11 | (1-3) | 97.4 | 71.1 | 53.9 | 82.8 | 74.8 |
| III期 | 51 | (7-9) | (1-3) | 98.0 | 82.3 | 68.8 | 90.4 | 65.6 |
| IV期 | 36 | 27 | (1-3) | 97.2 | 25.0 | 12.4 | 39.8 | 62.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 74 | 84 | | | | | |
| % | 46.8 | 53.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 32 | 47 | 37 | 29 | | |
| % | 8.2 | 20.3 | 29.7 | 23.4 | 18.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | 39 | 51 | 36 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 18.4 | 24.7 | 32.3 | 22.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 138 | 117 | 20 | (1-3) | | |
| % | 12.7 | 87.3 | 74.1 | 12.7 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 24 | (7-9) | 22 | 103 | | | |
| % | 15.2 | | 13.9 | 65.2 | | | |

290 大分県立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 86 | 53 | (1-3) | 98.8 | 38.4 | 28.2 | 48.5 | 70.2 |
| I期 | 38 | 21 | 0 | 100.0 | 44.7 | 28.7 | 59.6 | 70.2 |
| II期 | 30 | 15 | 0 | 100.0 | 50.0 | 31.3 | 66.1 | 66.8 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 67.5 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|-------|
| 対象数 | 53 | 33 | | | | | |
| % | 61.6 | 38.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 24 | 38 | 14 | | |
| % | | | 27.9 | 44.2 | 16.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 38 | 30 | (7-9) | (7-9) | 0 | (1-3) |
| | % | 44.2 | 34.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 36 | 16 | 13 | 0 | (1-3) |
| | % | 24.4 | 41.9 | 18.6 | 15.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 69 | 17 | 15 | (1-3) | 0 | | |
| % | 80.2 | 19.8 | 17.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 58 | 20 | | | |
| % | | | 67.4 | 23.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 294 | 170 | (1-3) | 99.0 | 41.9 | 36.3 | 47.5 | 69.5 |
| I期 | 116 | 26 | (1-3) | 98.3 | 77.5 | 68.7 | 84.1 | 69.9 |
| II期 | 18 | 11 | 0 | | | | | 74.1 |
| III期 | 68 | 47 | (1-3) | 98.5 | 29.9 | 19.5 | 41.0 | 70.6 |
| IV期 | 90 | 85 | 0 | 100.0 | 5.6 | 2.1 | 11.6 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 169 | 125 | 対象数 | | 21 | 273 |
| % | 57.5 | 42.5 | % | | 7.1 | 92.9 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 10 | 35 | 92 | 105 | 52 | |
| % | 3.4 | 11.9 | 31.3 | 35.7 | 17.7 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 116 | 18 | 68 | 90 | (1-3) | (1-3) |
| % | 39.5 | 6.1 | 23.1 | 30.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 162 | 132 | 127 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 55.1 | 44.9 | 43.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 51 | 30 | 95 | 118 | | |
| % | 17.3 | 10.2 | 32.3 | 40.1 | | |

290 大分県立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 199 | 22 | (4-6) | 98.0 | 88.9 | 83.6 | 92.5 | 63.6 |
| I期 | 98 | (4-6) | (1-3) | 98.0 | 93.8 | 86.8 | 97.2 | 64.0 |
| II期 | 73 | (4-6) | (1-3) | 98.6 | 93.1 | 84.2 | 97.1 | 61.9 |
| III期 | 21 | (4-6) | (1-3) | | | | | 74.9 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 199 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 34 | 29 | 74 | 35 | 27 | | |
| % | 17.1 | 14.6 | 37.2 | 17.6 | 13.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 98 | 73 | 21 | (4-6) | 0 | (1-3) | |
| % | 49.2 | 36.7 | 10.6 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 189 | 176 | 13 | 0 | | |
| % | 5.0 | 95.0 | 88.4 | 6.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 60 | (1-3) | 23 | 114 | | | |
| % | 30.2 | | 11.6 | 57.3 | | | |

291 大分赤十字病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

291 大分赤十字病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 159 | 54 | (7-9) | 95.6 | 65.7 | 57.7 | 72.5 | 69.9 |
| I期 | 117 | 21 | (7-9) | 94.0 | 81.7 | 73.3 | 87.7 | 67.4 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 74.0 |
| III期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 68.7 |
| IV期 | 22 | 20 | 0 | | | | | 73.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 122 | 37 | | | | | |
| % | 76.7 | 23.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 16 | 55 | 48 | 35 | | |
| % | | 10.1 | 34.6 | 30.2 | 22.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 117 | (4-6) | 13 | 22 | (1-3) | 0 | |
| % | 73.6 | | 8.2 | 13.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 31 | 128 | 126 | (1-3) | 0 | | |
| % | 19.5 | 80.5 | 79.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 19 | (1-3) | 27 | 111 | | | |
| % | 11.9 | | 17.0 | 69.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 121 | 50 | 0 | 100.0 | 58.7 | 49.4 | 66.9 | 70.4 |
| I期 | 22 | (4-6) | 0 | | | | | 74.0 |
| II期 | 40 | (7-9) | 0 | 100.0 | 77.5 | 61.2 | 87.6 | 72.8 |
| III期 | 31 | 11 | 0 | 100.0 | 64.5 | 45.2 | 78.5 | 77.6 |
| IV期 | 28 | 25 | 0 | | | | | 62.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 67 | 54 | | | | | |
| % | 55.4 | 44.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | 32 | 43 | 26 | | |
| % | | 10.7 | 26.4 | 35.5 | 21.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 22 | 40 | 31 | 28 | 0 | 0 | |
| % | 18.2 | 33.1 | 25.6 | 23.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 30 | 91 | 84 | (7-9) | 0 | | |
| % | 24.8 | 75.2 | 69.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (1-3) | 20 | 89 | | | |
| % | 9.1 | | 16.5 | 73.6 | | | |

291 大分赤十字病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 99 | 66 | (1-3) | 99.0 | 33.1 | 24.1 | 42.5 | 70.4 |
| I期 | 38 | 18 | (1-3) | 97.4 | 52.4 | 35.5 | 66.8 | 74.6 |
| II期 | 33 | 21 | 0 | 100.0 | 36.4 | 20.6 | 52.3 | 71.0 |
| III期 | 23 | 22 | 0 | | | | | 69.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 62.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 72 | 27 | | | | | | |
| % | 72.7 | 27.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 28 | 38 | 18 | | | |
| % | | 11.1 | 28.3 | 38.4 | 18.2 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 38 | 33 | 23 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | 38.4 | 33.3 | 23.2 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 11 | 39 | 30 | 19 | 0 | 0 | |
| | % | 11.1 | 39.4 | 30.3 | 19.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | | | |
| % | 49.5 | 50.5 | 50.5 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 26 | 67 | | | | |
| % | | | 26.3 | 67.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 179 | 110 | (1-3) | 99.4 | 38.6 | 31.4 | 45.6 | 71.7 |
| I期 | 67 | 13 | (1-3) | 98.5 | 80.6 | 68.9 | 88.2 | 69.6 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 74.3 |
| III期 | 52 | 42 | 0 | 100.0 | 19.2 | 9.9 | 30.9 | 72.4 |
| IV期 | 50 | 47 | 0 | 100.0 | 6.0 | 1.6 | 14.9 | 70.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|--|
| 対象数 | 124 | 55 | 対象数 | 24 | 155 | | | |
| % | 69.3 | 30.7 | % | 13.4 | 86.6 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 15 | 50 | 65 | 43 | | | |
| % | | 8.4 | 27.9 | 36.3 | 24.0 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 67 | (7-9) | 52 | 50 | 0 | (1-3) | | |
| % | 37.4 | | 29.1 | 27.9 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 106 | 73 | 70 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 59.2 | 40.8 | 39.1 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 20 | 10 | 44 | 105 | | | | |
| % | 11.2 | 5.6 | 24.6 | 58.7 | | | | |

291 大分赤十字病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 44 | (7-9) | 0 | 100.0 | 79.6 | 64.4 | 88.8 | 62.7 |
| I期 | 17 | (1-3) | 0 | | | | | 67.3 |
| II期 | 14 | (1-3) | 0 | | | | | 58.9 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 64.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 44 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 17 | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | 27.3 | 38.6 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 17 | 14 | (7-9) | (1-3) | 0 | (1-3) | |
| % | 38.6 | 31.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 39 | 34 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 88.6 | 77.3 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 23 | 0 | (7-9) | 14 | | | |
| % | 52.3 | | | 31.8 | | | |

292 大分大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う都道府県がん診療連携拠点病院であり、高度先進医療を行う特定機能病院である。また、県内唯一の大学病院でもある。希少がんや病期の進行した症例、多くの診療科の協力を必要とする併存疾患を持つ症例を受け入れている。

292 大分大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 239 | 97 | (4-6) | 98.3 | 59.1 | 52.6 | 65.1 | 70.7 |
| I期 | 172 | 44 | (1-3) | 98.3 | 74.1 | 66.8 | 80.1 | 71.2 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 72.3 |
| III期 | 14 | 11 | (1-3) | | | | | 74.5 |
| IV期 | 36 | 34 | 0 | 100.0 | 5.6 | 1.0 | 16.3 | 69.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 170 | 69 | | | | | |
| % | 71.1 | 28.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 23 | 72 | 88 | 47 | | |
| % | | 9.6 | 30.1 | 36.8 | 19.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 172 | 13 | 14 | 36 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 72.0 | 5.4 | 5.9 | 15.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 35 | 204 | 200 | (4-6) | 0 | | |
| % | 14.6 | 85.4 | 83.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 28 | 98 | 112 | | | |
| % | | 11.7 | 41.0 | 46.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 191 | 62 | (4-6) | 97.4 | 67.1 | 59.8 | 73.3 | 68.8 |
| I期 | 58 | (7-9) | 0 | 100.0 | 87.9 | 76.3 | 94.1 | 66.2 |
| II期 | 38 | 12 | (1-3) | 92.1 | 66.5 | 48.5 | 79.4 | 74.8 |
| III期 | 59 | 19 | (1-3) | 96.6 | 67.4 | 53.7 | 77.8 | 69.6 |
| IV期 | 25 | 21 | 0 | | | | | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-----|--|
| 対象数 | 114 | 77 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 16 | 24 | 57 | 55 | 39 | | |
| % | 8.4 | 12.6 | 29.8 | 28.8 | 20.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 58 | 38 | 59 | 25 | (1-3) | 10 | |
| % | 30.4 | 19.9 | 30.9 | 13.1 | | 5.2 | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 177 | 175 | (1-3) | 0 | | |
| % | 7.3 | 92.7 | 91.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 68 | 98 | | | |
| % | | 11.0 | 35.6 | 51.3 | | | |

292 大分大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 155 | 94 | (1-3) | 98.1 | 38.5 | 30.8 | 46.1 | 72.9 |
| I期 | 67 | 34 | 0 | 100.0 | 49.3 | 36.9 | 60.5 | 74.1 |
| II期 | 48 | 26 | (1-3) | 97.9 | 45.3 | 30.8 | 58.7 | 74.4 |
| III期 | 28 | 22 | (1-3) | | | | | 75.2 |
| IV期 | 12 | 12 | 0 | | | | | 69.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | 92 | 63 | | | | | |
| % | 59.4 | 40.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | 14 | 33 | 75 | 33 | | |
| % | | 9.0 | 21.3 | 48.4 | 21.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 67 | 48 | 28 | 12 | 0 | 0 |
| | % | 43.2 | 31.0 | 18.1 | 7.7 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 31 | 64 | 28 | 32 | 0 | 0 |
| | % | 20.0 | 41.3 | 18.1 | 20.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 116 | 39 | 39 | 0 | 0 | | |
| % | 74.8 | 25.2 | 25.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 10 | 120 | 25 | | | |
| % | | 6.5 | 77.4 | 16.1 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 274 | 135 | (1-3) | 98.9 | 50.2 | 44.1 | 56.0 | 69.0 |
| I期 | 139 | 28 | (1-3) | 98.6 | 79.6 | 71.8 | 85.4 | 70.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 67.3 |
| III期 | 62 | 44 | 0 | 100.0 | 29.0 | 18.4 | 40.5 | 70.8 |
| IV期 | 61 | 57 | (1-3) | 98.4 | 5.0 | 1.3 | 12.6 | 68.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 166 | 108 | 対象数 | | 18 | 256 |
| % | 60.6 | 39.4 | % | | 6.6 | 93.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 13 | 29 | 102 | 88 | 42 | |
| % | 4.7 | 10.6 | 37.2 | 32.1 | 15.3 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 139 | (7-9) | 62 | 61 | 0 | (4-6) |
| % | 50.7 | | 22.6 | 22.3 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 108 | 166 | 164 | (1-3) | 0 | |
| % | 39.4 | 60.6 | 59.9 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 35 | 144 | 91 | | |
| % | | 12.8 | 52.6 | 33.2 | | |

292 大分大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 85 | 12 | (1-3) | 97.6 | 85.7 | 76.1 | 91.6 | 64.7 |
| I期 | 39 | (1-3) | (1-3) | 97.4 | 94.7 | 80.6 | 98.7 | 67.4 |
| II期 | 35 | (7-9) | (1-3) | 97.1 | 79.7 | 62.1 | 89.8 | 68.7 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 52.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 60.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 85 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 21 | 30 | 14 | 13 | | |
| % | | 24.7 | 35.3 | 16.5 | 15.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 35 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | 45.9 | 41.2 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 77 | 77 | 0 | 0 | | |
| % | | 90.6 | 90.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 18 | (1-3) | 24 | 40 | | | |
| % | 21.2 | | 28.2 | 47.1 | | | |

293 大分県済生会日田病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

293 大分県済生会日田病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 62 | 42 | 0 | 100.0 | 32.3 | 21.1 | 43.9 | 74.8 |
| I期 | 29 | 11 | 0 | | | | | 74.0 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.7 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.5 |
| IV期 | 23 | 23 | 0 | | | | | 75.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 42 | 20 | | | | | |
| % | 67.7 | 32.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 10 | 24 | 22 | | |
| % | | | 16.1 | 38.7 | 35.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 29 | (4-6) | (4-6) | 23 | 0 | 0 | |
| % | 46.8 | | | 37.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | 42 | 30 | 12 | 0 | | |
| % | 32.3 | 67.7 | 48.4 | 19.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | (1-3) | 11 | 40 | | | |
| % | 16.1 | | 17.7 | 64.5 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 54 | 35 | 0 | 100.0 | 35.2 | 22.8 | 47.8 | 75.8 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 79.7 |
| II期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 82.8 |
| III期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 75.0 |
| IV期 | 19 | 16 | 0 | | | | | 80.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 31 | 23 | | | | | |
| % | 57.4 | 42.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 19 | 22 | | |
| % | | | | 35.2 | 40.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | 12 | 19 | (1-3) | (1-3) | |
| % | | 24.1 | 22.2 | 35.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 38 | 23 | 11 | (4-6) | | |
| % | 29.6 | 70.4 | 42.6 | 20.4 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 42 | | | |
| % | | | | 77.8 | | | |

293 大分県済生会日田病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 28 | 25 | 0 | | | | | 76.0 |
| I期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 80.8 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 69.7 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 76.8 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 21 | (7-9) | | | | | |
| % | 75.0 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 16 | | |
| % | | | | | 57.1 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (7-9) | 10 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | 35.7 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| % | 100.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 15 | 12 | | | |
| % | | | 53.6 | 42.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | 55 | 0 | 100.0 | 29.5 | 19.8 | 39.8 | 74.6 |
| I期 | 25 | (7-9) | 0 | | | | | 71.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 76.0 |
| III期 | 26 | 22 | 0 | | | | | 74.5 |
| IV期 | 20 | 20 | 0 | | | | | 82.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 56 | 22 | | | (7-9) | 70 |
| % | 71.8 | 28.2 | | | | 89.7 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 16 | 30 | 27 | |
| % | | | 20.5 | 38.5 | 34.6 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 25 | (7-9) | 26 | 20 | 0 | 0 |
| % | 32.1 | | 33.3 | 25.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 47 | 31 | 25 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 60.3 | 39.7 | 32.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 27 | 44 | | |
| % | | | 34.6 | 56.4 | | |

293 大分県済生会日田病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 34 | (4-6) | (1-3) | 91.2 | 81.8 | 63.9 | 91.4 | 64.1 |
| I期 | 17 | (1-3) | (1-3) | | | | | 61.3 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 59.4 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 50.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 34 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (7-9) | (7-9) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 17 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 50.0 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 30 | 25 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | 88.2 | 73.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (4-6) | 22 | | | |
| % | | | | 64.7 | | | |

294 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

当院は2011年症例より全国集計にデータを提出しているため、今回は2011年単年の集計となっています。そのため、対象症例が30例未満となっている女性乳房の生存率や各部位の病期別生存率の結果が一部を除き非公表になっているので数値に対する評価は差し控えたいと思います。当院の生存率集計については1年だけの集計で症例数も少ないため1つの症例に左右される影響も大きく、結果が正確なものとは限りません。年齢、治療方法、併存疾患の有無等様々な要因が関係するので、生存率だけで単純比較するのは考慮する必要があります。

294 独立行政法人国立病院機構大分医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 69 | 28 | (1-3) | 95.7 | 58.6 | 46.0 | 69.3 | 73.6 |
| I期 | 36 | 11 | (1-3) | 91.7 | 68.2 | 49.9 | 81.0 | 75.7 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 68.4 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | 15 | 11 | 0 | | | | | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 52 | 17 | | | | | |
| % | 75.4 | 24.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 14 | 24 | 26 | | |
| % | | | 20.3 | 34.8 | 37.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | (7-9) | (7-9) | 15 | 0 | (1-3) | |
| % | 52.2 | | | 21.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 61 | 55 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | 88.4 | 79.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 40 | 26 | | | |
| % | | | 58.0 | 37.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 20 | (1-3) | 94.3 | 61.0 | 46.2 | 72.8 | 69.9 |
| I期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.5 |
| II期 | 13 | (4-6) | 0 | | | | | 70.6 |
| III期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |
| IV期 | 10 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 31 | 22 | | | | | |
| % | 58.5 | 41.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 21 | (7-9) | 14 | | |
| % | | | 39.6 | | 26.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 13 | 13 | 15 | 10 | 0 | (1-3) | |
| % | 24.5 | 24.5 | 28.3 | 18.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 42 | 41 | (1-3) | 0 | | |
| % | 20.8 | 79.2 | 77.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 26 | 22 | | | |
| % | | | 49.1 | 41.5 | | | |

294 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 50 | 27 | 0 | 100.0 | 46.0 | 31.9 | 59.0 | 68.5 |
| I期 | 18 | (4-6) | 0 | | | | | 67.4 |
| II期 | 20 | 10 | 0 | | | | | 72.6 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 60.1 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 75.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 34 | 16 | | | | | |
| % | 68.0 | 32.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 16 | 18 | (4-6) | | |
| % | | | 32.0 | 36.0 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 18 | 20 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | 36.0 | 40.0 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | 23 | 11 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| | % | | 46.0 | 22.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 36 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| % | 72.0 | 28.0 | 28.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 44 | (4-6) | | | |
| % | | | 88.0 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 70 | 46 | (1-3) | 97.1 | 33.4 | 22.6 | 44.6 | 72.7 |
| I期 | 28 | 11 | (1-3) | | | | | 72.6 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 65.5 |
| III期 | 14 | 12 | 0 | | | | | 74.6 |
| IV期 | 23 | 21 | (1-3) | | | | | 72.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 49 | 21 | 対象数 | (1-3) | 68 | | |
| % | 70.0 | 30.0 | % | | 97.1 | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 17 | 29 | 18 | | |
| % | | | 24.3 | 41.4 | 25.7 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 28 | (4-6) | 14 | 23 | (1-3) | 0 | |
| % | 40.0 | | 20.0 | 32.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 31 | 30 | (1-3) | 0 | | |
| % | 55.7 | 44.3 | 42.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 41 | 22 | | | |
| % | | | 58.6 | 31.4 | | | |

294 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 24 | (4-6) | 0 | | | | | 68.6 |
| I期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 67.3 |
| II期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 73.2 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 63.9 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 63.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 24 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 12 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | 50.0 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | (7-9) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | 41.7 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 18 | (1-3) | 0 | | |
| % | | 83.3 | 75.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (7-9) | 16 | | | |
| % | | | | 66.7 | | | |

295 宮崎県立宮崎病院
2010-2011年2力年

コメント:

施設別生存率を比較すると、すべてのがん腫において差があります。これは、治療した対象者の進行度や年齢、併存症の有無及び重症度等の背景因子が異なることが大きく影響しております。単純に他施設との成績を比較することはできません。

295 宮崎県立宮崎病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 114 | 46 | (4-6) | 95.6 | 59.5 | 49.9 | 67.9 | 68.0 |
| I期 | 69 | 13 | (4-6) | 94.2 | 81.0 | 69.6 | 88.5 | 69.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 66.3 |
| III期 | 11 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.3 |
| IV期 | 22 | 22 | 0 | | | | | 66.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 77 | 37 | | | | | |
| % | 67.5 | 32.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 21 | 33 | 40 | 16 | | |
| % | | 18.4 | 28.9 | 35.1 | 14.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 69 | (4-6) | 11 | 22 | (7-9) | 0 | |
| % | 60.5 | | 9.6 | 19.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 85 | 83 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 25.4 | 74.6 | 72.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 17 | 32 | 59 | | | |
| % | | 14.9 | 28.1 | 51.8 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 136 | 56 | (1-3) | 97.8 | 58.8 | 50.0 | 66.5 | 70.4 |
| I期 | 33 | (4-6) | (1-3) | 97.0 | 87.9 | 70.9 | 95.3 | 68.9 |
| II期 | 45 | 11 | (1-3) | 95.6 | 75.4 | 60.0 | 85.6 | 68.0 |
| III期 | 23 | (7-9) | 0 | | | | | 72.6 |
| IV期 | 29 | 28 | 0 | | | | | 70.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 81 | 55 | | | | | |
| % | 59.6 | 40.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 40 | 51 | 28 | | |
| % | | 8.8 | 29.4 | 37.5 | 20.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 33 | 45 | 23 | 29 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 24.3 | 33.1 | 16.9 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 24 | 112 | 105 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | 17.6 | 82.4 | 77.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 36 | 86 | | | |
| % | | | 26.5 | 63.2 | | | |

295 宮崎県立宮崎病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 53 | 34 | (1-3) | 98.1 | 34.7 | 22.2 | 47.5 | 70.3 |
| I期 | 25 | 11 | (1-3) | | | | | 75.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 65.8 |
| III期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 66.9 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 57.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 44 | (7-9) | | | | | |
| % | 83.0 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 15 | 21 | (7-9) | | |
| % | | | 28.3 | 39.6 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 25 | (7-9) | 11 | (1-3) | (7-9) | 0 |
| | % | 47.2 | | 20.8 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 21 | (4-6) | 10 | (7-9) | 0 |
| | % | | 39.6 | | 18.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 33 | 20 | 20 | 0 | 0 | | |
| % | 62.3 | 37.7 | 37.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 36 | 13 | | | |
| % | | | 67.9 | 24.5 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 267 | 160 | 11 | 95.9 | 39.0 | 33.1 | 44.9 | 70.3 |
| I期 | 110 | 28 | (4-6) | 96.4 | 74.4 | 65.1 | 81.5 | 70.6 |
| II期 | 16 | 10 | (1-3) | | | | | 66.7 |
| III期 | 62 | 49 | (1-3) | 96.8 | 18.7 | 10.1 | 29.5 | 67.0 |
| IV期 | 70 | 64 | (4-6) | 94.3 | 4.4 | 1.0 | 12.3 | 68.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 178 | 89 | 対象数 | | 21 | 246 |
| % | 66.7 | 33.3 | % | | 7.9 | 92.1 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 31 | 69 | 114 | 45 | |
| % | | 11.6 | 25.8 | 42.7 | 16.9 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 110 | 16 | 62 | 70 | (7-9) | 0 |
| % | 41.2 | 6.0 | 23.2 | 26.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 139 | 128 | 125 | (1-3) | 0 | |
| % | 52.1 | 47.9 | 46.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 12 | 61 | 89 | 105 | | |
| % | 4.5 | 22.8 | 33.3 | 39.3 | | |

295 宮崎県立宮崎病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 211 | 36 | (7-9) | 96.7 | 82.9 | 77.0 | 87.3 | 60.2 |
| I期 | 104 | (4-6) | (1-3) | 97.1 | 94.2 | 87.6 | 97.4 | 62.9 |
| II期 | 63 | (4-6) | (1-3) | 95.2 | 92.0 | 81.9 | 96.6 | 63.3 |
| III期 | 23 | (4-6) | (1-3) | | | | | 57.1 |
| IV期 | 18 | 16 | 0 | | | | | 55.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 0 | 211 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 52 | 46 | 55 | 37 | 21 | | |
| % | 24.6 | 21.8 | 26.1 | 17.5 | 10.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 104 | 63 | 23 | 18 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 49.3 | 29.9 | 10.9 | 8.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 188 | 179 | (4-6) | (4-6) | | |
| % | 10.9 | 89.1 | 84.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 63 | (7-9) | 21 | 119 | | | |
| % | 29.9 | | 10.0 | 56.4 | | | |

296 国立病院機構 都城医療センター
2010-2011年2力年

コメント:

当院は専門医偏在等の地域性もあり、また高齢者や進行した慢性腎臓病等の併存疾患を占める割合が多く、がん再発以外の疾患の悪化で死亡する事例が見られるため、I期の生存率が他施設より低いと考えられます。

296 国立病院機構 都城医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | 39 | 0 | 100.0 | 50.0 | 38.5 | 60.5 | 71.4 |
| I期 | 40 | 13 | 0 | 100.0 | 67.5 | 50.7 | 79.7 | 71.0 |
| II期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 70.1 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 86.0 |
| IV期 | 21 | 19 | 0 | | | | | 74.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 58 | 20 | | | | | |
| % | 74.4 | 25.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 22 | 26 | 21 | | |
| % | | | 28.2 | 33.3 | 26.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 40 | 10 | (4-6) | 21 | 0 | (1-3) | |
| % | 51.3 | 12.8 | | 26.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 64 | 62 | (1-3) | 0 | | |
| % | 17.9 | 82.1 | 79.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 28 | 40 | | | |
| % | | | 35.9 | 51.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 129 | 54 | 0 | 100.0 | 58.1 | 49.1 | 66.1 | 70.1 |
| I期 | 38 | 11 | 0 | 100.0 | 71.1 | 53.9 | 82.8 | 65.1 |
| II期 | 35 | 10 | 0 | 100.0 | 71.4 | 53.4 | 83.5 | 69.8 |
| III期 | 33 | 16 | 0 | 100.0 | 51.5 | 33.5 | 66.9 | 68.7 |
| IV期 | 22 | 17 | 0 | | | | | 64.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 77 | 52 | | | | | |
| % | 59.7 | 40.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 22 | 32 | 41 | 30 | | |
| % | | 17.1 | 24.8 | 31.8 | 23.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 38 | 35 | 33 | 22 | 0 | (1-3) | |
| % | 29.5 | 27.1 | 25.6 | 17.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 15 | 114 | 107 | (7-9) | 0 | | |
| % | 11.6 | 88.4 | 82.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 10 | 10 | 28 | 81 | | | |
| % | 7.8 | 7.8 | 21.7 | 62.8 | | | |

296 国立病院機構 都城医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 14 | 11 | 0 | | | | | 77.1 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 79.5 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 85.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 77.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 73.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 11 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | | |
| % | 78.6 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | | | | |
| % | | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 133 | 98 | 0 | 100.0 | 26.3 | 19.2 | 34.0 | 72.5 |
| I期 | 23 | (7-9) | 0 | | | | | 67.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 66.0 |
| III期 | 54 | 40 | 0 | 100.0 | 25.9 | 15.2 | 38.0 | 70.7 |
| IV期 | 46 | 44 | 0 | 100.0 | 4.4 | 0.8 | 13.1 | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 98 | 35 | 対象数 | | 14 | 119 |
| % | 73.7 | 26.3 | % | | 10.5 | 89.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 10 | 31 | 56 | 33 | |
| % | | 7.5 | 23.3 | 42.1 | 24.8 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 23 | (7-9) | 54 | 46 | (1-3) | 0 |
| % | 17.3 | | 40.6 | 34.6 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 108 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| % | 81.2 | 18.8 | 18.8 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 53 | 54 | | |
| % | | 15.0 | 39.8 | 40.6 | | |

296 国立病院機構 都城医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 46 | 12 | 0 | 100.0 | 73.9 | 58.7 | 84.3 | 66.9 |
| I期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 64.2 |
| II期 | 22 | (4-6) | 0 | | | | | 63.9 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 72.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 52.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 46 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 16 | 12 | (7-9) | | |
| % | | | 34.8 | 26.1 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 15 | 22 | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 32.6 | 47.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 44 | 37 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | 95.7 | 80.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 12 | 0 | (4-6) | 28 | | | |
| % | 26.1 | | | 60.9 | | | |

297 宮崎大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

特になし

297 宮崎大学医学部附属病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 171 | 55 | (7-9) | 95.9 | 67.1 | 59.4 | 73.7 | 70.2 |
| I期 | 121 | 20 | (4-6) | 95.9 | 83.0 | 75.0 | 88.7 | 69.4 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 70.0 |
| III期 | 13 | (7-9) | 0 | | | | | 81.7 |
| IV期 | 30 | 26 | (1-3) | 96.7 | 10.4 | 2.6 | 24.3 | 71.1 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 123 | 48 | | | | | |
| % | 71.9 | 28.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 49 | 70 | 28 | | |
| % | | 11.1 | 28.7 | 40.9 | 16.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 121 | (4-6) | 13 | 30 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 70.8 | | 7.6 | 17.5 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 29 | 142 | 126 | (7-9) | (7-9) | | |
| % | 17.0 | 83.0 | 73.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 13 | (1-3) | 34 | 122 | | | |
| % | 7.6 | | 19.9 | 71.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 126 | 46 | (4-6) | 96.0 | 63.0 | 53.8 | 70.8 | 68.6 |
| I期 | 32 | (1-3) | (1-3) | 93.8 | 90.3 | 72.8 | 96.8 | 69.7 |
| II期 | 29 | (7-9) | (1-3) | | | | | 68.4 |
| III期 | 28 | 11 | (1-3) | | | | | 69.7 |
| IV期 | 28 | 23 | (1-3) | | | | | 64.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 84 | 42 | | | | | |
| % | 66.7 | 33.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 13 | 40 | 48 | 18 | | |
| % | | 10.3 | 31.7 | 38.1 | 14.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 32 | 29 | 28 | 28 | (1-3) | (7-9) | |
| % | 25.4 | 23.0 | 22.2 | 22.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 12 | 114 | 81 | 15 | 18 | | |
| % | 9.5 | 90.5 | 64.3 | 11.9 | 14.3 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 22 | 99 | | | |
| % | | | 17.5 | 78.6 | | | |

297 宮崎大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 125 | 77 | (1-3) | 97.6 | 37.2 | 28.7 | 45.7 | 69.5 |
| I期 | 41 | 16 | (1-3) | 97.6 | 60.4 | 43.7 | 73.6 | 71.8 |
| II期 | 36 | 20 | (1-3) | 97.2 | 42.9 | 26.4 | 58.3 | 65.9 |
| III期 | 33 | 26 | (1-3) | 97.0 | 18.8 | 7.6 | 33.8 | 68.8 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 64.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 90 | 35 | | | | | |
| % | 72.0 | 28.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 17 | 35 | 53 | 17 | | |
| % | | 13.6 | 28.0 | 42.4 | 13.6 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 41 | 36 | 33 | (7-9) | (4-6) | (1-3) |
| | % | 32.8 | 28.8 | 26.4 | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 21 | 41 | 31 | 23 | (7-9) | (1-3) |
| | % | 16.8 | 32.8 | 24.8 | 18.4 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 83 | 42 | 33 | (1-3) | (7-9) | | |
| % | 66.4 | 33.6 | 26.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 45 | 77 | | | |
| % | | | 36.0 | 61.6 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 239 | 120 | (4-6) | 97.9 | 49.4 | 42.9 | 55.6 | 69.6 |
| I期 | 119 | 28 | (1-3) | 97.5 | 76.2 | 67.5 | 82.9 | 71.4 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 66.0 |
| III期 | 48 | 34 | (1-3) | 97.9 | 29.2 | 17.2 | 42.3 | 66.8 |
| IV期 | 60 | 53 | (1-3) | 98.3 | 10.4 | 4.2 | 19.7 | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| 対象数 | 148 | 91 | 対象数 | | 24 | 215 |
| % | 61.9 | 38.1 | % | | 10.0 | 90.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (4-6) | 27 | 83 | 95 | 29 | |
| % | | 11.3 | 34.7 | 39.7 | 12.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 119 | 10 | 48 | 60 | 0 | (1-3) |
| % | 49.8 | 4.2 | 20.1 | 25.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 104 | 135 | 106 | (4-6) | 23 | |
| % | 43.5 | 56.5 | 44.4 | | 9.6 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 25 | 18 | 41 | 155 | | |
| % | 10.5 | 7.5 | 17.2 | 64.9 | | |

297 宮崎大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 66 | 10 | (4-6) | 92.4 | 84.0 | 72.3 | 91.1 | 64.0 |
| I期 | 26 | (1-3) | (1-3) | | | | | 64.6 |
| II期 | 31 | (4-6) | (1-3) | 93.5 | 83.3 | 64.3 | 92.7 | 62.5 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 46.3 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 36.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 66 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | (7-9) | 20 | 18 | (7-9) | | |
| % | 18.2 | | 30.3 | 27.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 31 | (4-6) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 39.4 | 47.0 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 62 | 40 | (1-3) | 21 | | |
| % | | 93.9 | 60.6 | | 31.8 | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 0 | 13 | 47 | | | |
| % | | | 19.7 | 71.2 | | | |

298 鹿児島県立薩南病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

298 鹿児島県立薩南病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 81 | 36 | 10 | 87.7 | 54.0 | 42.3 | 64.3 | 75.9 |
| I期 | 47 | (7-9) | (7-9) | 80.9 | 79.7 | 64.6 | 88.9 | 77.6 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 92.0 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | | | | | 77.8 |
| IV期 | 20 | 20 | 0 | | | | | 72.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 49 | 32 | | | | | |
| % | 60.5 | 39.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 15 | 33 | 29 | | |
| % | | | 18.5 | 40.7 | 35.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 47 | (1-3) | (7-9) | 20 | (1-3) | 0 | |
| % | 58.0 | | | 24.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 23 | 58 | 52 | (4-6) | 0 | | |
| % | 28.4 | 71.6 | 64.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | 11 | 57 | | | |
| % | | | 13.6 | 70.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 70 | 30 | (4-6) | 92.9 | 55.7 | 43.1 | 66.6 | 76.3 |
| I期 | 25 | (7-9) | (1-3) | | | | | 70.3 |
| II期 | 14 | (1-3) | (1-3) | | | | | 71.3 |
| III期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 77.9 |
| IV期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 82.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 33 | 37 | | | | | |
| % | 47.1 | 52.9 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 10 | 28 | 28 | | |
| % | | | 14.3 | 40.0 | 40.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | 14 | (7-9) | 16 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 35.7 | 20.0 | | 22.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 56 | 48 | (7-9) | 0 | | |
| % | 20.0 | 80.0 | 68.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 58 | | | |
| % | | | | 82.9 | | | |

298 鹿児島県立薩南病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 12 | 12 | 0 | | | | | 76.0 |
| I期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 63.5 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 82.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 0 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | 10 | | | |
| % | | | | 83.3 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 55 | 45 | (1-3) | 98.2 | 18.2 | 9.4 | 29.3 | 74.9 |
| I期 | 13 | (7-9) | (1-3) | | | | | 68.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 84.0 |
| III期 | 20 | 19 | 0 | | | | | 74.1 |
| IV期 | 17 | 15 | 0 | | | | | 78.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 32 | 23 | 対象数 | | (7-9) | 47 |
| % | 58.2 | 41.8 | % | | | 85.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 13 | 14 | 25 | |
| % | | | 23.6 | 25.5 | 45.5 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 13 | (1-3) | 20 | 17 | (1-3) | 0 |
| % | 23.6 | | 36.4 | 30.9 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| % | 80.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | 11 | 30 | | |
| % | 18.2 | | 20.0 | 54.5 | | |

298 鹿児島県立薩南病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 10 | (1-3) | (1-3) | | | | | 78.0 |
| I期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 73.0 |
| II期 | (1-3) | 0 | (1-3) | | | | | 85.0 |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 79.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 10 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 0 | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |
| % | | | | 100.0 | | | |

299 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

299 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 33 | 12 | (1-3) | 97.0 | 63.6 | 45.0 | 77.5 | 70.4 |
| I期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 66.1 |
| II期 | (4-6) | 0 | (1-3) | | | | | 72.8 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 73.3 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 58.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 24 | (7-9) | | | | | |
| % | 72.7 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 12 | (7-9) | | |
| % | | | | 36.4 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 15 | (4-6) | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 45.5 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 28 | 23 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | 84.8 | 69.7 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 22 | | | |
| % | | | | 66.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 37 | 20 | (1-3) | 97.3 | 45.0 | 28.5 | 60.1 | 71.0 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.7 |
| II期 | 10 | (4-6) | (1-3) | | | | | 70.8 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 21 | 16 | | | | | |
| % | 56.8 | 43.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 13 | 10 | | |
| % | | | | 35.1 | 27.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| % | | 27.0 | 27.0 | 29.7 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 31 | 31 | 0 | 0 | | |
| % | | 83.8 | 83.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (7-9) | 27 | | | |
| % | | | | 73.0 | | | |

299 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 73.2 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 85.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 74.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | | | |
| % | | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| | % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | | |
| % | | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | | | | |
| % | | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 290 | 139 | 0 | 100.0 | 52.1 | 46.2 | 57.6 | 68.8 |
| I期 | 124 | 18 | 0 | 100.0 | 85.5 | 78.0 | 90.6 | 68.0 |
| II期 | 19 | 10 | 0 | | | | | 71.8 |
| III期 | 72 | 45 | 0 | 100.0 | 37.5 | 26.5 | 48.5 | 66.2 |
| IV期 | 73 | 65 | 0 | 100.0 | 11.0 | 5.1 | 19.3 | 70.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 181 | 109 | 対象数 | | 25 | 265 |
| % | 62.4 | 37.6 | % | | 8.6 | 91.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 14 | 38 | 89 | 108 | 41 | |
| % | 4.8 | 13.1 | 30.7 | 37.2 | 14.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 124 | 19 | 72 | 73 | (1-3) | (1-3) |
| % | 42.8 | 6.6 | 24.8 | 25.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 111 | 179 | 128 | (1-3) | 48 | |
| % | 38.3 | 61.7 | 44.1 | | 16.6 | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 95 | 23 | 54 | 118 | | |
| % | 32.8 | 7.9 | 18.6 | 40.7 | | |

299 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 71.5 |
| I期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 70.7 |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 83.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | (4-6) | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 0 | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | (4-6) | 0 | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 0 | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

300 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

300 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 67 | 38 | (1-3) | 95.5 | 41.6 | 29.5 | 53.2 | 72.2 |
| I期 | 26 | (4-6) | (1-3) | | | | | 71.0 |
| II期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 84.0 |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | 23 | 22 | (1-3) | | | | | 76.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 45 | 22 | | | | | |
| % | 67.2 | 32.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 18 | 19 | 21 | | |
| % | | | 26.9 | 28.4 | 31.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 26 | 10 | 0 | 23 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 38.8 | 14.9 | | 34.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 25 | 42 | 37 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 37.3 | 62.7 | 55.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 24 | 35 | | | |
| % | | | 35.8 | 52.2 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | 42 | 0 | 100.0 | 46.2 | 34.9 | 56.7 | 72.2 |
| I期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 71.9 |
| II期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 75.4 |
| III期 | 17 | (4-6) | 0 | | | | | 64.6 |
| IV期 | 20 | 19 | 0 | | | | | 74.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 49 | 29 | | | | | |
| % | 62.8 | 37.2 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 23 | 24 | 23 | | |
| % | | | 29.5 | 30.8 | 29.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 16 | 16 | 17 | 20 | (7-9) | (1-3) | |
| % | 20.5 | 20.5 | 21.8 | 25.6 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 57 | 54 | (1-3) | 0 | | |
| % | 26.9 | 73.1 | 69.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 19 | 48 | | | |
| % | | | 24.4 | 61.5 | | | |

300 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 19 | 14 | 0 | | | | | 71.5 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 69.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 73.5 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 74.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 83.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 13 | (4-6) | | | | | |
| % | 68.4 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | (4-6) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | (4-6) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | 0 |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | 0 | (4-6) | (1-3) | (4-6) | (7-9) | 0 |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | 68.4 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 12 | (4-6) | | | |
| % | | | 63.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 278 | 168 | (1-3) | 99.3 | 39.2 | 33.5 | 44.9 | 70.7 |
| I期 | 119 | 37 | 0 | 100.0 | 68.9 | 59.8 | 76.4 | 72.9 |
| II期 | 22 | (7-9) | (1-3) | | | | | 69.2 |
| III期 | 62 | 50 | (1-3) | 98.4 | 18.3 | 9.8 | 29.0 | 69.1 |
| IV期 | 71 | 70 | 0 | 100.0 | 1.4 | 0.1 | 6.7 | 66.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 193 | 85 | 対象数 | | 21 | 257 |
| % | 69.4 | 30.6 | % | | 7.6 | 92.4 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (7-9) | 27 | 81 | 109 | 53 | |
| % | | 9.7 | 29.1 | 39.2 | 19.1 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 119 | 22 | 62 | 71 | (1-3) | (1-3) |
| % | 42.8 | 7.9 | 22.3 | 25.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 141 | 137 | 134 | (1-3) | 0 | |
| % | 50.7 | 49.3 | 48.2 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 40 | 20 | 85 | 133 | | |
| % | 14.4 | 7.2 | 30.6 | 47.8 | | |

300 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 69.4 |
| I期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 64.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 83.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | (7-9) | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | (7-9) | (1-3) | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

301 出水郡医師会広域医療センター
2011年のみ

コメント:

当院は高齢化と核家族化が高度に進んだ地域環境にある。まさに10年先の日本の状況を具現している。高齢化によって、死因に占める原疾患以外による（他病死）の割合が高くなっていると推測される。また病気に対する認識の不足や核家族化による病院へのアクセスの困難さから病院受診の時期が遅くなり、病気の発見時すでに進行した状態にある患者さんが多い。
今後は、住民に対し検診や早期受診の啓蒙を進めて行くことも重要と思われる。

301 出水郡医師会広域医療センター

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 44 | 24 | (1-3) | 97.7 | 44.3 | 29.2 | 58.3 | 74.4 |
| I期 | 25 | (7-9) | (1-3) | | | | | 74.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.7 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 75.2 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 31 | 13 | | | | | |
| % | 70.5 | 29.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 10 | 11 | 19 | | |
| % | | | 22.7 | 25.0 | 43.2 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 25 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | 0 | |
| % | 56.8 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | | |
| % | 36.4 | 63.6 | 63.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 29 | | | |
| % | | | | 65.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 57 | 22 | 0 | 100.0 | 61.4 | 47.5 | 72.6 | 73.3 |
| I期 | 10 | 0 | 0 | | | | | 75.5 |
| II期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 72.9 |
| III期 | 15 | (4-6) | 0 | | | | | 73.7 |
| IV期 | 16 | 14 | 0 | | | | | 72.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 26 | 31 | | | | | |
| % | 45.6 | 54.4 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 12 | 21 | 17 | | |
| % | | | 21.1 | 36.8 | 29.8 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | 15 | 15 | 16 | 0 | (1-3) | |
| % | 17.5 | 26.3 | 26.3 | 28.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 11 | 46 | 45 | (1-3) | 0 | | |
| % | 19.3 | 80.7 | 78.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (4-6) | 45 | | | |
| % | | | | 78.9 | | | |

301 出水郡医師会広域医療センター
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 16 | 15 | 0 | | | | | 76.4 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 84.3 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 66.0 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 83.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 71.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 13 | (1-3) | | | | | |
| % | 81.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (7-9) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (1-3) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | 81.3 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (4-6) | 11 | | | |
| % | | | | 68.8 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 12 | (7-9) | (1-3) | | | | | 77.2 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 81.0 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 79.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | 対象数 | | (1-3) | (7-9) | |
| % | | | % | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (1-3) | (7-9) | | | |
| % | | | | | | | |

301 出水郡医師会広域医療センター
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 69.2 |
| I期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 69.0 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 69.3 |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | (4-6) | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 0 | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

302 社会医療法人 博愛会 相良病院
2011年のみ

コメント:

特になし

302 社会医療法人 博愛会 相良病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | . | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

302 社会医療法人 博愛会 相良病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | . | . | . | | | | | |
| I期 | . | . | . | | | | | |
| II期 | . | . | . | | | | | |
| III期 | . | . | . | | | | | |
| IV期 | . | . | . | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|----|---|
| 対象数 | . | . | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | . | . | . | . | . | . |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | . | . | . | . | . | . |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | . | . | . | . | . | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | . | . | . | . | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 88.0 |
| I期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 0 | (1-3) | 対象数 | | 0 | (1-3) |
| % | | | % | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1-3) | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | |

302 社会医療法人 博愛会 相良病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 492 | 50 | 17 | 96.5 | 89.6 | 86.5 | 92.0 | 58.1 |
| I期 | 222 | (4-6) | (7-9) | 96.8 | 97.2 | 93.9 | 98.7 | 57.6 |
| II期 | 165 | 13 | (4-6) | 97.0 | 91.9 | 86.5 | 95.2 | 58.1 |
| III期 | 83 | 14 | (1-3) | 96.4 | 82.8 | 72.7 | 89.4 | 57.5 |
| IV期 | 19 | 14 | (1-3) | | | | | 64.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 492 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 146 | 129 | 116 | 65 | 36 | | |
| % | 29.7 | 26.2 | 23.6 | 13.2 | 7.3 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 222 | 165 | 83 | 19 | (1-3) | 0 | |
| % | 45.1 | 33.5 | 16.9 | 3.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 39 | 453 | 450 | (1-3) | (1-3) | | |
| % | 7.9 | 92.1 | 91.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 461 | 13 | 13 | (4-6) | | | |
| % | 93.7 | 2.6 | 2.6 | | | | |

303 地方独立行政法人那覇市立病院
2010-2011年2カ年

コメント:

特になし

303 地方独立行政法人那覇市立病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 112 | 49 | (4-6) | 96.4 | 55.6 | 45.8 | 64.3 | 71.8 |
| I期 | 61 | (7-9) | (4-6) | 93.4 | 86.4 | 74.7 | 93.0 | 69.9 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 69.3 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.5 |
| IV期 | 30 | 29 | 0 | 100.0 | 3.3 | 0.3 | 14.5 | 74.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 73 | 39 | | | | | |
| % | 65.2 | 34.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 28 | 35 | 33 | | |
| % | | 10.7 | 25.0 | 31.3 | 29.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 61 | (7-9) | (4-6) | 30 | (1-3) | (4-6) | |
| % | 54.5 | | | 26.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 34 | 78 | 77 | (1-3) | 0 | | |
| % | 30.4 | 69.6 | 68.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 20 | 40 | 41 | | | |
| % | 9.8 | 17.9 | 35.7 | 36.6 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 170 | 67 | (4-6) | 97.6 | 60.2 | 52.4 | 67.2 | 68.7 |
| I期 | 39 | 10 | (1-3) | 97.4 | 74.0 | 57.1 | 85.1 | 69.3 |
| II期 | 55 | 17 | (1-3) | 96.4 | 68.3 | 54.0 | 79.0 | 70.9 |
| III期 | 49 | 15 | (1-3) | 98.0 | 69.4 | 54.5 | 80.3 | 67.4 |
| IV期 | 26 | 25 | 0 | | | | | 69.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|--|
| 対象数 | 102 | 68 | | | | | |
| % | 60.0 | 40.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 11 | 28 | 42 | 59 | 30 | | |
| % | 6.5 | 16.5 | 24.7 | 34.7 | 17.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 39 | 55 | 49 | 26 | 0 | (1-3) | |
| % | 22.9 | 32.4 | 28.8 | 15.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 27 | 143 | 139 | (4-6) | 0 | | |
| % | 15.9 | 84.1 | 81.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 14 | 15 | 44 | 97 | | | |
| % | 8.2 | 8.8 | 25.9 | 57.1 | | | |

303 地方独立行政法人那覇市立病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 38 | 29 | 0 | 100.0 | 23.7 | 11.8 | 37.9 | 67.5 |
| I期 | 17 | 10 | 0 | | | | | 69.9 |
| II期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 64.3 |
| III期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 62.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|---|--|
| 対象数 | 28 | 10 | | | | | | |
| % | 73.7 | 26.3 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 14 | 13 | (1-3) | | | |
| % | | | 36.8 | 34.2 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | (7-9) | 11 | (1-3) | 0 | 0 | |
| | % | 44.7 | | 28.9 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 16 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | | 42.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 31 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | | |
| % | 81.6 | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 34 | (1-3) | | | | |
| % | | | 89.5 | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 100 | 87 | 0 | 100.0 | 13.0 | 7.3 | 20.4 | 74.6 |
| I期 | 20 | (7-9) | 0 | | | | | 72.9 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 79.5 |
| III期 | 27 | 27 | 0 | | | | | 77.8 |
| IV期 | 50 | 49 | 0 | 100.0 | 2.0 | 0.2 | 9.2 | 74.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 77 | 23 | 対象数 | | 15 | 85 |
| % | 77.0 | 23.0 | % | | 15.0 | 85.0 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 19 | 32 | 39 | |
| % | | | 19.0 | 32.0 | 39.0 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 20 | (1-3) | 27 | 50 | 0 | 0 |
| % | 20.0 | | 27.0 | 50.0 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 81 | 19 | 17 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 81.0 | 19.0 | 17.0 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 42 | 45 | | |
| % | | | 42.0 | 45.0 | | |

303 地方独立行政法人那覇市立病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 153 | 16 | (1-3) | 99.3 | 89.5 | 83.4 | 93.4 | 61.3 |
| I期 | 99 | (4-6) | 0 | 100.0 | 95.0 | 88.3 | 97.9 | 62.0 |
| II期 | 34 | 0 | (1-3) | 97.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 |
| III期 | 11 | (1-3) | 0 | | | | | 71.9 |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 57.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|--|
| 対象数 | 0 | 153 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 31 | 32 | 45 | 35 | 10 | | |
| % | 20.3 | 20.9 | 29.4 | 22.9 | 6.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 99 | 34 | 11 | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 64.7 | 22.2 | 7.2 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 143 | 142 | (1-3) | 0 | | |
| % | 6.5 | 93.5 | 92.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 41 | 15 | 13 | 84 | | | |
| % | 26.8 | 9.8 | 8.5 | 54.9 | | | |

沖縄県立中部病院
2010-2011年2力年

コメント:

2010-2011年5年生存率集計 施設別集計値への意見

沖縄県立中部病院は、救急医療、研修医教育、離島医療支援、地域医療支援を主な使命とし、地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院として、地域の中核病院としての役割を担っております。

5年実測生存率を部位別にみると「胃がん」は全国平均61.5%、沖縄県55.7%に対し、当院は46.7%と低い結果となりました。原因として死亡理由のうち、他因死の割合が33.3%と高い事が挙げられ、特に症例の4割を占めるI期での他因死の割合が68.7%と高かった事が影響していると考えられます。

「大腸がん」は全国平均63.5%、沖縄県58.5%に対し、当院は52.3%と低い結果となりました。死亡理由のうち他因死の割合は21.6%で、I期での他因死の割合は62.5%と高く、胃がんと同様に他因死の影響が強いことが考えられます。

「肝がん」は全国平均35.1%、沖縄県20.7%に対し、当院は20.0%と低く、IV期の割合が38.6%と進行例が多かった事が要因の一つと考えられます。

「肺がん」は全国平均36.3%、沖縄県20.7%に対し、当院は15.4%と低く、原因として進行例、70歳以上の高齢者、観血的治療未実施例、及び無治療例の割合が高い事が考えられます。

「乳がん」は全国平均87.9%、沖縄県85.3%に対し、当院は75.5%と低く、原因としてIII期・IV期の割合が高く、観血的治療実施割合が低いことが影響していると考えられます。

当院の特徴として全体的にIV期の割合が高く、観血的治療に至らない患者割合が5大がんのうち肝臓を除く部位で全国平均より高い傾向にあり、特に胃、大腸では原病死以外で死亡している患者の割合が高いことなど、あらゆる疾患に対してレベルの高い医療を提供しているため、連携をとる地域の医療機関から、治療が難しいがん患者の紹介が多いことも生存率が他施設より低いことに関係していると思われます。

これまで、当院ではがん診療の質の向上と共に、地域の皆様に向けて、がん啓発イベントや講演会などを開催してきましたが、院内の取り組みから地域をあげての取り組みへと移り変わるよう、地域の行政機関や近隣の医療機関との連携を深め、地域におけるがん診療の改善はもちろんのこと、一次予防・二次予防についても力をいれていきたいと考えております。

304 沖縄県立中部病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 75 | 40 | 0 | 100.0 | 46.7 | 35.1 | 57.4 | 71.2 |
| I期 | 44 | 16 | 0 | 100.0 | 63.6 | 47.7 | 75.9 | 71.0 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 73.5 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 80.5 |
| IV期 | 18 | 18 | 0 | | | | | 65.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 59 | 16 | | | | | |
| % | 78.7 | 21.3 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | 12 | 13 | 33 | 15 | | |
| % | | 16.0 | 17.3 | 44.0 | 20.0 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 44 | (4-6) | (1-3) | 18 | (1-3) | (1-3) | |
| % | 58.7 | | | 24.0 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 19 | 56 | 51 | (4-6) | 0 | | |
| % | 25.3 | 74.7 | 68.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 29 | 34 | | | |
| % | | | 38.7 | 45.3 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 158 | 75 | (1-3) | 98.7 | 52.3 | 44.2 | 59.7 | 68.9 |
| I期 | 31 | (7-9) | 0 | 100.0 | 74.2 | 55.0 | 86.2 | 68.8 |
| II期 | 36 | 13 | 0 | 100.0 | 63.9 | 46.1 | 77.2 | 73.5 |
| III期 | 42 | 13 | (1-3) | 97.6 | 68.4 | 51.8 | 80.3 | 64.9 |
| IV期 | 41 | 35 | (1-3) | 97.6 | 14.6 | 5.9 | 27.0 | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 94 | 64 | | | | | |
| % | 59.5 | 40.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 30 | 33 | 55 | 31 | | |
| % | | 19.0 | 20.9 | 34.8 | 19.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 31 | 36 | 42 | 41 | (4-6) | (1-3) | |
| % | 19.6 | 22.8 | 26.6 | 25.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 47 | 111 | 105 | (4-6) | 0 | | |
| % | 29.7 | 70.3 | 66.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (7-9) | 52 | 93 | | | |
| % | | | 32.9 | 58.9 | | | |

304 沖縄県立中部病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 55 | 44 | 0 | 100.0 | 20.0 | 10.7 | 31.4 | 71.9 |
| I期 | 17 | (7-9) | 0 | | | | | 68.0 |
| II期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 75.2 |
| III期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 77.8 |
| IV期 | 17 | 17 | 0 | | | | | 74.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|-------|---|
| 対象数 | 37 | 18 | | | | | |
| % | 67.3 | 32.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 18 | 16 | 15 | | |
| % | | | 32.7 | 29.1 | 27.3 | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 17 | 10 | (7-9) | 17 | (1-3) | 0 |
| | % | 30.9 | 18.2 | | 30.9 | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (7-9) | 17 | (7-9) | 19 | (1-3) | 0 |
| | % | | 30.9 | | 34.5 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 41 | 14 | 13 | (1-3) | 0 | | |
| % | 74.5 | 25.5 | 23.6 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 35 | 17 | | | |
| % | | | 63.6 | 30.9 | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 143 | 121 | 0 | 100.0 | 15.4 | 10.0 | 21.8 | 73.5 |
| I期 | 31 | 14 | 0 | 100.0 | 54.8 | 36.0 | 70.3 | 74.7 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 79.0 |
| III期 | 35 | 33 | 0 | 100.0 | 5.7 | 1.0 | 16.7 | 72.5 |
| IV期 | 63 | 63 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 対象数 | 107 | 36 | 対象数 | | 15 | 128 |
| % | 74.8 | 25.2 | % | | 10.5 | 89.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 26 | 59 | 42 | |
| % | | 9.1 | 18.2 | 41.3 | 29.4 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 31 | (4-6) | 35 | 63 | (7-9) | 0 |
| % | 21.7 | | 24.5 | 44.1 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 118 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| % | 82.5 | 17.5 | 17.5 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 13 | 61 | 69 | | |
| % | | 9.1 | 42.7 | 48.3 | | |

304 沖縄県立中部病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 78 | 19 | (1-3) | 98.7 | 75.5 | 64.3 | 83.6 | 64.5 |
| I期 | 36 | (4-6) | 0 | 100.0 | 88.9 | 73.1 | 95.7 | 67.6 |
| II期 | 17 | (1-3) | 0 | | | | | 72.3 |
| III期 | 13 | (4-6) | (1-3) | | | | | 60.7 |
| IV期 | 11 | (7-9) | 0 | | | | | 60.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 78 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 12 | 17 | 15 | 22 | 12 | | |
| % | 15.4 | 21.8 | 19.2 | 28.2 | 15.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 36 | 17 | 13 | 11 | (1-3) | 0 | |
| % | 46.2 | 21.8 | 16.7 | 14.1 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 18 | 60 | 55 | (4-6) | 0 | | |
| % | 23.1 | 76.9 | 70.5 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 15 | (4-6) | 23 | 34 | | | |
| % | 19.2 | | 29.5 | 43.6 | | | |

305 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
2010-2011年2力年

コメント:

「胃がん」の全体の実測生存率61.5%に対して、琉球大学医学部附属病院（以下、琉球大学病院）は60.0%と大きな違いはみられませんでした。

「大腸がん」の全体の実測生存率63.5%に対して、琉球大学病院は63.2%と大きな違いはみられませんでした。

「肝がん」の全体の実測生存率35.1%に対して、琉球大学病院は16.7%と大きく下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージIII期+IV期の割合は全国値29.6%に比べて琉球大学病院53.3%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

「肺がん」の全体の実測生存率36.3%に対して、琉球大学病院は36.8%と大きな違いはみられませんでした。

「乳がん」の全体の実測生存率87.9%に対して、琉球大学病院は77.5%と下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージIV期の割合は全国値5.3%に比べて琉球大学病院12.2%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

今回の結果から、琉球大学病院では、肝がん、乳がんの実測生存率が全国値と比べて低い結果でした。この原因としては、前述した理由だけではないため、合併症の有無、PSの評価など詳細な分析を実施する必要があると考えています。

さらに、患者側の要因だけではなく、診療の質指標（Quality Indicator ; QI）を用いた標準診療実施率の測定など、医療側の評価も必要と考えています。

今回の報告書の内容を琉球大学病院として分析し、生存率の向上をはかっていきたいと考えています。

305 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 70 | 28 | (1-3) | 98.6 | 60.0 | 47.5 | 70.4 | 66.7 |
| I期 | 42 | (4-6) | (1-3) | 97.6 | 85.7 | 70.8 | 93.3 | 67.8 |
| II期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.0 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 76.5 |
| IV期 | 16 | 15 | 0 | | | | | 62.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 42 | 28 | | | | | |
| % | 60.0 | 40.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 10 | 18 | 24 | (7-9) | | |
| % | | 14.3 | 25.7 | 34.3 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 42 | (4-6) | (4-6) | 16 | 0 | (1-3) | |
| % | 60.0 | | | 22.9 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 56 | 54 | 0 | (1-3) | | |
| % | 20.0 | 80.0 | 77.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | 15 | 15 | 29 | | | |
| % | 15.7 | 21.4 | 21.4 | 41.4 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 101 | 37 | (1-3) | 99.0 | 63.2 | 53.0 | 71.8 | 63.8 |
| I期 | 18 | (1-3) | (1-3) | | | | | 67.7 |
| II期 | 30 | 10 | 0 | 100.0 | 66.7 | 46.9 | 80.5 | 62.1 |
| III期 | 30 | (7-9) | 0 | 100.0 | 76.7 | 57.2 | 88.1 | 61.3 |
| IV期 | 22 | 17 | 0 | | | | | 62.3 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 68 | 33 | | | | | |
| % | 67.3 | 32.7 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 13 | 22 | 31 | 25 | 10 | | |
| % | 12.9 | 21.8 | 30.7 | 24.8 | 9.9 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 18 | 30 | 30 | 22 | 0 | (1-3) | |
| % | 17.8 | 29.7 | 29.7 | 21.8 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 14 | 87 | 79 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 13.9 | 86.1 | 78.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | 26 | 59 | | | |
| % | | 11.9 | 25.7 | 58.4 | | | |

305 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 30 | 25 | 0 | 100.0 | 16.7 | 6.1 | 31.8 | 64.0 |
| I期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 63.0 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 77.7 |
| III期 | 10 | (7-9) | 0 | | | | | 76.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 44.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 24 | (4-6) | | | | | | |
| % | 80.0 | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | (4-6) | 14 | (1-3) | | | |
| % | | | | 46.7 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (7-9) | (7-9) | 10 | (4-6) | 0 | 0 | | |
| | % | | 33.3 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (1-3) | 11 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| | % | 36.7 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 17 | 13 | 12 | 0 | (1-3) | | | |
| % | 56.7 | 43.3 | 40.0 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 13 | 14 | | | | |
| % | | | 43.3 | 46.7 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 89 | 56 | (1-3) | 98.9 | 36.8 | 26.9 | 46.8 | 67.9 |
| I期 | 44 | 16 | (1-3) | 97.7 | 63.1 | 46.9 | 75.5 | 70.5 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 71.3 |
| III期 | 15 | 12 | 0 | | | | | 63.9 |
| IV期 | 27 | 26 | 0 | | | | | 65.9 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|--|
| 対象数 | 60 | 29 | | (7-9) | 82 | | | |
| % | 67.4 | 32.6 | | % | 92.1 | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 14 | 20 | 44 | (4-6) | | | |
| % | | 15.7 | 22.5 | 49.4 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | | |
| 対象数 | 44 | (1-3) | 15 | 27 | 0 | 0 | | |
| % | 49.4 | | 16.9 | 30.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | | |
| 対象数 | 51 | 38 | 37 | (1-3) | 0 | | | |
| % | 57.3 | 42.7 | 41.6 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | | |
| 対象数 | (1-3) | 13 | 52 | 23 | | | | |
| % | | 14.6 | 58.4 | 25.8 | | | | |

305 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 49 | 12 | 0 | 100.0 | 75.5 | 60.9 | 85.3 | 61.0 |
| I期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 58.2 |
| II期 | 19 | (1-3) | 0 | | | | | 64.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 58.0 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 59.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 49 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (7-9) | 16 | 13 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | 32.7 | 26.5 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 19 | 19 | (1-3) | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | 38.8 | 38.8 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 13 | 36 | 35 | (1-3) | 0 | | |
| % | 26.5 | 73.5 | 71.4 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | 15 | 26 | | | |
| % | | | 30.6 | 53.1 | | | |

306 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

306 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 42 | 21 | (1-3) | 97.6 | 49.7 | 33.9 | 63.7 | 68.0 |
| I期 | 21 | (4-6) | 0 | | | | | 64.6 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 69.7 |
| III期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 74.7 |
| IV期 | 11 | 11 | 0 | | | | | 70.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 26 | 16 | | | | | |
| % | 61.9 | 38.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 14 | 18 | (1-3) | | |
| % | | | 33.3 | 42.9 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 21 | (1-3) | (4-6) | 11 | (1-3) | 0 | |
| % | 50.0 | | | 26.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 | | |
| % | 23.8 | 76.2 | 76.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 12 | (4-6) | 18 | | | |
| % | | 28.6 | | 42.9 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 104 | 38 | (1-3) | 98.1 | 63.2 | 53.1 | 71.7 | 68.0 |
| I期 | 24 | (1-3) | 0 | | | | | 66.7 |
| II期 | 27 | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.9 |
| III期 | 23 | (4-6) | (1-3) | | | | | 65.7 |
| IV期 | 22 | 21 | 0 | | | | | 68.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 65 | 39 | | | | | |
| % | 62.5 | 37.5 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | 20 | 32 | 33 | 14 | | |
| % | | 19.2 | 30.8 | 31.7 | 13.5 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | 27 | 23 | 22 | (4-6) | (4-6) | |
| % | 23.1 | 26.0 | 22.1 | 21.2 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 21 | 83 | 78 | (4-6) | 0 | | |
| % | 20.2 | 79.8 | 75.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (4-6) | 11 | 30 | 59 | | | |
| % | | 10.6 | 28.8 | 56.7 | | | |

306 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 23 | 17 | (1-3) | | | | | 69.5 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 69.3 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | | | | | 67.3 |
| III期 | 11 | 10 | 0 | | | | | 73.3 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 61.8 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 16 | (7-9) | | | | | |
| % | 69.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (7-9) | 10 | (1-3) | | |
| % | | | | 43.5 | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (4-6) | (4-6) | 11 | (4-6) | 0 | 0 | |
| | % | | 47.8 | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 (4-6) | (1-3) | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 16 | (7-9) | (7-9) | 0 | 0 | | |
| % | 69.6 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 15 | (4-6) | | | |
| % | | | 65.2 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 34 | 21 | 0 | 100.0 | 38.2 | 22.3 | 54.0 | 70.2 |
| I期 | 12 | (4-6) | 0 | | | | | 72.6 |
| II期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 69.0 |
| III期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 73.0 |
| IV期 | 13 | 11 | 0 | | | | | 69.2 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | 27 | (7-9) | 対象数 | | (7-9) | 26 |
| % | 79.4 | | % | | | 76.5 |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 10 | 11 | (7-9) | |
| % | | | 29.4 | 32.4 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 12 | (1-3) | (7-9) | 13 | 0 | (1-3) |
| % | 35.3 | | | 38.2 | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| % | 55.9 | 44.1 | 44.1 | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (4-6) | 16 | 13 | | |
| % | | | 47.1 | 38.2 | | |

306 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | (1-3) | (1-3) | 95.1 | 94.9 | 85.1 | 98.3 | 56.8 |
| I期 | 35 | 0 | (1-3) | 97.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 |
| II期 | 22 | (1-3) | (1-3) | | | | | 62.9 |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 67.0 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 53.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 61 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 21 | 15 | 16 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | 34.4 | 24.6 | 26.2 | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 35 | 22 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 57.4 | 36.1 | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 58 | 58 | 0 | 0 | | |
| % | | 95.1 | 95.1 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 28 | (1-3) | (7-9) | 25 | | | |
| % | 45.9 | | | 41.0 | | | |

307 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
2011年のみ
都道府県推薦病院

コメント:

特になし

307 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 19 | (4-6) | 0 | | | | | 68.2 |
| I期 | 10 | (1-3) | 0 | | | | | 68.6 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 71.3 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 60.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 67.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 13 | (4-6) | | | | | |
| % | 68.4 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 10 | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 52.6 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | | |
| % | | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | 0 | (4-6) | 14 | | | |
| % | | | | 73.7 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 48 | 17 | (1-3) | 97.9 | 64.3 | 49.0 | 76.1 | 68.8 |
| I期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 69.0 |
| II期 | 19 | (4-6) | (1-3) | | | | | 68.9 |
| III期 | 16 | (4-6) | 0 | | | | | 67.4 |
| IV期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 70.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 23 | 25 | | | | | |
| % | 47.9 | 52.1 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 16 | 14 | (7-9) | | |
| % | | | 33.3 | 29.2 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (4-6) | 19 | 16 | (4-6) | (1-3) | 0 | |
| % | | 39.6 | 33.3 | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 46 | 46 | 0 | 0 | | |
| % | | 95.8 | 95.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (4-6) | 38 | | | |
| % | | | | 79.2 | | | |

307 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 72.2 |
| I期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 67.5 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 63.0 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | | | | | |
| % | | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 (1-3) | 0 | (1-3) | 0 | (1-3) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 0 | (1-3) | (1-3) | 0 | (4-6) | 0 | |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | | |
| % | | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | (4-6) | | | |
| % | | | | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 72.0 |
| I期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 71.7 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | | 小細胞 | 非小細胞 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 対象数 | (4-6) | (4-6) | 対象数 | | (1-3) | (7-9) |
| % | | | % | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | |
| % | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | 0 | 0 | 0 | (7-9) | (1-3) | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | 0 | (1-3) | (4-6) | | |
| % | | | | | | |

307 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 26 | (4-6) | 0 | | | | | 64.3 |
| I期 | 12 | (1-3) | 0 | | | | | 63.8 |
| II期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 62.9 |
| III期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 75.5 |
| IV期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 61.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 26 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 12 | (7-9) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | |
| % | 46.2 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | | |
| % | | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 11 | (1-3) | (1-3) | 12 | | | |
| % | 42.3 | | | 46.2 | | | |

社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院

2011年のみ

都道府県推薦病院

コメント:

ハートライフ病院は、沖縄県中南部東海岸の中核病院として、24時間救急医療を行い、地域の医療機関と連携を密にした急性期医療を展開しております。がん診療にも力を入れ、日本がん治療認定医機構の認定研修病院として多くの実績をあげております。

当院は、2011年より都道府県推薦病院として「院内がん登録全国集計」に参加しており、独自に5大がん「胃・大腸・肝臓・肺・乳腺」、食道、前立腺、胆のう胆管、膵臓、白血病、ATL、MDSの実測生存率を算出し、ホームページ内で情報を公開しております。

今回公表されます院内がん登録2010-2011年5年生存率集計で示される実測生存率は、死因に関係なく、すべての死亡を計算に含みますので、年齢や併存疾患等の影響を大きく受けるため、高齢者を多く診療している施設では、低くなる傾向があります。5年生存率は、治療を考える上で重要な指標ではありますが、患者さんの背景、施設の特徴や役割がそれぞれ異なるので、生存率がそのまま、がん治療成績を示すものではありませんので、データを見る際はご注意ください。

尚、当院の集計対象は2011年の1年分となっております。

「胃がん」

性別で見ますと、当院は、男性が多く69.4%を占めており、全国も70.6%とほぼ同様の結果となっております。診断時年齢は、全国同様70歳代が最も多く、次いで60歳代となっております。平均年齢は、全国69.9歳、当院70.2歳であり、ほぼ同様となっております。観血的治療の治癒切除率を比較しますと、全国74.7%、沖縄県73.2%、当院72.2%とほぼ同様の結果であり、標準治療が行われていることが分かります。発見経緯は、全国同様、その他が最も多く、自覚症状を認め来院となった方が多くなっております。

また、実測生存率を比較しますと、全国61.5%、沖縄県55.7%に対し、当院は66.7%と高い生存率となっております。当院は、転移のない早期がんI期の患者さんが最も多く、全体の67%を占めており、生存率が高くなった要因と思われます。

「大腸がん」

わが国における大腸がんの罹患率は、増加傾向にあり、国立がん研究センターの人口動態統計によるがん死亡データによりますと、沖縄県は、2014年に大腸がんによる死亡率は、男性46位、女性47位、男女計46位であることがわかり、現在も深刻な問題となっております。

当院でも大腸がんの症例は多く、2011年院内がん登録456件中、大腸がんは61件と全体の13%を占めております。

性別に見ますと、全国は58%と男性がやや多いのに対し、当院は男女ほぼ同数、診断時年齢は、全国は70歳代が最も多く、次いで60歳代、当院は70歳代が最も多く、次いで80歳代となっており、平均年齢においても、全国69.0歳、当院71.6歳とやや年齢層が高くなっております。発見経緯では全国同様、がん検診、健康診断での発見が少なくその他が最も多く、自覚症状を認め来院となった方が多くなっております。病期別に見ますと、全国はII期26.5%が最も多く、次いでIII期25.4%、I期25.2%、IV期19.6%となっております。当院はII期29.5%が最も多く、次いでI期24.6%、IV期21.3%、III期16.4%となっており全国、当院ともリンパ節転移、遠隔転移のないII期の患者さんの割合が多くなっております。観血的治療の治癒切除率を比較しますと、全国78.2%、沖縄県76.6%、当院73.8%と低くなっております。実測生存率も全国63.5%、沖縄県58.5%に対し当院は、49.2%と低い生存率となっております。理由として、当院は全国に比べ70歳代、80歳代の高齢者が多く、IV期の患者さんの割合が高いことが要因と思われます。

大腸がんは早期に診断、治療が開始できれば根治が可能ながんであり、当院では「大腸がん早期発見プロジェクト」を立ち上げ、入院患者さんに対し、便潜血の無料検査を実施し、大腸がん死亡率低下を目指しております。

「最後に」

当院では、がんの早期診断、早期治療に積極的に取り組んでおり、その一環として、医師、看護師、医療技術職などの専門家による無料の健康講座を開催いたしております。病気に対する基礎知識を学び、ご自身の健康に関心を持って頂くことで、今後も地域住民の検診受診勧奨に努めていきたいと思っております。

308 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院

胃

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 36 | 12 | (1-3) | 97.2 | 66.7 | 48.8 | 79.5 | 70.2 |
| I期 | 24 | (4-6) | 0 | | | | | 70.3 |
| II期 | (1-3) | 0 | 0 | | | | | 71.0 |
| III期 | (1-3) | (1-3) | 0 | | | | | 72.0 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 69.4 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 25 | 11 | | | | | |
| % | 69.4 | 30.6 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 10 | 13 | (4-6) | | |
| % | | | 27.8 | 36.1 | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 24 | (1-3) | (1-3) | (7-9) | 0 | 0 | |
| % | 66.7 | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (4-6) | 30 | 26 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 83.3 | 72.2 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | 0 | (7-9) | 11 | 18 | | | |
| % | | | 30.6 | 50.0 | | | |

大腸

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 61 | 31 | 0 | 100.0 | 49.2 | 36.2 | 60.9 | 71.6 |
| I期 | 15 | (1-3) | 0 | | | | | 72.3 |
| II期 | 18 | 11 | 0 | | | | | 73.8 |
| III期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 69.9 |
| IV期 | 13 | 12 | 0 | | | | | 71.5 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 対象数 | 30 | 31 | | | | | |
| % | 49.2 | 50.8 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 14 | 23 | 15 | | |
| % | | | 23.0 | 37.7 | 24.6 | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | 15 | 18 | 10 | 13 | 0 | (4-6) | |
| % | 24.6 | 29.5 | 16.4 | 21.3 | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (7-9) | 52 | 45 | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | 85.2 | 73.8 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (7-9) | 23 | 28 | | | |
| % | | | 37.7 | 45.9 | | | |

308 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
肝
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 23 | 18 | 0 | | | | | 68.6 |
| I期 | 10 | (4-6) | 0 | | | | | 66.8 |
| II期 | (7-9) | (4-6) | 0 | | | | | 74.1 |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 62.6 |
| IV期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 対象数 | 16 | (7-9) | | | | | |
| % | 69.6 | | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (1-3) | (1-3) | 10 | (7-9) | (1-3) | | |
| % | | | 43.5 | | | | |
| 病期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | 対象数 | 10 | (7-9) | (4-6) | 0 | (1-3) | 0 |
| | % | 43.5 | | | | | |
| 取り扱い規約 | 対象数 | (4-6) | (7-9) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 |
| | % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | 20 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 0 | | |
| % | 87.0 | | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | 11 | (7-9) | | | |
| % | | | 47.8 | | | | |

肺
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 18 | 17 | (1-3) | | | | | 82.6 |
| I期 | (7-9) | (7-9) | 0 | | | | | 82.6 |
| II期 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III期 | (4-6) | (4-6) | 0 | | | | | 79.3 |
| IV期 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | | | | 84.6 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | 部位 | 小細胞 | 非小細胞 | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------|----|
| 対象数 | 17 | (1-3) | | (1-3) | 17 | |
| % | 94.4 | | | | 94.4 | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | 13 | |
| % | | | | | 72.2 | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 |
| 対象数 | (7-9) | 0 | (4-6) | (7-9) | 0 | 0 |
| % | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | |
| 対象数 | 17 | (1-3) | (1-3) | 0 | 0 | |
| % | 94.4 | | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | |
| 対象数 | 0 | (1-3) | 12 | (4-6) | | |
| % | | | 66.7 | | | |

308 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
女性乳房
5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合(%) | 実測生存率 | 95%CI low | 95%CI high | 平均年齢(歳) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|---------|
| 全体 | 23 | (1-3) | 0 | | | | | 63.2 |
| I期 | (7-9) | (1-3) | 0 | | | | | 65.2 |
| II期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 57.8 |
| III期 | (4-6) | 0 | 0 | | | | | 61.0 |
| IV期 | (4-6) | (1-3) | 0 | | | | | 68.0 |

属性別集計対象数

| 性別 | 男性 | 女性 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|
| 対象数 | 0 | 23 | | | | | |
| % | | 100.0 | | | | | |
| 年代 | 50歳未満 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | | |
| 対象数 | (4-6) | (1-3) | (7-9) | (4-6) | (1-3) | | |
| % | | | | | | | |
| UICC TNM分類総合ステージ | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不詳 | 空欄 | |
| 対象数 | (7-9) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | 0 | 0 | |
| % | | | | | | | |
| 観血的治療の実施 | 無 | 有 | 治癒切除 | 非治癒切除 | 別不詳 | | |
| 対象数 | (1-3) | 22 | 17 | (4-6) | 0 | | |
| % | | 95.7 | 73.9 | | | | |
| 発見経緯 | がん検診 | 健康診断 | 他疾患観察中 | その他 | | | |
| 対象数 | (1-3) | (4-6) | (7-9) | (7-9) | | | |
| % | | | | | | | |