

急性骨髄性白血病 化学療法(シタラビン大量療法)基本パス【患者用】

様 歳

担当医:

担当薬剤師:

担当看護師:

	治療前	シタラビン大量療法 1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6~7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13、14日目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20、21日目	22日目	23日目	退院日									
	年 月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月、日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月、日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月、日	月 日	月 日	月 日									
目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>化学療法の必要性を理解した上で、治療の同意をしている</li> <li>治療のスケジュールが理解できる</li> <li>治療の合併症および副作用を理解している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>シタラビン投与による副作用が現れた時、すぐに報告することができる</li> <li>処置を続けなければならないような血圧・酸素飽和度の低下がない</li> <li>身の回りの日常生活が1人できる</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>肝機能値の上昇はあるが、許容範囲である</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>肝機能値の上昇はあるが、許容範囲である</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>肝機能値の上昇はあるが、許容範囲である</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>処置を続けなければならないような血圧・酸素飽和度の低下がない</li> <li>身の回りの日常生活が1人できる</li> <li>重度の発熱性好中球減少(発熱を伴う好中球の減少)がない</li> </ul>					
検査	治療を始めるために、様々な検査(血液検査、心電図、心臓超音波、レントゲン検査等)を行います	血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります		血液検査があります									
治療処置	 <p>中心静脈カテーテルを入れます</p>	<p>点滴</p> <p>【メイン】</p> <p>1. 生理食塩水または維持液 500ml 24時間続けます</p>  <p>【側管】</p> <p>1. アレルギー(吐き気)止め 15分 12時間ごと</p> <p>2. 吐き気止め 15分 12時間ごと</p> <p>3. シタラビン 3時間 12時間ごと</p>						<p>血液データに応じて赤血球輸血、血小板輸血をする場合があります</p> <p>発熱があれば採血を行い、点滴の抗生剤を使用します</p> <p>状況によっては、点滴の追加や変更があります</p> <p>発熱があれば、解熱剤を内服します</p>						<p>不眠時、睡眠導入剤を内服できます</p>						<p>吐き気がある時、吐き気止めの注射をします</p>						<p>点眼薬が6時間毎にあります(治療前日から9日目まで)</p> 					
観察	<ul style="list-style-type: none"> <li>身長・体重</li> <li>体温、血圧、脈拍</li> <li>酸素飽和度</li> <li>便の状態</li> <li>中心静脈カテーテル挿入部位の腫れや痛み、赤みなど</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>体重</li> <li>体温、血圧、脈拍</li> <li>酸素飽和度</li> <li>中心静脈カテーテル挿入部位の腫れや痛み、赤みなど</li> <li>主な副作用</li> <li>吐き気や嘔吐</li> <li>眠気、運動失調(動きのバランスの悪さ)</li> <li>皮膚の発疹</li> <li>眼の炎症症状(赤みやかゆみなど)</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>体温、血圧、脈拍</li> <li>酸素飽和度</li> <li>中心静脈カテーテル挿入部位の腫れや痛み、赤みなど</li> <li>主な副作用</li> <li>立ちくらみ</li> <li>眠気、運動失調(動きのバランスの悪さ)</li> <li>皮膚の発疹</li> <li>出血</li> <li>眼の炎症症状(赤みやかゆみなど)</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>体温、血圧、脈拍</li> <li>酸素飽和度</li> <li>中心静脈カテーテル挿入部位の腫れや痛み、赤みなど</li> <li>主な副作用</li> <li>立ちくらみ</li> <li>眠気、運動失調(動きのバランスの悪さ)</li> <li>皮膚の発疹</li> <li>出血</li> </ul>																	
活動	病院建物内は制限はありません	治療に差し支えない程度はかまいません						 <p>特に制限はありません(病院建物内自由、ただし病状に応じて制限をすることがあります)</p>						特に制限はありません																	
清潔	入浴できます	抗がん剤投与時以外は入浴できます						 <p>入浴できます</p>																							
食事	特に制限はありません							特に制限はありません(状態によっては食事内容を検討します)																							
説明・指導	<p>以下について説明します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>担当医から治療計画について</li> <li>看護師から入院生活について</li> <li>治療パンフレット(治療スケジュールや副作用など)</li> <li>薬について</li> <li>高額医療費について</li> </ul>	<p>以下について説明します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>シタラビンの主要な副作用について</li> <li>症状出現、早期に伝えることの必要性について</li> <li>点滴に注意した日常生活の過ごし方について</li> <li>点眼薬の必要性について</li> <li>感染予防行動(手洗い・うがい等)について</li> <li>発熱性好中球減少症について</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>重大な副作用がなければ退院が可能です</li> <li>退院後の生活や緊急時の対応について説明します</li> </ul>																	