

Ⅲ 地域がん登録による5年生存率の日米比較

International comparison of 5-year survivals from population-based cancer registries

部位別5年相対生存率(%)の日米比較 大阪府がん登録とSEERプログラム

Comparison of 5-year relative survivals by site Osaka Cancer Registry and the SEER Program.

部 位 (ICD-10)	Site	大阪 Osaka	米国 U.S.A.	部 位 (ICD-10)	Site	大阪 Osaka	米国 U.S.A.
全部位 (C00-C96)	All sites	40.6	62.4	乳房(女) (C50)	Breast (females)	79.7	86.4
口腔・咽頭 (C00-C14)	Oral cavity, Pharynx	48.7	57.4	子宮頸 (C53)	Cervix uteri	66.5	72.5
食道 (C15)	Esophagus	18.5	13.2	子宮体 (C54)	Corpus uteri	68.6	84.9
胃 (C16)	Stomach	47.2	21.8	卵巣 (C56)	Ovary	34.9	52.2
結腸 (C18)	Colon	57.6	61.2	前立腺 (C61)	Prostate	52.8	97.2
直腸および肛門 (C19-C21)	Rectum	53.6	61.8	精巣 (C62)	Testis	89.4	95.7
肝および肝内胆管 (C22)	Liver	14.9	5.6	膀胱 (C67)	Urinary bladder	67.3	82.3
胆のうおよび胆外胆管 (C23-C24)	Gallbladder	11.7	15.8	甲状腺 (C73)	Thyroid	84.7	96.0
膵臓 (C25)	Pancreas	4.4	4.2	ホジキン病 (C81)	Hodgkin's disease	42.9	82.8
喉頭 (C32)	Larynx	75.0	64.2	非ホジキンリンパ腫 (C82-C85)	Non-Hodgkin's lymphoma	37.9	53.3
気管・気管支および肺 (C33-C34)	Lung,bronchus	13.0	14.9	白血病 (C91-C95)	Leukemia	27.7	47.1

(注)大阪：1993-95年診断患者 59,227人、5年間の消息不明数は 677人、1.14%

米国：1993-95年診断患者 282,329人、5年間の消息不明数は4,804人、1.70%

Note: Osaka: 59,227 cancer patients diagnosed during 1993-95, lost to follow-up: 677 (1.14%)

USA: 282,329 cancer patients diagnosed during 1993-95, lost to follow-up: 4,804 (1.70%)